HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Вздутие живота, и что с ним делать – часть 2.

Синдром раздражённого кишечника

В 1-й части урока мы разобрали:

I. Физиологические / анатомические причины

1. Аэрофагия (заглатывание воздуха)
2. Замедленное опорожнение желудка (гастропарез), замедленный кишечный транзит (атоничный кишечник)
3. Непроходимость кишечника


II. Пищевые причины и недостаток ферментов

1. Не хватает ферментов поджелудочной железы
2. Избыток или непереносимость фруктозы
3. Целиакия и нецелиакийная чувствительность к глютену
4. Лактозная непереносимость
5. Плохо усваиваиваются FODMAP-продукты

III. Функциональные и нейрогенные расстройства ЖКТ

Синдром раздражённого кишечника (СРК). Висцеральная гиперчувствительность.

СРК – хр. функциональное расстройство ЖКТ, при котором нарушается работа толстой кишки без видимых органических причин.




Основные **симптомы:**

- вздутие живота, особенно во 2-й половине дня
- вздутие на большое количество клетчатки: сырые овощи, зелень, листовые салаты, сырые фрукты
- боли по ходу толстой кишки, уменьшающиеся после дефекации. Ночных болей нет
- запоры, диарея или чередование этих состояний
- слизь в стуле (крови и гноя при этом нет)
- чувство неполного опорожнения кишечника



HOLISTICA DOC

Боль может возникнуть в любом месте кишечника – легко спутать с другими проблемами в ЖКТ.



HOLISTICA DOC

Важно!

При СРК отсутствуют эрозии, язвы, опухоли или другие видимые нарушения структуры кишечника. СРК не рассматривается как фактор развития онкологии кишечника или аутоиммунных заболеваний ЖКТ.

Но! СРК может идти в комплексе с другими заболеваниями ЖКТ.



СРК относят к нейрогенным расстройствам (особенности работы нервной системы).

В основе – висцеральная гиперчувствительность: рецепторы нервных клеток кишечника избыточно сильно воспринимают сигналы перистальтической волны кишечника и растяжения кишечника при прохождении пищевого комка и газов. Снижен порог восприятия боли. Нормальное движение и растяжение кишечника воспринимается как болезненное.

Особенность длительного течения СРК: количество и тяжесть жалоб не соответствуют данным обследований (по анализам всё может быть ок, а жалоб – очень много).

Причины и факторы риска:

- особенности работы нервной системы, формирующие повышенную чувствительность кишечника
- тревожное расстройство, депрессия, ипохондрия (состояние субъективно переживается тяжело)
- стресс (при нём симптомы усиливаются)
- дисбиоз толстой кишки (как результат инфекций кишечника, нарушений питания и др.) и развитие субклинического воспаления слизистой толстой кишки
- непереносимость FODMAP-продуктов
- гормональные колебания (у женщин – часто усиление симптомов в период менструаций)

Диагностика СРК

Исключаем органические патологии
и воспаление: УЗИ ОБП, анализ кала на скрытую кровь и кальпротектин. Как дополнение – ФГДС и колоноскопия.



Диагностика СРК

Анализы крови на:

- маркеры воспаления (СРБ чувствительный, СОЭ)
- анемию


Если СРК с диареей:

- для исключения целиакции – антитела к тканевой трансглутаминазе, антитела к эндомизию
- для исключения антибиотико-ассоциированной диареи и псевдомембранозного колита – кал на токсины *Clostridium difficile (A и B)*
- для исключения СИБР – водородно-дыхательный тест

Наблюдаем за тем, что ухудшает состояние при СРК:

- грубая клетчатка без термической обработки в большом количестве: сырые листовые овощи, зелень, проростки круп и бобовых, капуста, редис, редька
- FODMAP-продукты, особенно группа олигосахаридов (чеснок, лук, спаржа, чечевица, нут и другие бобовые) и полиолов (грибы, болгарский перец, сельдерей и пр.)
- фрукты и ягоды с грубой шкуркой: яблоки, груши, айва, крыжовник и др.
- смузи и соки
- холодная вода и напитки
- избыток орехов, семечек





Точно нужно к врачу, если есть:

- ночные боли
- потеря веса
- кровь в стуле
- возраст старше 50 лет с появлением новых симптомов

База: питание и ЗОЖ при СРК

Образ жизни

Дневник еды и самочувствия, чтобы отследить связь симптомов, приёмов пищи и эмоционального состояния (1–2 недели).

Не носить одежду, пережимающую живот.

Сон: вовремя, в достаточном количестве.

Стресс-менеджмент и снижение тревожности:

- дыхательные упражнения, медитация, когнитивно-поведенческая терапия (КПТ)
- умеренная физическая активность: ходьба, пилатес, йога. Регулярность важнее интенсивности – хотя бы 30 мин в день
- простые травы для уменьшения тревожности: ромашка, тимьян, мелисса, мята перечная, валериана – пить в течение дня

База: питание и ЗОЖ при СРК

Образ жизни

Тепловые процедуры:

- прогревание живота грелкой / камнями (вялый и чувствительный тип пищеварения)
- тёплые ванночки для ног перед сном (воспалённый тип пищеварения, если нет противопоказаний)



База: питание и ЗОЖ при СРК

Питание

Полноценный, сбалансированный по питательным веществам **рацион.**

Регулярные приёмы пищи – 4–5 раз в день, без переедания, но и без голода.

Есть спокойно, медленно, пережёвывая тщательно.

Акцент на тёплую / горячую, приготовленную пищу и напитки.

Основа рациона – супы и бульоны. При чувствительном и вялом пищеварении можно делать крепкие бульоны, при воспалённом – сливать первый бульон.

Легкоусвояемый белок – в соответствии с вашим протоколом.

База: питание и ЗОЖ при СРК

Питание

Жиры:

- нерафинированные растительные масла с хорошим индексом омега 3-6-9 (льняное, оливковое, кедровое)
- кокосовое молоко, кокосовое масло (лауриновая и каприловая кислоты)
- гхи



Ради пробы можно на время исключить FODMAP-продукты, возможно не все, а частично.

(Фаза 0, дневник питания 1–2 недели)

Полноценная термическая обработка каш, овощей (особенно капустных).

Овощи: начать с пропорции 90 % приготовленных, 10 % сырых. Постепенно можно пробовать переходить на 70 / 30. Сырые овощи присоединять к супам / бульонам.

На время исключить грубую клетчатку: сырые листовые овощи и капуста, проростки, шкурка яблок, груш.



HOLISTICA DOC



Фрукты и ягоды с высоким содержанием фруктозы и сорбитола – термическая обработка. С умеренным или низким количеством – используем в разумных количествах: абрикос, персик, малина, нектарин, цитрусовые. Сочетаем фрукты с горячим напитком.

При ограничении бобовых, круп, овощей, фруктов – добавить источники мягкой клетчатки в рацион: псиллиум, чиа, льняной кисель, «Оптифайбер» (экстракт плодов циамопсиса) и др.

Пробиотические продукты со штаммами бактерий

Saccharomyces boulardii, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophilus:

- йогурты и другие к/м продукты
- ферментированные напитки
- овощи (при хорошей переносимости)
- мисо





HOLISTICA DOC








Специи: зира, тмин, чёрный тмин, фенхель, кориандр, бадьян, орегано – добавлять в пищу и напитки.



HOLISTICA DOC

Травы и нутрицевтики

Медикаментозная терапия СРК. В клинических протоколах используются:

- спазмолитики
- пробиотики
- слабительные или антидиарейные
- антидепрессанты в малых дозах — при выраженном болевом синдроме или тревоге



Мята перечная листья

Активные вещества: ментол, ментон, цинеол.

- Лечение синдрома раздражённого кишечника (СРК): эффективно снижает симптомы СРК, включая боль в животе и вздутие (метаанализ)
- Спазмолитическое действие: расслабляет гладкую мускулатуру ЖКТ
- Улучшение симптомов диспепсии
- Антимикробное действие

Как использовать?

- Чай с добавлением мяты и ромашки
- Мятное масло в капсулах
- Аптечные успокаивающие сборы с мятой в составе

Мята перечная листья





«Фитоседан № 2»: валериана, хмель, мята, пустырник, солодка.

«Успокаивающий сбор № 2»: валериана, листья мяты перечной, хмель, листья мать-и-мачехи, солодка.

Не использовать эти сборы при гипертонии и женских гормонозависимых заболеваниях.

Мята – осторожно при ГЭРБ (может расслаблять нижний пищеводный сфинктер).

Чай против вздутия

- зира (кумин) – 10 г
- семена фенхеля (или укропа) – 10 г
- кориандр – 10 г

Действие: специи в составе чая являются спазмолитиками, противовоспалительными, а также мягко усиливают пищеварение. Дополнительный эффект: проходят отёки :)





Чай против вздутия

Все компоненты смешиваются в равных долях и НЕ перемалываются.

Вы берёте 1 чайную ложку смеси зёрен без горки и завариваете их в термосе на 500 мл (залейте семена горячей кипячёной водой и дайте настояться 10 минут). Если у вас маленькая термокружка на 300 мл, вам нужно взять !половину! чайной ложки смеси семян.

Пьёте этот чай в течение дня в тёплом виде по 100–200 мл между приёмами пищи.





Пробиотики

Клинически значимые штаммы пробиотических бактерий при СРК:

- *Saccharomyces boulardii*
- *Bifidobacterium infantis*
- *Bifidobacterium longum*
- *Bifidobacterium bifidum*
- *Lactobacillus plantarum*
- *Lactobacillus rhamnosus*
- *Lactobacillus acidophilus*

Что делают: уменьшают боль, вздутие, улучшают перистальтику, нормализуют стул, снижают воспаление. *B. longum* и *L. rhamnosus* – «психобиотики» (влияют на ось кишечник – мозг).

При покупке пробиотиков читайте состав: если есть лактоза, ФОС, ГОС, МОС (разные типы олигосахаридов), инулин – может быть реакция ЖКТ на FODMAP-продукты.


Пробиотики


ЭНТЕРОСТИМ
Enterostim
10 капсул
Enterostim
ЭНТЕРОСТИМ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНА ДОБАВКА КЪМ ХРАНИТЕ. НЕ ЗАМЕСТВА ЛЕКАРСТВО
КОМПОНЕНТЫ КОМПЛЕКСА СПОСОБСТВУЮТ:
СНИЖЕНИЮ АКТИВНОСТИ ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ
ПОВЫШЕНИЮ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ ФУНКЦИИ
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СИМПТОМОВ ДИАРЕИ
ВОССТАНОВЛЕНИЮ МИКРОФЛОРЫ
Saccharomyces boulardii
5 млрд КОЕ
полезных бактерий в каждой капсуле
10 капсул
с 1 года
GMO Free
Vegan


Seeking Health
ProBiota HistaminX
Histamine-friendly probiotics that support a healthy gut, skin and immune system.*
DIETARY SUPPLEMENT


#1 DOCTOR RECOMMENDED BRAND*
align
PROBIOTIC
5X EXTRA STRENGTH*
5X MORE GOOD BACTERIA^
24/7 DIGESTIVE SUPPORT™
Naturally helps promote and support a healthy digestive system*
PROBIOTIC SUPPLEMENT
21 CAPSULES


NutriCology
Restore-Biotic®
SACCHAROMYCES BOULARDII
Friendly Probiotic Yeast
3
DIETARY SUPPLEMENT
120 vegetarian capsules


ULTRA POTENCY
CUSTOM PROBIOTICS
D-LACTATE FREE
PROBIOTIC POWDER
DAIRY FREE
250 Billion cfu's per gram
Keep refrigerated to retain maximum potency


HYPOALLERGENIC | GLUTEN-FREE
KIRKMAN®
SACCHAROMYCES BOULARDII
Probiotic yeast that supports intestinal flora*
DIETARY SUPPLEMENT


THORNE
Sacro-B
DIETARY SUPPLEMENT

Магний

Снижает мышечные спазмы кишечника

→ расслабляет гладкую мускулатуру ЖКТ, может уменьшать боль и вздутие.

Снимает стресс и тревожность

→ многие пациенты с СРК страдают от тревожных расстройств, а магний участвует в регуляции ГАМК (нейромедиатора расслабления).

При СРК лучше использовать не магниевые воды (сульфат магния), а магний хелат (бисглицинат).

Приём в дозировке 200–400 мг вечером, после ужина или перед сном.

При склонности к гипотонии – начать с дозировки 200 мг.

Бутират (масляная кислота)

Одна из важнейших короткоцепочечных жирных кислот (КЦЖК) для здоровья ЖКТ, особенно для толстой кишки. Продукт ферментации пищевых волокон (клетчатки) бактериями кишечника.

- Поддерживает рост полезных бактерий. Является индикатором «здорового» микробиома — чем больше бутирата, тем выше микробиотическая устойчивость
- При язвенном колите и синдроме раздражённого кишечника (СРК) у пациентов часто наблюдается сниженный уровень бутирата в кишечнике
- Применение масляной кислоты даёт: снижение симптомов СРК, ускорение заживления слизистой при воспалении, нормализацию стула при диарее и запорах, вызванных дисбиозом

Бутират (масляная кислота)

Стимуляция синтеза масляной кислоты через питание: спаржа, бобовые, перловка, овсянка, яблоки, охлаждённый рис / картофель. Многие из этих продуктов – FODMAP!





Как сделать дома **йогурт на закваске**

(подходит для тех, кто нормально переносит молочные продукты хотя бы частично)

500 мл животного молока (козье или коровье) доведите до кипения и остудите до +/- 40 °С. Перелейте молоко в банку, растворите в нём пакетик закваски и хорошо перемешайте.

Поставьте банку в тёплое место (к батарее, в тёплую духовку) на 14–16 часов (летом дело идет быстрее). Ваш йогурт готов!



HOLISTICA DOC



Если за условный вечер и ночь йогурт не сквасился, не переживайте, просто дайте ему ещё несколько часов постоять в тепле и не бойтесь, что он «перестоит» — это ему не навредит.

К вечеру точно получите йогурт :)

Йогурт хранится в холодильнике 5–7 дней. Если делать его регулярно, можно сквашивать молоко частью предыдущего йогурта.

Люди с частичной переносимостью лактозы могут съедать до 100 мл йогурта в тёплом виде.

HOLISTICA DOC