HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Нарушение перистальтики кишечника: запоры

Запоры – нарушение функции кишечника, при котором возникает редкий, затруднённый или неполный акт дефекации, часто сопровождающийся дискомфортом, вздутием, ощущением неполного опорожнения.

Что считается **нормой стула:**

- ежедневный
- 1–2 раза в сутки, один из этих раз – утром вскоре после просыпания (реакция на то, что мы встаём с постели) или после завтрака (гастроколический рефлекс)
- сформированный
- достаточного объёма, нормального цвета (не белёсый, не чёрный)
- не липнет


Что считается **запором**?

- Стул не каждый день (через день, 1–2 раза в неделю)
- Тип 1–2 по Бристольской шкале
- Напряжение при дефекации
- Ощущение неполного опорожнения, отхождение небольшого количества стула



БРИСТОЛЬСКАЯ ШКАЛА СТУЛА

Разработана доком Кеном У. Хитоном из Бристольского университета (Великобритания) и впервые опубликована в 1997 г. в «Скандинавском журнале гастроэнтерологии»

	Отдельные жёсткие куски, похожие на орехи, проходят с трудом	ЭТО ЗАПОР
	Колбасовидное комковатое	ТОЖЕ ЗАПОР, но мягче
	Как колбаска с ребристой поверхностью	ВСЕ НОРМ
	В форме колбаски или змеи, мягкое и гладкое	ВСЕ НОРМ
	В виде мягких маленьких шариков с ровной поверхностью	КАЖЕТСЯ, НАЧИНАЕТСЯ ДИАРЕЯ
	Мягкое с рваными краями	ДИАРЕЯ
	Жидкое без твердых частиц	ТЯЖЕЛАЯ ДИАРЕЯ

HOLISTICA DOC


Виды запоров по механизму формирования

Вид	Причины
Алиментарный (диетический)	Недостаток клетчатки и жидкости. Диеты с высоким содержанием белка, фастфуд, мало воды
Гипокинетический	Недостаток движения: постельный режим, сидячая работа
Психогенный	Тревожные расстройства, стресс. «Запор путешественника»
Медикаментозный	Побочный эффект лекарств: антациды, ИПП, антибиотики, антидепрессанты, препараты железа, кальция, мочегонные и др.
Эндокринный	Гипотиреоз, диабет
Механический	Нарушение проходимости кишечника: спайки, грыжи


По клиническому типу:

- атонический запор
- спастический запор
- смешанный тип

Слабая перистальтика. Стул 1–2 раза в неделю, обильный, плотный. Ноющая распирающая боль в правом боку.



HOLISTICA DOC



Сильный тонус кишечника. Стул через день, «овечий». Ощущение неполного опорожнения. Коликообразные боли, как правило, в левом боку и слева внизу живота.


Когда к врачу:

- нет стула > 7 дней, сильная боль в животе
- рвота, кровь в кале

HOLISTICA DOC

Коррекция запоров

- Жидкость
- Привычки и движение
- Клетчатка
- Хороший отток желчи
- Нормальная микрофлора кишечника



Жидкость

Около 2–3 литров
в день, включая:

- всю воду (тёплую кипячёную, со специями, минеральную и пр.)
- супы и бульоны
- морсы, компоты, настой шиповника, травяные чаи



Магниевая вода: слабительный эффект за счёт осмотического действия солей магния, которые притягивают воду в просвет кишечника и стимулируют его перистальтику.



- Donat Mg
- Stelmas Mg
- Лысогорская
- Mg Mivela

Как пить: 200–250 мл воды в день, натощак или в промежутках между приёмами пищи. Подогретую и с выпущенным газом. Курс – 2 недели.

Нельзя при:

- СРК с диареей
- воспалительных заболеваниях ЖКТ (ЯК, болезнь Крона в обострении)
- гиперкинетическом желчном пузыре

Бульоны (куриный, говяжий, бараний и т. д.): слабительный эффект за счёт комплексного действия:



- жиры стимулируют желчеотток
- аминокислоты активизируют рецепторы слизистой ЖКТ, усиливая сокращения кишечника
- соли: слабый осмотический раствор
- тёплая жидкость стимулирует рефлекс желудок–кишечник
- тепло – спазмолитический эффект

Как пить: 1–3 кружки горячего бульона в день, можно за 10–20 минут до каждого крупного приёма пищи.

Привычки и движение

Физическая активность: минимум 30 минут в день ходьбы или другой умеренной физической активности.

Упражнения на расслабление или тонизацию ЖКТ (в зависимости от типа пищеварения).

Раньше вставать – 06:00–07:00.

Утренний ритуал: стакан тёплой воды после подъёма с постели.

Привычка к стулу в утренние часы.



Клетчатка

**Женщины – не менее 25 г в сутки,
мужчины – не менее 35 г в сутки.**

Женщины	Мужчины
Гречка отварная 150 г = 5,5 г клетчатки	Гречка отварная 200 г = 7,3 г клетчатки
Чечевица отварная 150 г = 11,8 г клетчатки	Чечевица отварная 200 г = 15,7 г клетчатки
Салат с листьями салата, зеленью, томатом, авокадо 200–250 г = 6–6,5 г клетчатки	Салат с листьями салата, зеленью, томатом, авокадо 200–250 г = 6–6,5 г клетчатки
Смесь приготовленных овощей 150 г = 4 г клетчатки	Смесь приготовленных овощей 250 г = 6,6 г клетчатки

Клетчатка

**Женщины – не менее 25 г в сутки,
мужчины – не менее 35 г в сутки**

Женщины	Мужчины
Фрукт средний (яблоко / груша) или ягоды 100 г = 5 г клетчатки	2 средних фрукта (яблоко / груша) или ягоды 200 г = 10 г клетчатки
Итого: 33 г клетчатки (плюс овощи в супах, свежие овощи / зелень к каждому крупному приёму пищи)	Итого: 46 г клетчатки (плюс овощи в супах, свежие овощи / зелень к каждому крупному приёму пищи)



При ограничении бобовых, круп, овощей, фруктов – добавить источники мягкой клетчатки в рацион: псиллиум, чиа, льняной кисель, «Оптифайбер» (экстракт плодов циамопсиса) и др.

Избегать очищенных от клетчатки продуктов: манка, шлифованный рис, мучные изделия и макароны из муки тонкого помола.



Топ-20 продуктов по содержанию клетчатки:

Продукт (бобовые и крупы)	Количество клетчатки на 100 г
Фасоль красная (варёная)	8,7
Чечевица (варёная)	7,9
Нут (варёный)	7,6
Перловка отварная	6,5
Овсянка долгой варки отварная	6,3
Ячка отварная	5,9
Булгур отварной	4,5
Гречка отварная	3,7
Зелёный маш	3

Продукт (овощи и зелень)	Количество клетчатки на 100 г
Авокадо	6,7
Листовая капуста (кейл)	4,1
Брюссельская капуста отварная	4
Брокколи отварная	3,8
Капуста белокочанная сырая	2,9
Свёкла отварная	2,8
Морковь	2,7
Зелёная фасоль стручковая	2,7
Шпинат отварной	2,4
Батат печёный	2,3
Цветная капуста отварная	2

Продукт (овощи и зелень)	Количество клетчатки на 100 г
Тыква запечённая	2
Зелень разная: петрушка, укроп, кинза	2–3,5
Салат (различные сорта)	1,2–2,2



Продукт (фрукты и ягоды)	Количество клетчатки на 100 г
Инжир сушёный	9,8
Чернослив	7,1
Курага	7
Малина	6,5
Ежевика	5,3
Смородина чёрная	4,8
Груша (с кожурой)	3,1
Яблоко (с кожурой)	2,8

Отток желчи

1. Жиры, среднее количество – 60 г в день: любые масла (оливковое, льняное, сливочное и др.), авокадо, животный жир, орехи и семечки, также облепиховое масло, лецитин
2. Горькие травы (руккола и другие виды садовой зелени) и напитки (какао, цикорий, напиток с корнем одуванчика)
3. Бульоны
4. Тёплая кипяченая вода
5. Специи: фенхель, зира, тмин, кориандр, имбирь, гвоздика



Пробиотические продукты

- простокваша
- ряженка
- йогурт без добавок
- кефир
- квашеная капуста, кимчи и другие квашеные овощи
- комбуча, водный кефир
- мисо



Пробиотические продукты

Сколько есть? В идеале – каждый день что-то ферментированное!

Кисломолочные продукты и ферментированные напитки: 3–5 раз в неделю по 200 мл.

Ферментированные овощи: 2–3 столовые ложки 3 раза в неделю.

Мисо, натто – 2 столовые ложки 1–2 раза в неделю.

Чтобы дать кишечнику адаптироваться, увеличивайте объём **постепенно**!

Ограничение: FODMAP, непереносимость лактозы.



Кратко: топ продуктов и трав против запоров

- Бульоны
- 1 стакан тёплой минеральной воды
- Горькие травы (артишок, расторопша, аптечные шведские горечи и пр.)
- Горькие напитки: цикорий, пуэр и пр.
- Масла
- Клетчатка: овощи / крупа / бобовые / фрукт / ягоды – в каждый приём пищи
- Овощи и фрукты: свёкла, тыква, лук, шпинат, ревень, груши, персики, киви, сливы, чернослив, морская капуста
- Кисломолочные продукты или ферментированные овощи / напитки