HOLISTICA DOC

ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Вздутие живота, и что с ним делать – часть 3. Синдром избыточного бактериального роста

В 1-й и 2-й частях урока мы разобрали такие причины вздутия, как:

1. Аэрофагия
2. Замедленное опорожнение желудка, замедленный кишечный транзит
3. Непроходимость кишечника
4. Дефицит ферментов поджелудочной железы
5. Избыток или непереносимость фруктозы
6. Целиакия и нецелиакийная чувствительность к глютену
7. Лактозная непереносимость
8. Реакция на FODMAP-продукты
9. Синдром раздражённого кишечника (СРК)

IV. Микробиологические причины: избыточный бактериальный рост в тонкой кишке




Синдром избыточного бактериального роста (СИБР): увеличение в тонкой кишке бактерий, представляющих нормальную микрофлору кишечника, или патогенных микроорганизмов.

Избыточные бактерии в тонкой кишке:

- ферментируют углеводы → выделяют газы (водород, метан, H_2S)
- нарушают пищеварение и всасывание питательных веществ
- вызывают воспаление и повреждают слизистую

В норме в тонкой кишке значительно меньше бактерий, чем в толстой. Она защищена от избыточного бактериального роста с помощью:

- кислой среды желудка
- желчи
- ферментов поджелудочной железы
- моторики кишечника
- иммунных механизмов – секреции IgA



Причины СИБР

- **Снижение кислотности желудочного сока:** приём ИПП, хр. стресс, нарушения в питании и т. д.
- **Снижение моторики желудка и кишечника:** атрофический гастрит, гипотиреоз, малоподвижный образ жизни, регулярное переедание, малое содержание клетчатки в рационе и др.
- **Нарушение оттока или концентрации желчи:** сладж, дискинезия желчевыводящих путей, камни желчного пузыря / удалённый желчный пузырь




Причины СИБР

- **Недостаток ферментов поджелудочной железы:** хр. воспаление, естественное снижение секреции ферментов с возрастом
- **Хр. воспалительные заболевания ЖКТ:** дуоденит, колит, энтероколит, аутоиммунные заболевания ЖКТ
- **Операции на ЖКТ**
- **Избыток сахаров** в рационе
- **Частый приём антибиотиков**



СИБР: отличительные признаки от других проблем с ЖКТ



- Вздутие, урчание и метеоризм через 30–90 минут после еды
- Непереносимость ферментированных продуктов: ферментированные овощи, кисломолочные продукты, комбуча, мисо и др.
- Непереносимость пробиотиков
- При СИБР с активным воспалением – боли в тонкой кишке: вокруг пупка, при нажатии на зону тонкой кишки
- При приёме антибиотиков становится лучше

Другие признаки СИБР

- Плотный белый налёт на языке
- Запах изо рта
- Повышен B12 в анализах
- Реакция на FODMAP-продукты: вздутие, боли в животе, нарушение стула
- Диарея, запор или их чередование
- Непереваренная пища в стуле
- В копрограмме: йодофильная флора, дрожжевые грибы, а также признаки нарушения работы различных отделов ЖКТ – мышечные волокна, мыла и др.
- Хр. кандидоз (пищевод, кишечник, вагинальный и т. д.), частые мочеполовые инфекции

Другие признаки СИБР

- **Признаки дефицитов питательных веществ:** хр. усталость, потеря веса, выпадают волосы, низкие белок и железо по анализам
- При активном воспалении могут быть **повышены СОЭ, СРБ чувствительный, ферритин**



СИБР часто соседствует с СРК, так как дисбиоз + воспаление в кишечнике → висцеральная гиперчувствительность. Поэтому может быть реакция на грубую клетчатку, шкурку фруктов и овощей, вздутие может усиливаться к вечеру, тревожность, ипохондрия, депрессия и др. признаки СРК.

Диагностика СИБР – водородно-дыхательный тест



Исключаем органические патологии и воспаление:

- УЗИ ОБП
- анализ кала на скрытую кровь и кальпротектин
- маркеры воспаления в анализе крови: СРБ чувствительный, СОЭ

Коррекция СИБР

Стандарт лечения СИБР – антибиотики. Когда они действительно нужны:

- выражены признаки СИБР: сильное вздутие, метеоризм, частая диарея, плохая переносимость FODMAP и другие жалобы на пищеварение
- есть воспаление в кишечнике: выраженный болевой синдром, повышены маркеры воспаления в анализах
- потеря веса
- мальадсорбция: дефициты питательных веществ по анализам

Если признаков «тяжёлого СИБР» нет, можно пробовать без них.

Но без устранения первопричин – даже с приёмом антибиотиков высока вероятность рецидива или частичного эффекта терапии.

Усиливаем перевариваю способность и моторику желудка

База – в ваших уроках «Еда: какая делает мне хуже, а какая лучше?» и «Правила еды: лайфхаки и кулинарные приёмы, чтобы переваривать пищу лучше».

Базовые правила:

- питьевой режим – тёплая вода и напитки, избегать холодных напитков и пищи
- регулярное питание – 4–5 раз в день
- не есть «на бегу», всухомятку или в стрессе
- не переедать
- ежедневное движение
- соблюдение режима сна: минимум 7–8 часов и пр.



Специи-прокинетики в соответствии с протоколом

- имбирь
- корица
- душистый перец
- куркума
- зира
- тмин обыкновенный
- фенхель
- розмарин
- тимьян
- чеснок



Фитосоставы

- На основе граната и длинного перца – для **вялого** пищеварения
- На основе кориандра – для **воспалённого** пищеварения
- На основе костуса или кальцита – для **чувствительного** пищеварения







Прогревания желудка
(вялое и чувствительное пищеварение)

Устраняем застой желчи

(или поддерживаем концентрацию желчи, если желчный удалён)



- Базовые правила здорового питания для вашего типа пищеварения
- Тёплое питьё
- Источники жиров и лецитина: масла, яйца, тофу, авокадо
- Овощи с желчегонным эффектом: тыква (особенно запечённая), свёкла (тушёная или варёная), морковь, брокколи, цветная капуста, садовая зелень и салаты (руккола, укроп, петрушка, одуванчик и др.)

Устраняем застой желчи

(или поддерживаем концентрацию желчи, если желчный удалён)

- Немного кислого и жгучего вкусов в пище (кроме противовоспалительного протокола)
- Бульоны
- Умеренная физическая нагрузка, упражнения на тонизацию / расслабление живота
- Избегать длительного сидения и тесной одежды
- Тёплая минеральная вода (вялое пищеварение)



Специи-спазмолитики

- зелёный кардамон
- гвоздика
- кориандр
- зира
- тмин обыкновенный
- чёрный тмин
- фенхель
- бадьян
- тимьян
- лавровый лист
- сафлор
- мускатный орех
- лемонграсс
- кафирский лайм
- мята перечная



Специи-холеретики

- имбирь
- гвоздика
- пажитник
- паприка
- куркума
- розмарин
- длинный перец
- сафлор
- чеснок



Травы и фитосоставы

- Трифала
- артишок и другие горечи
- полынь, пижма
- сок лопуха



Прогревания правого подреберья (вялое и чувствительное пищеварение)

Поддержка поджелудочной

- Отказ от тяжелых сочетаний продуктов
- База в питании и ЗОЖ – как для поддержки кислотности желудка и желчеоттока
- Особое внимание – на меры для хорошего переваривания белка и жиров (урок «Правила еды: лайфхаки и кулинарные приёмы, чтобы переваривать пищу лучше»)



Специи-ферменты

- корица
- душистый перец
- куркума
- кориандр
- зира
- тмин обыкновенный

Фитосоставы

- Отвар чёрного кардамона
- Кардамон-4 (для вялого пищеварения)

FODMAP-элиминация на 4–8 недель
(частичная или полная – зависит от степени интенсивности СИБР и реакции на FODMAP-продукты)

Натуральная **антимикробная** терапия

Обычно диеты + поддержки желчеоттока, кислотности и поджелудочной железы – достаточно.

Если нет – добавляем «тяжёлую артиллерию»: антимикробную и противоплёночную терапию.

Меры далее можно использовать в полном объёме ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСТРАНЕНИЯ ВОСПАЛЕНИЯ в ЖКТ (если оно у вас есть).

Сначала 2 месяца работаем над выводом воспаления и заживлением слизистой, затем – добавляем активные инструменты на выбор.



- **Чеснок:** бактерицидная активность против широкого спектра микрофлоры
- **Масло орегано:** подавляет бактерии, грибки и простейших – *Candida, E. coli, Klebsiella*
- **Экстракт грейпфрутовых косточек (GSE):** in vitro активность против 800+ штаммов бактерий и 100+ грибков
- **Берберин:** широкий спектр активности против бактерий, в том числе грамотрицательных, клиническая эффективность при СИБР + СРК
- **Масло чёрного тмина:** подавляет рост *Helicobacter pylori* и других патогенов
- **Ним (Azadirachta indica):** антибактериальное и антипаразитарное действие

HOLISTICA DOC

Исследование: «Herbal therapy is equivalent to rifaximin for the treatment of small intestinal bacterial overgrowth» (Global Advances in Health and Medicine), Gurevich & Friedman, 2014.

104 пациента с положительным водородным дыхательным тестом:

- **группа 1:** натуральная терапия (орегано, чеснок, берберин, полынь)
- **группа 2:** рифаксимин (антибиотик)
- **результат:** улучшение симптомов и нормализация анализов:
  - 46 % в фитогруппе
  - 34 % в антибиотикгруппе
  - + меньше побочных эффектов в группе натуральных средств



HOLISTICA DOC

Как можно **использовать**?

- **Орегано как специю** – добавлять в пищу при любом типе пищеварения (при воспалённом – умеренно)
- **Чёрный тмин** – добавлять в пищу при вялом и чувствительном типах пищеварения
- **Чеснок** – добавлять в пищу при вялом (и – умеренно – при чувствительном) типе пищеварения





Используем 1 средство на выбор!

- **Масло орегано** в капсулах:
  1–2 капсулы в день после еды
- **Чесночный экстракт**:
  1 капсула в день после еды
- **Масло чёрного тмина**:
  1/2–1 ч. л. × 2 раза/день
  в промежутках между
  приёмами пищи
  (осторожно – снижает
  давление!)
- **Экстракт косточек грейпфрута:**
  10–15 капель × 3 раза/день
- **Берберин:**
  500 мг × 2 раза/день
- **Ним:** 250–500 мг в день



HOLISTICA DOC

Разрушение биоплёнок бактерий

Специи: куркума, имбирь, чеснок, корица – использовать в пищу.






Используем 1 средство на выбор!

- **Отвар или экстракт гранатовых корок**
  - 1 ст. л. **сушёных дроблёных корок граната** варить 2 минуты в 200 мл горячей кипячёной воды, настоять 15–20 минут, пить в тёплом виде по 100 мл 2 раза в день. Осторожно: закрепляет стул!
  - либо 250–500 мг экстракта в день
- **«Вобэнзим»** (аптечный ферментный комплекс): 1 капсула 2 раза в день за 1 час до еды
- **Каприловая кислота** в капсулах: 500–1000 мг × 2–3 раза/день за 1 час до еды
- **Монолаурин** (лауриновая кислота): 500–1000 мг × 2–3 раза/день за 1 час до еды
- **NAC** (АЦЦ – N-ацетилцистеин): по инструкции производителя, 600–1200 мг/день

Возможная схема использования антимикробных средств

Неделя	Добавки на выбор
1	Любое из противоплёночных решений (отвар корок граната / «Вобэнзим» / монолаурин и пр.) Сорбент – любой на выбор из вашего протокола 1–2 раза в день между приёмами пищи и вечером
2-3	Любое из противоплёночных решений Сорбент Любое из натуральных антимикробных решений

Возможная схема использования антимикробных средств

Неделя	Добавки на выбор
4-6	Любое из противоплёночных решений: можно заменить на альтернативное Любое из натуральных антимикробных решений: можно заменить на альтернативное Пробиотик (см. урок «Вздутие ч. 2»)
7-9	Любое из натуральных антимикробных решений Пробиотик