HOLISTICA DOC


ШКОЛА ПРАКТИЧЕСКОЙ НУТРИЦИОЛОГИИ

Учебно-практическая программа

ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ ЖКТ



Поддержка здоровья ЖКТ при удалённом желчном пузыре



Желчный пузырь служит для концентрации «молодой» желчи, поступающей из печени. В желчном пузыре желчь концентрируется в +/-6 раз и становится «зрелой».

После удаления желчного пузыря:

1. **Снижается захват желчных кислот. Желчь не концентрирована, желчных кислот недостаточно. Биологические функции желчи не выполняются в полной мере**

   Ферментопатия: снижение секреции пищеварительных ферментов, обрабатывающих пищу в тонкой кишке. Нарушение всасывания жирных кислот и жирорастворимых витаминов.

1. **Потенциально – развитие СИБР (синдром избыточного бактериального роста)**

   Снижение бактерицидных функций желчи, рост патогенной микрофлоры.

1. **Дисрегуляция сфинктера Одди (временная либо постоянная)**

   Либо спазм. Либо зияние.

HOLISTICA DOC

После удаления желчного пузыря:

4. **При спазме: задержка желчи в протоках**


   Распирание в правом подреберье. Запоры.

4. **При зиянии: подтекание желчи в двенадцатиперстную кишку**

   Раздражение слизистой двенадцатиперстной кишки. Формирование локального хронического воспаления. Диарея. Нарушение защитного слоя энтероцитов и их нормальной работы: синдром повышенной кишечной проницаемости.

4. **Возможен заброс желчи в желудок**

   Тошнота. Горечь во рту. Пища в желудке переваривается хуже.



Симптомокомплекс после удаления желчного пузыря:

- слабое пищеварение
- частое вздутие и метеоризм
- слабые боли и ощущение жжения в области пупка
- нарушение стула
- сухость кожи и слизистых
- горечь во рту





Питание и ЗОЖ после удаления желчного пузыря

Задачи поддержки здоровья:

1. Поддержка пищеварения. Восполнение пищеварительных ферментов при ферментопатии (специи, травы)
2. Восполнение желчных кислот
3. Профилактика повторного образования камней, поддержка желчеоттока
4. Восстановление нормальной нервной регуляции работы сфинктера желчевыводящей протоки
5. Адсорбция подтекающей в кишечник желчи
6. При подтекании в двенадцатиперстную кишку и при забросе желчи в желудок – защита слизистых

Питание и ЗОЖ после удаления желчного пузыря

Задачи поддержки здоровья:

7. Ликвидация хронического воспалительного процесса в кишечнике
8. Нормализация микрофлоры кишечника
9. Регуляция стула



Питание

1. Полноценное питание, содержащее все группы продуктов
2. Поддержка работы ЖКТ: меню, сочетания продуктов, специи и т. д.
3. Иметь в рационе продукты, заживляющие кишечник: бульоны (не костные, умеренной крепости и жирности), масла и жиры (без излишков, но обязательно), лёгкие виды белка (тофу, рыба, белое мясо птицы и т. д.)





Питание

4. Дробное питание – не обязательно!

   Часто 6-разовое и более питание успокаивает слабые боли в кишечнике. При устранении воспалительного процесса при подтекании желчи в кишечник можно питаться 3–4 раза в день.

4. Поддержка микрофлоры (при отсутствии симптоматики СИБР): продукты-пробиотики (кисломолочное, ферментированные овощи и напитки)

Питание

6. Нейтрализация излишков желчи с помощью клетчатки. В рационе каждый день должны быть:
   - овощи – не менее 400–500 г (сырые + приготовленные; оптимально – минимум в 2 приёма пищи)
   - цельные злаки и бобовые (не менее, чем в 1 приём пищи)
   - продукты с высоким содержанием пектина (не менее, чем в 1 приём пищи: свёкла, морковь, тыква, яблоки, слива, груши)



HOLISTICA DOC

Фито- и аптечные препараты. Вариант А

Если есть воспаление в желудке и двенадцатиперстной кишке (хр. гастрит, дуоденит, эрозии) с выраженной симптоматикой (боли, жжение, изжога, горечь во рту) – сначала заживляем слизистую.
См. противовоспалительные и заживляющие меры в других уроках – фитосоставы, травы, чаи (обволакивающие, «слизи», прокинетики, противовоспалительные).

Далее переходим к варианту Б.



Вариант Б

1. Восполнение желчных кислот. УДХК или препараты с бычьей желчью (Ox bile): подбирает и назначает врач. Обычно – короткими курсами в течение года.







HOLISTICA DOC

Вариант Б

2. Адсорбция желчи клетчаткой. Если в рационе не хватает клетчатки, возможен дополнительный приём мягкой клетчатки: псиллиум, чиа, семя льна, «Оптифайбер» и др. (см. урок «Готовим ЖКТ к работе»). Принимать короткими курсами по 2–3 недели в течение года.





Вариант Б

3. Противовоспалительные для кишечника.

   Для поддержки слизистой тонкой кишки: отвар Иролтуева или Трифалы 1–2 раза в день по 100–200 мл в тёплом виде в промежутках между приёмами пищи. Курсами по 25–30 дней, несколько раз в год.





Вариант Б

4. Профилактика образования камней в протоках: лецитин / эссенциальные фосфолипиды.





Вариант Б

5. При отсутствии СИБР: про-/метабиотики «Хилак форте», «Актофлор-С», «Бактистатин», «Стимбифид» и пр.



HOLISTICA DOC

Поддерживающая схема для ЖКТ при удалённом желчном

Утром во время завтрака	Костус-6
За завтраком	Лецитин / эссенциальные фосфолипиды
Между завтраком и обедом	Отвар Иролтуева / Трифала
Между обедом и ужином	(опционально) Клетчатка
Через время после ужина	Про-/метабиотики
На ночь	УДХК или препарат с желчью

Курс всех мер – 3–4 недели. В течение года можно делать 4–5 таких курсов.