

Le modèle d'Ising

January 26, 2016

Contents

I.	Introduction	2
II.	Représentation en courant aléatoire	3

I. Introduction

Modèle introduit par Lenz en 1920. On considère un graphe $G := (V_G, E_G)$. A chaque sommet de $v \in V_G$ on associe une valeur $\sigma_v \in \{-1, 1\}$. L'énergie d'une telle configuration est alors donnée par:

$$H_G(\sigma) = - \sum_{(x,y) \in E_G} \sigma_x \sigma_y$$

soit deux fois le nombre de sommets voisins qui ne sont pas "alignés". Pour $(x, y) \in E_G$, on notera $x \sim y$.

Définition 1 La mesure de probabilité du modèle d'Ising sur le graphe G à température inverse β est définie par:

$$\langle X \rangle_{G,\beta}^f = \frac{1}{Z_{(G,\beta)}^f} \sum_{\sigma \in \{\pm 1\}^{V_G}} X(\sigma) \exp(-\beta H_G(\sigma))$$

où X est une fonction $\{\pm 1\}^{V_G} \rightarrow \mathbb{R}$ et où $Z_{(G,\beta)}^f = \sum_{\sigma \in \{\pm 1\}^{V_G}} e^{-\beta H_G(\sigma)}$ est appelée fonction de partition du modèle.

Remarques:

- la mesure est invariante par inversement de tous les signes: "symétrie"
- on voudrait travailler sur de plus grands graphes, \mathbb{Z}^d par exemple

On considère maintenant $G \subset \mathbb{Z}^d$ et on définit la frontière ∂G de G par:

$$\partial G = \{x \in V_G | \exists y \in \mathbb{Z}^d \setminus G, y \sim x\}$$

Pour rompre la symétrie, on "plonge" G dans un monde + en définissant le nouvel Hamiltonien:

$$H_G(\sigma)^+ = - \sum_{x \sim y} \sigma_x \sigma_y - \sum_{x \in \partial G} \sigma_x$$

On pose maintenant $\Lambda_n = [-n, n]^d$ et on définit la magnétisation spontanée:

$$m(\beta) = \inf_{n \in \mathbb{N}} \langle \sigma_0 \rangle_{\Lambda_n, \beta}^+$$

Définition 2 On définit la température inverse critique $\beta_c^{(d)} = \inf\{\beta > 0 | m(\beta) > 0\}$

Ising a montré que $\beta_c^{(1)} = +\infty$ puis Peirls montre que $\forall d \geq 2, \beta_c^{(d)} \in]0, +\infty[$.

Questions

1. $\beta_c^{(d)} = 0$?

2. $m(\beta_c^{(d)}) = 0$?
3. $\lim_{\beta \downarrow \beta_c} m(\beta)$?
4. comportement de $m(\beta)$ autour de β_c ?
5. vitesse de décroissance en n de $\langle \sigma_0 \rangle_{\Lambda_n, \beta}^+$?
6. universalité?

Théorème 1 (Kramers - Wanier) $\beta_c(2) = \frac{1}{2} \log(1 + \sqrt{2})$

Pour $d \geq 3$ on n'a pas de formule explicite pour $\beta_c(d)$.

Théorème 2 (Aizenman - Barsky - Fernandez (1980))

$$\forall \beta < \beta_c, \langle \sigma_0 \rangle_{\Lambda_n, \beta}^+ \leq e^{-cn}$$

où $c > 0$ est une constante dépendant de β .

Conjecture: $m(\beta) = (\beta - \beta_c)^{\bar{\beta} + o(1)}$ quand $\beta \downarrow \beta_c$, avec

$$\bar{\beta} = \begin{cases} 1/8 & \text{si } d = 2 \text{ (prouvé)} \\ ? & \text{si } d = 3 \\ 1/2 & \text{si } d \geq 4 \text{ (prouvé)} \end{cases}$$

Pour $d = 3$, $m(\beta_c) = 0$ (Aizenman, DC, 2015).

Conjecture: $\langle \sigma_0 \rangle_{\Lambda_n, \beta_c}^+ = \frac{1}{n^{\alpha_1 + o(1)}}$

$$\alpha_1 = \begin{cases} 1/8 & \text{si } d = 2 \\ ? & \text{si } d = 3 \\ (d-2)/2 & \text{si } d \geq 4 \end{cases}$$

La corrélation (ici entre l'origine et la frontière) décroît donc à vitesse $n^{-\alpha_1}$ où n est la distance entre l'origine et la frontière.

Au lieu de faire tendre les limites du graphe vers l'infini, on peut aussi faire tendre la maille du réseau vers 0. On se donne Ω un ouvert de \mathbb{R}^d . On se donne le graphe $\Omega_\delta = \Omega \cap \delta \mathbb{Z}^d$. Pour $x \in \Omega$, on pose x^δ un point de Ω_δ très proche de x . On définit pour $x_1, \dots, x_k \in \Omega$:

$$\langle \sigma_{x_1} \dots \sigma_{x_k} \rangle_\Omega = \lim_{\delta \downarrow 0} \frac{\langle \sigma_{x_1^\delta} \dots \sigma_{x_k^\delta} \rangle_{\Omega_\delta}}{\delta^{k\alpha_1}}$$

Universalité: Universalité signifie que les résultats restent valables si on transforme le graphe. Ceci est encore une question très ouverte. On a une relation entre un nombre pair de spins et deux spins par le théorème suivant:

Théorème 3 (Aizenman)

$$\langle \sigma_{x_1} \dots \sigma_{x_{2k}} \rangle = \sum_{\pi \text{ pairing}} \langle \sigma_{x_{\pi(1)}} \sigma_{x_{\pi(2)}} \rangle \dots \langle \sigma_{x_{\pi(2k-1)}} \sigma_{x_{\pi(2k)}} \rangle$$

On considère une transformation conforme ϕ dans \mathbb{R}^2 (holomorphe et bijective) entre Ω et $\phi(\Omega)$, on a le résultat pour l'universalité:

Théorème 4 (Chelkak-Hongler-Izyurov)

$$\langle \sigma_{x_1} \dots \sigma_{x_k} \rangle_{\Omega} = |\phi'(x_1)|^{\frac{1}{8}} \dots |\phi'(x_k)|^{\frac{1}{8}} \langle \sigma_{\phi(x_1)} \dots \sigma_{\phi(x_k)} \rangle_{\phi(\Omega)}$$

II. Représentation en courant aléatoire

But: Obtenir/étudier une représentation géométrique du modèle d'Ising

Définition 3 (Courant) *Un courant sur G est une application:*

$$\begin{aligned} n : E_G &\rightarrow \mathbb{N} \\ xy &\mapsto n_{xy} \end{aligned}$$

Etant donné un courant n , on définit l'ensemble ∂n , l'ensemble des sources de n , par:

$$\partial n = \left\{ x \in V_G \mid \sum_{y \sim x} n_{xy} \text{ impair} \right\}$$

On définit le poids de n par:

$$w_{\beta}(n) = \prod_{x \sim y} \frac{\beta^{n_{xy}}}{n_{xy}!}$$

Pour $A \subset V_G$ on définit une probabilité sur l'ensemble des chemins par:

$$P_{\beta}^A(n) \propto \begin{cases} 0 & \text{si } \partial n \neq A \\ w_{\beta}(n) & \text{si } \partial n = A \end{cases}$$

Cette probabilité ne met du poids que sur les chemins dont les sources sont exactement A . Soit $A \subset V_G$, on définit:

$$Z_{G,\beta}^f(A) \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{\sigma \in \{\pm 1\}^{V_G}} \left(\prod_{x \in A} \sigma_x \right) e^{-\beta H_G(\sigma)}$$

or

$$\exp(-\beta H_G(\sigma)) = \prod_{x \sim y} \exp(\beta \sigma_x \sigma_y) = \prod_{x \sim y} \sum_{n_{xy}=0}^{+\infty} \frac{(\beta \sigma_x \sigma_y)^{n_{xy}}}{n_{xy}!}$$

d'où:

$$Z_{G,\beta}^f(A) = \sum_{n \text{ courant}} \left(\prod_{x \sim y} \frac{\beta^{n_{xy}}}{n_{xy}!} \right) \left(\sum_{\sigma \in \{\pm 1\}^{V_G}} \prod_{x \in V_G} \sigma_x^{\sum_{y \sim x} n_{xy} + \delta_{x \in A}} \right)$$

Beaucoup de termes de la somme principale sont nuls. Si n est un courant tel que $\partial n \neq A$, alors le produit $\prod_{x \in V_G} \sigma_x^{\sum_{y \sim x} n_{xy} + \delta_{x \in A}}$ contient un terme σ_x élevé à une puissance impaire. Cela implique que la somme de ces produits pour $\sigma \in \{\pm 1\}^{V_G}$ s'annule.

Il ne reste donc que:

Proposition 1

$$Z_{G,\beta}^f(A) = 2^{|V_G|} \sum_{\partial n = A} w_\beta(n)$$

On en déduit $\langle \prod_{x \in A} \sigma_x \rangle_{G,\beta}^f$, la constante de normalisation étant obtenue pour $A = \emptyset$:

$$\langle \prod_{x \in A} \sigma_x \rangle_{G,\beta}^f = \frac{\sum_{\partial n = A} w_\beta(n)}{\sum_{\partial n = \emptyset} w_\beta(n)}$$

Proposition 2 (Première inégalité de Griffiths)

$$\forall A \subset V_G, \langle \prod_{x \in A} \sigma_x \rangle_{G,\beta}^f \geq 0$$

Cas de l'environnement +: Travailler avec le Hamiltonien H_G^+ revient rajouter un sommet fantôme g à G et le relier à tous les sommets de ∂G . Si on impose $\sigma_g = +1$, le Hamiltonien est exactement H_G^+ . On peut alors refaire le même calcul de $Z_{G,\beta}^+(A)$, pour le graphe G^g auquel on a rajouté g . On a alors:

$$Z_{G,\beta}^+(A) = 2^{|V_G|} \sum_{\partial n \cap V_G = A} w_\beta(n)$$

Décomposition d'un courant: On peut décomposer un courant en boucles et en chemins reliant deux sources. Etant donné un courant sans sources on peut construire un chemin sur G partant d'un sommet x de "degré" $\sum_{y \sim x} n_{xy}$ non nul (et pair) en se déplaçant sur une arête xy telle que $n_{xy} > 0$. On retire 1 à cette arête et on continue le chemin à partir de y (ce qui est forcément possible vu que y a maintenant un degré impair). L'opération se termine lorsque l'on revient en x . On décompose donc un courant sans sources en boucles. Si le courant a des boucles, on construit de la même façon des chemins qui partent des sources (et terminent donc sur ces sources), jusqu'à ce que le courant n'aie plus de sources. On le décompose alors en boucles. On va interpréter ces chemins en termes de marches aléatoires sur G ...