

유기화학 논문·반응 정리집

Klein 유기화학 1~23장 인용 문헌 · 기출 출제 경향 · 노벨상 연계

I. 기출 출제 경향 분석 (2014~2026학년도 유기화학 66문항)

1. 영역별 출제 빈도

카보닐 α -탄소-축합 반응	14
분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS)	13
방향족 치환·다이아조늄 화학	12
입체화학·형태 분석	10
작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	9
고리화 첨가·자리옮김·방향족성	6
유기 산·염기	2

영역	2014-2017	2018-2021	2022-2026	2점	4점	합계	중요도
카보닐 α -탄소-축합 반응	4	3	7	3	11	14	★★★
분광학적 구조 결정(IR·NMR·MS)	4	4	5	13	0	13	★★★★
방향족 치환·다이아조늄 화학	3	3	6	3	9	12	★★★★
입체화학·형태 분석	4	2	4	6	4	10	★★★★
작용기 변환·친핵성 반응 메커니즘	3	5	1	5	4	9	★★
고리화 첨가·자리옮김·방향족성	2	2	2	2	4	6	★★
유기 산·염기	0	1	1	2	0	2	★

· 2점(기입형)은 분광 구조 결정과 짧은 입체화학, 4점(서술형)은 카보닐 축합·방향족 다단계 합성 + 굵은 화살표 메커니즘이 주류이다.
· 최근(2022~2026) 경향: ① 다단계 합성에서 중간체 분자식 제시 → 구조 추론, ② 고리 형성 단계(Robinson, Dieckmann, 분자 내 알돌, Claisen 자리옮김) 메커니즘 요구, ③ 입체특이성(Wittig→에폭사화, 동역학적 분할·ee), ④ 방향족성·FMO와 결합한 고리화 첨가.

2. 핵심 반응 우선순위 (출제 빈도·최신성 기준)

순위	핵심 반응/개념	대표 기출
1	엔올레이트 축합: 알돌·Claisen·Dieckmann·Michael·Robinson 고리 형성, 말론산/아세토아세트산 에스터 합성, 탈카복실화	2026A-11, 2025A-11, 2024B-7, 2023A-10, 2023B-7, 2022B-9
2	방향족: EAS 배향·속도, SNAr(Meisenheimer), 벤자민, 다이아조늄(Sandmeyer, 짝지음, 페놀화), Hofmann 자리옮김	2026A-10, 2025A-10, 2024A-10/11, 2023A-2, 2022B-8
3	분광: IR 카보닐·OH, ^1H NMR 이동·갈라짐·J, ^{13}C /DEPT, MS 동위원소·McLafferty	매년 1~2문항
4	입체화학: anti/syn 첨가 → meso/라셈, E2 trans-diaxial, 에폭사이드 열림, 동역학적 분할·ee, A값	2026A-1, 2024B-2, 2023B-2, 2021B-8, 2017A-13
5	고리화 첨가·자리옮김: Diels-Alder(endo, 위치), Claisen/Cope, 방향족성(Hückel)	2025B-7, 2024A-11, 2020B-7, 2019B-4, 2022A-2
6	작용기 변환: Grignard/큐프레이트(1,2 vs 1,4), 알카인 수화, 라디칼 첨가, 아실 치환 메커니즘(^18O), 인접기 관여	2026B-7, 2021B-9, 2020B-8, 2017A-4

3. 노벨 화학상과 유기화학 출제 포인트

연도	수상자	주제	임용 연계 포인트
2025	Kitagawa · Robson · Yaghi	금속-유기 골격체 (MOF)	배위 결합 기반 다공성 골격 — 착화합물·무기 영역과 연계
2022	Bertozzi · Meldal · Sharpless	클릭 화학·생체직교 화학	CuAAC(1,4-트라이아졸), 변형 촉진 SPAAC, 알카인 꼬리표 아미노산
2021	List · MacMillan	비대칭 유기촉매	프롤린 엔아민 촉매(알돌·Robinson/Hajos-Parrish), 이미늄 촉매 Diels-Alder, ee 계산
2010	Heck · Negishi · Suzuki	Pd 촉매 교차 짝지음	산화적 첨가-금속 교환-환원적 제거, 아릴 할라이드·다이하조늄 활용
2005	Chauvin · Grubbs · Schrock	올레핀 복분해	금속 카벤, 고리 닫음 복분해(RCM)
2001	Knowles · Noyori · Sharpless	키랄 촉매 수소화·산화	Sharpless 비대칭 에폭시화(DET), BINAP-Ru 수소화
1994	Olah	탄소 양이온 화학	초강산·초친전자체, 탄소 양이온 자리옮김
1990	Corey	역합성 분석	합성 설계(실패), 보호기 전략
1981	Fukui · Hoffmann	프런티어 오비탈·궤도 대칭	HOMO-LUMO, Diels-Alder 위치/endo 선택성, 전자고리화
1979	Brown · Wittig	수소화불소화 · Wittig 반응	anti-Markovnikov syn 첨가, oxaphosphetane, 알켄 기하
1969	Barton · Hassel	형태 분석	의자 형태·A값·축/적도 반응성(E2 trans-diaxial)
1950	Diels · Alder	Diels-Alder 반응	[4+2] 협동 고리화 첨가, endo 규칙
1912	Grignard · Sabatier	Grignard 시약 · 촉매 수소화	탄소 친핵체의 카보닐 첨가

II. 교재(Klein 유기화학) 인용 논문 · 반응 정리 — 총 233편

각 장 끝 「참고문헌」에 실린 논문과, 그 논문을 소재로 한 도전·종합 문제의 반응을 정리했다. 중요도는 인용 출처 관점(★★★ 빈출 핵심)이다. 구조식은 RDKit으로 생성·검증하였다.

장	제목	논문 수	★★★
1장	일반화학 복습하기	9	0
2장	분자 표현법	14	0
3장	산과 염기	11	6
4장	알케인과 사이클로알케인	9	0
5장	입체이성질현상	9	2
6장	화학반응성과 메커니즘	10	3
7장	치환 반응	12	7
8장	알켄: 구조 및 제거 반응을 이용한 제법	8	4
9장	알켄의 첨가 반응	10	8
10장	알카인	10	3
11장	라디칼 반응	10	3
12장	합성	10	8
13장	알코올과 페놀	10	3
14장	에터와 에폭사이드; 싸이올과 설파이드	11	3
15장	적외선 분광법과 질량 분석법	10	2
16장	핵자기공명 분광법	7	1
17장	콘쥬게이션 파이계와 페리고리 협동반응	10	4
18장	방향족 화합물	10	3
19장	방향족 치환반응	10	3
20장	알데하이드와 케톤	12	4
21장	카복실산과 그 유도체	10	4
22장	알파 탄소 화학: 엔올과 엔올 음이온	11	3
23장	아민	10	3

제1장 일반화학 복습하기

- 원자 오비탈·전자 배치: Aufbau, Pauli 배타 원리, Hund 규칙
- 원자가 결합 이론(σ 결합 = 결합축 위 겹침)과 분자 오비탈 이론 (LCAO, HOMO/LUMO)
- 혼성화: sp^3 (정사면체 109.5°) $\rightarrow$ sp^2 (평면 삼각 120° , $\sigma+\pi$) $\rightarrow$ sp (선형 180° , $\sigma+2\pi$)
- VSEPR: 입체수 = σ 결합 수 + 비공유 전자쌍 수 $\rightarrow$ 분자 기하 예측
- 결합·분자 쌍극자 모멘트(벡터 합)와 극성
- 분자 간 힘: 쌍극자-쌍극자 < 수소 결합, London 분산력(표면적 $\uparrow$ $\rightarrow$ 끓는점 $\uparrow$, 가지 $\uparrow$ $\rightarrow$ 끓는점 $\downarrow$)
- 용해도: 끼리끼리 녹는다, 비누 = 양친매성 $\rightarrow$ 마이셀


문제 1.68 · tert-butyl isocyanide $\rightarrow$ isocyanide dichloride

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 4536–4537

반응 tert-뷰틸 아이소사이아나이드(A, $R-N^+ \equiv C^-$) $\rightarrow$ (Cl_2) $\rightarrow$ 아이소사이아나이드 이염화물(B, $R-N=CCl_2$)로 바뀌 아이소나이트릴 반응성을 일시적으로 차폐

개념 혼성화·결합각: A의 N·C는 sp (C-N-C 약 180° , C 비공유쌍은 sp 오비탈), B의 N·C는 sp^2 (약 120° 보다 약간 작음)




문제 1.69 · dihydromyrcene (3,7-dimethylocta-1,6-diene)

중요도 ★☆☆☆

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 1123–1125

반응 두 π 결합 중 입체 장애가 적은 말단 일치환 C=C에 선택적 시약이 먼저 반응

개념 입체 장애: 삼치환 C=C가 더 혼잡 $\rightarrow$ 반응 느림(입체 장애 $\neq$ 입체수)




문제 1.71 · [^{18}F]fluoroethylcholine (PET 추적자)

중요도 ★☆☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2003, 44, 9165–9167

반응 $^{18}F-CH_2CH_2Br + Me_2NCH_2CH_2OH \rightarrow$ (N-알킬화, SN_2) $\rightarrow$ 4차 암모늄 브로민화물

개념 헤테로원자 혼성화(F, Br, N 모두 sp^3), C-N-C 약 109.5°




문제 1.72 · epichlorohydrin + phenol → phenyl glycidyl ether

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron* 2006, 62, 10968–10979

반응 에피클로로하이드린 + 페놀, NaOH, 가열 → 클로로하이드린 3 + 페닐 글리시딜 에터 4; 가열(증류) 시 쉽게 분리

개념 수소 결합과 끓는점: O-H 있는 3이 끓는점 훨씬 높음



문제 1.73 · phenalamide A2 (보론산 에스터 중간체)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 1713–1715

반응 Phenalamide A2 전합성에 쓰인 알릴 피나콜 보로네이트의 구조 분석

개념 B는 sp^2 (빈 p 오비탈), 예상 O-B-O 120° 지만 5원 고리 때문에 약 110°


문제 1.74 · benzonitrile oxide (옥사졸리디논 합성)

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 1099–1113

반응 하이드록시모일 염화물 $PhC(Cl)=NOH \rightarrow (-HCl) \rightarrow$ 나이트릴 옥사이드 $PhC\equiv N^+-O^-$

개념 형식 전하(N +1, O -1), 극성 용매 용해도, C-C-N 결합각 $120^\circ \rightarrow 180^\circ$



문제 1.75 · estradiol 17 α -엔아인-알렌 유도체 (유방암 치료 후보)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2001, 42, 8579–8582

반응 에스트라다이올 C17에 $C\equiv C-CH=CH-CH=C=CH_2$ 사슬을 단 화합물의 알렌 부분 구조 분석

개념 알렌: 말단 C sp^2 , 중앙 C $sp(180^\circ)$, 두 π 결합(및 말단 치환기 평면)이 서로 수직


문제 1.76 · Boc-Leu-NH-iPr (효소 모방 폴다머)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2001, 3, 3843–3846

반응 Boc 카바메이트 C=O와 아이소프로필아마이드 N-H가 가까이 위치

개념 분자 내 수소 결합(7원 고리, γ -turn)




문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8833–8838

반응 COOH 결합 자리(A)는 페놀·아닐린 모두 결합, 피리딘 결합 자리(B)는 비스페놀 A만 강하게 결합

개념 수소 결합 주개/받개 상보성: 피리딘 N(받개 전용)은 더 산성인 페놀 O-H와 선택적으로 결합

노벨상 1987 (Cram·Lehn·Pedersen, 초분자·호스트-게스트 화학)



비스페놀 A

제2장 분자 표현법

- Lewis 구조 → 부분 축약·축약 구조 → 선-결합 구조(C, H 생략)
- 작용기가 반응성을 결정, 형식 전하와 숨은 비공유 전자쌍 찾기
- 쇄기/점선, Fischer-Haworth 투영으로 3차원 표현
- 공명: 굵은 화살표 규칙(단일 결합 끊지 않기, 2주기 원소 옥텟 초과 금지)
- 공명 5유형: 알릴 비공유쌍, 알릴 양이온, C⁺ 옆 비공유쌍, 전기 음성도 다른 원자 간 π 결합, 고리 내 콘쥬게이션 π
- 기여도 규칙: 옥텟 충족 > 형식 전하 최소 > 음전하는 전기음성 원자에
- 비편재 비공유쌍은 p 오비탈(원자 sp²), 아마이드 C-N 회전 제한

문제 (본문 인용)

중요도 ★☆☆

문헌 *Org. Biomol. Chem.* 2015, 13, 7813–7821
반응 각주 1: 연습 문제에서 표시를 찾지 못함(본문 인용으로 추정)
개념

문제 2.68 · (+)-dragmacidin D (해면 알칼로이드)


중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2015, 17, 1529–1532
반응 2-아미노이미다졸륨 양이온의 전하 비편재화
개념 구아니디늄형 공명: + 전하가 세 N에 분산, 공명 혼성체(δ^+)

문제 2.69 · CL-20 / HMX 공결정 (고에너지 물질)

중요도 ★☆☆

문헌 *Cryst. Growth Des.* 2012, 12, 4311–4314
반응 CL-20 : HMX = 2 : 1 공결정, 분자식 계산과 고리 N 비공유쌍 분석
개념 나이트라민 N-NO₂ 공명: 고리 N 비공유쌍은 비편재(sp², 평면)



HMX

문제 2.70 · progesterone (W. S. Johnson 생체모방 폴리엔 고리화)


중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1971, 93, 4332–4334
반응 폴리엔 고리화 중간체의 1,3-다이옥솔란-2-일륨(옥소카베늄) 양이온 안정성
개념 양이온 옆 산소 비공유쌍 공명(옥소카베늄), 모든 원자 옥텟 충족
노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)

문제 2.71 · cholesterol, porritoxin (구조 수정 사례)

중요도 ★☆☆

문헌 *Angew. Chem. Int. Ed.* 2005, 44, 1012–1044
반응 잘못 제안된 천연물 구조와 수정된 구조의 작용기 비교
개념 작용기 식별: 2차 알코올·알켄(콜레스테롤), 락탐·에터·1차 알코올(porritoxin)



콜레스테롤(올바른 구조)


문제 2.72 · malachite green 등 트리아릴메테인 염료

중요도 ★★☆☆

문헌 Chem. Rev. 1993, 93, 381–433

반응 Basic green 4(말라카이트 그린)·basic violet 4(에틸 바이올렛) 양이온의 공명

개념 + 전하가 N 두 개·중심 C·고리 o/p 위치에 비편재; NR₂가 셋인 basic violet 4가 더 안정



말라카이트 그린


문제 2.73 · poly(vinyl acetate) → poly(vinyl alcohol)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Chem. Ed. 2006, 83, 1534–1536

반응 아세트산 바이닐 중합 → PVAc → NaOH/H₂O 완전 가수분해 → PVA

개념 IR: 에스터 C=O(약 1740 cm⁻¹)·C-O(1240) 소멸, 넓은 O-H(3200-3500) 증가



아세트산 바이닐


문제 2.74 · 3-acetyl-7-(diethylamino)coumarin

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Chem. Ed. 2006, 83, 287–289

반응 4-(다이에틸아미노)살리실알데하이드 + 아세트아세트산 에틸, 피페리딘 → Knoevenagel 축합 후 락톤화 → 쿠마린

개념 IR로 반응 확인: 페놀 O-H·알데하이드 C-H(2720/2820) 소멸, 락톤 C=O(약 1730) 생성



문제 2.75 · 트리스(도데실옥시)벤질 4-폼일벤즈아마이드 (젤화제 중간체)

중요도 ★★☆☆

문헌 Soft Matter 2012, 8, 5486–5492

반응 젤화제 중간체의 작용기 확인과 C-N 결합 회전

개념 아마이드 C(=O)-N 부분 이중 결합성(공명) → 회전 제한, 벤질 CH₂-N은 자유 회전


문제 2.76 · 피리디늄 알데하이드 + 다이아민 비스-이민

중요도 ★★☆☆

문헌 Langmuir 2012, 28, 14567–14572

반응 RCHO + R'NH₂ → RCH=NR' (2 : 1 축합으로 비스-이민)

개념 이민 형성, 3,5- vs 3,4-치환 생성물은 구조 이성질체



문제 2.77 · Pro-Val 볼라 양친매성 젤화제

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 11478–11484

반응 아마이드 N-H와 아민 N-H의 수소 결합 주개 능력 비교, 분자 간 수소 결합 적층

개념 아마이드 공명($N^+=C-O^-$)으로 N-H가 더 극성 → 강한 주개

문제 2.78 · tropolone

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1997, 62, 3200–3207

반응 트로폴론은 산(→ 트로폴론산 음이온)이자 염기(→ 1,2-다이하이드록시트로필륨)

개념 비편재화로 방향족(6π 트로필륨) 성격, C-C 결합 길이 균등화




문제 2.79 · rhodamine 6G (Basic red 1)

중요도 ★☆☆

문헌 *Chem. Rev.* 1993, 93, 381–433

반응 잔텐 양이온 염료에서 공명에 참여하지 못하는 고리 찾기

개념 2-(에톡시카보닐)페닐 고리는 입체 장애로 잔텐 평면과 수직 → p 오비탈 겹침 불가



로다민 6G


문제 2.80 · tofacitinib (JAK 억제제)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Invest. Dermatol.* 2014, 134, 2988–2990

반응 선-결합 구조에서 각 탄소의 숨은 H 개수 세기 ($C_{16}H_{20}N_6O$)

개념 선-결합 구조 해석, 분자식



tofacitinib (3R,4R)

제3장 산과 염기

- Brønsted-Lowry 산·염기, 양성자 전달은 굵은 화살표 2개 이상
- pKa로 평형 판단: 평형은 더 약한 산(pKa 큰 쪽) 방향으로 이동
- 짝염기 안정성 ARIO: 원자(전기음성도·크기) > 공명 > 유발 효과 > 오비탈($sp > sp^2 > sp^3$)
- 평준화 효과: 용매의 짝염기보다 강한 염기는 존재할 수 없음 (H_2O 대신 $NaNH_2$ ·LDA 등)
- 용매화 효과·짝이온 효과로 pKa 차이 설명
- Lewis 산(전자쌍 받개)·Lewis 염기(전자쌍 주개), 예: BH_3 ·THF, $AlCl_3$ -카보닐 착물
- 보호기 도입 마지막 단계(MOMCl/DIPEA, TMSCl/2,6-lutidine, TBSCl/imidazole)는 옥소늄 탈양성자화

문제 (본문 인용)

중요도 ★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2003, 5, 4931–4934

반응 각주 1: 연습 문제에서 표시를 찾지 못함(누락된 교재 p.140 또는 본문 인용으로 추정)

개념

문제 3.62 · (-)-seimatopolide A (항당뇨)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 5749–5752

반응 MOM 옥소늄($R-O^+(H)-CH_2OMe$) + Hünig 염기(DIPEA) → 중성 MOM 에터 + iPr_2EtNH^+

개념 pKa 비교(옥소늄 약 -2~-3.5 vs 트라이알킬암모늄 약 10-11) → 평형이 생성물 쪽으로 크게 치우침

문제 3.63 · asteltoxin (S. L. Schreiber 합성)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8720–8721

반응 4-메톡시-5,6-다이메틸-2-피론의 6- CH_3 를 강염기로 탈양성자화 → 비닐로그 엔올레이트 음이온. ※ 교재 인쇄상 각주 3·4가 주제와 뒤바뀐 것으로 보임(인쇄 그대로 표기)

개념 음이온 공명 4개, 주 기여체는 카보닐 O에 음전하



문제 3.64 · Nε-(propargyloxycarbonyl)-L-lysine (단백질 표지용)


중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1984, 106, 4186–4188

반응 가장 산성인 양성자 4개의 순위. ※ 교재 인쇄상 각주 3·4가 주제와 뒤바뀐 것으로 보임(인쇄 그대로 표기)

개념 산성도: CO_2H (약 4-5) > 카바메이트 N-H(약 17) > 말단 알카인 C-H(약 25) > 아민 N-H(약 38)

노벨상 2022 (Sharpless·Meldal·Bertozzi, 클릭·생체직교 화학)



프로파질 카바메이트 라이신

문제 3.65 · 2-deuterio-2-methylpropane


중요도 ★★★

문헌 *J. Chem. Ed.* 1981, 58, 79–80

반응 아이소부테인 $\rightarrow$ $\text{Br}_2, h\nu \rightarrow$ t-BuBr $\rightarrow$ Mg, Et₂O $\rightarrow$ t-BuMgBr $\rightarrow$ D₂O $\rightarrow$ (CH₃)₃C-D

개념 Grignard 시약 = 탄소 음이온 염기(D₂O 탈중수소화), IR C-D 신축 약 2180 cm⁻¹ (환산 질량 효과)

노벨상 1912 (V. Grignard, Grignard 시약)



문제 3.66 · bengamide (메싸이오닌 아미노펩티데이스 억제제)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2007, 48, 8787–8789

반응 2차 알코올 + TMSCl $\rightarrow$ O-실릴 옥소늄 $\rightarrow$ 2,6-lutidine 탈양성자화 $\rightarrow$ TMS 에터

개념 pKa(옥소늄 약 -2 vs 2,6-lutidinium 6.7)로 염기 적합성 판단, 입체 장애·비친핵성 염기, IR O-H 소멸

문제 3.67 · (+)-coronafacic acid (coronatine 핵심부)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 2433–2437

반응 케톤 + 2,2-다이메틸프로페인-1,3-다이올, p-TsOH(촉매), -H₂O $\rightarrow$ 1,3-다이옥세인 케탈

개념 양성자화된 케톤(pKa 약 -7) vs TsOH(약 -2.8): 평형은 중성 케톤 쪽, 촉매량으로 충분


문제 3.68 · phakellin (해양 항생 천연물)

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2002, 4, 2645–2648

반응 cyclo(L-Pro-L-Pro) 다이케토피페라진 + LDA $\rightarrow$ 아마이드 α-엔올레이트

개념 가장 산성인 α-H, LDA(쪽산 pKa 약 36)는 부피 크고 비친핵성 염기



다이케토피페라진 1


문제 3.70 · Bordwell DMSO 산도 (diphenylmethane vs phenylacetone)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1981, 46, 4327–4331

반응 다이페닐메테인(pKa 약 32.2)과 페닐아세톤(약 19.9) 쪽염기의 공명 비교

개념 엔올레이트(음전하가 O에)가 페닐 고리 비편재보다 훨씬 안정 $\rightarrow$ 카보닐 α-H가 더 산성



다이페닐메테인 5

페닐아세톤 6

문제 3.71 · 7-desmethoxyfusarentin (MCF-7 세포독성)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 4051–4053

반응 O-H⁺-TBS 옥소늄 + 이미다졸 $\rightarrow$ TBS 에터 + 이미다졸륨


개념 pKa(이미다졸륨 약 7 vs 옥소늄 약 -2) $\rightarrow$ 생성물 쪽 평형

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8720–8721

반응 EtNa 1~4 당량: CO₂H → 카바메이트 N-H → 알카인 C-H → 아민 N-H 순 탈양성자화; EtONa는 CO₂H만 완전 탈양성자화

개념 평준화 효과·pKa 차이로 염기 세기 선택(에테인 pKa 약 50, 에탄올 약 16)

노벨상 2022 (Sharpless·Meldal·Bertozzi, 클릭·생체직교 화학)



라이신 유도체

제4장 알케인과 사이클로알케인

- IUPAC 명명 4단계(모체·치환기·번호·알파벳 순), 이중고리 bicyclo[x.y.z] 명명
- 연소열($-\Delta H^\circ$)로 이성질체 안정성 비교: 가지 많을수록 안정
- Newman 투영: 엇갈림(안정) vs 가림, 비틀림 변형(에테인 12 kJ/mol), 뷰테인 anti < gauche
- 고리 변형 = 각 변형 + 비틀림 변형, 사이클로헥세인 의자형은 변형 없음
- 축/적도 위치, 고리 뒤집기, 1,3-이축 상호작용 → 큰 치환기는 적도 선호
- cis/trans-데칼린은 고리 뒤집기로 상호 변환 불가(trans-데칼린은 고정)
- 형태 선호에 수소 결합·전자쌍 반발 같은 특수 상호작용도 작용

문제 4.67 · ureidopyrimidinone (UPy, titin 모방 고분자)

중요도 ★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766–8768

반응 UPy 단위의 분자 내 수소 결합 1개 + 이량체의 분자 간 4중 수소 결합

개념 분자 내 N-H...N 수소 결합으로 평면 형태, DDAA·AADD 4중 수소 결합 이량체

노벨상 1987 (Cram·Lehn·Pedersen, 초분자·호스트-게스트 화학)

문제 4.68 · aspernomine (Aspergillus nomius 인돌 다이터펜)

중요도 ★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8078–8081

반응 다고리 골격의 의자형 고리 접합·치환기의 축/적도 판정

개념 cis/trans-데칼린형 고리 접합, 축/적도 위치, 이면각

문제 4.69 · butane-2,3-diol

중요도 ★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 8766–8768

반응 C2-C3 축 엇갈림 형태 3개를 Newman 투영으로 그려 안정성 비교

개념 CH_3/CH_3 anti + OH/OH gauche 형태가 분자 내 O-H...O 수소 결합으로 가장 안정



뷰테인-2,3-다이올

문제 4.70 · methanol C-O 회전

중요도 ★☆☆

문헌 J. Phys. Chem. A 2002, 106, 1642–1646

반응 메탄올 엇갈림/가림 형태, 회전 장벽 약 4.2 kJ/mol

개념 가림 상호작용 에너지 분할: H/H 4.0 kJ/mol, 비공유쌍/C-H 가림은 거의 0


문제 4.71 · 1,4-bis(triazolyl)phenazine 형광체

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 7479–7486

반응 아릴-트라이아졸 C-C 결합 180° 회전으로 형태 A ⇌ B (A가 8.96 kcal/mol 더 안정)

개념 회전 중 공주게이션 일시 붕괴, C-H⋯N 인력 vs 비공유쌍-비공유쌍 반발



모델(R = CH₃)

문제 4.72 · all-trans-hexaisopropylcyclohexane


중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1990, 112, 893–894

반응 헥사에틸사이클로헥세인은 전부 적도, 헥사아이소프로필 유도체는 전부 축 의자형을 선호

개념 인접 적도 iPr의 gauche 충돌(기어 효과) vs 축 배치의 변형 완화

노벨상 1969 (D. H. R. Barton·O. Hassel, 형태 분석)



헥사아이소프로필사이클로헥세인

문제 4.73 · ureidopyrimidinone (UPy)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 8766–8768

반응 4.67과 동일 개념: 분자 내 수소 결합 1개 + 이량체 분자 간 수소 결합 4개

개념 자기 상보적 4중 수소 결합(DDAA·AADD)

노벨상 1987 (Cram·Lehn·Pedersen, 초분자·호스트-게스트 화학)

문제 4.74 · trans-데칼린 융합 γ-락톤 부분입체이성질체


중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1961, 83, 606–614

반응 두 부분입체이성질체의 연소열 차이 17.2 kJ/mol

개념 trans-이적도 융합은 의자형 유지, trans-이축 융합은 5원 고리로 연결 불가 → 꼬인 보트 → 연소열 큼

노벨상 1969 (D. H. R. Barton·O. Hassel, 형태 분석)



γ-락톤(구조식)

문제 4.75 · 비타민 D 모방체 (bicyclo[2.2.2]octane)

중요도 ★☆☆

문헌 *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2012, 22, 1756–1760

반응 탄화수소 골격의 계통명: 1-(5-ethylheptyl)-4-methylbicyclo[2.2.2]octane

개념 이중고리 화합물 명명

제5장 입체이성질현상

- 구조 이성질체 vs 입체이성질체, cis/trans
- 키랄 중심(네 치환기 모두 다름), 거울상이성질체
- CIP 규칙으로 R/S 결정(최저 순위를 점선에 두고 1→2→3 시계 방향 = R)
- 비광회전도 $[\alpha] = \alpha/(c \cdot l)$, 라셀 혼합물, 거울상 초과량(% ee)
- 부분입체이성질체, 최대 2°개 입체이성질체, 대칭면 → meso
- Fischer 투영, 형태 이동성 화합물은 광학 비활성
- 키랄 중심 없는 키랄성: 알렌·회전 장애 이성질체(축 키랄성), 키랄 분할


문제 5.63 · 1,2,4-trioxane (항골육종)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 13554–13557

반응 사이클로헥센온-1,2,4-트라이옥세인 융합 이중고리의 키랄 중심 R/S 판정

개념 키랄 중심 3개 → 최대 8개 입체이성질체, 거울상·부분입체 관계



트라이옥세인(구조식)

문제 5.64 · coibacin B (항리슈마니아)

중요도 ★★☆☆

문헌 Org. Lett. 2012, 14, 3878–3881

반응 α,β -불포화 δ -락톤 + 트라이엔 + 트랜스 사이클로프로페인의 입체 분석

개념 키랄 중심 3개(알켄 고정 시) → $2^3 = 8$ 입체이성질체

문제 5.65 · 산화환원 전환형 키랄 Cu 촉매 Michael 첨가


중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 8054–8057

반응 말론산 다이에틸 + trans- β -나이트로스타이렌 → Cu(I) 촉매는 S, Cu(II) 촉매는 R 생성물

개념 % ee → %S/%R 환산(CH_3CN : 72% ee = 86 : 14 최적), 거울상 선택적 촉매

노벨상 2001 (Knowles·Noyori·Sharpless, 비대칭 촉매 반응) — 키랄 촉매 개념 연계



문제 5.66 · 탈수소화-Diels-Alder 연속 반응


중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2011, 133, 14892–14895

반응 아세트산 헥스-5-엔일 → 촉매 탈수소화 → 1,3-다이엔 → N-페닐말레이미드와 Diels-Alder → cis-융합 부가물

개념 아키랄 출발물 → 라셈: endo 쌍(주)·exo 쌍(부)은 각각 거울상, 주-부 관계는 부분입체

노벨상 1950 (O. Diels-K. Alder, 다이엔 합성)




문제 5.67 · methyl 4,6-O-(4-aminobenzylidene)- α -D-glucopyranoside (젤화제)

중요도 ★★★

문헌 *Langmuir* 2012, 28, 14039–14044

반응 융합 이중 의자형으로 다시 그리기(가교 H 축)

개념 trans-데칼린형 융합 의자, 아릴·OH 적도, α -아노머 OMe 축



문제 5.68 · 강직한 다고리 케이지 케톤 (D3-trishomocubanone 추정)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2001, 66, 2072–2077

반응 회전·반사 대칭 판정

개념 C_2 회전축은 있으나 대칭면 없음 → 키랄

문제 5.69 · meloscine (알렌 중간체)

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 934–937

반응 1,3-이치환 알렌 중간체의 Newman 투영과 거울상·부분입체이성질체

개념 알렌의 축 키랄성(말단 치환기 평면 직교)


문제 5.70 · 2,5-dideoxy-2,5-iminohexitol (DMDP형 이미노당) 10종

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 7777–7792

반응 D-글루쿠로노락톤 유도체 1D/1L에서 입체이성질 이미노당 10종 합성


개념 C_2 대칭 골격: 키랄 중심 4개 → $16 - 6(\text{중복}) = 10$ (키랄 8 + meso 2)



문헌 *Chem. Eng. News* 2015, 93, 7

반응 (S)-levetiracetam의 관찰 회전도 계산: $[\alpha] = -93.4 \rightarrow \alpha = -4.67^\circ$

개념 비광회전도 계산, lev- = 좌선성 거울상이성질체



(S)-levetiracetam

제6장 화학반응성과 메커니즘

- ΔH (결합 해리 에너지로 계산), ΔS , $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$, $\Delta G < 0$ 이면 자발적($K_{eq} > 1$)
- 속도론: 속도식·활성화 에너지, 에너지 도표의 전이 상태·중간체, Hammond 가설
- 친핵체(비공유쌍· π 결합) $\rightarrow$ 친전자체($\delta+$, 빈 p 오비탈, 탄소 양이온)
- 굽은 화살표 4유형: 친핵성 공격, 이탈기 이탈, 양성자 전달, 자리옮김
- 탄소 양이온 안정성 $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$ (초공준계이선), 더 안정한 양이온이 될 때만 1,2-H/CH₃ 이동
- 고리 변형 해소(고리 확장)가 자리옮김의 추진력
- 비가역 화살표: 강친핵체 + 나쁜 이탈기, 큰 pKa 차 양성자 전달

문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1990, 112, 2003–2005
반응 각주 1: 연습 문제에서 표시를 찾지 못함(본문 인용으로 추정)
개념

문제 6.53 · 프로펠레인 이성질체 (부테놀라이드 재배열)


중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 17877–17880
반응 MeO⁻(촉매) $\rightarrow$ γ -탈양성자화(다이엔올레이트) $\rightarrow$ E1cB형 C-O 개열 $\rightarrow$ 분자 내 옥사-Michael 첨가 $\rightarrow$ 양성자화
개념 화살표 유형 조합(양성자 전달·이탈기 이탈·친핵성 공격), 주 공명 기여체(카보닐 O에 음전하)

문제 6.54 · tert-butyl 3-acetoxy-2,3-dideuteriobutanoate

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2007, 72, 793–798
반응 HO⁻가 아세테이트 C=O에 첨가 $\rightarrow$ 사면체 알콕사이드가 α -H를 분자 내 syn 제거 $\rightarrow$ (E)-2,3-다이중수소 뷰텐산 에스터
개념 D 표지로 syn 제거(고리형 전이 상태) 확인, 화살표 유형 배열



문제 6.55 · preussomerin (분변 진균 항진균제) 생체모방

중요도 ★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 3–5
반응 LiOH $\rightarrow$ 나프톡사이드 $\rightarrow$ 분자 내 C-O 결합 형성으로 비스-스파이로케탈 재배열 $\rightarrow$ 양성자화
개념 강직한 스파이로 골격 $\rightarrow$ 한쪽 면에서만 결합 형성 $\rightarrow$ 단일 부분입체이성질체

문제 6.56 · (+)-aureol 생합성

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 4710–4713
반응 C8 3° 양이온 $\rightarrow$ 1,2-수소화 이동 $\rightarrow$ 1,2-메틸 이동 $\rightarrow$ C10 3° 양이온 (friedo형 골격 재배열)
개념 탄소 양이온 자리옮김, 이동기는 빈 p 오비탈과 anti-periplanar(trans-이축), 입체 결정
노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)

문제 6.57 · (-)-strychnine (Woodward 전합성)


중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1954, 76, 4749–4751

반응 아이소스트리크닌 + $\text{HO}^- \rightarrow$ 확장 엔올레이트 $\rightarrow \alpha$ -재양성자화로 C=C 이동 $\rightarrow$ 알콕사이드 $\rightarrow$ 분자 내 옥사-Michael $\rightarrow$ 스트리크닌

개념 콘จู게이트 첨가(α, β -불포화 락탐의 β -탄소가 친전자 중심), 분자 내 반응의 면 선택성

노벨상 1965 (R. B. Woodward, 유기 합성 기술)



스트리크닌(구조식)

문제 6.58 · isocomene (Pirrung, 트라이퀴네인)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1979, 101, 7130–7131

반응 사이클로뷰틸카비닐 양이온 $\rightarrow$ 1,2-알킬 이동(고리 확장) $\rightarrow$ 사이클로펜틸(트라이퀴네인) 3° 양이온

개념 고리 변형 해소가 추진력($3^\circ \rightarrow 3^\circ$), 이동 결합은 빈 p 오비탈과 정렬 $\rightarrow$ 부분입체 선택성

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)


문제 6.59 · 2-amino-3-cyanopyrrole (^{15}N 표지 실험)

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 537–539

반응 피롤 융합 1,2,3-트리아진 250 °C 열분해($-\text{N}_2$) $\rightarrow$ 2-아미노-3-사이아노피롤; ^{15}N 이 나이트릴에만 존재

개념 아미딘 공명으로 두 N이 동등해지는 경로라면 $4a : 4b \approx 1 : 1 \rightarrow$ 관찰 결과로 메커니즘 반증



생성물 4(모델)


문제 6.60 · cis-2-methyl-7-phenyloxepan-4-one

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2005, 7, 515–517

반응 스파이로사이클로프로페인 1,3-다이옥세인 + Lewis 산 $\rightarrow$ 옥소카베늄 + 사이클로프로판올레이트 $\rightarrow$ 호모엔올레이트 고리 닫힘 $\rightarrow$ 옥세판온


개념 사이클로프로페인 고리 변형 해소, 호모엔올레이트 친핵체 + 옥소카베늄 친전자체



문헌 *Org. Biomol. Chem.* 2013, 11, 2498–2513

반응 2,3-다이메틸-4,4-다이페닐뷰트-3-엔-1-올 + TsOH → OH 양성자화 → 분자 내 Friedel-Crafts형 고리화 → 탈양성자화

개념 화살표 유형 순서: 양성자 전달 → 친핵성 공격 + 이탈기 이탈(협동) → 양성자 전달(방향족성 회복)



제7장 치환 반응

- SN2: 협동·뒷면 공격, 속도 = $k[\text{기질}][\text{Nu}]$, 메틸 $> 1^\circ > 2^\circ \gg 3^\circ$, 입체 반전
- SN2 유리 조건: 강친핵체, 좋은 이탈기, 극성 비양성자성 용매 (DMSO, DMF, 아세톤)
- SN1: 이탈기 이탈(속도 결정) → 탄소 양이온 → Nu 공격, $3^\circ > 2^\circ$, 라선헬화(이온쌍으로 반전 약간 우세)
- SN1 유리 조건: 약친핵체·양성자성 용매(가용매분해), 양이온 자리움김 가능
- OH 활성화: $\text{ROH} + \text{TsCl/py} \rightarrow \text{ROTs(입체 유지)} \rightarrow \text{Nu}^- (\text{SN2, 반전}); 3^\circ \text{ ROH} + \text{HX} (\text{SN1})$
- Finkelstein(NaI, 아세톤), Williamson 에터 합성($\text{RO}^- + 1^\circ \text{RX}$)
- 이웃 기 참여(N:S): 아지리디늄·설포늄 중간체를 거친 이중 반전 = 입체 유지

문제 7.77 · cyoctol (항안드로겐·남성형 탈모 치료제)


중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron* 2004, 60, 9599–9614

반응 (R)-3-메톡시펜탄-1-올 → TsCl, py(토실레이트) → NaI(Finkelstein, SN2) → PPh_3 , 가열(SN2) → 포스포늄 아이오딘화물 (Wittig 염)

개념 OH의 설포네이트 활성화, Finkelstein, 중성 친핵체 SN2 → 이온쌍 생성물; 키랄 중심은 C1 반응이라 영향 없음

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — Wittig 염(포스포늄염)




문제 7.78 · 2-butoxynaphthalene (IR 모니터링 실험)

중요도 ★★★

문헌 *J. Chem. Ed.* 2009, 86, 850–852

반응 2-나프톨 → NaOH(나프톡사이드) → n-BuI(SN2) → 2-뷰톡시나프탈렌

개념 페놀 산도($\text{pKa } 9.5$ vs $\text{H}_2\text{O } 15.7$), Williamson 에터 합성, IR O-H 소멸로 반응 확인



문제 7.79 · triphenylmethyl ether (트리틸 가용매분해)


중요도 ★★★

문헌 *J. Chem. Ed.* 2009, 86, 853–855

반응 $\text{Ph}_3\text{CBr} + \text{ROH}(\text{H}_2\text{O}, \text{MeOH}, \text{EtOH}) \rightarrow$ 트리틸 양이온 → Ph_3COR (거의 즉시)

개념 SN1 가용매분해, 세 고리로 공명 안정화된 트리틸 양이온; IR(OH) vs NMR(OCH_3)로 분석

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)




문제 7.86 · 1-benzyl-2-ethylideneaziridine (바이닐 SN2)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 6868–6869

반응 (E)-2-브로모뷰트-2-엔-1-올 → TsCl, py → BnNH₂ (알릴 SN2) → NaNH₂, NH₃, -78 °C → 면 내 바이닐 SN2로 2-알킬리덴 아지리딘

개념 바이닐 탄소의 면 내(σ^*) 뒷면 공격, 알켄 기하 반전




문제 7.87 · 3-methylazetidin-3-yl acetate (고리 확장)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Org. Chem. 2012, 77, 3181–3190

반응 2-(브로모메틸)-2-메틸아지리딘 + NaOAc, CH₃CN → 1-아조니아바이사이클로[1.1.0]뷰테인 → 아제티딘(주) + 아지리딘 아세테이트(부)

개념 이웃 기 참여(질소 머스터드형), 변형이 큰 이중고리 이온의 위치 선택적 개환




문제 7.88 · biotin (Hoffmann-La Roche 전합성)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1982, 104, 6460–6462

반응 2차 알코올 + SOCl₂, py → 클로로설파이트 → 고리 S의 이웃 기 참여(설폰늄) → Cl⁻ 개환 → 입체 유지 염화물 → biotin

개념 황 이웃 기 참여(설폰 머스터드형): 이중 반전 = 입체 유지



제8장 알켄: 구조 및 제거 반응을 이용한 제법

- 알켄 명명: E/Z, 치환 많을수록 안정, Bredt 규칙
- E2: 협동, 속도 = $k[\text{기질}][\text{염기}]$, 3° 가장 빠름, H와 이탈기 anti-periplanar(고리에서는 trans-이축)
- NaOEt(작은 강염기) → Zaitsev(더 치환된 알켄), t-BuOK(부피 큰 염기) → Hofmann(덜 치환된 알켄)
- β-탄소에 H가 하나면 E2는 입체 특이적
- E1 탈수: 진한 H_2SO_4 , 가열 → Zaitsev 알켄(양이온, 자리옮김 가능), 입체 선택적(trans)
- 시약 역할: 친핵체 전용(X^- , RS^-), 염기 전용(H^- , DBU, DBN), 강 친핵체·강염기(HO^- , RO^-)
- 기질 등급별: 1° → SN2 (t-BuOK면 E2), 2° → E2 주, 3° → E2 만(강염기)

문제 8.89 · pladienolide B (Streptomyces platensis 마크롤라이드)

중요도 ★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 4730–4733

반응 31단계 입체 선택적 합성의 표적 구조 분석(반응 없음)

개념 삼치환 알켄 E/Z, 입체 요소 13개 → $2^{13} = 8192$, 거울상·부분입체이성질체 그리기

문제 8.90 · cholic acid형 스테로이드 (Δ^{11} 알켄)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 6948–6950

반응 $12\alpha\text{-OH} \rightarrow \text{TsCl, py} \rightarrow \text{NaOAc(염기)} \text{ E2} \rightarrow \Delta^{11} \text{ 알켄}$; D 표지로 제거되는 H 판정

개념 E2 trans-이축(anti-periplanar) 요구: 축 방향 $11\beta\text{-H}$ 만 제거 → 적도 D는 남음

노벨상 1969 (D. H. R. Barton-O. Hassel, 형태 분석)


문제 8.91 · 2-alkylideneoxetane (taxol의 옥세테인)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2007, 48, 8353–8355

반응 옥세테인 2차 알코올 부분입체이성질체 → TsCl, py → t-BuOK E2 → 엑소 엔올 에터 알켄(Zaitsev 우세)

개념 β-탄소 H가 하나 → 입체 특이적 E2: 두 부분입체이성질체가 반대 기하(E/Z) 알켄을 줌(Newman 분석)




문제 8.92 · (E)-stilbene (DMF 탈브로민화)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1991, 56, 2582–2584

반응 meso- 및 dl-1,2-다이브로모-1,2-다이페닐에테인 + DMF → 모두 (E)-스틸벤만 생성

개념 협동 anti 제거라면 dl → (Z)여야 함 → 단계적 메커니즘; 입체 선택적이지 입체 특이적이지 아님



문제 8.93 · (+)-coronafacic acid (phytotoxin coronatine)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 2433–2437

반응 cis-하이드린데인 2차 알코올 → TsCl, py → DBU E2 → α,β-불포화 메틸 에스터

개념 anti-periplanar 요구 + 에스터 α-H 산도·콘쥬게이션으로 위치 선택성 결정

문제 8.94 · 아자이도 케탈의 분자 내 Schmidt 반응

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2010, 132, 2530–2531

반응 산 → 아미노다이아조늄 → N_2^+ 와 anti-periplanar인 C-C 결합의 1,2-이동(고리 확장) → 양이온을 OH가 포획 → 탈양성자화

개념 이동기의 anti-periplanar 정렬(E2와 유사), 옥소카베늄 포획


문제 8.95 · 2-iodobutane E2 위치 선택성

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1973, 95, 3405–3407

반응 2-아이오도부테인 + 산소 음이온 염기(DMSO, 50 °C): 염기가 강할수록 1-뷰텐 비율 증가(7.2 → 17.1%)

개념 염기 세기와 Hofmann/Zaitsev 비율(반응성-선택성), 4-나이트로페녹사이드 약 9% 예측




문제 8.96 · 2-butyl-Y + t-BuOK (trans/cis-2-butene 비)

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1965, 87, 5517–5518

반응 2-뷰틸-Y + t-BuOK/t-BuOH, 50 °C: trans : cis = I 2.2, Br 1.4, Cl 1.3, OTs 0.6

개념 Newman 투영의 전이 상태 분석: 큰 OTs 이탈기는 C3-메틸과의 반발로 cis 생성 전이 상태 선호



제9장 알켄의 첨가 반응

- $\text{HX} \rightarrow$ Markovnikov 첨가(탄소 양이온, 자리옮김 가능), $\text{HBr/ROOR} \rightarrow$ anti-Markovnikov(라디칼)
- H_3O^+ 수화(Markovnikov, 자리옮김), $\text{Hg}(\text{OAc})_2 \cdot \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaBH}_4$ 옥시수은화(Markovnikov, 자리옮김 없음)
- $\text{BH}_3 \cdot \text{THF} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2, \text{NaOH}$ 수소화붕소화-산화: anti-Markovnikov, syn 첨가, 입체 장애 적은 면
- H_2/Pt 촉매 수소화(syn), 킬랄 촉매로 비대칭 수소화
- $\text{Br}_2 \rightarrow$ 브로모늄 이온 $\rightarrow$ anti 첨가; $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 할로하이드린 (OH는 더 치환된 C)
- $\text{RCO}_3\text{H} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$ anti 이수산화, OsO_4/NMO (또는 찬 KMnO_4) syn 이수산화
- $\text{O}_3 \rightarrow$ DMS 오존 분해($\text{C}=\text{C}$ 절단 $\rightarrow$ 카보닐)
- 할로락톤화·브로모에터화: 할로늄 이온을 분자 내 친핵체가 anti로 열기


문제 9.68 · 5-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-one (sabinene 골격)

중요도 ★★★

문헌 Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321–1325

반응 1-메톡시-4-메틸사이클로헥사-1,4-다이엔 + HCl (과량) $\rightarrow$ 1,4-다이클로로-1-메톡시-4-메틸사이클로헥세인 $\rightarrow$ (가수분해; 염기, 분자 내 C-알킬화) $\rightarrow$ 바이사이클로[3.1.0]헥산온

개념 두 $\text{C}=\text{C}$ 에 Markovnikov HCl 첨가(옥소카베늄· 3° 양이온), 엔올레이트 분자 내 $\text{S}_\text{N}2$ 로 사이클로프로페인



문제 9.82 · Taxol (K. C. Nicolaou 전합성)

중요도 ★★★

문헌 Nature 1994, 367, 630–634

반응 탁세인 ABC 삼고리 중간체 $\rightarrow$ 1) $\text{BH}_3 \cdot \text{THF}$ 2) H_2O_2 , 염기 $\rightarrow$ C5 2차 알코올(옥세테인 O 도입 위치)

개념 BH_3 의 화학 선택성(이치환 $\text{C}5=\text{C}6$ 만 반응), 부피 큰 OBn 반대쪽 위치·면 선택적 syn 첨가

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화

문제 9.83 · adamantylideneadamantane 브로모늄 이온


중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1985, 107, 4504–4508

반응 아다만틸리덴아다만테인 + $\text{Br}_2 \rightarrow$ 안정한 브로모늄 이온(Br^- 의 뒷면 공격 불가 $\rightarrow$ 다이브로마이드 생성 안 됨)

개념 브로모늄 메커니즘, 입체 장애로 2단계 장벽 상승 $\rightarrow$ 에너지 도표의 깊은 우물

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)



문제 9.84 · diisopinocampheylborane (lpc₂BH)


중요도 ★★★

문헌 J. Org. Chem. 1984, 49, 945–947

반응 (+)-α-피넨(2 당량) + BH₃·THF → lpc₂BH 단일 입체이성질체

개념 syn 수소화붕소화, gem-다이메틸 가교 반대 면에서만 접근, B는 덜 치환된 C → 키랄 수소화붕소화 시약

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화



문제 9.85 · zaragozic acid A (스쿠알렌 합성효소 억제제, Nicolaou)

중요도 ★★★

문헌 Angew. Chem. Int. Ed. 1994, 33, 2187–2190

반응 엑소 알킬리덴 락톤 알릴 알코올 + OsO₄ (촉매), NMO → syn 이수산화(윗면) → 락톤 자리옮김(분자 내 에스터 교환)

개념 OsO₄ syn 이수산화의 면 선택성: 스파이로 아세토나이드·CH₃OSEM이 아랫면 차폐


문제 9.86 · monensin (W. C. Still 합성)

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1980, 102, 2118–2120

반응 (Z)-불포화 카복실산 + I₂, NaHCO₃ → 아이오도락톤화 → δ-락톤 (5S,6S) 단일 부분입체이성질체

개념 아이오도도늄 형성 → 카복실레이트 anti 공격(6원 고리), 알릴 1,3-변형(A1,3) 조절 부분입체 선택성



문제 9.87 · Hg(OAc)₂ 옥시수은화 상대 속도

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414–1418

반응 알켄별 옥시수은화 상대 속도(1,1-이치환 1000 > 일치환 100 > 알릴 OMe 31.8 > 삼치환 25.8 > 알릴 Cl 2.4)

개념 친전자성 첨가: 알킬 공여↑·유발 효과 전자 끌기↓, 삼치환은 입체 장애로 느림

문제 9.88 · 9-BBN 수소화붕소화 상대 속도

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1989, 111, 1414–1418

반응 9-BBN 수소화붕소화 상대 속도(바이닐 에터 1615 … trans-1-클로로부텐 0.003)

개념 B는 친전자체: 공명 공여(바이닐 에터)↑, 알릴 EWG↓, 부피 큰 9-BBN은 입체에 매우 민감

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화

문제 9.89 · heliol (가교 벤즈옥사바이사이클)


중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 2929–2931

반응 2-(2-하이드록시-6-메틸헵트-6-엔-2-일)페놀 + H_3O^+ , CH_3CN → 3° 벤질 양이온 → 알켄 분자 내 공격(6원 고리) → 새 3° 양이온을 페놀 O가 포획 → 라셈 가교 에터

개념 탄소 양이온-올레핀 고리화(Markovnikov), 분자 내 에터 형성, 평면 양이온 → 라셈

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)



문제 9.90 · reserpine (R. B. Woodward 합성)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron* 1958, 2, 1–57

반응 삼고리 γ -락톤 + Br_2 (브로모늄 → 분자 내 OH anti 공격 = 브로모에터화) → NaOMe (α -H 제거, HBr 제거) → α,β -불포화 락톤 → MeO^- Michael 첨가

개념 브로모늄 이온의 분자 내 개환, 염기 제거, 콘쥬게이트 첨가

노벨상 1965 (R. B. Woodward, 유기 합성 기술)

제10장 알카인

- 제조: 이할로젠화물(geminal/vicinal) + 과량 $\text{NaNH}_2 \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 말단 알카인(이중 E2)
- HX (1 당량) $\rightarrow$ 바이닐 할라이드, 과량 $\text{HX} \rightarrow$ geminal 이할로젠 화물(Markovnikov)
- H_2SO_4 , H_2O , $\text{HgSO}_4 \rightarrow$ 메틸 케톤(엔올 $\rightarrow$ 토토머화); $\text{R}_2\text{BH} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2$, $\text{NaOH} \rightarrow$ 알데하이드
- X_2 (1 당량) $\rightarrow$ (E)-1,2-다이할로알켄, 과량 $\text{X}_2 \rightarrow$ 테트라할라이드, $\text{O}_3 \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 카복실산
- 알킬화: $\text{NaNH}_2 \rightarrow \text{RX}$ (메틸·1°) $\text{SN}_2 \rightarrow$ 내부 알카인 (아세틸라이드 pKa 약 25)
- Na , $\text{NH}_3(\text{l}) \rightarrow \text{trans}$ -알켄, $\text{H}_2/\text{Lindlar} \rightarrow \text{cis}$ -알켄, $\text{H}_2/\text{Pt} \rightarrow$ 알켄
- 바이닐 양이온은 불안정(sp), 알카인 지퍼 이성질화, 케토-엔올 토토머화

문제 10.69 · α,α -이치환 α -아미노산 전구체

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2003, 5, 4017–4020

반응 말단 알카인 $\rightarrow$ 1) NaNH_2 2) MEMCl (SN_2) 3) H_2 , $\text{Pt} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{-O-CH}_2\text{CH}_2\text{OMe}$ 사슬

개념 아세틸라이드 알킬화 + 완전 수소화, CIP 우선순위 불변 $\rightarrow$ S 유지


문제 10.70 · propyne (다이메틸 황산 메틸화)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1959, 24, 840–842

반응 $(\text{CH}_3\text{O})_2\text{SO}_2$ (1 mol) + $\text{HC}\equiv\text{CNa}$ (2 mol) $\rightarrow$ 프로파인 2 mol + Na_2SO_4 ; 부산물 2-뷰타인·아세틸렌

개념 아세틸라이드 SN_2 알킬화(메틸 황산도 알킬화제), 생성물 알카인과 아세틸라이드 간 산-염기 교환




문제 10.71 · salvinorin A (κ -오피오이드 작용제)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2007, 129, 8968–8969

반응 1-(퓨란-3-일)뷰트-2-인-1-올 $\rightarrow$ 1) NaNH_2 2) $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 1-(퓨란-3-일)뷰트-3-인-1-올 (알카인 지퍼)

개념 반복 탈양성자화·재양성자화(알렌 경우), 말단 아세틸라이드 형성이 평형을 끌어감(pKa 25 vs NH_3 , 38)




문제 10.72 · 다이아이오도다이엔 (고리 횡단 고리화)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 1996, 37, 1571–1574

반응 사이클로데카-1,6-다이아인 + $\text{I}_2 \rightarrow$ 고리 횡단 고리화 $\rightarrow$ 융합 이중고리 다이아이오도다이엔(94%)

개념 아이오도늄(아이오디레늄) 형성, 불안정한 바이닐 양이온 회피 $\rightarrow$ 협동적 고리 횡단 공격




문제 10.73 · dimesitylacetaldehyde (안정한 단순 엔올)

중요도 ★★☆☆

문헌 Acc. Chem. Res. 1988, 21, 442–449

반응 다이페닐아세트알데하이드(엔올 9.1%) vs 다이메시틸아세트알데하이드(엔올 95%)

개념 케토-엔올 토토머화, $sp^3 \rightarrow sp^2$ 결합각 확대($109.5^\circ \rightarrow 120^\circ$)로 아릴 간 입체 반발 해소




문제 10.74 · 1,2-bis(phenylethynyl)benzene 고리화

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1966, 88, 4525–4526

반응 H_2SO_4 , $H_2O \rightarrow$ 바이닐 양이온 연쇄 고리화 $\rightarrow$ 3-벤조일-2-페닐인덴; $Br_2 \rightarrow$ 엑소 브로모알킬리덴 인덴

개념 페닐 안정화 바이닐 양이온, 5원 고리 형성, 엔올 토토머화, 면 내 공격 방향으로 알켄 기하 결정



문제 10.75 · roquefortine C (Penicillium roqueforti)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2008, 130, 6281–6287

반응 이미다졸 고리의 두 토토머($1H \rightleftharpoons 3H$) 상호 변환

개념 염기 촉매(이미다졸라이드 음이온)·산 촉매(이미다졸륨) 토토머화, 분자 내 수소 결합 토토머 안정화


문제 10.76 · N-reverse-prenylated indoline

중요도 ★★☆☆

문헌 Tetrahedron Lett. 2001, 42, 7277–7280

반응 인돌린 + 2-메틸뷰트-3-인-2-일 아세테이트, $CuCl$ (촉매), $i-Pr_2NEt \rightarrow$ N-프로파질 인돌린 $\rightarrow H_2$, Lindlar $\rightarrow$ N-(2-메틸뷰트-3-엔-2-일)인돌린

개념 3° 프로파질 양이온(알렌일 공명) $SN1$ 형 N-알킬화, Lindlar 부분 수소화



문제 10.77 · 3-heptyne 형태 분석

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Phys. Chem. A 2007, 111, 3513–3518

반응 3-헵타인을 '늘어난 펜테인'으로 보고 가장 안정한 형태 분석($C1 \cdot C6$ 거의 가림)


개념 Newman 투영, $C \equiv C$ 로 $4.1 \text{ \AA}$ 떨어져 가림 변형 없음, anti/gauche

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1976, 98, 3295–3300

반응 $\text{PhC}\equiv\text{CR} + \text{HCl} \rightarrow \text{PhC}(\text{Cl})=\text{CHR}$, R 부피↑ → E 선택성↑ (Me 70:30 → t-Bu 100:0)

개념 페닐 공명 안정화 선형 바이닐 양이온(위치 선택성), Cl⁻의 면 내 접근(H 쪽)으로 입체 선택성

노벨상 1994 (G. A. Olah, 탄소 양이온 화학)



제11장 라디칼 반응

- 라디칼 안정성 $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$, 알릴·벤질은 공명 안정화(바이닐은 아님)
- 화살표 6유형(반쪽 화살표): 균일 분해, π 첨가, H 추출, 할로젠 추출, 제거, 결합(짜지음)
- 연쇄 반응: 개시(과산화물, AIBN, hv) → 전파 → 종결; 억제제 O_2 ·하이드로퀴논
- $Br_2, hv \rightarrow 3^\circ$ C-H 선택적 브로민화(Cl_2 보다 선택성 큼)
- HBr, ROOR → anti-Markovnikov 첨가; NBS, hv → 알릴 브로민화(두 위치 이성질체 가능)
- 라디칼 탄소에 생긴 새 키랄 중심 → 라셈
- 자동 산화 → 하이드로과산화물, 항산화제(BHT, 비타민 E·C), 라디칼 중합

문제 11.49 · thiol-ene 단백질 접합

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 6916–6919

반응 $R-CH=CH_2 + R'SH$, 라디칼 개시제 → $R-CH_2CH_2-SR'$ (단백질 N-알릴 아마이드 + 시스테인 SH → 싸이오에터 결합)

개념 라디칼 연쇄($RS\cdot$ 말단 첨가 → 2° 라디칼 → RSH에서 H 추출), anti-Markovnikov

노벨상 2022 (Sharpless·Meldal·Bertozzi, 클릭·생체직교 화학)


문제 11.50 · 1-bromopropane 대기 산화

중요도 ★★★

문헌 *J. Phys. Chem. A* 2008, 112, 7930–7938

반응 1-브로모프로페인 → $HO\cdot$ (2° C-H 추출) → O_2 (퍼옥시 라디칼) → NO (알콕시 라디칼) → O_2 (α -H 추출) → 브로모아세톤

개념 H 추출, 라디칼 짝지음, O 원자 이동 등 라디칼 단계 조합




문제 11.51 · resveratrol (항산화제)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 5025–5031

반응 $RO\cdot$ 가 페놀성 H를 추출: 4'-OH가 우선

개념 페녹실 라디칼이 para 위치를 통해 C=C·다른 고리로 비편재화(meta-OH는 불가)




문제 11.52 · cinnamyl sulfoxide (설펜산 에스터 재배열)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2000, 122, 3367–3374

반응 신나밀 아렌설펜에이트 → 가열 → C-O 균일 분해 → 신나밀 라디칼 + $ArS-O\cdot$ → S에서 재결합 → 신나밀 설펜사이드

개념 두 공명 안정화 라디칼을 주는 결합이 먼저 끊어짐(비공유쌍 이웃 라디칼 공명)



문제 11.53 · oseltamivir (Tamiflu) 중간체

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2006, 128, 6310–6311

반응 이중고리 아이오도락탐 → t-BuOK(E2, Bredt 규칙) → NBS, hv(알릴 브로민화, 알릴 라디칼 반대 말단에 Br) → 알릴 브로마이드

개념 anti-periplanar E2, 알릴 라디칼 공명에 의한 C=C 이동, exo 면 선택성

문제 11.54 · 트라이퀴넨인 라디칼 연쇄 고리화

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1986, 108, 1708–1709

반응 α-사이아노에스터 라디칼 → 5-exo-trig 고리화 → 고리 횡단 첨가 → 선형 트라이퀴넨인 / 가교 삼고리 라디칼

개념 라디칼 고리화(5-exo vs 6-endo), 연속 고리 형성


문제 11.55 · bisphenyl carbodiazone 광분해 (TEMPO 포획)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2006, 47, 2115–2118

반응 PhN=N-C(=O)-N=NPh , hv(350 nm), TEMPO → $\text{PhN=N-C(=O)-O-TMP} + \text{Ph-O-TMP} + \text{N}_2$

개념 C-N 균일 분해, $\text{PhN=N} \cdot \rightarrow \text{Ph} \cdot + \text{N}_2$, TEMPO 라디칼 포획




문제 11.56 · iodocubane

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2001, 123, 1842–1847

반응 큐베인 + Cl_2 (·Cl, 개시) → 아이오도큐베인 + HCl; I_2 로는 반응 안 함

개념 전파 단계의 BDE 열역학: H-Cl_3 (423) 형성은 유리, I-Cl_3 (192) 약한 결합 → 두 전파 단계 모두 발열




문제 11.57 · paclitaxel 단편 (Kharasch 반응)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2002, 43, 8587–8590

반응 (a) $\text{RCH=CH}_2 + \text{CCl}_4$, $(\text{PhCO}_2)_2$, 가열 → $\text{RCH(Cl)CH}_2\text{CCl}_3$; (b) 퓨라노스 다이엔 → ·CCl₃ 첨가 → 6-exo-trig 고리화 → Cl 추출 → 사이클로헥세인 융합 퓨라노스


개념 Kharasch 원자 이동 라디칼 첨가(덜 치환된 C에 ·CCl₃), 라디칼 고리화



문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2009, 131, 653–661

반응 페닐아세틸렌 + 나이트로소벤젠, 가열 → 이중 라디칼(바이닐 라디칼 + 나이트록사이드) → ortho 탄소에 고리화 → 수소 이동 (방향족화) → N-하이드록시인돌

개념 바이닐 라디칼의 방향족 고리 첨가, 재방향족화



제12장 합성

- 할로젠 위치 옮기기: 제거(NaOEt 또는 t-BuOK) $\rightarrow$ 첨가(HBr Markovnikov 또는 HBr/ROOR)
- π 결합 위치 옮기기: 첨가(HBr) $\rightarrow$ 제거($\text{t-BuOK} = \text{Hofmann}$, $\text{NaOEt} = \text{Zaitsev}$)
- 알케인 $\rightarrow$ 알켄: 1) Br_2 , $\text{h}\nu$ 2) NaOEt ; 알켄 $\rightarrow$ 알카인: 1) Br_2 2) 과량 NaNH_2 3) H_2O
- 알카인 $\rightarrow$ cis-알켄($\text{H}_2/\text{Lindlar}$), trans-알켄(Na/NH_3), 알케인(H_2/Pt)
- C-C 결합 형성: 아세틸라이드 + $\text{RX}(\text{SN}2)$, 에폭사이드(호모프로파질 알코올), 알데하이드·케톤(프로파질 알코올)
- C-C 결합 절단: 오존 분해(O_3 ; $\text{DMS} \rightarrow$ 알데하이드·케톤, O_3 ; $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 카복실산)
- 역합성 분석: 탄소 골격 변화 여부 + 작용기 종류·위치 변화 여부

문제 12.32 · 3-phenylpropyl acetate (실론 계피 향 성분)


중요도 ★★★

문헌 J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 4344–4348

반응 톨루엔 $\rightarrow$ NBS, $\text{h}\nu \rightarrow \text{HC}\equiv\text{CNa} \rightarrow \text{H}_2/\text{Lindlar} \rightarrow \text{HBr}$, $\text{ROOR} \rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2\text{Na}(\text{SN}2) \rightarrow$ 아세트산 3-페닐프로필

개념 벤질 브로민화, 아세틸라이드 C-C 형성, anti-Markovnikov HBr, 카복실레이트 $\text{SN}2$

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.33 · 2,5-hexanedione (갈근 향 성분)


중요도 ★★★

문헌 Agric. Biol. Chem. 1988, 52, 1053–1055

반응 3,4-다이에틸사이클로뷰텐 $\rightarrow \text{H}_2$, $\text{Pt} \rightarrow \text{Br}_2$, $\text{h}\nu(3^\circ) \rightarrow \text{NaOEt}(\text{Zaitsev}) \rightarrow \text{O}_3$; $\text{DMS} \rightarrow$ 2,5-헥세인다이온

개념 π 결합 위치 이동(직접 오존 분해 시 다른 생성물), 3° 선택적 브로민화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.34 · 1-penten-3-ol (메추라기 사료 휘발 성분)


중요도 ★★★

문헌 J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7204–7211

반응 아세틸렌만 사용: 프로판알 제조($1\text{-뷰타인} \rightarrow \text{Lindlar} \rightarrow \text{O}_3/\text{DMS}$) $\rightarrow \text{HC}\equiv\text{CNa} +$ 프로판알 $\rightarrow 1\text{-펜틴-3-올} \rightarrow \text{H}_2$, Lindlar

개념 아세틸라이드 + 알데하이드 $\rightarrow$ 프로파질 알코올, 부분 수소화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.35 · tetradecane (프라이드치킨 휘발 성분)


중요도 ★★☆☆

문헌 J. Agric. Food Chem. 1983, 31, 1287–1292

반응 아세틸렌 → 반복 2탄소 증가로 1-브로모헥세인 → 아세틸렌 이중 알킬화 → 7-테트라데사인 → H₂, Pt

개념 아세틸라이드 반복 알킬화, anti-Markovnikov HBr, 완전 수소화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.36 · 2-decanone / decanal (미생물 휘발 성분)


중요도 ★★☆☆

문헌 J. Nat. Prod. 2012, 75, 1765–1776

반응 공통 중간체 1-데사인 → H₂SO₄, H₂O, HgSO₄ → 2-데칸온 / 1) R₂BH 2) H₂O₂, NaOH → 데칸알

개념 알카인 수화의 위치 선택성(Markovnikov vs anti-Markovnikov), 토토머화

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소·인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화



문제 12.37 · (Z)-3-hexenyl acetate (녹엽 휘발 성분)


중요도 ★★☆☆

문헌 Nat. Prod. Rep. 2012, 29, 1288–1303

반응 1-뷰타인 → NaNH₂ → 에틸렌 옥사이드 → H₂O → 3-헥신-1-올 → H₂, Lindlar → (Z)-3-헥센-1-올 → AcOH, H⁺

개념 아세틸라이드 + 에폭사이드(호모프로파질 알코올), Lindlar cis 환원, Fischer 에스테르화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.38 · 3-methylbutanal + hexanal (토마토 향)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Agric. Food Chem. 2002, 50, 3401–3404

반응 2-메틸운데크-4-엔 오존 분해(O₃; DMS) → 3-메틸뷰탄알 + 헥산알 1 : 1; 알켄은 내부 알카인의 Lindlar 환원으로

개념 오존 분해 역합성, 아세틸렌 이중 알킬화

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.39 · methyl 4-methylpentanoate (Streptomyces 휘발 성분)


중요도 ★★★

문헌 *Actinomycetologica* 2009, 23, 27–33

반응 2-메틸뷰테인 $\rightarrow$ $\text{Br}_2, h\nu \rightarrow \text{NaOEt} \rightarrow \text{HBr, ROOR} \rightarrow t\text{-BuOK (Hofmann)} \rightarrow \text{HBr, ROOR} \rightarrow \text{HC}\equiv\text{CNa} \rightarrow \text{O}_3; \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_3\text{OH, H}^+$

개념 할로젠-π 결합 위치 이동, 아세틸라이드 +2C, 말단 알카인 오존 분해 -1C

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.40 · (E)-2-hexenal (카베르네 소비뇽 향)


중요도 ★★★

문헌 *J. Agric. Food Chem.* 2009, 57, 3818–3830

반응 1,1-다이브로모펜테인 $\rightarrow$ 과량 $\text{NaNH}_2 \rightarrow \text{HCHO} \rightarrow \text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 2-헥신-1-올 $\rightarrow \text{Na, NH}_3(l) \rightarrow$ (E)-2-헥센-1-올 $\rightarrow \text{PCC}$

개념 이할로젠화물 이중 제거로 아세틸라이드, 아세틸라이드 + 알데하이드, 용해 금속 trans 환원

노벨상 1990 (E. J. Corey, 역합성 분석)



문제 12.41 · (Z)-14-methylhexadec-8-en-1-ol (Trogoderma 성페로몬)


중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron* 1977, 33, 2447–2450

반응 5-메틸헵트-1-엔 $\rightarrow \text{BH}_3 \cdot \text{THF} \rightarrow \text{Br}_2, \text{NaOMe} \rightarrow$ 1-브로모-5-메틸헵테인 $\rightarrow \text{HC}\equiv\text{CLi} \rightarrow \text{BuLi; I(CH}_2)_7\text{OTHP} \rightarrow \text{TsOH, MeOH} \rightarrow \text{H}_2, \text{Lindlar}$

개념 anti-Markovnikov 유기붕소 브로민화, 아세틸라이드 이중 알킬화, THP 탈보호, Lindlar cis 환원; 키랄 중심 불변

노벨상 1979 (H. C. Brown·G. Wittig, 붕소-인 화합물의 유기합성 시약화) — 수소화붕소화



제13장 알코올과 페놀

- $\text{ROH} + \text{SOCl}_2/\text{py}$ 또는 $\text{TsCl}/\text{py} \rightarrow \text{NaX} \rightarrow \text{RX}$ ($\text{S}_\text{N}2$, 입체 반전); $3^\circ \text{ROH} + \text{HX} \rightarrow \text{S}_\text{N}1$
- $3^\circ \text{ROH} + \text{진한 H}_2\text{SO}_4$, 가열 $\rightarrow$ 알켄($\text{E}1$); $\text{ROTs} + \text{NaOEt} \rightarrow$ 알켄($\text{E}2$)
- $1^\circ \text{ROH} + \text{PCC} \cdot \text{DMP} \cdot \text{Swern} \rightarrow$ 알데하이드;
 $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 카복실산; $2^\circ \text{ROH} \rightarrow$ 케톤
- 페놀 + $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow$ 벤조퀴논 (퀴논 $\rightleftharpoons$ 하이드로퀴논 산화환원)
- NaBH_4 : 알데하이드·케톤만 환원 / LiAlH_4 : 에스터·카복실산까지 1°ROH 로 환원
- $\text{RMgBr} + \text{알데하이드} \cdot \text{케톤} \rightarrow 2^\circ \cdot 3^\circ \text{ROH}$; + 에스터 $\rightarrow$ R 2개 첨가된 3°ROH
- OH 보호: $\text{TMSCl}/\text{Et}_3\text{N} \rightarrow \text{ROTMS}$ (Grignard 공존) $\rightarrow$ TBAF 또는 H_3O^+ 로 탈보호
- 알코올 산성도: 공명·유도·용매화 (페놀 $\text{pK}_a \approx 10 \gg$ 알코올 pK_a 15-18)

문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 3390–3400

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2000, 65, 9249–9251

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Agric. Food Chem.* 1986, 34, 140–144

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

문제 13.63 · (S)-gizzerosine 합성 중간체


중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2007, 48, 8479–8481

반응 Boc-아미노 엔알 에스터 $\rightarrow$ 1) H_2 , Pd/C (C=C 수소화) 2) NaBH_4 , MeOH ($\text{CHO} \rightarrow 1^\circ \text{OH}$) $\rightarrow$ 6-하이드록시 Boc-아미노 에스터

개념 화학선택적 환원: NaBH_4 는 에스터·카바메이트를 건드리지 않음(LiAlH_4 사용 불가)

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문제 13.68 · briarellin E

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 5458–5470

반응 OTBS 2개를 가진 브리아렐린 골격 $\rightarrow$ TBAF $\rightarrow$ 두 실릴 에터가 모두 OH로 바뀐 트라이올(골격·입체 유지)

개념 F-에 의한 실릴 보호기 제거(Si-F 결합이 매우 강함)

문제 13.69 · duryne

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Nat. Prod. 2011, 74, 1262–1267

반응 탄소 11개 이하 단위로 대칭 C30 다이엔다이인 다이올 합성: 아세틸렌 이중 알킬화 → Lindlar(cis); 말단은 E-엔알 + $\text{HC}\equiv\text{CMgBr}$ → 프로파질 알코올개념 알카인 알킬화, Lindlar(cis)/Na-NH₃(trans) 환원, 아세틸라이드의 카보닐 첨가, 대칭 분자 설계

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화

문제 13.70 · estragole


중요도 ★★☆☆

문헌 J. Nat. Prod. 1987, 50, 990–991

반응 p-크레솔 → NaOH, CH₃I (O-메틸화) → NBS, hν (벤질 브로민화) → Mg → 에틸렌 옥사이드 → TsCl/py → t-BuOK → 4-알릴아니솔

개념 페녹사이드 Williamson, 벤질 라디칼 브로민화, Grignard 탄소 사슬 연장, 부피 큰 염기 E2

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문제 13.71 · 2-methylheptan-4-one / 3-methylheptan-4-one


중요도 ★★☆☆

문헌 J. Nat. Prod. 1996, 59, 49–51

반응 1-뷰텐 → BH₃·THF; H₂O₂, NaOH → PCC → 뷰탄알; i-BuMgBr(또는 sec-BuMgBr) 첨가 → 2° ROH → Na₂Cr₂O₇ 산화 → 케톤

개념 알켄 → 알코올(anti-Markovnikov), Grignard 역합성, 2° 알코올 산화

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문제 13.72 · 5,9,12,16-tetramethyleicosane (토마토 노린재 페로몬)

중요도 ★★☆☆

문헌 J. Chem. Ecol. 2012, 38, 814–824

반응 2-사이클로프로필헥산-2-올 + HBr → 사이클로프로필카비닐 양이온 고리 열림 → 동종알릴 브로민화물(E/Z); Grignard 2당량 + 헥세인-2,5-다이온 → 탈수 → H₂/Pd

개념 SN1형 사이클로프로필카비닐 → 동종알릴 고리 열림(고리 변형 해소), Grignard·탈수·수소화 조합


노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1989, 111, 6682–6690

반응 K 고리 테트라하이드로피란 → TBAF(실릴 제거, 다이올) → TsCl/py(1° OH만 토실화) → NaOMe(3° 알콕사이드의 분자 내 SN2) → 다리걸친 이환 에터

개념 선택적 1° 토실화, 분자 내 Williamson 에터 합성, 두 작용기가 같은 면(syn)일 때만 고리 닫힘



제14장 에터와 에폭사이드; 싸이올과 설파이드

- Williamson 에터 합성: $\text{ROH} \rightarrow 1) \text{NaH} \ 2) 1^\circ \text{RX} \rightarrow \text{ROR}$ (SN2; 3°RX 는 E2)
- 알콕시수은화-탈수은화: 알켄 + $\text{Hg}(\text{OAc})_2$, $\text{ROH} \rightarrow \text{NaBH}_4 \rightarrow$ Markovnikov 에터
- 에터 산 분해: $\text{ROR} + \text{과량 HX, 가열} \rightarrow 2 \text{RX}$ ($\text{ArOR} \rightarrow \text{ArOH} + \text{RX}$)
- 에폭시화: RCO_3H (입체특이적 syn) 또는 $\text{Br}_2/\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH}$ (할로하이드린 고리 닫힘)
- Sharpless 비대칭 에폭시화: 알릴 알코올 + $t\text{-BuOOH}$, $\text{Ti}(\text{OiPr})_4$, (+)/(-)-DET
- 에폭사이드 열림: 강한 친핵체(RO^- , CN^- , RS^- , RMgBr , LiAlH_4) $\rightarrow$ 덜 치환된 C에 SN2(반전); 산 촉매 $\rightarrow$ 더 치환된 C
- Grignard + 에폭사이드 $\rightarrow$ OH가 새 사슬 2번 탄소 ($\text{C}=\text{O}$ 첨가는 1번 탄소)
- 싸이올: $\text{RX} + \text{NaSH} \rightarrow \text{RSH}$; $2 \text{RSH} \rightleftharpoons \text{RSSR}$ (산화 $\text{Br}_2/\text{환원 Zn}\cdot\text{HCl}$); $\text{R}_2\text{S} \rightarrow \text{NaIO}_4 \rightarrow \text{설파사이드} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_2 \rightarrow \text{설폰}$

문제 14.60 · reidispongiolide A 합성 단편


중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2009, 50, 5012–5014

반응 트리틸 글리시딜 에터 $\rightarrow 1) \text{CH}_2=\text{CHMgBr} \ 2) \text{H}_2\text{O}$ (덜 치환된 CH_2 공격) $\rightarrow \text{A} \rightarrow \text{NaH, CH}_3\text{I} \rightarrow \text{B} \rightarrow \text{cat. OsO}_4, \text{NMO} \rightarrow$ 다이올 부분입체이성질체 C + D

개념 Grignard의 에폭사이드 SN2 열림(입체중심 유지), Williamson 메틸화, syn-다이하이드록시화

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문제 14.61 · fumonisins B1 (C7-C9 도입)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 3233–3236

반응 말단 에폭사이드 + 프로파질 브로민화물에서 만든 프로파질 Grignard $\rightarrow$ 덜 치환된 C6 공격 $\rightarrow$ 알카인 알코올

개념 탄소 친핵체에 의한 에폭사이드 위치선택적 열림(SN2)

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화

문제 14.62 · (+)-myrrhanol A (guggul 성분)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2009, 74, 6151–6156

반응 엑소 메틸렌 데칼린 $\rightarrow 1) \text{MCPBA}$ (덜 가려진 면 에폭시화, 스피로 에폭사이드) $2) \text{LiAlH}_4 \ 3) \text{H}_2\text{O} \rightarrow 3^\circ$ 알코올 단일 부분입체이성질체

개념 과산 에폭시화의 면선택성, LiAlH_4 H-의 덜 치환된 C 공격 — C-O 결합이 끊어지지 않아 입체 보존

문제 14.63 · (S,S)-reboxetine (Pfizer 공정)


중요도 ★★★

문헌 *Org. Proc. Res. & Devel.* 2007, 11, 354–358

반응 (E)-신나밀 알코올 → t-BuOOH, Ti(OiPr)₄, (-)-DIPT → (2R,3R)-에폭시 알코올 → 2-에톡시페녹사이드 SN2(벤질 C, 반전) → 다이올 → TMS 보호/2° OMs/탈보호 → NaOH (분자 내 SN2) → 말단 에폭사이드

개념 Sharpless 비대칭 에폭시화, 에폭사이드 SN2 열림 위치·반전, 선택적 보호, 분자 내 Williamson

노벨상 2001 Knowles · Noyori · Sharpless — 비대칭 촉매 산화(Sharpless 에폭시화)



문제 14.64 · 2-C-methyl-D-erythritol


중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2002, 67, 4856–4859

반응 (E)-알릴 알코올 → Sharpless((-)-DET) 에폭시화 → 1° OH 아세틸화 → H₃O⁺: 아세테이트 C=O 산소가 3° 에폭사이드 C 공격 → 다이옥솔라날륨 → 이한 오쏘에스터

개념 Sharpless 에폭시화 시약 선택, 인접기 관여(아세톡시)에 의한 산 촉매 에폭사이드 열림

노벨상 2001 Knowles · Noyori · Sharpless — 비대칭 촉매 산화(Sharpless 에폭시화)




문제 14.65 · Corey-Chaykovsky 에폭시화

중요도 ★★★

문헌 *Synth. Commun.* 2003, 33, 2135–2143

반응 트라이메틸설포늄 + NaH → 황 일리드; 아세트페논 C=O 공격 → 베타인 알콕사이드 → 분자 내 SN2(Me₂S 이탈) → 2-메틸-2-페닐옥시레인

개념 황 일리드의 카보닐 첨가 후 고리 닫힘(Wittig과 대비: 알켄 대신 에폭사이드)



문제 14.66 · Payne 자리옮김 (탄수화물 합성 전략)


중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1982, 104, 3515–3516

반응 2,3-에폭시 알코올 + NaOH/H₂O, PhSH → 1° 알콕사이드가 C2 공격(반전)하여 말단 에폭사이드로 이동(Payne) → PhS-가 CH2 공격 → 1-페닐싸이오-2,3-다이올; (b) Sharpless((+)-DET) 후 같은 과정

개념 Payne 자리옮김 평형 + 말단 에폭사이드 선택적 포획, Sharpless 에폭시화와 결합한 당 합성

노벨상 2001 Knowles · Noyori · Sharpless — 비대칭 촉매 산화(Sharpless 에폭시화)



문제 14.67 · laureatin (골격 자리옮김)

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 7883–7890

반응 옥세테인 알켄 + Br₂ → 브로모늄 → 옥세테인 O가 5-exo 공격(옥소늄) → 인접 OH가 옥세타늄 C 공격(반전) → THF + 에폭 사이드

개념 할로늄 이온의 분자 내 산소 포획, 고리 변형 해소에 의한 옥세테인 → THF 고리 확장


문제 14.68 · 에폭시알켄의 옥시수은화

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1981, 46, 930–939

반응 2-알릴옥시레인 + 1) Hg(OAc)₂, H₂O 2) NaBH₄ → Markovnikov 수화물(96%); 사슬이 한 개 긴 경우 에폭사이드 O가 머 큐리늄을 5-exo 공격 → 이환 옥소늄 → THF·THP 고리 생성물

개념 옥시수은화(Markovnikov, 자리옮김 없음), 고리 크기(5원 TS)에 따른 분자 내 친핵체 경쟁




문제 14.69 · 할로늄 유도 알콕시 이동

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2008, 73, 5592–5594

반응 MOM 에터 알켄 + 1) I₂ 2) PhSH, Et₃N → 아이오도늄을 MOM의 OMe 산소가 공격(6원 고리 옥소늄) → 단편화로 OMe 이동 + 옥소카베늄을 PhS⁻가 포획 → 1,3-syn 아이오도 에터

개념 할로늄 이온의 인접기 관여, 옥소카베늄 이온 포획, 의자형 6원 TS의 입체 제어



문제 14.70 · artemisinin 유도체

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2002, 67, 1253–1260

반응 9,10-에폭사이드 + (CF₃)₂CHOH, cat. H₃O⁺ → C10(아노머 탄소)에 옥소카베늄 형성 → HFIP가 덜 가려진 면 첨가 → OH와 OCH(CF₃)₂가 cis

개념 산 촉매 에폭사이드 열림에서 고리 산소의 옥소카베늄 안정화 → 위치·입체 선택성 역전(SN1형)

제15장 적외선 분광법과 질량 분석법

- IR 진동수 $\propto$ 결합 세기·환산 질량: $C\equiv C/C\equiv N$ 2100-2300, $C=O$ 1650-1850, $X-H$ 2750-4000 cm^{-1}
- 공명기이성 $C=O$ 는 낮은 파수로 이동; 3000 cm^{-1} 기준 sp^2/sp^3 C-H 구분
- 세기 $\propto$ 쌍극자 변화: $C=O$ 강함, 대칭 $C=C/C\equiv C$ 약하거나 보이지 않음
- 수소결합 O-H는 넓은 띠, 묶은 용액 자유 O-H는 좁은 띠; 1° 미만 N-H 2개 띠
- MS: $M^+ \cdot$, 기준 봉우리, 질소 규칙, $M+1$ (탄소 수 $\approx$ 상대세기/1.1%), $M+2$ (Cl 1/3, Br 1:1)
- 단편화: α -절단, 벤질 절단, McLafferty 자리옮김(γ -H 이동), 안정한 양이온 생성 방향
- HRMS 정확 질량으로 분자식 결정; ESI는 큰 생체분자에 사용
- 수소 결핍 지수(HDI): 할로젠은 H로, O 무시, N은 H 하나 빼기

문제 15.69 · 안트라퀴논 산성 염료

중요도 ★☆☆

문헌 *Anal. Chem.* 2013, 85, 831–836

반응 섬유에서 레이저로 직접 추출한 염료의 음이온 HRMS: 423.0647(M^-), 424.0681(^{13}C), 425.0605(^{34}S), 425.0715($^{13}C_2$)

개념 동위원소 패턴과 HRMS 질량 결손으로 $^{13}C_2$ 와 ^{34}S 봉우리 구분

노벨상 2002 Fenn · Tanaka · Wüthrich — 생체분자 질량분석(ESI)-NMR


문제 15.70 · ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate 케토-엔올

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1952, 74, 4070–4073

반응 β -케토 에스터 케토형(1740 에스터, 1720 케톤) $\rightleftharpoons$ 엔올형(1660 공명기이성·수소결합 에스터 $C=O$, 1620 $C=C$)

개념 케토-엔올 토토머화, 공명기이성·분자 내 수소결합에 의한 $C=O$ 흡수 이동과 엔올 안정화



문제 15.71 · 2-(4-bromophenyl)ethanol

중요도 ★★★

문헌 *J. Chem. Ed.* 2008, 85, 832–833

반응 X(1-아릴에탄올): $M-15$ (α -절단, CH_3 손실) 187/185; Y(2-아릴에탄올): $M-31$ (CH_2OH 손실) $\rightarrow$ 브로모벤질(트로필륨) 양이온 171/169

개념 알코올의 α -절단, 벤질 절단, Br 동위원소 쌍($M/M+2 \approx 1:1$)


문제 15.72 · myosmine

중요도 ★★★

문헌 *Anal. Chem.* 1954, 26, 1428–1431

반응 IR에 N-H 띠(3300-3500) 없음 $\rightarrow$ 엔아민형이 아닌 이민형(1-피롤린) 토토머; 1621 cm^{-1} 강한 띠 = 공명기이성 $C=N$

개념 IR로 토토머 판별(N-H 유무, $C=N$ 신축)




문제 15.73 · 테트라졸 ⇌ 아자이드 원자가 토토머

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1959, 81, 4671–4673

반응 이환 테트라졸 1 ⇌ 2-아자이드-1-피롤린 2; 2120-2160 cm⁻¹ 아자이드 비대칭 신축 띠가 없음 → 평형이 테트라졸 쪽

개념 IR 특성 띠(-N3 ≈ 2100-2160 cm⁻¹)로 평형 위치 판단



문제 15.74 · cyclohexanone

중요도 ★★☆☆

문헌 *Appl. Spectrosc.* 1960, 14, 95–97

반응 저분해능 기준 봉우리 m/z 55가 HRMS에서 55.0183(C3H3O⁺)과 55.0546(C4H7⁺)로 분리

개념 HRMS 정확 질량으로 같은 정수 질량 이온의 분자식 구분

문제 15.75 · 사이클로프로페인 지방산 피롤리딘 아마이드

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1977, 42, 126–129

반응 기준 봉우리 m/z 113 = McLafferty 자리옮김(γ-H가 C=O로 이동, β-절단) → CH₂=C(OH)·N(C₄H₈)⁺ ·

개념 McLafferty 자리옮김

문제 15.76 · pinolenic acid


중요도 ★★☆☆

문헌 *Anal. Chem.* 2011, 83, 4738–4744

반응 오존 존재 ESI: [M+H]⁺ 279 + 오존 분해 알데하이드 211·171·117 → 이중결합 위치 Δ5, Δ9, Δ12 결정; 음이온 모드 277·209·169·115

개념 오존 분해로 C=C 위치 결정, ESI [M+H]⁺/[M-H]⁻

노벨상 2002 Fenn · Tanaka · Wüthrich — 생체분자 질량분석(ESI)·NMR



문제 15.77 · 스테로이드 클로로하이드린

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1957, 79, 243–247

반응 trans-2,3-클로로하이드린: 이중 적도(gauche) 이성질체는 분자 내 O-H···Cl 수소결합 → 3594 cm⁻¹ (더 넓은); 이중 축(anti)은 자유 OH 3617

개념 형태(축/적도)와 분자 내 수소결합에 의한 O-H 흡수 이동

노벨상 1969 Barton · Hassel — 형태 분석

문제 15.78 · phosphatidic acid (16:0/18:1)

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2006, 128, 58–59

반응 음이온 MS m/z 673 → 오존 처리 시 563(Δ9 알데하이드), 용매 MeOH 611 / EtOH 625 (Criegee 카보닐 옥사이드가 알코올에 포획)

개념 오존 분해 단편으로 C=C 위치 결정, Criegee 중간체

노벨상 2002 Fenn · Tanaka · Wüthrich — 생체분자 질량분석(ESI)·NMR

제16장 핵자기공명 분광법

- 화학적 동등성: 동위·거울상위 양성자는 동등, 부분입체위 양성자는 비동등(치환 시험)
- 화학적 이동: CH₃ 0.9, CH₂ 1.2, CH 1.7 + 보정(알코올·에터 O +2.5, 에스터 O +3.0, C=O +1.0)
- 방향족 H $\approx$ 7 ppm(반자기 이방성), 알데하이드 H $\approx$ 10, COOH $\approx$ 12 ppm
- 적분 = 상대 양성자 수; n+1 규칙, 짝지음 상수 J, OH는 보통 갈라지지 않음
- 구조 결정 순서: HDI $\rightarrow$ 신호 수·적분 $\rightarrow$ (δ , 다중도) $\rightarrow$ 조각 $\rightarrow$ 조립 $\rightarrow$ 검증
- ^{13}C : C=O 160-220, sp^2 100-150, C-O 50-100, sp^3 0-50 ppm; 대칭으로 신호 수 결정
- DEPT-90: CH만; DEPT-135: CH·CH₃ 양, CH₂ 음, 4차 C 없음

문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 Food Chem. 2016, 196, 211–219

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

문제 16.66 · methyl 2-acetoxypropanoate

중요도 ★★★

문헌 Angew. Chem. Int. Ed. 2011, 50, 8387–8390

반응 C₆H₁₀O₄, IR 1747(에스터), ^1H 5.1(q,1H)·3.75(s,3H)·2.1(s,3H)·1.5(d,3H), ^{13}C 171·170·69·52·21·17 $\rightarrow$ O-아세틸 락트산 메틸

개념 IR· ^1H · ^{13}C 종합 구조 결정, 아실옥시-에스터 α -CH의 강한 탈차폐(5.1 ppm)

문제 16.72 · brevianamide S

중요도 ★☆☆

문헌 Org. Lett. 2012, 14, 4770–4773

반응 이량체 다이케토피페라진 알칼로이드의 모든 ^1H 신호 δ -다중도 예측(역프레닐 CH₃ 1.5 s, 비닐 6.1 dd/5.1 dd, N-CH₂ 4.1 t 등)

개념 복잡 분자의 화학적 이동·갈라짐 예측

문제 16.73 · 1,3,6-cyclononatriene 음이온

중요도 ★☆☆

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1973, 95, 3437–3438

반응 사이클로노나트라이엔 + KNH₂/액체 NH₃ $\rightarrow$ 이중 알릴 C-H 탈양성자화 $\rightarrow$ 헵타트라이엔일 음이온; 음전하 탄소(홀수 위치) H는 3.4–3.7, 마디 위치 H는 5.5–5.6 ppm

개념 공명 구조와 전하 분포에 따른 차폐, 대칭과 신호 수


문제 16.74 · flutamide

중요도 ★☆☆

문헌 J. Chem. Ed. 2003, 80, 1439–1443

반응 4-나이트로-3-(트라이플루오로메틸)아닐린 + 아이소부틸 클로라이드, 피리딘 $\rightarrow$ 플루타마이드; 아마이드화 후 방향족 H 모두 저자기장 이동(N 고립쌍이 C=O로 비편재)

개념 치환기의 공명·유도 효과가 방향족 H 화학적 이동에 미치는 영향, 아민 아실화



문제 16.75 · 3-acetyl-7-(diethylamino)coumarin		중요도 ★★☆☆
문헌	<i>J. Chem. Ed.</i> 2006, 83, 287–289	
반응	가장 저자기장 신호 8.42 = H4(두 C=O와 공명하는 β-H), 7.38 = H5; 밀고-당기는 편극으로 C3=C4 IR 신축이 쿠마린보다	
강함		
개념	공명에 의한 β-H 탈차폐, 쌍극자 변화와 IR 세기	

문제 16.76 · 하이드로나프타센 부분입체이성질체		중요도 ★☆☆
문헌	<i>Tetrahedron Lett.</i> 2011, 52, 4182–4185	
반응	비스(TMS-에타인일)벤즈알데하이드 + Fischer 카벤 (CO) ₅ Cr=C(OMe)R → 오환 비스(사이클로헥센온) 부분입체이성질체	
3:4; ¹³ C 신호 수로 구별		
개념	분자 대칭(거울면 유무)과 ¹³ C 신호 수	
노벨상	1973 E. O. Fischer · Wilkinson — 유기금속(금속 카벤) 화학	

제17장 콘쥬게이션 파이계와 페리고리 협동반응

- 1,3-뷰타다이엔 + HBr: 저온 1,2-첨가(속도론적) vs 고온 1,4-첨가(열역학적) — 알릴 양이온 공명
- Diels-Alder [4+2]: s-cis 다이엔 + EWG 친다이엔체 → 사이클로헥센; 입체특이적, endo 우세
- FMO: 다이엔 HOMO-친다이엔체 LUMO; 열적 [4+2] 허용, 열적 [2+2] 금지·광화학 허용
- 전자고리화: 4π 열 콘로테이션/광 디스로테이션, 6π 열 디스로테이션/광 콘로테이션
- 시그마 자리옮김 [3,3]: Cope(1,5-다이엔), Claisen(알릴 바이닐 에터 → γ,δ-불포화 카보닐)
- UV-Vis: 콘쥬게이션 증가 → λ_{max} 증가; Woodward-Fieser 규칙(217 + 30·5·5·39)
- 시각: 11-cis-레티날 → 전부-trans 광이성질화(로돕신)

문제 17.71 · gelsemoxonine

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 17634–17637

반응 cis-다이바이닐사이클로프로페인(실릴 엔올 에터 + 옥스인돌 알킬리덴) 70 °C → [3,3] 시그마 자리옮김(보트 TS) → 스피로-옥스인돌 사이클로헥타다이엔

개념 다이바이닐사이클로프로페인-사이클로헥타다이엔 자리옮김(Cope형), 고리 변형 해소

노벨상 1981 Fukui · Hoffmann — 프런티어 오비탈·궤도 대칭 보존

문제 17.72 · 다이싸이엔일에텐 광변색 무수물


중요도 ★★★

문헌 J. Photochem. Photobiol. A 2006, 184, 177–183

반응 다이싸이엔일 말레산 무수물 → UV(6π 광화학 콘로테이션 고리 닫힘) → 고리형 착색 이성질체(두 CH₃ trans, 키랄·라섬) → 가시광으로 고리 열림

개념 광화학 6π 전자고리화 = 콘로테이션, 광변색(photochromism)

노벨상 1981 Fukui · Hoffmann — 프런티어 오비탈·궤도 대칭 보존



문제 17.73 · chelidone (최초 전합성)

중요도 ★★★

문헌 J. Am. Chem. Soc. 1971, 93, 3836–3837

반응 벤조사이클로뷰텐 120 °C → 4π 열적 콘로테이션 고리 열림(o-퀴노다이메테인) → 분자 내 Diels-Alder(알카인 친다이엔체) → 벤조[c]페난트리딘 골격

개념 전자고리화 고리 열림 + 분자 내 Diels-Alder 연쇄

노벨상 1981 Fukui · Hoffmann — 프런티어 오비탈·궤도 대칭 보존

문제 17.74 · atropurpuran 합성 연구

중요도 ★★★

문헌 Org. Lett. 2010, 12, 1152–1155

반응 아미노 테트라렌 135 °C → 6π 열적 디스로테이션 전자고리화(사이클로헥사다이엔) → 사슬의 알릴기와 분자 내 Diels-Alder → 바이사이클로[2.2.2]옥텐 + 피페리딘


개념 6π 전자고리화 → 분자 내 [4+2] 연쇄 반응

노벨상 1981 Fukui · Hoffmann — 프런티어 오비탈·궤도 대칭 보존

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2000, 122, 190–191

반응 싸이오아마이드 → 1) BuLi (Z)-싸이오엔올레이트 2) 2-사이클로헥실리덴에틸 브로민화물 (S-알킬화) → 케텐 N,S-아세탈 → [3,3] 싸이오-Claisen (의자 TS) → 새 α -입체중심 단일 배열

개념 Claisen [3,3] 자리옮김, 의자형 전이 상태, C2-대칭 키랄 보조기의 면선택성



제18장 방향족 화합물

- 벤질 산화: $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7/\text{H}_2\text{SO}_4$ 또는 KMnO_4 , 가열 $\rightarrow$ 벤조산 (벤질 H 필요)
- NBS, 가열/hv $\rightarrow$ 벤질 브로민화; 벤질 할라이드는 $\text{S}_\text{N}1$ · $\text{S}_\text{N}2$ · $\text{E}1$ · $\text{E}2$ 모두 가능
- Birch 환원(Na , MeOH , NH_3) $\rightarrow$ 1,4-사이클로헥사다이엔: EDG 탄소는 환원 안 됨, EWG 탄소는 환원
- 벤젠 촉매 수소화는 강한 조건(Ni , 100 atm, 150 °C); 바이닐기는 선택적 수소화
- Hückel $4n+2$ 규칙: 방향족/반방향족/비방향족; Frost 원; 사이클로부타다이엔 반방향족, COT 비방향족(통 모양)
- 사이클로펜타다이엔일 음이온·트로필륨 양이온·사이클로프로펜일 양이온 방향족
- 피리딘 N 고립쌍(sp^2 , 염기성) vs 피롤 N 고립쌍(방향족 6π 에 참여, 비염기성)
- 분광: 방향족 H ≈ 7 ppm, 벤질 H 2-3 ppm, ^{13}C 100-150 ppm; 고리 전류에 의한 차폐/탈차폐

문제 18.66 · 다이하이드로[14]아놀렌 다이음이온

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 5385–5388

반응 퀴노이드 다이사이아노메틸렌 거대고리 $\text{A} + 2\text{e}^- \rightarrow$ 다이음이온 B: 14π 둘레($4n+2$, $n=3$) $\rightarrow$ 방향족화가 쉬운 환원의 추진력

개념 Hückel 규칙, 음전하·홀전자 공명 비편재


문제 18.67 · 테트라졸로-벤즈아이소싸이아졸 $\rightleftharpoons$ 아자이드

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1959, 81, 4671–4673

반응 고리에 남는 N(S에 결합)은 양쪽 모두 sp^2 : 테트라졸에서는 피롤형(고립쌍이 p 궤도, 방향족 6π), 아자이드에서는 피리딘형(고립쌍 sp^2)

개념 헤테로고리 N의 혼성과 고립쌍의 방향족성 참여 여부



문제 18.68 · 1,2,5,6-tetracyanocyclooctatetraene- Mg^+

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2005, 127, 13070–13078

반응 통 모양 COT의 1,2,5,6-CN 4개가 같은 면으로 모여 Mg^+ 에 동시 배위; 평면 테트라사이아노벤젠은 CN이 평면 내에서 발산하여 불가

개념 COT 비방향족(통 모양) vs 벤젠 평면 방향족, 분자 기하


문제 18.69 · phenanthrene (결합 고정)

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1985, 107, 6678–6683

반응 나프탈렌 C1-C2 < C2-C3 결합 길이; 페난트렌 C9-C10은 공명 구조 5개 중 4개에서 이중결합 $\rightarrow$ Br_2 가 C9=C10에 첨가 $\rightarrow$ trans-9,10-다이브로모-9,10-다이하이드로페난트렌

개념 다환 방향족의 결합 차수(공명 구조 수), 방향족 육중항을 유지하는 첨가



제19장 방향족 치환반응

- EAS: $\text{Br}_2/\text{FeBr}_3$, $\text{Cl}_2/\text{AlCl}_3$, $\text{HNO}_3/\text{H}_2\text{SO}_4(\text{NO}_2^+)$, 발연 $\text{H}_2\text{SO}_4(\text{SO}_3, \text{가역})$ — 시그마 착물(아레늄) 경우
- Friedel-Crafts 알킬화(자리옮김·다중 알킬화 문제) vs 아실화(아실륨, 자리옮김 없음) → Clemmensen $\text{Zn}(\text{Hg})/\text{HCl}$
- $\text{ArNO}_2 \rightarrow \text{Fe}(\text{Zn}, \text{Sn})/\text{HCl} \rightarrow \text{ArNH}_2$; 겔사슬 KMnO_4 산화 → ArCOOH
- 배향: 강·중 활성화기($-\text{NH}_2$, $-\text{OH}$, $-\text{OR}$, $-\text{NHCOR}$) o/p; 할로젠 약한 불활성화 o/p; $\text{C}=\text{O}$, CN , NO_2 , CX_3 m
- 다중 치환: 가장 강한 활성화기가 지배, 입체 효과, SO_3H 차단기 활용
- SNAr : 이탈기 o/p에 강한 EWG(NO_2) → 첨가-제거 (Meisenheimer 착물), $\text{F} > \text{Cl}$
- 벤자인: $\text{ArCl} + \text{NaNH}_2/\text{NH}_3$ 또는 NaOH $350^\circ\text{C} \rightarrow$ 제거-첨가 (동위원소 표지 증거)


문제 19.83 · 4-X-4'-Y-스틸벤 브로민화

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1973, 38, 493–499

반응 스틸벤 + $\text{Br}_2 \rightarrow$ 1,2-다이브로모 다이아릴에테인; 속도 $\text{Y} = \text{OMe} > \text{Me} > \text{Cl} > \text{NO}_2$ (양전하 발생 TS를 EDG가 안정화, Hammett $\rho < 0$)

개념 치환기 전자 효과와 친전자성 첨가 속도




문제 19.84 · 아미노테트라린 중간체 (2-tetralone)

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 5503–5514

반응 아릴아세틸 클로라이드 + $\text{CH}_2=\text{CH}_2$, $\text{AlCl}_3 \rightarrow$ 아실륨에 에틸렌 첨가 $\rightarrow$ 1° 탄소 양이온(또는 β -클로로케톤) $\rightarrow$ 분자 내 Friedel-Crafts 알킬화 $\rightarrow$ 8-브로모-5-메틸-2-테트라론

개념 아실륨 이온, 분자 내 Friedel-Crafts 알킬화(고리 형성), 방향족성 회복




문제 19.85 · SNAr 알카인화

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2007, 9, 2741–2743

반응 1-클로로-3-플루오로-2-나이트로벤젠 + Na 아세틸라이드 $\rightarrow$ F만 치환(Cl 유지) — 첨가(Meisenheimer 착물 형성)가 속도 결정 단계

개념 SNAr 첨가-제거, 이탈기 $\text{F} > \text{Cl}$ 의 근거(전기음성도에 의한 ipso C 활성화)




문제 19.86 · 삼중수소 표지 메톡시벤젠

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1967, 89, 4418–4424

반응 $\text{ArT} + \text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{T}$ 가 결합한 C에 양성자화(아레늄 이온, OMe가 o/p 안정화) $\rightarrow \text{T}^+$ 손실(탈삼중수소화); OMe 3개(2,4,6) 쪽이 더 빠름

개념 EAS 양성자 교환 메커니즘, 활성화기 수와 시그마 착물 안정성



문제 19.87 · picryl iodide

중요도 ★★☆☆

문헌 *Prog. Stereochem.* 1958, 2, 125

반응 큰 I 원자 때문에 오쏘 NO₂ 2개가 고리 평면 밖으로 비틀림 $\rightarrow$ 공명 불가(C-N 1.45 Å); 파라 NO₂는 공평면·공유게이션(1.35 Å)

개념 공명의 입체 저해(steric inhibition of resonance)

문제 19.88 · 7-hydroxynitidine (벤조[c]페난트리딘)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 1999, 1, 985–988

반응 아릴 브로마이드 + NaNH₂(2당량) $\rightarrow$ N-H 탈양성자화 + 오쏘 H 제거 $\rightarrow$ 벤자린 $\rightarrow$ 나프틸 C2의 분자 내 친핵 공격(고리 형성) $\rightarrow$ H₂O $\rightarrow$ 다이하이드로벤조[c]페난트리딘

개념 제거-첨가(벤자린) 메커니즘, 분자 내 아라린 고리화


문제 19.89 · 9-iodo-10-phenylphenanthrene

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2005, 70, 3511–3517

반응 2-(페닐에타인일)바이페닐 + ICl $\rightarrow$ I⁺가 알카인 활성화 $\rightarrow$ 메톡시페닐 고리의 분자 내 SEAr(6-endo) $\rightarrow$ OMe 파라 위치 공격 A : 오쏘 위치 B $\approx$ 3 : 1

개념 분자 내 친전자성 방향족 치환, 배향(o/p) + 입체 장애



문제 19.90 · 3,3-diphenylquinuclidinium (초친전자체)


중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1999, 64, 6702–6705

반응 퀴누클리딘-3-온 + 벤젠, CF₃SO₃H → N·O 이중 양성자화 다이양이온(초친전자체) → 벤젠 SEAr 2회(카보닐 C, 이후 벤질 3° 양이온) → 3,3-다이페닐 퀴누클리디늄

개념 초강산·초친전자체, 하이드록시알킬화형 Friedel-Crafts

노벨상 1994 Olah — 탄소 양이온·초강산 화학




문제 19.91 · BN-dibenzo[g,p]chrysene

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2011, 133, 18614–18617

반응 다이아릴아민 → 1) BuLi 2) BCl₃ (N-BCl₂) → AlCl₃(보레늄 양이온) → 분자 내 친전자성 붕소화 2회 → BN 도핑 다환 방향족

개념 보레늄 친전자체의 SEAr, BN/CC 등전자 방향족성, 만(fjord) 영역 입체 반발



문제 19.92 · spirobifluorene

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2004, 6, 2381–2383

반응 비스(바이페닐-2-일) 케톤 + cat. H₃O⁺ → 카보닐 양성자화 → 분자 내 SEAr(OMe 오쏘) → 플루오렌-9-올 → 탈수 → 9-아릴 플루오렌일 양이온 → 2차 SEAr → 9,9'-스피로바이플루오렌

개념 이중 분자 내 Friedel-Crafts(하이드록시알킬화), 탄소 양이온

제20장 알데하이드와 케톤

- 친핵성 첨가: H_2O (수화물), $\text{ROH}/[\text{H}^+]$ (헤미아세탈 → 아세탈), $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (고리 아세탈 보호기), $\text{HS}(\text{CH}_2)_n\text{SH}$ (싸이오아세탈 → Raney Ni → CH_2)
- 1° 아민 → 이민, 2° 아민 → 엔아민, NH_2OH → 옥심, NH_2NH_2 → 하이드라존 → Wolff-Kishner(NaOH , 가열) → CH_2
- $\text{LiAlH}_4 \cdot \text{NaBH}_4$ → 알코올; RMgBr → 알코올; HCN/KCN → 사이아노하이드린
- Wittig: $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHR}$ → 알켄 (불안정 일리드 Z, 안정 일리드 E); $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHOMe}$ → 엔올 에터 → H_3O^+ → 1C 연장 알데하이드
- Baeyer-Villiger: RCO_3H → 에스터/락톤 (이동 경향 $3^\circ > 2^\circ \cdot \text{Ph} > 1^\circ > \text{CH}_3$)
- 아세탈은 염기·친핵체에 안정 → 화학선택적 보호
- 분광: $\text{C}=\text{O}$ 1715 cm^{-1} , 알데하이드 C-H $2700/2850$, $\text{CHO} \approx 10\text{ ppm}$, ^{13}C $\text{C}=\text{O} \approx 200\text{ ppm}$

문제 (본문 인용) ·

중요도 ★☆☆

문헌 *Tetrahedron* 2012, 68, 9289–9292

반응 장 본문(예제·학습 문제)에서 인용된 문헌 — 제공된 문제 페이지에는 해당 문제가 없음

개념

문제 20.83 · cyclodidemniserinol trisulfate 합성 연구

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2009, 50, 4587–4591

반응 β -케톤 에스터 → 1) $\text{HOCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$, TsOH (케톤 아세탈 보호) 2) LiAlH_4 (에스터 → 1° OH) 3) PCC (→ CHO) 4) $\text{HS}(\text{CH}_2)_3\text{SH}$, H^+ → 1,3-다이싸이안

개념 화학선택적 보호(케톤 아세탈), 에스터 환원·산화, 싸이오아세탈 형성

문제 20.84 · 케이지 케톤 고리 확장

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2001, 66, 2072–2077

반응 다리 걸친 케톤 → RCO_3H (Baeyer-Villiger, 락톤) → 과량 LiAlH_4 (다이올) → TsCl/py (1° OTs) → 염기 (분자 내 Williamson) → 고리 에터; 대칭 상실로 ^1H 신호 증가

개념 Baeyer-Villiger, 락톤 환원, 선택적 토실화, 분자 대칭과 NMR

문제 20.85 · scorzocreticin

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron* 2014, 43, 8161–8167

반응 ArCH_2OH → PCC (ArCHO) → $\text{Ph}_3\text{P}=\text{CHOMe}$ (Wittig, 엔올 에터) → H_3O^+ (ArCH_2CHO) → NaBH_4 → $\text{ArCH}_2\text{CH}_2\text{OH}$ (탄소 1개 연장)

개념 메톡시메틸렌 Wittig에 의한 1탄소 동족화, 엔올 에터 가수분해

노벨상 1979 Brown · Wittig — 수소화불소화 · Wittig 반응

문제 20.86 · 에틸 프롤리네이트 엔아민


중요도 ★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 1969, 10, 4233–4236

반응 사이클로헥산온 + 광학 활성 에틸 프롤리네이트, TsOH , $-\text{H}_2\text{O}$ → 엔아민; $\text{N}-\text{C}(\text{sp}^3)$ 결합의 부분 이중결합성 때문에 두 회전 이성질체의 상호 전환이 느림

개념 엔아민 형성, N 고립쌍 공유제이션에 의한 회전 제한(형태 이성질체)

노벨상 2021 List · MacMillan — 비대칭 유기촉매(엔아민 촉매)



문제 20.87 · 사이클로옥텐온 사슬 도입

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2003, 68, 6455–6458

반응 고리 C=C가 있는 사이클로옥텐온에 -CH₂CH₂CHO 도입: 아세탈 보호 Grignard → H₂SO₄(탈수) → AcOH/H₂O(탈보호) 경로만 성공; O₃·BH₃ 경로는 고리 C=C도 공격

개념 화학선택성, 아세탈 = 가려진 알데하이드(Grignard 공존)

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화

문제 20.88 · furo[2,3-b]indole 중간체


중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 4494–4496

반응 2-나이트로벤즈알데하이드 → Ph₃P=CH-O-CH₂CH=CH₂ (Wittig, 알릴 바이닐 에터) → 가열 [3,3] Claisen 자리옮김 → 2-(2-나이트로페닐)펜트-4-엔알

개념 알콕시메틸렌 Wittig + Claisen 자리옮김

노벨상 1979 Brown · Wittig — 수소화불소화 · Wittig 반응



문제 20.89 · (+)-frondosin B (Shapiro 반응)

중요도 ★★☆☆

문헌 *Chem. Sci.* 2010, 1, 37–42

반응 2,2-다이메틸사이클로헥산온 트라이실하이드라존 + t-BuLi(2당량) → N-H·α-C-H 탈양성자화 → ArSO₂⁻ 이탈 → 바이닐 다이아제나이드 → N₂ 손실 → 바이닐리튬

개념 Bamford-Stevens-Shapiro 반응(Wolff-Kishner 유사), 바이닐 음이온 생성

문제 20.90 · 메톡시메틸렌 Wittig


중요도 ★★☆☆

문헌 *Chem. Ber.* 1962, 95, 2514–2525

반응 사이클로헥산온 + Ph₃P=CHOMe → (메톡시메틸렌)사이클로헥세인 → H₃O⁺ (엔올 에터 C 양성자화 → 옥소카베늄 → 헤미아세탈 → MeOH 손실) → 사이클로헥세인카브알데하이드

개념 Wittig 메커니즘, 엔올 에터의 산 촉매 가수분해

노벨상 1979 Brown · Wittig — 수소화불소화 · Wittig 반응



문제 20.91 · hispidospermidin

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1998, 120, 4039–4040

반응 -CH₂CH₂COCl 결사슬 하이드린데인 + AlCl₃ → 아실륨 → 고리 알켄의 분자 내 공격(지방족 Friedel-Crafts 아실화) → 2° 양이온: Cl⁻ 포획(1) 또는 1,2-H 이동 후 탈양성자(2), 3 : 2

개념 아실륨 이온, 탄소 양이온 자리옮김(1,2-수소화 이동)

문제 20.92 · kibelone C

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2011, 133, 9956–9959

반응 2-아로일-다이하이드록시사이클로헥센온 + cat. H_3O^+ , 아세톤 → 페놀 OH의 헤미케탈 → 옥소카베늄(알릴형) → H_2O 의 알릴 위치 첨가 → cis-다이올 → 아세토나이드 → 테트라하이드로잔톤

개념 산 촉매 헤미케탈·아세탈 형성, 알릴 전위(비닐로가 양이온)


문제 20.93 · 비닐로가 아실 트리플레이트 단편화

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2006, 128, 6499–6507

반응 3-옥소사이클로헥센일 트리플레이트 + 1) LiAlH_4 2) H_2O → 알릴 알코올 A + B: 알콕사이드가 $\text{C}=\text{O}$ 를 재형성하며 C-C 절단, TfO^- 이탈과 함께 $\text{C}\equiv\text{C}$ 형성(Grob형) → 알카인 알데하이드 → 재환원 → 2,2-다이메틸헥스-5-인-1-올

개념 Grob/Eschenmoser-Tanabe형 단편화, IR(3305 cm^{-1} $\equiv\text{C-H}$, 2117 cm^{-1} $\text{C}\equiv\text{C}$)· ^1H NMR 구조 결정



제21장 카복실산과 그 유도체

- RCOOH 제조: $\text{RCH}_2\text{Br} \rightarrow \text{NaCN} \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$, 가열; $\text{RBr} \rightarrow \text{Mg} \rightarrow \text{CO}_2 \rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$; $\text{RCOOH} \rightarrow \text{LiAlH}_4/\text{BH}_3 \rightarrow \text{RCH}_2\text{OH}$
- 친핵성 아실 치환(사면체 중간체) 반응성: 산 > 할로젠화물 > 무수물 > 에스터 > 아마이드
- $\text{RCOCl} + \text{ROH/py} \rightarrow$ 에스터, + 아민 $\rightarrow$ 아마이드, + $\text{LiAl(OtBu)}_3\text{H} \rightarrow$ 알데하이드, + $\text{R}_2\text{CuLi} \rightarrow$ 케톤, + 과량 $\text{RMgBr} \rightarrow 3^\circ$ 알코올
- 에스터: Fischer 에스터화, 비누화(NaOH), $\text{DIBAH} \rightarrow$ 알데하이드, $\text{LiAlH}_4 \rightarrow$ 알코올
- 아마이드: 가수분해, $\text{LiAlH}_4 \rightarrow$ 아민, $\text{SOCl}_2 \rightarrow$ 나이트릴
- 나이트릴: 가수분해 $\rightarrow$ RCOOH , $\text{RMgBr} \rightarrow$ 케톤, $\text{LiAlH}_4 \rightarrow \text{RCH}_2\text{NH}_2$
- 분광: C=O $1650\text{--}1850\text{ cm}^{-1}$, ^{13}C $160\text{--}185$ (나이트릴 $115\text{--}130$), COOH $^1\text{H} \approx 12\text{ ppm}$

문제 21.81 · 3,6-dihydro-2H-pyran (RCM)


중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2000, 2, 791–794

반응 1-페닐뷰트-3-엔-1-올 $\rightarrow$ 1) NaH , 에틸 2-브로모프로파노에이트($\text{S}_\text{N}2$, 반전) 2) $\text{DIBAH}(\rightarrow \text{CHO})$ 3) $\text{Ph}_3\text{P=CH}_2 \rightarrow$ 다이엔 에터 $\rightarrow$ Grubbs 촉매(RCM, $-\text{C}_2\text{H}_4$) $\rightarrow$ 2-메틸-6-페닐-3,6-다이하이드로-2H-피란

개념 Williamson 에터, DIBAH 부분 환원, Wittig, 고리 닫음 복분해(RCM)

노벨상 2005 Chauvin · Grubbs · Schrock — 올레핀 복분해




문제 21.82 · aminotetralin 중간체

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 5503–5514

반응 1-브로모-3,5-다이메틸벤젠 $\rightarrow$ 1) NBS , $h\nu$ (벤질 일브로민화) 2) NaCN ($\text{S}_\text{N}2$) 3) H_3O^+ , 가열 $\rightarrow$ (3-브로모-5-메틸페닐)아세트산

개념 벤질 브로민화, 나이트릴 경유 1탄소 연장 카복실산 합성



문제 21.83 · 콜산 유도 스테로이드

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 1859–1862

반응 $12\alpha\text{-OH}$ 메틸 에스터 $\rightarrow$ 1) NaH , 알릴 브로민화물 (O -알릴화) 2) 과량 LiAlH_4 (C_{24} 에스터 $\rightarrow 1^\circ \text{ OH}$) 3) 아크릴로일 클로라이드, 피리딘 $\rightarrow$ 아크릴레이트 에스터

개념 Williamson 에터, 에스터 환원, 산 염화물에 의한 에스터화 — 단계 순서 설계

문제 21.84 · amphidinolide N 유사체 단편

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Biomol. Chem.* 2006, 4, 2119–2157

반응 $(E)\text{-}\alpha,\beta\text{-불포화 카복실산} \rightarrow \text{LiAlH}_4$ (알릴 1° 알코올) $\rightarrow \text{PBr}_3$ (또는 $\text{CBr}_4/\text{PPh}_3$) $\rightarrow$ 알릴 브로민화물; $\text{PMB}\cdot\text{TBS}\cdot\text{TMS}$ 보호기 유지

개념 카복실산 환원, 알코올 $\rightarrow$ 할로젠화물 변환, 보호기 호환성


문제 21.85 · BMS-708163 중간체

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 6542–6544

반응 4-(브로모메틸)-3-플루오로벤조나이트릴 + KOAc, DMF (SN2) → 아세테이트 → NaOMe, MeOH (에스터 교환) → 벤질 알코올; NaOH(aq) 직접 처리는 나이트릴 가수분해-SNAr 부반응

개념 SN2, 염기 촉매 에스터 교환(사면체 중간체), 작용기 선택성



문제 21.86 · 치환 벤조산 메틸의 비누화 속도

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1961, 83, 4214–4216

반응 $\text{ArCO}_2\text{Me} + \text{NaOH} \rightarrow \text{ArCO}_2^-$: 속도 $p\text{-NO}_2 > m\text{-NO}_2 > m\text{-Cl} \approx m\text{-Br} > \text{H} > p\text{-CH}_3 > p\text{-OCH}_3 > p\text{-NH}_2$ (EWG가 C=O 친전자성 증가, 공명 EDG는 감소)

개념 친핵성 아실 치환 속도 결정 단계(OH^- 첨가), 치환기 공명·유도 효과(Hammett)

문제 21.87 · Corey 프로스타글란딘 중간체


중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1970, 92, 397–398

반응 7-(메톡시메틸)바이사이클로[2.2.1]헵트-5-엔-2-온 → MCPBA, NaHCO_3 (Baeyer-Villiger, 다리목 C 이동) → 이환 락톤 → NaOH(aq), H_3O^+ → cis-하이드록시 산

개념 Baeyer-Villiger 위치선택성(더 치환된 C 이동), 락톤 가수분해

노벨상 1990 Corey — 역합성 분석



문제 21.88 · quadrone

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1984, 49, 4094–4095

반응 삼환 메실레이트 카복실산 → 1) NaH (메실레이트 이온화와 함께 Wagner-Meerwein 1,2-알킬 이동 → 알켄) 2) H_2SO_4 , H_2O (Markovnikov 양성자화 → 3° 양이온을 CO_2H 가 포획) → 락톤

개념 탄소 양이온 골격 자리옮김, 분자 내 락톤화

문제 21.89 · 브로모하이드린 락톤 자리옮김

중요도 ★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2008, 49, 6853–6855

반응 cis-접합 γ -락톤 브로모하이드린 + NaH → 알콕사이드의 분자 내 아실 이동(락톤 교환) → 해방된 알콕사이드가 anti C-Br에 분자 내 SN2 → 에폭시 락톤

개념 분자 내 친핵성 아실 치환(트랜스락톤화), 할로하이드린 → 에폭사이드(anti 배열)

문제 21.90 · englerin A

중요도 ★☆☆

문헌 *Angew. Chem. Int. Ed.* 2009, 48, 9105–9108

반응 에폭시 δ -락톤 + cat. NaOMe → MeO^- 아실 첨가로 락톤 열림 → 알콕사이드가 C=O 재형성하며 에폭사이드 C-O 절단(알데하이드) → 3° 알콕사이드가 메틸 에스터 공격 → γ -락톤(고리 축소)

개념 친핵성 아실 치환 연쇄, 염기 촉매 고리 축소

제22장 알파 탄소 화학: 엔올과 엔올 음이온

- α -할로젠화: 산 촉매 Br_2 (일치환), HVZ(Br_2 , PBr_3 ; H_2O), 할로 폼 반응(메틸 케톤 $\rightarrow$ 카복실산)
- 알돌 첨가 $\rightarrow$ 가열 시 축합(E1cb) $\rightarrow \alpha, \beta$ -불포화 카보닐; 교차-분자 내 알돌(5-6원 고리)
- Claisen 축합(NaOEt) $\rightarrow \beta$ -케토 에스터; Dieckmann(분자 내) $\rightarrow$ 고리 β -케토 에스터
- LDA, -78°C $\rightarrow$ 속도론적(덜 치환) 엔올레이트 / NaH , 25°C $\rightarrow$ 열역학적(더 치환) 엔올레이트 $\rightarrow$ 알킬화
- 말론산 에스터 합성 $\rightarrow \text{RCH}_2\text{COOH}$; 아세토아세트산 에스터 합성 $\rightarrow$ 메틸 케톤 (β -케토산 탈카복실화)
- Michael 첨가: R_2CuLi , 안정화 엔올레이트; Stork 엔아민(알킬화-Michael) $\rightarrow \text{H}_3\text{O}^+$
- Robinson 고리 형성 = Michael + 분자 내 알돌 축합
- 짝 첨가-알킬화 연쇄(α, β -이중 알킬화), 1,3- vs 1,5-이작용기 역합성


문제 22.110 · Stork 엔아민 알킬화

중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1954, 76, 2029–2030

반응 사이클로헥산온 + 피롤리딘, TsOH , $-\text{H}_2\text{O}$ $\rightarrow$ 엔아민 A $\rightarrow$ 1) CH_3I (C-알킬화, 이미늄) 2) H_3O^+ $\rightarrow$ 2-메틸사이클로헥산온 B

개념 엔아민 = 중성 엔올레이트 등가체, Stork 엔아민 알킬화



문제 22.111 · C2-대칭 trans-2,5-dimethylpyrrolidine 엔아민

중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 1977, 42, 1663–1664

반응 사이클로헥산온 + 광학 순수 trans-2,5-다이메틸피롤리딘 $\rightarrow$ 단일 엔아민(C2 대칭) $\rightarrow \text{CH}_3\text{I}$, H_3O^+ $\rightarrow$ 2-메틸사이클로헥산온 83% ee

개념 C2-대칭 키랄 보조기, 면선택적 알킬화, ee

노벨상 2021 List · MacMillan — 비대칭 유기촉매(엔아민 촉매)

문제 22.112 · 1,3-diphenylcyclopentadiene (폴벤 전구체)


중요도 ★★★

문헌 *J. Org. Chem.* 2012, 77, 6371–6376

반응 1-페닐펜테인-1,4-다이온 $\rightarrow$ 1) $\text{NaOH}/\text{H}_2\text{O}$, 가열 (분자 내 알돌 축합, 5원 고리) 2) PhMgCl (1,2-첨가) 3) 진한 H_2SO_4 (탈수) $\rightarrow \text{C}_{17}\text{H}_{14}$

개념 분자 내 알돌 축합(5원 고리 선호), Grignard 1,2-첨가, 산 촉매 탈수

노벨상 1912 Grignard · Sabatier — Grignard 시약 · 촉매 수소화



문제 22.113 · haouamine B

중요도 ★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 9291–9295

반응 아릴 치환 다이하이드로피리디논 + Tf_2O , 피리딘 $\rightarrow$ O-트리플릴 옥소카베논(β -C 강친전자성) $\rightarrow$ 전자 풍부 다이메톡시아릴의 분자 내 Friedel-Crafts형 짝 첨가 $\rightarrow$ 4차 탄소 + 엔올 트리플레이트

개념 Tf_2O 에 의한 Michael 받개 활성화, 분자 내 짝 첨가, 짧은 사슬에 의한 cis 입체 제어

문제 22.114 · α -옥소케텐 다이싸이오아세탈 고리화

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 6918–6920

반응 α -옥소케텐 다이싸이오아세탈 + 다이에틸 말로네이트, $K_2CO_3 \rightarrow$ 말로네이트 짝 첨가-EtS⁻ 제거(바이닐 치환) $\rightarrow$ 분자 내 Michael(6-endo) $\rightarrow$ 사이클로헥센온

개념 Michael 첨가-제거, 분자 내 Michael 고리 형성

문제 22.115 · (-)-N-methylwelwitindolinone C isothiocyanate

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2011, 133, 15797–15799

반응 5-브로모인돌-사이클로헥산온 + 과량 $NaNH_2 \rightarrow$ 케톤 엔올레이트 + 4,5-인돌라인(아라인) $\rightarrow$ 엔올레이트 α -C가 C4 공격(분자 내) $\rightarrow$ 다리 걸친 이환 케톤; 부생성물 = O-아릴화 엔올 에터

개념 아라인(벤자인) 포획, 엔올레이트의 양쪽성(C- vs O-공격)

문제 22.116 · 에틸 프롤리네이트 엔아민 Michael 첨가


중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 1969, 10, 4233–4236

반응 프롤리네이트 엔아민의 두 회전 이성질체 + 메틸 아크릴레이트 $\rightarrow H_3O^+ \rightarrow$ 메틸 3-(2-옥소사이클로헥실)프로파노에이트 21% ee; 두 회전 이성질체가 서로 반대 면을 가려 거의 라섬

개념 Stork 엔아민 Michael 첨가, 키랄 보조기의 면선택성과 형태 이성질체

노벨상 2021 List · MacMillan — 비대칭 유기촉매(엔아민 촉매)



문제 22.117 · *Pseudococcus viburni* 성 페로몬

중요도 ★★☆☆

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2010, 51, 5291–5293

반응 락톨 $\rightarrow Ph_3P=CHCO_2Et$ (Wittig, E-에노에이트) $\rightarrow TsCl/py$ (1° OTs) $\rightarrow Me_2CuLi$ (1,4-첨가 $\rightarrow$ 에스터 엔올레이트의 분자 내 SN_2 , 5-exo) $\rightarrow$ 사이클로펜테인 $\rightarrow LiAlH_4 \rightarrow Ac_2O/py \rightarrow$ 아세테이트

개념 안정 일리드 Wittig, 큐프레이트 짝 첨가-분자 내 알킬화 연쇄

노벨상 1979 Brown · Wittig — 수소화불소화 · Wittig 반응

문제 22.118 · fusarisetin A

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 2012, 134, 920–923

반응 β -케토 아마이드(N-메틸 세린 메틸 에스터) + $NaOMe \rightarrow$ 엔올레이트의 Dieckmann 축합(테트라믹산 5원 고리) $\rightarrow$ 결사슬 2° OH의 분자 내 헤미케탈 형성 $\rightarrow$ 오환 골격

개념 Dieckmann 축합, 헤미케탈 형성


문제 22.119 · 음이온 가속 Claisen 고리 확장

중요도 ★★☆☆

문헌 *Org. Lett.* 2012, 14, 4738–4741

반응 *cis*-2-벤조일-6-바이닐-다이하이드로피란 + 1) NaHMDS 2) H₂O → 엔올레이트(알릴 바이닐 에터 공명형) → 음이온 가속 [3,3] Claisen → 8원 고리 2-하이드록시-2-페닐사이클로옥타다이엔온

개념 엔올레이트 공명, Claisen [3,3] 자리옮김, 보트형 TS 키랄성 전달



문제 22.120 · ¹⁴C 표지 지베렐린 유도체

중요도 ★★☆☆

문헌 *Can. J. Chem.* 2004, 82, 293–300

반응 A고리 열린 지베렐린 알데하이드 + 1) K₂CO₃, H₂O (락톤 엔올레이트) 2) HCl → 분자 내 알돌 첨가 → A고리 재형성, 3-OH(에피머 혼합)

개념 분자 내 알돌 첨가(역알돌의 역), 동위원소 표지 합성

제23장 아민

- 아민 제조: $\text{RBr} + \text{NaCN} \rightarrow \text{LiAlH}_4$; 아마이드 $\rightarrow \text{LiAlH}_4$;
 $\text{ArNO}_2 \rightarrow \text{H}_2/\text{Pt}$ 또는 Fe-Zn-Sn/HCl
- 아자이드 합성($\text{NaN}_3 \rightarrow \text{H}_2/\text{Pt}$ 또는 LiAlH_4), Gabriel 합성(프탈이미드, KOH ; RBr ; H_2NNH_2)
- 환원성 아민화: 카보닐 + $\text{NH}_3/\text{RNH}_2/\text{R}_2\text{NH}$, $[\text{H}^+]$, NaBH_3CN (과알킬화 없음)
- Hofmann 제거: 과량 $\text{CH}_3\text{I} \rightarrow \text{Ag}_2\text{O}$, H_2O , 가열 $\rightarrow$ 덜 치환된 알켄
- $1^\circ \text{ArNH}_2 + \text{NaNO}_2/\text{HCl} \rightarrow$ 아릴 다이아조늄 $\rightarrow$ Sandmeyer(CuX , CuCN), $\text{HBF}_4(\text{ArF})$, $\text{H}_2\text{O}/\text{가열}(\text{ArOH})$, $\text{H}_3\text{PO}_2(\text{ArH})$, 아조 짝지음
- 2° 아민 + $\text{HNO}_2 \rightarrow$ N-나이트로소아민; 아민 아실화 $\rightarrow$ 아마이드
- 염기도: 알킬 아민 $>$ 아릴 아민 $\gg$ 아마이드; 피리딘 $>$ 피롤; 피롤 EAS는 C2, 피리딘은 C3(강한 조건)


문제 23.89 · (-)-(S,S)-homaline

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2012, 53, 1119–1121

반응 2° 아민(3-클로로프로필) $\rightarrow$ 1) HCHO , $[\text{H}^+]$, NaBH_3CN (환원성 N-메틸화) 2) NaN_3 (1° 염화물 SN_2) $\rightarrow$ 3° 아민 아자이드

개념 환원성 아민화(과알킬화 방지), 아자이드 SN_2




문제 23.90 · 니코틴 유사 진통제

중요도 ★★★

문헌 *Bioorg. Med. Chem. Lett.* 2006, 16, 2013–2016

반응 6-클로로니코틴산 $\rightarrow$ 1) SOCl_2 (산 염화물) 2) 사이클로펜틸아민 (아마이드) 3) 과량 LiAlH_4 , $\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2^\circ$ 아민

개념 아마이드 경유 아민 합성(LiAlH_4 환원), 대안: 알데하이드 환원성 아민화




문제 23.91 · halosaline

중요도 ★★★

문헌 *Org. Lett.* 2007, 9, 2673–2676

반응 8원 아자이드 락톤 $\rightarrow \text{H}_2$, Pd ($\text{N}_3 \rightarrow \text{NH}_2$) $\rightarrow$ 분자 내 아민의 락톤 $\text{C}=\text{O}$ 공격(락톤 $\rightarrow \delta$ -락탐, 고리 축소) $\rightarrow$ 과량 $\text{LiAlH}_4 \rightarrow$ 할로살린

개념 아자이드 환원, 분자 내 아마이드 교환, 락탐 환원



문제 23.92 · quinine (Woodward-Doering), homomeroquinene


중요도 ★★★

문헌 *J. Am. Chem. Soc.* 1945, 67, 860–874

반응 N-아세틸 피페리딘 1° 아민 → 1) 과량 CH₃I (-NMe₃⁺) 2) 60% NaOH, 가열 (Hofmann 제거 → 바이닐; 에스터·아마이드 가수분해) → 호모메로퀸 C₁₀H₁₇NO₂

개념 철저 메틸화-Hofmann 제거(덜 치환된 알켄), 아마이드·에스터 가수분해

노벨상 1965 Woodward — 유기 합성(퀴닌 등 전합성)




문제 23.93 · piperazinone 유도체

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2009, 50, 3817–3819

반응 페나실 브로마이드 + L-알라닌 메틸 에스터, NaHCO₃ (S_N2) → 아미노 케톤 → BnNH₂, NaBH₃CN, AcOH, 가열 (환원성 아민화 → 락탐화) → 피페라진-2-온 (부분입체이성질체 혼합)

개념 S_N2 N-알킬화, 환원성 아민화의 입체 비선택성, 분자 내 아마이드화



문제 23.94 · 아데노신 기반 알킬화 항암제

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2004, 45, 5807–5810

반응 5'-아미노 아데노신(TES 보호) + 에틸 (E)-4,5-다이브로모펜트-2-엔오에이트, DBU → S_N2 2회(분자 간 → 분자 내) → N-치환 2-바이닐 아지리딘

개념 아민의 연속 S_N2, 아지리딘 고리 형성(알킬화제)


문제 23.95 · 엔아미노에스터(비닐로가 카바메이트)

중요도 ★★★

문헌 *Tetrahedron Lett.* 2005, 46, 979–982

반응 Boc-아미노 아자이드 → H₂, Pd → 1° 아민 2 → 메틸 아세토아세테이트와 이민 3 → 토토머화 → (Z)-엔아민 4 (공유계이션 + 분자 내 N-H...O=C 수소결합)

개념 아자이드 환원, 이민-엔아민 토토머화, 공유계이션·수소결합에 의한 엔아민 안정화




문제 23.96 · crispine A

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 2011, 76, 1605–1613

반응 다이메톡시페닐알라닌 메틸 에스터 + 4-클로로부탄알, $[H_3O^+]$ → 이미늄 → Pictet-Spengler(6-endo SEAr) → 테트라하이드로아이소퀴놀린 → 분자 내 N-알킬화(SN2) → 피롤로아이소퀴놀린

개념 이민/이미늄 형성, Pictet-Spengler 고리화, 분자 내 SN2



문제 23.97 · epibatidine 고리 열린 유사체

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1999, 64, 4966–4968

반응 N-CO₂Et 트로페인 3° 알코올 + CF₃CO₂H, NaBH₃CN → 3° 양이온 → N 고립쌍이 밀어주는 Grob형 단편화(C1-C2 절단) → N-아실이미늄 + 1,1-이치환 알켄 → NaBH₃CN 환원 → 2-알릴 피롤리딘

개념 Grob 단편화, N-아실이미늄 이온 환원

문제 23.98 · 2-아미노퓨란 IMDAF

중요도 ★★☆☆

문헌 *J. Org. Chem.* 1999, 64, 4617–4626

반응 2-아미노퓨란 + 사슬 아크릴레이트, 가열·MeOH → 분자 내 퓨란 Diels-Alder → 산소 다리 개열(N 밀어줌, 이미늄) → MeOH 짝 첨가 → 헥사하이드로인돌(OH·OMe trans)

개념 분자 내 Diels-Alder(퓨란), 산소 다리 개열, 이미늄 짝 첨가

노벨상 1950 Diels · Alder — Diels-Alder 반응