2027학년도 중등학교교사 임용후보자 선정경쟁시험 대비 · 최종 점검 실전 모의고사 제1회

화 학

제1차 시험 | 3 교시 전공 B | 11문항 40점 | 시험 시간 90분


◦ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오. ◦ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.


1. 다음은 분자식이 $C_9H_{10}O_2$인 화합물 X와 Y의 분광학 자료이다.

	IR (cm^{-1})	^1H NMR (300 MHz, $CDCl_3$), δ (ppm)
X	1740 (강함), 1230	7.35 (m, 5H), 5.10 (s, 2H), 2.08 (s, 3H)
Y	1740 (강함), 1160	7.30 (m, 5H), 3.69 (s, 3H), 3.62 (s, 2H)

X와 Y의 구조를 각각 그리시오. [2점]

2. 다음은 1-chloro-2-methylcyclohexane의 두 입체이성질체 (가)와 (나)를 각각 NaOEt/EtOH와 가열하여 E2 반응으로 주생성물을 얻는 반응이다.

(가) 

(나) 

(가)와 (나)로부터 얻어지는 주생성물의 구조를 각각 그리시오. [2점]

3. <자료 1>은 2022 개정 과학과 교육과정의 중학교 '과학' 성취기준과 성취기준 해설이고, <자료 2>는 이 성취기준에 따른 수업에서 학생이 작성한 논증을 툴민(S. Toulmin)의 논증 구조로 분석한 것이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

[9과16-03] 화학 반응에서 질량이 보존됨을 실험을 통해 추론할 수 있다.
(성취기준 해설) 화학 반응이 일어날 때 물질을 구성하는 원자의 (㉠)만 변하고, 원자의 종류와 수는 변하지 않음을 강조하여 설명한다.

<자료 2>

[실험] 강철솜을 공기 중에서 가열하였더니 질량이 증가하였다. 밀폐된 용기 안에서 가열하였더니 용기 전체의 질량은 변하지 않았다.

요소	학생의 진술
(㉡)	강철솜이 연소하는 반응에서도 반응 전후 전체 질량은 보존된다.
자료	밀폐 용기 안에서 가열했을 때 전체 질량이 변하지 않았다.
(㉢)	화학 반응에서는 원자가 새로 생기거나 없어지지 않으므로, 닫힌 계의 질량은 일정하다.
뒷받침	라부아지에의 정밀한 질량 측정 실험 결과
(㉣)	단, 열린 용기에서 기체가 반응에 참여하거나 빠져나가는 경우는 측정된 질량이 달라질 수 있다.

<작성 방법>

◦ <자료 1>의 괄호 안의 ㉠에 해당하는 내용을 쓸 것.
◦ <자료 2>의 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 해당하는 툴민 논증 요소를 순서대로 쓸 것.
◦ <자료 2>의 괄호 안의 ㉣에 해당하는 툴민 논증 요소를 쓰고, 공기 중에서 가열한 강철솜의 질량이 증가한 이유를 ㉣과 관련지어 서술할 것.
◦ 학생이 <자료 2>와 같이 증거에 근거하여 결론을 이끌고 일반화하는 활동을 할 때 개발할 것으로 기대되는 것을 2022 개정 과학과 교육과정 과정·기능의 5가지 요소 중에서 1가지 찾아 쓸 것.

4. <자료>는 2022 개정 과학과 교육과정의 중학교 '과학' 성취기준 [9과04-03]에 따라 발생 학습 모형을 적용하여 구성한 수업이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자 료>

[9과04-03] 여러 가지 물질의 상태 변화를 관찰하고, 이를 입자 모형으로 설명할 수 있다.

단계	교수·학습 활동
예비	학생들에게 아세톤이 든 지퍼백을 뜨거운 물에 넣을 때 무엇이 달라질지 질문하여 학생들의 생각을 조사한다.
(가)	지퍼백에 아세톤을 넣고 질량을 잰 뒤 뜨거운 물에 넣어 부풀어 오르는 모습을 관찰하게 한다. 학생들은 자신의 생각을 모둠에서 이야기한다. 학생 A는 ㉠ "아세톤 입자가 열을 받아 커지니까 지퍼백이 부풀고 질량도 늘어날 것 같아요."라고 말한다.
도전	(㉡)
(나)	학생들은 상태 변화 시 질량과 부피 변화를 입자 모형으로 설명하고, 이를 이용해 드라이아이스의 승화 등 새로운 상황의 현상을 설명한다.

<작성 방법>

◦ (가)와 (나)에 해당하는 발생 학습 모형의 단계 명칭을 순서대로 쓸 것.
◦ 밑줄 친 ㉠에 나타난 학생 A의 오개념 2가지를 각각 쓸 것.
◦ 괄호 안의 ㉡에 들어갈 교수·학습 활동을 발생 학습 모형의 '도전' 단계의 특징이 드러나도록 1가지 서술할 것.
◦ 2022 개정 과학과 교육과정의 [9과04-03] 성취기준 해설에 근거하여, 교사가 이 수업에서 입자 모형으로 설명하도록 지도해야 할 내용을 서술할 것.

5. <자료 1>은 연소 이론과 관련된 과학사 내용이고, <자료 2>는 2022 개정 과학과 교육과정의 '교수·학습 방법' 내용의 일부이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]

<자료 1>

(가) 18세기 중반까지 화학자들은 플로지스톤 이론을 받아들이고, 이 이론의 틀 안에서 연소, 하소, 금속의 제련 등 여러 현상을 설명하고 정밀화하는 연구를 수행하였다.

(나) 그러나 ㉠ 금속을 가열하여 금속재(산화물)를 만들면 질량이 오히려 증가한다는 사실이 정밀한 측정으로 거듭 확인되었다. 일부 학자들은 플로지스톤이 음의 질량을 가진다는 가정을 덧붙이기도 했으나, 문제가 누적되면서 이론에 대한 신뢰가 흔들렸다.

(다) 프리스틀리(J. Priestley)는 산화 수은을 가열하여 얻은 기체를 '탈플로지스톤 공기'라고 불렀다. 같은 기체를 라부아지에(A. Lavoisier)는 '산소'라고 부르고, 연소를 물질이 산소와 결합하는 현상으로 해석하였다. ㉡ 두 사람은 같은 실험 결과를 보고도 서로 다른 개념 체계로 해석하여, 상대의 주장을 같은 기준으로 비교하기 어려웠다.

(라) 결국 많은 화학자들이 산소 이론을 받아들였으며, 이후의 연구는 산소 이론의 틀 안에서 이루어졌다.

<자료 2>

과학 지식의 잠정성, 과학적 방법의 다양성, 과학 윤리, 과학·기술·사회의 상호 관련성, 과학적 모델의 특성, 과학의 본성과 관련된 내용을 적절한 소재를 활용하여 지도한다.

<작성 방법>


- 쿤(T. Kuhn)의 과학 혁명 이론에 근거하여, <자료 1>의 (가)에 해당하는 과학 활동의 시기를 쓸 것.
- 쿤의 이론에 근거하여, <자료 1>의 밑줄 친 ㉠에 해당하는 용어를 쓸 것.
- 쿤의 이론에 근거하여, <자료 1>의 밑줄 친 ㉡에 나타난 개념을 쓸 것.
- <자료 2>의 내용 중에서 <자료 1>의 (가)~(라)를 소재로 지도하기에 가장 적절한 것 1가지를 골라 쓰고, 그렇게 판단한 이유를 서술할 것.


6. 다음은 기체 A의 단분자 반응에 대한 린데만(Lindemann) 메커니즘과, 일정 온도에서 얻은 실험 결과이다.

- 메커니즘 $A + M \rightleftarrows A^* + M$ (정반응 k_1, 역반응 k_{-1}), $A^* \rightarrow P$ (k_2)
- 관측 속도 법칙 : $d[P]/dt = k_{uni}[A]$ (M은 충돌 상대 분자)
- 실험 결과 : $1/k_{uni}$를 1/[M]에 대해 그리면 직선이 되며, 기울기는 1.0×10^{-6} M·s, 세로축 절편은 2.0×10^{-4} s이다.

A^*에 정류 상태 근사를 적용하여 k_{uni}를 k_1, k_{-1}, k_2, [M]으로 나타내시오. 또한, [M]이 매우 클 때와 매우 작을 때 이 반응의 전체 반응 차수를 각각 쓰고, [M]이 매우 작을 때의 속도 결정 단계를 쓰시오. 그리고 실험 결과로부터 k_1과 k_{-1}/k_2의 값을 각각 단위와 함께 쓰시오. [4점]

7. 다음은 2가지 Diels-Alder 반응이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)





B (주생성물)

(2*E*,4*E*)-hexa-2,4-diene　　dimethyl maleate

A의 입체구조를 그리고, A가 exo 생성물보다 우세하게 생성되는 이유를 전이 상태에서의 궤도함수 상호작용과 관련지어 서술하시오. 또한, B의 입체구조를 그리고, B가 광학 활성을 나타내는지 쓰고 그 이유를 서술하시오. [4점]

8. 표는 사면체 구조의 금속 카보닐 화학종 (가)~(다)와, (가)의 CO 1개가 PPh_3로 치환된 (라)의 C–O 신축 진동에 대한 자료이다.

화학종	(가) $Ni(CO)_4$	(나) $[Co(CO)_4]^-$	(다) $[Fe(CO)_4]^{2-}$	(라) $Ni(CO)_3(PPh_3)$
IR 활성 ν(CO) (cm^{-1})	2060	1890	1790	2069, 1990

(나)가 18전자 화학종임을 확인하는 과정을 서술하시오. 또한, (가)~(다)의 ν(CO)가 (가) > (나) > (다)의 순서인 이유를 결합 모형에 근거하여 서술하시오. 그리고 (가)에서 C–O 신축 진동에 해당하는 기약 표현을 모두 쓰고, (라)의 점군과 (라)에서 IR 활성 C–O 신축 띠가 2개인 이유를 기약 표현을 이용하여 쓰시오. (단, PPh_3는 하나의 점으로 취급한다.) [4점]

> T_d : E, $8C_3$, $3C_2$, $6S_4$, $6\sigma_d$ | A_1 (1, 1, 1, 1, 1) A_2 (1, 1, 1, −1, −1) E (2, −1, 2, 0, 0) T_1 (3, 0, −1, 1, −1; R) T_2 (3, 0, −1, −1, 1; x, y, z)
> C_{3v} : E, $2C_3$, $3\sigma_v$ | A_1 (1, 1, 1; z) A_2 (1, 1, −1) E (2, −1, 0; (x, y))

9. 다음은 2주기 등핵 2원자 분자 및 이온과 관련된 자료이다.

> ◦ 화학종 : O_2^+, O_2, O_2^-, O_2^{2-}
> ◦ N_2의 광전자 스펙트럼에서 이온화 에너지가 가장 작은 띠(15.6 eV)는 진동 미세 구조가 거의 없는 좁은 띠이고, 그다음 띠(16.7 eV)는 진동 미세 구조가 뚜렷하게 나타난다.

O_2^+, O_2, O_2^-, O_2^{2-}를 결합 길이가 짧은 것부터 순서대로 나열하고, 이 중 반자기성인 것을 쓰시오. 또한, N_2에서 15.6 eV 띠에 해당하는 분자 궤도함수를 쓰고, 이 궤도함수가 $1\pi_u$보다 에너지가 높은 이유를 서술하시오. 그리고 15.6 eV 띠에서 진동 미세 구조가 거의 나타나지 않는 이유를 서술하시오. [4점]

10. 다음은 25 ℃에서 은 할로젠화물의 용해와 관련된 평형 자료이다.

> ◦ $AgCl(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$ $K_{sp} = 1.6 \times 10^{-10}$
> ◦ $AgI(s) \rightleftarrows Ag^+(aq) + I^-(aq)$ $K_{sp} = 8.1 \times 10^{-17}$
> ◦ $Ag^+(aq) + 2NH_3(aq) \rightleftarrows Ag(NH_3)_2^+(aq)$ $\beta_2 = 1.0 \times 10^7$

$AgCl(s) + 2NH_3(aq) \rightleftarrows Ag(NH_3)_2^+(aq) + Cl^-(aq)$의 평형 상수($K$)를 쓰고, 처음 농도가 1.0 M인 NH_3 수용액에서 AgCl의 몰 용해도를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 또한, 같은 조건에서 AgI의 몰 용해도를 쓰고, AgCl을 녹인 이 용액에 HNO_3을 충분히 가할 때 나타나는 변화를 그 이유와 함께 서술하시오. (단, NH_3의 양성자화와 $Ag(NH_3)^+$의 생성은 무시하고, 용해에 의한 부피 변화는 없다.) [4점]

11. 다음은 25 ℃에서 1 M H_2SO_4 매질 속 0.0500 M Fe^{2+} 수용액 50.00 mL를 0.1000 M Ce^{4+} 표준 용액으로 적정하는 실험에 대한 자료이다.

> ◦ 적정 반응 : $Fe^{2+} + Ce^{4+} \rightarrow Fe^{3+} + Ce^{3+}$
> ◦ 1 M H_2SO_4에서 형식 전위($E^{\circ\prime}$, SHE 기준) : Fe^{3+}/Fe^{2+} 0.68 V, Ce^{4+}/Ce^{3+} 1.44 V, Sn^{4+}/Sn^{2+} 0.14 V

당량점 부피(mL)를 쓰고, Ce^{4+} 용액 12.50 mL를 가했을 때의 전위(V)를 쓰시오. 또한, 당량점에서의 전위를 구하는 과정과 그 결과를 제시하시오. 그리고 Fe^{2+} 대신 같은 매질의 Sn^{2+}을 Ce^{4+}로 적정할 때($Sn^{2+} + 2Ce^{4+} \rightarrow Sn^{4+} + 2Ce^{3+}$), 당량점의 전위(V)를 쓰시오. (단, 전위는 SHE 기준이며, $2.303RT/F = 0.059$ V이다.) [4점]

<수고하셨습니다.>