

# 초판 → 최종 검수 수정 내역 (v5 → v6)

검수 에이전트 3개가 66문항 전체를 독립적으로 다시 풀어 확인했고, 그 결과 14문항이 수정되었다. 아래 "변경 필드"는 git 기록(초판 커밋 e612400 ↔ 최종 커밋 42f612f)을 자동 비교해서 얻었다.

| 최종<br>화-번 | 기출 키           | 변경<br>필드  | 수정 내용                                                                                                                                                             |
|-----------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-4       | 2026A-1        | 해설,<br>출처 | 출처를 추출본 원문「Org. Proc. Res. & Devel. 2007, 11, 354-358 (Klein 14.63)」으로 교체.<br>Sharpless 면 선택 규칙의 그리는 방향을 명확히 함(C=C를 세로로, CH <sub>2</sub> OH를 아래 탄소의 오른쪽 아래<br>에). |
| 1-6       | 2026A-10       | 노벨<br>상   | 근거가 약한 1950 Diels-Alder 연계를 삭제하고 2010 Pd 짝지음만 남김                                                                                                                  |
| 1-8       | 2024A-10       | 해설        | 속도 결정 단계를 "①의 첨가 단계"에서 "②의 첨가 단계"로 바로잡음                                                                                                                           |
| 1-9       | 2024A-11       | 해설        | 용어 수정: "평면형(equatorial)" → "적도 방향(equatorial)"                                                                                                                    |
| 1-10      | 2026A-11       | 해설        | 2-methylcyclopentane-1,3-dione의 pKa를 ≈11에서 ≈5(고리형 1,3-다이온)로 수정                                                                                                    |
| 3-1       | 2021A-2        | 본문,<br>해설 | MS m/z 107의 Br 동위원소 짝(109)을 추가함. 2,2-dibromopentane을 배제하는 근거를 NMR 기준<br>으로 교체                                                                                     |
| 3-9       | 2021A-9        | 해설        | 2-formylcyclohexanone의 pKa를 9-11에서 6-9로 수정. 토토머 논증을 NMR 증거 중심으로 완화                                                                                                |
| 3-10      | 2020A-9        | 본문        | 단서 조건을 "C를 제외한 각 단계에서는 ... 분리·정제"로 바꿔 '분리하지 않은 C'와 생기던 모순을 없앴                                                                                                     |
| 4-3       | 2015A-기<br>입10 | 해설        | 2-decanone의 α-절단 배경이 뒤바뀐 것을 바로잡음: C1-C2 절단 → m/z 141(• CH <sub>3</sub> 손실), C2-C3 절<br>단 → m/z 43(• C <sub>8</sub> H <sub>17</sub> 손실)                            |
| 4-7       | 2016A-5        | 본문        | 출발물 4-methylanisole에 화합물 기호 A를 붙임(B부터 시작하던 문제)                                                                                                                    |
| 4-8       | 2017A-13       | 본문        | (-)-DET 면 선택 힌트에 그리는 방향을 명시(가로로 그리면 결과가 반대로 나옴)                                                                                                                   |
| 4-11      | 2016B-4        | 정답        | "클로로늄(C=Cl <sup>+</sup> )"을 "C=Cl <sup>+</sup> 공명 구조"로 고침(halonium 혼동 방지)                                                                                         |
| 5-3       | 2021A-3        | 본문        | (가) 반응 화살표의 방향을 바로잡음(X → A)                                                                                                                                       |
| 5-8       | 2026B-7        | 해설        | "산화로 B가 OH로" → "C-B 결합이 C-OH로 바뀌어(배열 유지)"(화합물 B와의 혼동 방지)                                                                                                          |

## 검수에서 확인했지만 바꾸지 않은 사항 (참고)

- 스펙트럼 수치(δ, J, IR, MS 세기)는 해당 화합물의 전형적인 문헌값이며, 인용 논문의 실제 스펙트럼과 대조하지는  
않았다. 덜 확실한 값: flutamide 아마이드 C=O 1712 cm<sup>-1</sup>, 일부 MS 세기.
- A값(CH<sub>3</sub> 7.3, Ph 11.7 kJ/mol 등)은 표준값이며, Klein 표와 약간 다를 수 있다. 순서와 결론에는 영향이 없다.
- 소스 논문 연결이 느슨한 문항: 2023A-2, 2017A-5, 2014B-논술2 자리. 일부 문항은 「Klein 22장 반응의 복습」을  
출처로 쓴다(관련 논문이 추출본에 없음).
- Hajos-Parrish 93% ee, lpc<sub>2</sub>BH (R)-2-butanol, 2-(hydroxymethylene)cyclohexanone의 δ 14/8.6 등은 일반 문  
헌 지식에서 가져왔다.