# 중등 화학 임용 대비 과교론 기출 변형 — 물질과 에너지·화학 반응의 세계 최종 엄선 16제 (탐구 그림·교과서 캡처 포함판)

2022 개정 고등학교 진로 선택 '물질과 에너지'(1~8번: 물질의 세 가지 상태 · 용액의 성질 · 화학 변화의 자발성 · 반응 속도) + '화학 반응의 세계'(9~16번: 산 염기 평형 · 산화·환원 반응 · 탄소 화합물과 반응)
소재: 비상교육·미래엔 교과서의 탐구 활동 + 2022 개정 과학과 교육과정 진로 선택 '물질과 에너지'·'화학 반응의 세계' 원문(성취기준·탐구 활동·성취기준 해설·적용 시 고려 사항·내용 체계·교수·학습 및 평가)


○ 파란 굵은 글씨로 표시한 〈자료〉는 교육과정 원문을 그대로 옮긴 것이며, 빈칸은 원문의 해당 용어입니다. ○ [ ] 안은 변형한 원 기출(화교론 우선, 물·생·지는 경향 참고)입니다. ○ 지도서 문장은 쓰지 않았고, 오개념·유의점만 기출 유형에 맞게 재구성했습니다. ○ 선정 기준: 출제 가능성 ★5 문항 전부 + 화학 반응의 세계 도금 탐구(실험 안전·채점) 1문항, 영역별 교육과정 탐구 활동과 성취기준 해설의 범위 제한을 빠짐없이 포함. ○ 별점은 2024-2026 물화생지 과교론 출제 경향 기준 중요도·출제 가능성입니다. ○ 모든 문항은 4점 서술형이며, 한 문항이 한 쪽입니다. ○ 모범 답안 및 해설(18-49쪽)은 문항별 2쪽으로, 첫 쪽에 관련 교과서 탐구 캡처(비상교육·미래엔)를 크게 싣고, 둘째 쪽에 모범 답안 · 해설(핵심 이론, 교육과정 근거, 채점 포인트, 두 교과서 비교, 출제 포인트)을 실었습니다.

| 번호 | 교과서·단원 | 원 기출 / 핵심 이론 | 별점 | 문제 쪽 | 해설 쪽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비상교육·미래엔 물질과 에너지 Ⅰ-1 | 2024 화학 B3 (기어리 모형: 실제 세계-모형-예측-데이터) · 2022 화학 B3 (기체 모형) · 2026 물리 B4 (기체 실험 타당성) | ★★★★★ | 2 | 18-19 |
| 2 | 미래엔·비상교육 물질과 에너지 Ⅰ-3 | 2026 화학 B5 (POE 모형·분자 간 상호작용, 물질과 에너지) · 2017 화학 논술 (POE 예측의 역할) · 2022 화학 A6 (추리) | ★★★★★ | 3 | 20-21 |
| 3 | 비상교육·미래엔 물질과 에너지 Ⅱ-2 | 2022 화학 B3 (브루너 표현 양식·자료 변환) · 2023 화학 A6 (증기 압력·브루너) · 2025 화학 B5 (측정 타당도) | ★★★★★ | 4 | 22-23 |
| 4 | 비상교육·미래엔 물질과 에너지 Ⅱ-3 | 2023 화학 A7 (SAPA 탐구 기능) · 2023 화학 B3 (조작·종속 변인) · 2026 물리 B4 (실험 설계 타당성) | ★★★★★ | 5 | 24-25 |
| 5 | 비상교육·미래엔 물질과 에너지 Ⅲ-2 | 2026 화학 A6 (가설-연역적 탐구) · 2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2015 화학 (교육과정 수준 벗어남: 엔탈피) | ★★★★★ | 6 | 26-27 |
| 6 | 비상교육·미래엔 물질과 에너지 Ⅲ-3 | 2015 화학 논술 (엔트로피·드라이버 개념 변화) · 2025 화학 A7 (드라이버 생각의 재구성) · 2023 화학 B4 (교육과정 범위 위배) | ★★★★★ | 7 | 28-29 |
| 7 | 비상교육·미래엔 물질과 에너지 Ⅳ-1 | 2026 화학 B4 (오수벨: 유의미 수용 vs 유의미 발견) · 2022 화학 A7 (귀납) · 2025 화학 B3 (반응 속도, 물질과 에너지) | ★★★★★ | 8 | 30-31 |
| 8 | 비상교육·미래엔 물질과 에너지 Ⅳ-3 | 2025 화학 A7 (하슈웨 C1·C2·R1·R2) · 2022 화학 B4 (촉매) · 2026 물리 B5 (인지 갈등 유형) | ★★★★★ | 9 | 32-33 |
| 9 | 비상교육·미래엔 화학 반응의 세계 Ⅰ-1 | 2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) · 2026 화학 A5 (실험 오류) | ★★★★★ | 10 | 34-35 |
| 10 | 비상교육·미래엔 화학 반응의 세계 Ⅰ-2 | 2021 화학 A5 (비고츠키 비계·ZPD) · 2025 화학 A5 (컴퓨팅 사고력·디지털 소양) · 2021 화학 A7 (당량점 = 중성 오개념) | ★★★★★ | 11 | 36-37 |
| 11 | 비상교육·미래엔 화학 반응의 세계 Ⅰ-3 | 2016 화학 ($CH_3COONa$ 가수 분해) · 2017 화학 논술 (포스너 조건) · 2026 화학 B3 (포스너 유용성) | ★★★★★ | 12 | 38-39 |
| 12 | 비상교육·미래엔 화학 반응의 세계 Ⅰ-4 | 2026 생물 B4 (선행조직자: 설명 조직자 vs 비교 조직자) · 2026 화학 B4 (오수벨 유의미 학습) · 2021 화학 A6 (성취기준 해설 범위) | ★★★★★ | 13 | 40-41 |
| 13 | 비상교육 화학 반응의 세계 Ⅱ-1 | 2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 · 2020 화학 B3 (로슨 경험-귀추적 순환학습) | ★★★★★ | 14 | 42-43 |
| 14 | 비상교육·미래엔 화학 반응의 세계 Ⅱ-2 | 2024 화학 B4 (다니엘 전지: 문제 인식·가설·변인·오개념) · 2025 화학 B5 (측정 타당도) · 2022 화학 B5 (전지 오개념) | ★★★★★ | 15 | 44-45 |
| 15 | 비상교육·미래엔 화학 반응의 세계 Ⅱ-3 | 2018 화학 (실험 안전·평가표) · 2016 화학 (분석적 vs 총체적 채점) · 2026 지구 A7 (채점표 유형·피드백) | ★★★★☆ | 16 | 46-47 |
| 16 | 미래엔·비상교육 화학 반응의 세계 Ⅲ-2 | 2022 화학 A6 (기초 탐구 과정: 관찰·추리) · 2021 화학 B5 (추리·실험 안전) · 2023 화학 B4 (교육과정 범위 위배) | ★★★★★ | 17 | 48-49 |

**[2024 화학 B3 (기어리 모형: 실제 세계-모형-예측-데이터) · 2022 화학 B3 (기체 모형) · 2026 물리 B4 (기체 실험 타당성) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅰ-1 탐구 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류 확인하기' · 미래엔 탐구 '기체의 종류를 확인할 수 있는 실험을 설계하고 수행하기'

**1.** 〈자료 1〉은 '미지의 기체 확인하기' 탐구에서 모둠의 기록과 대화이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. (단, R = 0.082 atm·L/(mol·K)이고, 미지의 기체는 공기를 구성하는 기체 중 하나이다.) [4점]




〈자료 1〉

○ 기체통의 질량을 잰 뒤 기체를 유리 주사기에 100.0 mL 포집하고 다시 기체통의 질량을 재었다. 실험실 온도 25.0 ℃, 기압 1.000 atm.

| 포집 전 기체통(g) | 포집 후 기체통(g) | 기체 부피(mL) |
|---|---|---|
| 144.80 | 144.67 | 100.0 |

○ 학생 O의 계산: ㉠M = nRT/PV에 값을 넣어 분자량을 구하자.

○ 학생 P: 계산한 분자량이 32이니 ㉡분자량만 알면 어떤 기체든 종류를 확실히 정할 수 있어요.

○ 교사: 이상 기체 방정식이라는 모형으로 예측한 값과 실제 측정값을 비교해 보자. 0.13 g처럼 작은 질량을 재면 결과가 얼마나 믿을 만할까?

| 공기 성분 | $N_2$ | $O_2$ | Ar | $CO_2$ |
|---|---|---|---|---|
| 분자량 | 28 | 32 | 40 | 44 |

〈자료 2〉

**○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - (1) 물질의 세 가지 상태**

[12물에01-01] 기체의 온도, 압력, 부피, 몰수 사이의 관계를 통합적으로 이해하고, 이상 기체 방정식을 ( ㉢ ) 활용하는 사례를 조사하여 화학의 유용함을 인식할 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 모의실험을 통해 기체의 압력과 부피, 온도와 부피, 몰수와 부피 관계 등을 파악하여 ( ㉣ )을/를 함양하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠의 오류를 수정하여 미지 기체의 분자량을 구하고 기체의 종류를 쓸 것.


○ 기어리(R. Giere)의 모형 기반 추론의 요소(실제 세계, 모형, 예측, 데이터)를 이 탐구 상황에 각각 대응시키고, 예측과 데이터가 일치할 때 내릴 수 있는 판단을 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정하고, 측정한 질량이 작아 생기는 문제를 줄이는 실험 방법을 1가지 제안할 것. 또한 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

**[2026 화학 B5 (POE 모형·분자 간 상호작용, 물질과 에너지) · 2017 화학 논술 (POE 예측의 역할) · 2022 화학 A6 (추리) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [미래엔·비상교육 물질과 에너지] Ⅰ-3 탐구 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기' (두 교과서 동명 탐구)

**2.** <자료 1>은 POE(예상-관찰-설명) 전략을 적용한 분자 간 상호작용 수업이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]




**분자량 32~37 비교**

$SiH_4$ −112 / $PH_3$ −88

HCl −85 / $H_2S$ −60

$NH_3$ −33 vs $SbH_3$ −17 (㉡?)

<자료 1>

(가) 교사: 분자량이 비슷한 $SiH_4$(32), $PH_3$(34), $H_2S$(34), HCl(37) 중 끓는점이 가장 높은 물질은 무엇일까? 이유와 함께 써 보자.

학생 BB: ㉠분자량이 비슷하니까 끓는점도 거의 같을 거예요. / 학생 CC: 쌍극자 모멘트가 가장 큰 HCl(1.08 D)이 가장 높을 거예요. ($H_2S$ 0.97 D)

(나) 14~17족 수소 화합물의 분자량에 따른 끓는점 자료를 제시하였다.

| 족 | 2주기 | 3주기 | 4주기 | 5주기 |
|---|---|---|---|---|
| 14족 | $CH_4$ −161 | $SiH_4$ −112 | $GeH_4$ −88 | $SnH_4$ −52 |
| 15족 | $NH_3$ −33 | $PH_3$ −88 | $AsH_3$ −62 | $SbH_3$ −17 |
| 16족 | $H_2O$ 100 | $H_2S$ −60 | $H_2Se$ −41 | $H_2Te$ −2 |
| 17족 | HF 20 | HCl −85 | HBr −67 | HI −35 |

(단위: ℃)

(다) 학생들은 예상과 자료를 비교하여 설명을 수정하였다. 한 모둠은 ㉡"$H_2O$, HF, $NH_3$는 수소 결합 때문에 같은 족의 다른 수소 화합물보다 끓는점이 모두 높다."라고 정리하였다.

학생 DD: ㉢물이 끓으면 O-H 결합이 끊어져서 수증기가 돼요.

<자료 2>

**○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - (1) 물질의 세 가지 상태**

[12물에01-03] 물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 ( ㉣ )(으)로 이해하고, 액체의 종류에 따라 끓는점이 달라짐을 설명할 수 있다.

<탐구 활동> • ( ㉤ )의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기

<작성 방법>

○ (가)~(다)를 POE의 단계에 대응시키고, (가) 단계에서 이유와 함께 예상하게 하는 것의 교육적 의미를 쓸 것.

○ <자료 1>의 끓는점 자료를 근거로 밑줄 친 ㉠과 학생 CC의 예상을 각각 비판하고, 분자량이 비슷한 네 물질의 끓는점 차이를 분자 간 상호작용으로 설명할 것.


○ 밑줄 친 ㉡의 진술에서 자료와 맞지 않는 부분을 찾아 수정하고, 밑줄 친 ㉢의 오개념을 수정할 것. 또한 괄호 안의 ㉣과 ㉤에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

**[2022 화학 B3 (브루너 표현 양식·자료 변환) · 2023 화학 A6 (증기 압력·브루너) · 2025 화학 B5 (측정 타당도) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅱ-2 디지털 탐구 '설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기' (온도 센서·스프레드시트) · 미래엔 탐구 '설탕물의 농도에 따른 끓는점과 어는점 측정하기'

**3.** 〈자료 1〉은 온도 센서로 설탕물의 끓는점과 어는점을 측정하여 공유한 결과와 학생들의 해석이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. (단, 물의 $K_b$ = 0.51 ℃·kg/mol, $K_f$ = 1.86 ℃·kg/mol이다.) [4점]




〈자료 1〉

○ 모둠별로 서로 다른 몰랄 농도의 설탕물을 만들어 온도 센서로 측정하고 스프레드시트에 공유하였다.

| 몰랄 농도(m) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 어는점(℃) | −0.91 | −1.88 | −2.82 | −3.70 | −4.62 | −5.61 |
| 끓는점(℃) | 100.58 | 101.08 | 101.54 | 102.12 | 102.58 | 103.18 |

○ 끓는점을 측정한 모둠들은 ㉠삼각 플라스크 입구를 막지 않고 5분 이상 계속 가열하였다.

○ 수업 흐름: (가) 시험관을 한제에 넣고 직접 온도 센서를 꽂아 측정한다. → (나) 스프레드시트로 '몰랄 농도-온도 변화' 그래프를 그린다. → (다) $\Delta T_f = K_f \cdot m$으로 나타낸다.

학생 Q: ㉡설탕이 물 분자 사이의 수소 결합을 방해해서 어는점이 내려가는 거니까, 설탕 대신 포도당을 같은 몰랄 농도로 녹이면 어는점 내림이 달라질 거예요.

〈자료 2〉

**○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - (2) 용액의 성질**

[12물에02-02] 실험 데이터를 이용하여 용액의 농도에 따른 증기압, 끓는점, 어는점의 변화를 비교하고, 일상생활에서 나타나는 사례와 연관 지어 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: • [12물에02-02] 끓는점 오름과 어는점 내림은 몰랄 농도 또는 ( ㉢ )을/를 도입하여 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 디지털 센서를 이용한 온도 데이터의 수집과 저장, 처리를 통해 ( ㉣ ) 탐구 활동을 하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 수업 흐름 (가)~(다)를 브루너(J. Bruner)의 표현 양식에 각각 대응시키고, 이 순서로 제시하는 까닭을 서술할 것.


○ 어는점 자료와 끓는점 자료를 각각 $K_f$, $K_b$로 예측한 값과 비교하여 어느 자료가 이론과 크게 다른지 쓰고, 그 원인을 밑줄 친 ㉠과 관련지어 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 끓는점 오름·어는점 내림의 특성과 관련지어 수정하고, 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

**[2023 화학 A7 (SAPA 탐구 기능) · 2023 화학 B3 (조작·종속 변인) · 2026 물리 B4 (실험 설계 타당성) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅱ-3 탐구 '농도와 삼투 현상의 관계 탐색하기' (실험 설계) · 미래엔 탐구 '농도와 삼투 현상의 관계를 찾기 위한 실험을 설계하고 수행하기'

**4.** 〈자료 1〉은 '농도와 삼투 현상의 관계 탐색하기' 탐구에서 한 모둠이 작성한 실험 설계와 교사의 피드백이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. (단, R = 0.082 atm·L/(mol·K), 1 atm은 물기둥 약 10 m에 해당한다.) [4점]




**우리 모둠의 설계 점검**

조작: 몰농도 → ㉡ 1 M 한 가지만?

통제: ㉠ 온도뿐?

종속: 높이 차 → ㉢ 멈출 때까지?

$\pi = CRT = 1 \times 0.082 \times 298 \simeq ?$

〈자료 1〉

○ 문제 인식: 설탕물의 몰농도와 삼투 현상은 어떤 관계가 있을까?

| 우리 모둠의 실험 설계 | |
|---|---|
| 조작 변인 | 설탕물의 몰농도 |
| 통제 변인 | ㉠ 온도 |
| 종속 변인 | 양쪽 액면의 높이 차 |
| 실험 과정 | ① ㉡1 M 설탕물 50 mL를 만든다. ② 반투막이 있는 삼투압 실험 장치의 왼쪽에 증류수를, 오른쪽에 설탕물을 0 눈금까지 넣는다. ③ ㉢액면 높이가 더 이상 변하지 않을 때 높이 차를 잰다. |

○ 교사: 25 ℃에서 1 M 설탕물의 삼투압을 계산해 보면 이 과정 ③을 수업 시간에 할 수 있을지 알 수 있을 거야.

학생 EE: 설탕 대신 ㉣같은 몰농도의 NaCl 수용액을 써도 $\pi = CRT$로 삼투압이 같게 나올 거예요.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - (2) 용액의 성질**

[12물에02-03] 용액의 농도에 따른 삼투현상을 이해하고, 일상생활에서 삼투현상이 나타나는 사례를 찾아 화학 원리가 유용하게 적용됨을 인식할 수 있다.

〈탐구 활동〉 • 농도와 ( ㉤ )의 관계를 찾기 위한 실험 설계하고 수행하기

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - 교수·학습 방법**

• 교사 중심의 실험보다 ( ㉥ ) 탐구 활동을 설계하고, 동료들과의 협업을 통해 과제를 해결하는 과정에서 상호 협력이 중요함을 인식하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉡의 과정이 이 모둠의 탐구 문제를 해결하기에 부적절한 이유를 조작 변인과 관련지어 서술하고, ㉠ 외에 통제해야 할 변인을 2가지 쓸 것.

○ 25 ℃에서 1 M 설탕물의 삼투압을 구하고, 이를 근거로 밑줄 친 ㉢의 과정이 실현되기 어려운 이유를 쓴 뒤, 종속 변인을 측정하는 방법을 조작적으로 다시 정의하여 수정할 것.


○ 밑줄 친 ㉣의 오류를 수정하고, 괄호 안의 ㉤과 ㉥에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.


**[2026 화학 A6 (가설-연역적 탐구) · 2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2015 화학 (교육과정 수준 벗어남: 엔탈피) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅲ-2 탐구 '중화 반응으로 헤스 법칙 확인하기' (두 교과서 동명 탐구)

**5.** <자료 1>은 '중화 반응으로 헤스 법칙 확인하기' 탐구의 과정과 결과이고, <자료 2>는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. (단, 용액의 비열은 4.2 J/(g·℃), NaOH의 화학식량은 40.0이다.) [4점]

**엔탈피 변화 (NaOH 0.20 mol 기준)**




<자료 1>

○ 가설: "반응물과 생성물이 같으면 반응 경로가 달라도 반응 엔탈피는 같을 것이다."

○ 실험 가: 물 200 g(22.0 ℃)에 NaOH(s) 8.0 g을 녹임 → 최고 32.0 ℃. 실온(22.0 ℃)으로 식힌 뒤 1 M 염산 200 g을 넣음 → 최고 28.0 ℃.

○ 실험 나: 물 200 g(㉠ 24.0 ℃)에 NaOH(s) 8.0 g과 1 M 염산 200 g을 함께 넣음 → 최고 35.2 ℃.

| 경로 | 단계 1 | 단계 2 | 합 | 실험 나(직접) |
|---|---|---|---|---|
| NaOH 1 mol당 ΔH(kJ) | −43.7 | −51.4 | −95.1 | ( A ) |

학생 U: 두 값이 정확히 같지 않으니 ㉡헤스 법칙은 틀렸다고 결론 내려야 해요.

<자료 2>

예비 교사: 다음 차시에는 ㉢엔탈피를 H = U + PV로 정의하고, 내부 에너지와 일의 관계로부터 엔탈피가 상태 함수임을 유도하게 할게요.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - (3) 화학 변화의 자발성**

[12물에03-02] 측정하기 어려운 화학 반응의 엔탈피를 헤스 법칙으로 구하여 화학 법칙의 유용성을 인식할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: • [12물에03-01] 화학 반응에서 열의 출입에 관련된 내용으로 제한하며, ( ㉣ )(으)로서의 엔탈피는 다루지 않는다.

<작성 방법>

○ 이 탐구가 가설-연역적 탐구에 해당하는 근거를 가설과 예측(연역)의 관계로 서술하고, 실험 나의 결과로 ( A )를 구할 것.


○ <자료 1>의 실험 설계에서 결과의 차이를 만들 수 있는 문제점을 밑줄 친 ㉠을 포함하여 2가지 서술하고, 밑줄 친 ㉡의 결론이 적절하지 않은 이유를 쓸 것.

○ 괄호 안의 ㉣에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉢의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

**[2015 화학 논술 (엔트로피·드라이버 개념 변화) · 2025 화학 A7 (드라이버 생각의 재구성) · 2023 화학 B4 (교육과정 범위 위배) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅲ-3 해 보기 '저절로 일어나는 변화의 특징 알아보기' · 탐구 '자발적 변화의 특징 찾아보기' · 미래엔 해 보기 '자발적 변화의 특징 알아보기' · '엔트로피 변화의 부호 예측하기'

**6.** <자료 1>은 드라이버(R. Driver)의 개념 변화 학습 모형을 적용한 화학 변화의 자발성 수업이고, <자료 2>는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



모인 배열 → 퍼진 배열

(잉크·증발·용해)

**자발적 변화의 공통점은?**

$N_2H_4(g) + O_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(g)$ $\Delta H < 0$

$4Fe(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s)$ $\Delta H < 0$

얼음 융해 · $NH_4NO_3$ 용해: $\Delta H > 0$ (㉠ 반례)

<자료 1>

(가) 학생들은 "저절로 일어나는 변화는 모두 열을 방출하는 변화이다."라는 생각을 모둠별로 발표하였다.

(나) 교사는 ㉠얼음이 실온에서 저절로 녹는 현상과 질산 암모늄이 물에 녹으며 차가워지는 현상을 보여 주었다.

(다) 잉크의 확산, 물의 증발, 설탕의 용해에서 분자 배열의 공통점을 찾고 '엔트로피' 개념을 도입하였다.

(라) 하이드라진 연소 $N_2H_4(g) + O_2(g) \rightarrow N_2(g) + 2H_2O(g)$, 손난로 $4Fe(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2Fe_2O_3(s)$의 엔트로피 변화와 공통점을 찾게 하였다.

학생 V: ㉡두 기체가 한 용기에 모여 있는 쪽이 더 복잡해 보이니까, 기체가 두 용기에 나누어 퍼진 것보다 엔트로피가 커요.

<자료 2>

예비 교사: 다음 차시에는 ㉢$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$를 이용해 반응이 자발적으로 일어나는 온도를 계산하게 할게요.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - (3) 화학 변화의 자발성**

[12물에03-03] 엔트로피의 의미를 이해하고, 엔탈피와 엔트로피의 변화로 화학 변화의 자발성을 설명할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: • [12물에03-03] ( ㉣ )은/는 다루지 않으며, 엔트로피는 ( ㉤ )(으)로 다룬다.

<작성 방법>

○ (가)와 (나)에 해당하는 드라이버 모형의 단계(또는 세부 단계)를 각각 쓰고, ㉠이 학생의 생각에 대해 하는 역할을 서술할 것.


○ (라)의 두 반응에서 엔트로피 변화의 부호를 각각 쓰고, 두 반응이 모두 자발적으로 일어나는 까닭을 엔탈피 변화와 관련지어 서술할 것. 또한 밑줄 친 ㉡의 오개념을 수정할 것.

○ 괄호 안의 ㉣과 ㉤에 들어갈 말을 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉢의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

**[2026 화학 B4 (오수벨: 유의미 수용 vs 유의미 발견) · 2022 화학 A7 (귀납) · 2025 화학 B3 (반응 속도, 물질과 에너지) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅳ-1 탐구 '반응물의 농도로 반응 속도 나타내기' · 탐구 '1차 반응의 특징 알아보기' · 미래엔 해 보기 '일차 반응의 특징 알아보기'

**7.** 〈자료 1〉은 반응 속도식과 반감기를 지도하는 두 교사의 수업이고, 〈자료 2〉는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]




**$NO_2 + CO \rightarrow NO + CO_2$**

$[NO_2] \times 2 \rightarrow v \times 4$

$[CO] \times 2 \rightarrow v \times 2$

$v = k[NO_2]^m[CO]^n$, m = ? n = ?

〈자료 1〉

○ 교사 A: "반응 속도식 $v = k[A]^m[B]^n$의 차수는 실험으로 정한다."라는 원리와 1차 반응의 반감기 개념을 먼저 설명하고, 이를 기존에 배운 '반응 속도는 단위 시간당 농도 변화'와 연결 지으며 예제에 적용하게 하였다.

○ 교사 B: 아래 자료만 주고 학생 스스로 규칙성을 찾게 하였다.

| 실험 | $[NO_2](M)$ | [CO](M) | 초기 속도(M/s) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.10 | 0.10 | $2.1\times10^{-3}$ |
| 2 | 0.20 | 0.10 | $8.4\times10^{-3}$ |
| 3 | 0.20 | 0.20 | $1.7\times10^{-2}$ |

| 시간(s) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| $[N_2O_5](M)$ | 0.40 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.10 |

학생 X: $NO_2(g) + CO(g) \rightarrow NO(g) + CO_2(g)$에서 계수가 모두 1이니까 ㉠$v = k[NO_2][CO]$예요.

〈자료 2〉

예비 교사: 다음 차시에는 ㉡$\ln[A] = -kt + \ln[A]_0$를 미분 방정식에서 직접 유도하게 할게요.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - (4) 반응 속도**

[12물에04-01] 화학 반응 속도를 반응물의 농도로 표현할 수 있음을 알고, 자료 해석을 통하여 반응 속도식을 구할 수 있다.

(가) 성취기준 해설: • [12물에04-02] ( ㉢ )을/를 유도하는 것은 다루지 않으며, 자료 해석을 통해 반감기를 찾도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 교사 A와 교사 B의 수업을 오수벨(D. Ausubel)의 관점에서 학습 방식(수용/발견)으로 각각 구분하여 쓰고, 교사 A의 수업이 '유의미' 학습이 되기 위한 조건 2가지를 서술할 것.


○ 〈자료 1〉의 자료로 $NO_2$와 CO에 대한 반응 차수를 각각 구하여 밑줄 친 ㉠의 오개념을 수정하고, $N_2O_5$ 분해 반응의 반감기와 그 특징을 쓸 것.


○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉡의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

**[2025 화학 A7 (하슈웨 C1·C2·R1·R2) · 2022 화학 B4 (촉매) · 2026 물리 B5 (인지 갈등 유형) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅳ-3 탐구 '온도와 반응 속도의 관계 실험하기' · 탐구 '촉매와 반응 속도의 관계 실험하기' · 미래엔 탐구 '온도에 따른 반응 속도 측정하기' · '반응 속도에 영향을 주는 물질 알아보기'

**8.** 〈자료 1〉은 온도와 촉매가 반응 속도에 미치는 영향을 지도하는 수업의 일부이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]




〈자료 1〉

○ $KIO_3$-$NaHSO_3$(녹말) 시계 반응: 얼음물, 실온의 물, 뜨거운 물에서 청람색이 될 때까지 걸린 시간을 측정하였다.

학생 Z: 온도가 높으면 분자들이 더 자주 부딪히니까 빨라지는 거예요. 즉 ㉠속도 증가는 충돌 횟수 증가 때문이에요.

○ 교사는 "온도를 10 ℃ 높이면 충돌 횟수는 약 2 %만 늘어나는데, 반응 속도는 약 2배가 된다."라는 자료와, 두 온도에서의 분자 운동 에너지 분포 곡선을 제시하였다.

○ 10 % 과산화 수소수 7 mL에 KI 0.05 g을 넣었더니 기포가 많이 발생하였다.

학생 AA: ㉡KI는 반응물과 전혀 반응하지 않고 옆에 있기만 해도 반응을 빠르게 해요. 그리고 촉매를 넣으면 반응열도 커져요.

〈자료 2〉

**○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '물질과 에너지' - (4) 반응 속도**

[12물에04-03] 화학 반응에서 유효 충돌과 ( ㉢ )의 의미를 알고, 화학 반응이 일어나기 위한 조건에 관심을 가질 수 있다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 생태전환교육과 연계하여 토양 오염, 수질 오염, 대기 오염 등 인류가 당면한 환경 문제의 심각성을 인지하고, ( ㉣ )을/를 사용하여 이를 해결하는 방법을 통해 지속가능한 지구에 대한 책임감을 갖도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 하슈웨(M. Hashweh)의 인지 갈등 모형에서 학생 Z의 C1과, 교사가 제시한 자료 중 R2와 C2에 해당하는 것을 각각 쓰고, 교사의 자료가 유발하는 갈등의 유형을 쓸 것.


○ 밑줄 친 ㉠의 오개념을 분자 운동 에너지 분포와 관련지어 수정할 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 두 가지 오개념을 각각 수정하고, 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

**[2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) · 2026 화학 A5 (실험 오류) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅰ-1 탐구 '여러 가지 산과 염기 수용액의 pH 측정하기' · 미래엔 Ⅰ-2 탐구 '0.1 M 산과 염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교하기'

**9.** 〈자료 1〉은 '0.1 M 산과 염기 수용액의 pH 측정' 수업에 대한 두 교사의 계획과 학생 활동 결과이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. (단, 25 ℃에서 $CH_3COOH$의 $K_a = 1.8\times10^{-5}$, $NH_3$의 $K_b = 1.8\times10^{-5}$이다.) [4점]




〈자료 1〉

○ 교사 A: "산 수용액이나 염기 수용액의 농도가 같으면 pH도 같을까?"라는 문제와 실험 과정(0.1 M HCl, $CH_3COOH$, NaOH, $NH_3$ 수용액 20 mL를 각각 3회 측정하여 평균)을 제시하고, 결과는 학생이 측정하여 해석하게 한다.

○ 교사 B: 같은 문제만 제시하고, 측정할 용액의 종류와 측정 방법은 모둠이 스스로 정하게 한다.

| 수용액(0.1 M) | HCl | $CH_3COOH$ | NaOH | $NH_3$ |
|---|---|---|---|---|
| 모둠 1 평균 pH | 1.07 | 2.84 | 12.82 | 10.90 |
| 모둠 2 평균 pH | 1.05 | ㉠ 1.62 | 12.85 | 10.94 |

○ 모둠 2는 염산의 pH를 측정한 직후 전극을 헹구지 않고 아세트산 수용액에 넣었다.

학생 C: 아세트산도 산이니까 0.1 M이면 ㉡[$H_3O^+$] = 0.1 M이고 이론값은 pH 1.0이에요.

〈자료 2〉

**○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - (1) 산 염기 평형**

〈탐구 활동〉 • 0.1M의 강산, 강염기, 약산, 약염기 수용액의 pH를 측정하고 ( ㉢ )과 비교하기

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 브뢴스테드-라우리 정의에서부터 약산, 약염기 수용액의 pH를 구하기까지 ( ㉣ )의 개념이 바탕이 됨을 인지하도록 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 헤론(M. Herron)의 탐구 수준에 따라 교사 A와 교사 B의 수업이 각각 몇 수준에 해당하는지 쓰고, 그 근거를 '문제·방법·결과'의 제시 여부로 서술할 것.


○ ㉠의 값이 나타난 원인을 실험 과정과 관련지어 서술하고 개선 방법을 쓸 것. 또한 3회 반복 측정하여 평균을 구하는 것이 높이고자 하는 측정의 특성을 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오류를 수정하여 0.1 M $CH_3COOH$ 수용액의 이론적 pH를 구하는 과정을 서술하고, 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.


**[2021 화학 A5 (비고츠키 비계·ZPD) · 2025 화학 A5 (컴퓨팅 사고력·디지털 소양) · 2021 화학 A7 (당량점 = 중성 오개념) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅰ-2 탐구 '중화 적정 곡선 나타내기' (디지털 탐구: MBL pH 센서) · 미래엔 Ⅰ-3 탐구 '중화 적정 곡선 그리기'

**10.** <자료 1>은 중화 적정 곡선을 시각화하는 수업에서 교사와 학생의 대화이고, <자료 2>는 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]



표의 값으로 그린 그래프



MBL '시간-pH' (㉠ 62 s?)

<자료 1>

○ 농도를 모르는 염산 30.0 mL를 0.1 M NaOH(aq)으로 적정하며 pH를 측정하였다.

| NaOH(mL) | 0.0 | 20.0 | 29.6 | 29.9 | 30.0 | 30.1 | 30.2 | 35.0 | 45.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pH | 1.1 | 1.7 | 3.2 | 3.8 | 7.1 | 10.2 | 10.5 | 11.9 | 12.3 |

○ 학생 D는 MBL pH 센서로 얻은 '시간-pH' 그래프에서 ㉠pH가 급격히 변한 시각이 62초이므로, 62초를 이용해 염산의 농도를 구하겠다고 하였다.

교사: (가) 가로축에 무엇을 놓아야 넣어 준 NaOH의 양과 pH의 관계를 볼 수 있을까? / (나) 표의 값으로 직접 그래프를 그려 보자. 처음 두 점은 선생님과 같이 찍어 볼까? / (다) 이제 남은 점은 혼자 찍어 보렴.

학생 E: 강산과 강염기의 중화점이 pH 7이니까 ㉡아세트산을 NaOH으로 적정해도 중화점의 pH는 7이에요.

<자료 2>

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - (1) 산 염기 평형**

<탐구 활동> • 실험 데이터에 근거하여 ( ㉢ ) 시각화하기

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 중화 적정 곡선을 다룰 때 학생들이 수학적 사고에 기반한 ( ㉣ )과 디지털 소양을 함양하도록 수업을 구성하여 지도할 수 있다.

<작성 방법>

○ 교사의 발문 (가)~(다)를 비고츠키(L. Vygotsky)의 근접 발달 영역(ZPD) 및 비계 설정과 관련지어 설명하고, (나)에서 (다)로의 변화가 의미하는 바를 쓸 것.


○ 밑줄 친 ㉠의 문제점을 그래프의 변인과 관련지어 서술하고, <자료 1>의 표를 이용하여 염산의 몰 농도를 구할 것.

○ 밑줄 친 ㉡의 오개념을 염의 가수 분해와 관련지어 수정하고, 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

**[2016 화학 ($CH_3COONa$ 가수 분해) · 2017 화학 논술 (포스너 조건) · 2026 화학 B3 (포스너 유용성) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅰ-3 탐구 '여러 가지 염 수용액의 액성 알아보기' · 미래엔 Ⅰ-4 탐구 '염 수용액의 액성을 예측하고 확인하기'

**11.** 〈자료 1〉은 염 수용액의 액성을 지도하는 수업의 흐름과 학생 활동지이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]




〈자료 1〉

(가) 학생들은 "염은 산과 염기가 중화되어 생긴 물질이니 수용액은 모두 중성이다."라고 예상하였다. 측정 결과 NaCl 7.0, $CH_3COONa$ 8.9, $NH_4Cl$ 4.9로 나타나자 학생들은 당황하였다.

(나) 교사는 짝산·짝염기의 이온화 상수를 비교하여 각 수용액의 액성을 설명하게 하였다.

(다) 이어서 제산제에 쓰이는 $NaHCO_3$ 수용액의 액성을 예측하고 측정(pH 8.3)하여 확인하게 하였다.

| 이온 | $NH_4^+$ | $CH_3COO^-$ | $HCO_3^-$ |
|---|---|---|---|
| 25 ℃ 이온화 상수 | $K_a = 5.6\times10^{-10}$ | $K_b = 5.6\times10^{-10}$ | $K_a = 4.7\times10^{-11}$, $K_b = 2.2\times10^{-8}$ |

○ 학생 활동지: ㉠NaCl은 강염기의 짝산인 $Na^+$과 강산의 짝산인 $Cl^-$으로 이루어져 중성이다. / ㉡$NaHCO_3$는 산성염이므로 수용액은 산성일 것이다.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - (1) 산 염기 평형**

[12반응01-04] 이온화 상수를 이용하여 염의 가수 분해를 설명할 수 있다.

〈탐구 활동〉 • 짝산 짝염기의 ( ㉢ )를 바탕으로 염 수용액의 액성을 예측하고 실험 결과와 비교하기

〈작성 방법〉

○ 포스너(G. Posner) 등의 개념 변화 조건 중 (가)와 (다)가 각각 충족시키려는 조건을 쓰고, 그 근거를 서술할 것.


○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡의 오류를 각각 찾아 수정하고, ㉡은 〈자료 1〉의 이온화 상수를 근거로 설명할 것.

○ 괄호 안의 ㉢에 들어갈 말을 쓰고, 〈자료 1〉의 이온화 상수를 이용하여 $CH_3COONH_4$ 수용액의 액성을 예측할 것.

**[2026 생물 B4 (선행조직자: 설명 조직자 vs 비교 조직자) · 2026 화학 B4 (오수벨 유의미 학습) · 2021 화학 A6 (성취기준 해설 범위) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅰ-4 탐구 '물과 완충 용액의 pH 변화 비교하기' (미래엔 Ⅰ-5 동명 탐구)

**12.** <자료 1>은 완충 작용 수업의 도입과 실험 결과이고, <자료 2>는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. <작성 방법>에 따라 서술하시오. [4점]




**선행조직자: 르샤틀리에 원리**

$CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$

$CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$

같은 점? 다른 점?

<자료 1>

○ 도입: 교사는 '화학' 과목에서 배운 르샤틀리에 원리(평형에 변화를 주면 그 변화를 줄이는 방향으로 평형이 이동함)를 먼저 제시하고, "완충 용액도 이 원리와 어떤 점이 같고 어떤 점이 다를까?"라고 질문하였다.

○ 증류수와 pH 7 완충 용액 50 mL에 1 M 염산 또는 1 M NaOH(aq)을 한 방울(약 0.05 mL)씩 넣고 pH를 측정하였다.

| | 처음 | HCl 한 방울 후 | NaOH 한 방울 후 |
|---|---|---|---|
| 증류수 | 6.53 | 3.74 | 10.51 |
| 완충 용액 | 7.11 | 7.08 | 7.21 |

학생 F: ㉠증류수는 순수한 물이라 처음 pH가 7이어야 하는데 6.53이 나왔으니 pH 측정기가 고장 났어요.

<자료 2>

예비 교사: 다음 차시에는 ㉡완충 용액에 넣는 산의 양을 바꾸어 가며 완충 용액의 pH를 소수 둘째 자리까지 계산하는 문제 10개를 풀게 할게요.

**○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - (1) 산 염기 평형**

[12반응01-05] 화학 평형으로 생체 내 완충 작용을 설명하고, 화학 원리의 신비로움을 느낄 수 있다.

(가) 성취기준 해설: • [12반응01-05] 완충 작용을 설명할 때 복잡한 ( ㉢ )은/는 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 ( ㉣ )을/를 중심으로 다룬다.

<작성 방법>

○ 도입에서 교사가 사용한 오수벨(D. Ausubel)의 선행조직자 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 다른 유형과 비교하여 서술할 것.


○ 밑줄 친 ㉠의 해석을 수정하고, 증류수 50 mL에 1 M 염산 한 방울(0.05 mL)을 넣었을 때의 이론적 pH를 구할 것. 또한 완충 용액의 pH가 거의 변하지 않는 까닭을 $CH_3COOH/CH_3COO^-$ 완충 용액을 예로 들어 반응식으로 설명할 것.

○ 괄호 안의 ㉢과 ㉣에 들어갈 말을 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉡의 계획이 적절하지 않은 이유를 서술할 것.

**[2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 · 2020 화학 B3 (로슨 경험-귀추적 순환학습) 변형]** **중요도/출제가능성 ★★★★★**

교과서 탐구: [비상교육 화학 반응의 세계] Ⅱ-1 탐구 '색이 변하는 용액 관찰하기' (포도당 + NaOH + 메틸렌 블루)

**13.** 〈자료 1〉은 '색이 변하는 용액' 수업의 탐색 단계와 학생들의 설명이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]




〈자료 1〉

○ 증류수 100 mL에 포도당 1.5 g, NaOH 2 g을 녹이고 메틸렌 블루 용액 약 2 mL를 넣은 뒤 마개를 막아 두었더니 파란색이 점점 사라져 무색이 되었다. 플라스크를 흔들면 다시 파란색이 되었고, 이 변화는 여러 번 반복되었다.

교사: 왜 이런 일이 일어날까? 각자 생각을 말해 보자.

학생 G: 사과를 깎아 두면 공기와 만나 갈색이 되잖아요. 그것처럼 흔들 때 공기 중의 무언가가 들어가서 색이 돌아오는 것 같아요.

학생 H: 흔들면 용액의 온도가 올라가서 파란색이 되는 것 같아요.

○ 교사는 모둠별로 흔든 횟수·마개를 연 시간·용액 온도를 기록하게 하고, 모둠의 자료를 모아 어떤 설명이 자료와 맞는지 토론하게 한 뒤, '산화·환원 지시약' 개념을 도입하였다.

학생 I: ㉠마개를 막아 둘 때 포도당이 산소와 결합하여 산화되면서 메틸렌 블루를 환원시켜요.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - 교수·학습 방법**

- 학생의 지적 호기심과 학습 동기를 유발할 수 있도록 발문하고, ( ㉡ )을/를 적극적으로 활용한다.

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - 내용 체계 가치·태도**

·과학의 ( ㉢ ) 가치 ·과학 유용성 ·자연과 과학에 대한 감수성 ·과학 창의성

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 수업에 해당하는 로슨(A. Lawson)의 순환학습 유형을 쓰고, 학생 G의 사고에 나타난 추론 방식과 함께 그렇게 판단한 근거를 서술할 것.


○ 밑줄 친 ㉠의 오류를 마개를 막아 둘 때와 흔들 때로 나누어, 각 과정의 산화제와 환원제를 밝혀 수정할 것.

○ 괄호 안의 ㉡과 ㉢에 들어갈 말을 순서대로 쓰고, 이 실험에서 학생에게 지도해야 할 안전 사항을 1가지 쓸 것.

**[2024 화학 B4 (다니엘 전지: 문제 인식·가설·변인·오개념) · 2025 화학 B5 (측정 타당도) · 2022 화학 B5 (전지 오개념) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅱ-2 탐구 '효율적인 전지의 조건 탐색하기' · 미래엔 Ⅱ-3 탐구 '효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색하기'

**14.** 〈자료 1〉은 '효율적인 전지의 조건 탐색하기' 탐구에서 모둠의 탐구 계획과 측정 결과, 학생들의 대화이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. (단, 25 ℃ 표준 환원 전위는 $Cu^{2+}/Cu$ +0.34 V, $Fe^{2+}/Fe$ −0.45 V, $Zn^{2+}/Zn$ −0.76 V이다.) [4점]




**측정 전위차**

Zn/Cu 0.90 V

Zn/Fe 0.23 V (㉡ 오류?)

Fe/Cu 0.65 V

〈자료 1〉

○ 탐구 질문: 화학 전지의 전위차는 금속의 종류에 따라 어떻게 달라질까?

○ 모둠 계획: 1 M $ZnSO_4$, $CuSO_4$, $FeSO_4$ 수용액에 각 금속판을 넣고 염다리로 연결한 뒤 멀티미터로 전위차를 측정한다. ㉠금속판은 사포로 문지르는데, 모둠원마다 문지르는 정도와 담그는 깊이는 각자 편하게 한다.

| (−)극 / (+)극 | Zn / Cu | Zn / Fe | Fe / Cu |
|---|---|---|---|
| 측정 전위차(V) | 0.90 | 0.23 | 0.65 |

학생 J: ㉡Zn과 Fe는 표준 환원 전위가 둘 다 (−)라서 원래 전지가 될 수 없는데 0.23 V는 측정 오류예요.

학생 K: Zn → $Zn^{2+}$ + $2e^-$이니까 ㉢Zn/Cu 전지의 표준 전지 전위는 0.34 − 2×(−0.76) = 1.86 V예요.

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - (2) 산화·환원 반응**

〈탐구 활동〉 • 금속판과 전해질을 이용하여 전지를 구성하고, ( ㉣ )이/가 갖추어야 하는 조건 탐색하기

(가) 성취기준 해설: • [12반응02-03] 산화·환원 반응을 통하여 ( ㉤ )이/가 전기 에너지로 전환되는 원리를 다룬다.

〈작성 방법〉

○ 이 탐구의 조작 변인과 종속 변인을 쓰고, 밑줄 친 ㉠의 문제점을 실험의 타당도와 관련지어 서술할 것.


○ 밑줄 친 ㉡과 ㉢의 오개념을 각각 수정하고, Zn/Fe 전지의 표준 전지 전위를 구할 것.

○ 괄호 안의 ㉣과 ㉤에 들어갈 말을 순서대로 쓰고, 측정한 전위차가 표준 전지 전위보다 작게 나타날 수 있는 실험상의 원인을 1가지 쓸 것.

**[2018 화학 (실험 안전·평가표) · 2016 화학 (분석적 vs 총체적 채점) · 2026 지구 A7 (채점표 유형·피드백) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★☆

교과서 탐구: [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅱ-3 탐구 '은도금하기' (미래엔 Ⅱ-4 동명 탐구)

**15.** 〈자료 1〉은 전기 도금 수업에 대한 예비 교사의 계획과 학생의 보고서, 채점 기준이고, 〈자료 2〉는 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]




**채점 기준(총체적?)**

8~10점: 정확히 이해, 안전하게 잘 수행

4~7점: 대체로 이해·수행

0~3점: 이해와 수행 부족

〈자료 1〉

○ 예비 교사의 계획: 다이사이아노은산 칼륨($K[Ag(CN)_2]$) 수용액에 은판을 전원 장치의 (+)극에, 구리 펜던트를 (−)극에 연결한다. ㉠도금이 빨리 되도록 수용액을 알코올램프로 가열하면서 진행한다.

○ 학생 L의 보고서: ㉡(+)극은 화학 전지처럼 환원이 일어나는 곳이므로 은판에서 $Ag^+$이 Ag로 환원된다. 그리고 ㉢ 은판의 은 원자가 그대로 떨어져 나와 펜던트에 붙는다.

| 채점 기준(10점) |
|---|
| 8~10점: 도금의 원리를 정확히 이해하고 실험을 안전하게 잘 수행하였다. / 4~7점: 대체로 이해하고 수행하였다. / 0~3점: 이해와 수행이 부족하다. |

〈자료 2〉

○ **2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - (2) 산화·환원 반응**

〈탐구 활동〉 • 염 수용액과 전원 장치를 이용하여 금속 제품 표면에 도금하기

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 화학 전지 만들기 및 도금 실험을 수행할 때 ( ㉣ )을/를 착용한 후 실험실 안전 수칙에 따라 실험하고, 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 화학 실험실 폐수 및 폐기물 처리 기준과 방법에 따라 처리할 수 있도록 한다.

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠의 문제점을 사용하는 물질과 관련지어 서술하고, 괄호 안의 ㉣에 들어갈 말을 쓸 것. 또한 같은 탐구 활동을 더 안전하게 수행할 수 있는 대체 실험을 1가지 제안할 것.


○ 밑줄 친 ㉡과 ㉢의 오개념을 각 전극의 반응식을 써서 수정할 것.

○ 〈자료 1〉의 채점 기준이 해당하는 채점 방식을 쓰고, 이를 평가 요소별로 점수를 부여하는 방식으로 바꿀 때의 장점을 쓴 뒤 평가 요소 2가지를 제시할 것.

**[2022 화학 A6 (기초 탐구 과정: 관찰·추리) · 2021 화학 B5 (추리·실험 안전) · 2023 화학 B4 (교육 과정 범위 위배) 변형]** 중요도/출제가능성 ★★★★★

교과서 탐구: [미래엔·비상교육 화학 반응의 세계] Ⅲ-2 탐구 '은거울 반응으로 작용기의 변화 탐구하기' · '음주 측정기로 작용기 변화 탐구하기' · 비상교육 Ⅲ-2 탐구 '음주 측정기를 만들어 작용기의 변화 탐구하기'

**16.** 〈자료 1〉은 작용기의 변화를 탐구하는 실험에서 학생들이 작성한 기록이고, 〈자료 2〉는 예비 교사의 계획과 관련 교육과정 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]




〈자료 1〉

○ 실험 가(은거울 반응): 0.1 M 질산 은 수용액 5 mL에 진한 암모니아수를 갈색 앙금이 녹을 때까지 한 방울씩 넣고, 0.5 M 포도당 수용액과 0.1 M KOH 수용액을 2 mL씩 넣어 60 ℃ 물에서 흔들었다.

○ 실험 나(음주 측정기): 0.1 M 다이크로뮴산 칼륨 수용액과 6 M 황산을 섞어 적신 실리카 겔을 관에 채우고, 에탄올을 적신 솜을 넣어 막았다.

| 학생 | 기록 |
|---|---|
| FF | ① 병의 안쪽 벽에 은색 막이 생겼다. ② 포도당의 -CHO가 -COOH로 바뀌었다. |
| GG | ③ 실리카 겔이 ㉠노란색에서 초록색으로 변했다. ④ 에탄올의 -OH가 산화되어 알데하이드가 생성되었다. |

○ 실험 후 모둠 1은 ㉡실험 가에서 남은 암모니아성 질산 은 용액을 다음 차시에 다시 쓰려고 뚜껑을 닫아 보관하였다.

〈자료 2〉

예비 교사: 다음 차시에는 ㉢에스터화, 첨가, 치환, 제거 반응의 메커니즘을 화살표로 나타내고 케톤·에터·아민의 작용기 반응까지 정리하게 할게요.

**○ 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학 반응의 세계' - (3) 탄소 화합물과 반응**

〈탐구 활동〉 • 음주 측정기 만들기, 은거울 반응 등 실험을 통해 작용기의 변화 탐구하기

(가) 성취기준 해설: • [12반응03-01~02] 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고 ( ㉣ )이/가 바뀌면 화합물의 ( ㉤ )도 바뀐다는 수준으로 다룬다.

(나) 성취기준 적용 시 고려 사항: • 탄소 화합물의 반응의 종류를 학습하기보다는 탄소 화합물의 반응을 활용하여 인간의 삶을 윤택하게 하는 화합물을 개발할 수 있다는 점을 중점으로 지도한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 ①~④를 기초 탐구 과정의 '관찰'과 '추리'로 분류하고, 두 과정을 구분하는 기준을 서술할 것.

○ 실험 가에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 쓰고, 밑줄 친 ㉠의 오류를 실험 나의 산화수 변화와 관련지어 수정할 것. 또한 밑줄 친 ㉡의 문제점과 실험 나에서 추가로 지도해야 할 안전 사항을 1가지씩 쓸 것.


○ 괄호 안의 ㉣과 ㉤에 들어갈 말을 순서대로 쓰고, 밑줄 친 ㉢의 계획이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 2가지 서술할 것.

## 1번 모범 답안 및 해설 [2024 화학 B3 (기어리 모형: 실제 세계-모형-예측-데이터) · 2022 화학 B3 (기체 모형) · 2026 물리 B4 (기체 실험 타당성) 변형] ★★★★★


### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅰ-1 탐구 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류 확인하기' · 미래엔 탐구 '기체의 종류를 확인할 수 있는 실험을 설계하고 수행하기'





비상교육 물질과 에너지 Ⅰ-1 탐구 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류 확인하기'




같은 탐구 (계속)




미래엔 물질과 에너지 Ⅰ-1 탐구 '기체의 종류를 확인할 수 있는 실험을 설계하고 수행하기'




같은 탐구 (계속)

**1번 모범 답안 및 해설 (계속) [2024 화학 B3 (기어리 모형: 실제 세계-모형-예측-데이터) · 2022 화학 B3 (기체 모형) · 2026 물리 B4 (기체 실험 타당성) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- n = w/M이므로 M = wRT/PV이다. M = 0.13 × 0.082 × 298 / (1.000 × 0.1000) ≈ 32 → 산소($O_2$).
- 실제 세계: 기체통에서 포집한 미지의 기체, 모형: 이상 기체 방정식(PV = nRT), 예측: 기체가 $O_2$라면 이 조건에서 100 mL의 질량은 약 0.13 g, 데이터: 측정한 질량 감소 0.13 g. 예측과 데이터가 일치하므로 '이 기체는 $O_2$이다'라는 가설(모형의 적용)이 지지된다(일치하지 않으면 모형 적용을 기각).
- 분자량이 같은 서로 다른 물질이 있을 수 있으므로 분자량만으로는 종류를 확정할 수 없다(후보 범위 제한 등 추가 정보 필요). 방법 예: 주사기로 여러 번 포집하여 총부피와 총 질량을 크게 하거나, 더 정밀한 저울을 쓰고 반복 측정한다. ㉢ 근사적으로, ㉣ 디지털 소양.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 기어리의 모형 기반 추론: 실제 세계의 대상과 모형(이론적 가설)의 적합성을 판단하기 위해, 모형으로부터 예측을 이끌어 내고 관찰 데이터와 비교한다. 일치하면 모형이 그 대상에 적합하다는 판단이 지지되고, 불일치하면 기각된다. 이상 기체 방정식은 실제 기체에 근사적으로 적용되는 모형이다.

**[교육과정 근거]** [12물에01-01] 성취기준(이상 기체 방정식을 근사적으로 활용), 탐구 활동(이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기), 고려 사항(모의실험으로 디지털 소양 함양).


**[채점 포인트]** M = wRT/PV와 32($O_2$). 기어리 4요소의 정확한 대응과 '예측-데이터 일치 → 모형 적용 지지'. ㉡은 분자량이 같은 다른 물질의 존재. 작은 질량 문제는 포집량을 늘리는 구체적 방법. ㉢ 근사적으로, ㉣ 디지털 소양.

**[두 교과서 비교]** 미래엔은 미지 기체(He 등) 확인 실험을 설계하게 하며, 측정 질량이 0.1 g 수준이라 계산값(약 5.2 g/mol)이 이론값 4와 크게 다르다. 두 교과서 모두 '작은 질량의 측정 오차'가 핵심 지도 지점이다. 미래엔 날개의 수증기압 보정 언급이 결과 계산에는 반영되지 않은 점도 비판적 검토 소재이다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(주사기 100 mL, 0.13 g, 25 ℃, 1 atm → 32)를 기어리 모형 기반 추론(2024 화학 B3)으로 구성. 공식 오기(지도서 예시 오류를 학생 오류로 재구성), '분자량만으로 확정' 오개념, 작은 질량 측정의 오차, [12물에01-01]·고려 사항 원문 빈칸(근사적으로, 디지털 소양).

## 2번 모범 답안 및 해설 [2026 화학 B5 (POE 모형·분자 간 상호작용, 물질과 에너지) · 2017 화학 논술 (POE 예측의 역할) · 2022 화학 A6 (추리) 변형] ★★★★★

### ■ 관련 교과서 탐구 — [미래엔·비상교육 물질과 에너지] Ⅰ-3 탐구 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기' (두 교과서 동명 탐구)



탐구 능력 | 문제 해결 능력

수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기

목표

수소 화합물의 끓는점 차이를 분자 간 상호작용으로 추론하고 설명할 수 있다.

자료 해석

그림은 14족~17족 원소의 수소 화합물의 분자량에 따른 끓는점을 나타낸 것이다.



(자료 출처: "CRC Handbook of Chemistry and Physics(105th ed.)", 2024.)

1. 14족~17족 원소의 수소 화합물 중 무극성 분자를 써 보자.

2. 같은 족 원소의 수소 화합물에서 분자의 분자량이 커지면 끓는점은 어떻게 변하는지 설명해 보자. (단, $H_2O$, HF, $NH_3$는 제외한다.)


정리

1. $H_2S$가 $SiH_4$보다 끓는점이 높은 까닭을 분자 간 상호작용으로 설명해 보자.

2. 14족 원소의 수소 화합물의 끓는점이 $CH_4 < SiH_4 < GeH_4 < SnH_4$ 순으로 높아지는 까닭을 분자 간 상호작용으로 설명해 보자.

3. 15족~17족 원소의 수소 화합물의 끓는점이 14족 원소의 수소 화합물과 다른 경향을 나타내는 까닭을 분자 간 상호작용으로 설명해 보자.

미래엔 물질과 에너지 Ⅰ-3 탐구 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기'



스스로 평가하기

| 지식·이해 |

수소 화합물의 끓는점을 분자 간 상호작용으로 설명했는가?

☆☆☆☆☆

| 과정·기능 |

수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인을 추론할 때 타당한 근거를 제시했는가?


☆☆☆☆☆

| 가치·태도 |

분자 간 상호작용이 물질의 끓는점을 추론하는 데 유용하게 사용됨을 인식했는가?

☆☆☆☆☆

같은 탐구 (계속)



탐구

자료 해석

수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기

목표 수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인을 분자 사이의 힘으로 추론할 수 있다.

그림은 14족~17족 원소의 수소 화합물의 끓는점을 나타낸 것이다.



(출처: "CRC Handbook of Chemistry and Physics, 104th edition, 2023)

정리

1. 14족 원소의 수소 화합물은 중심 원자의 주기가 증가할수록 끓는점이 어떻게 변하는가?

2. 15족~17족 원소의 수소 화합물 중 중심 원자가 3주기~5주기 원소인 분자는 주기가 증가할수록 끓는점이 어떻게 변하는가?

3. 물($H_2O$), 플루오린화 수소(HF), 암모니아($NH_3$)는 각각 같은 족의 다른 수소 화합물보다 끓는점이 높다. 그 까닭을 설명해 보자.

비상교육 물질과 에너지 Ⅰ-2 탐구 '수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기'

**2번 모범 답안 및 해설 (계속) [2026 화학 B5 (POE 모형·분자 간 상호작용, 물질과 에너지) · 2017 화학 논술 (POE 예측의 역할) · 2022 화학 A6 (추리) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- (가) 예상(Predict), (나) 관찰(Observe), (다) 설명(Explain). 이유와 함께 예상하게 하면 학생의 선개념이 드러나고, 자료와 불일치할 때 인지 갈등이 일어나 설명을 수정하려는 동기가 생긴다(예상에 대한 책임감·호기심 유발).
- ㉠ $SiH_4$ −112, $PH_3$ −88, HCl −85, $H_2S$ −60 ℃로 분자량이 비슷해도 끓는점이 크게 다르다. CC: 쌍극자 모멘트가 더 큰 HCl보다 $H_2S$의 끓는점이 높으므로 쌍극자 모멘트만으로 판단할 수 없다(분자의 크기·모양, 분산력의 기여가 함께 작용). 설명: 분자량이 비슷해 분산력은 비슷하지만, 무극성인 $SiH_4$는 분산력만 작용하여 가장 낮고, 극성 분자인 $PH_3$·HCl·$H_2S$는 쌍극자·쌍극자 힘이 더해져 끓는점이 높다.
- $NH_3$(−33 ℃)는 $PH_3$·$AsH_3$보다는 높지만 $SbH_3$(−17 ℃)보다 낮으므로 '모두 높다'는 틀렸다. 수정: "$H_2O$와 HF는 같은 족에서 끓는점이 가장 높고, $NH_3$는 분자량에 비해 끓는점이 비정상적으로 높다." ㉢ 끓을 때는 분자 사이의 상호작용(수소 결합 등)이 끊어질 뿐 분자 내 공유 결합(O-H)은 끊어지지 않는다(수증기도 $H_2O$ 분자). ㉣ 분자 간 상호작용, ㉤ 수소 화합물.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** POE(예상-관찰-설명): 예상 단계에서 근거와 함께 공언한 선개념을 관찰 결과와 비교하게 하여 인지 갈등을 일으키고, 설명 단계에서 개념을 수정한다. 분자량이 비슷하면 분산력이 비슷하므로, 극성(쌍극자·쌍극자 힘)과 수소 결합의 유무가 끓는점 차이를 만든다. 쌍극자 모멘트의 크기만으로 끓는점을 판단할 수는 없다.

**[교육과정 근거]** [12물에01-03] 성취기준(물질이 액체로 존재할 수 있는 이유를 분자 간 상호작용으로 이해하고 액체의 종류에 따른 끓는점 차이 설명), 탐구 활동(수소 화합물의 끓는점에 영향을 주는 요인 추론하기).


**[채점 포인트]** POE 세 단계 대응과 '이유와 함께 예상'의 의미(선개념 표면화·인지 갈등). ㉠·CC 비판은 표의 수치($SiH_4$ −112 … $H_2S$ −60, HCl < $H_2S$)로. ㉡은 $SbH_3$ > $NH_3$를 근거로 수정, ㉢은 분자 간 상호작용 vs 분자 내 결합. ㉣ 분자 간 상호작용, ㉤ 수소 화합물.

**[두 교과서 비교]** 미래엔은 가로축을 분자량으로, 비상교육은 주기로 그려 비교 관점이 다르다(분자량이 비슷한 물질 비교에는 미래엔 그래프가 유리). 두 교과서 모두 $NH_3$의 끓는점을 '같은 족에서 높다'고 진술하나 $SbH_3$가 더 높다.

**[출제 포인트]** 미래엔 탐구(14~17족 수소 화합물의 분자량-끓는점 그래프)를 POE(2026 화학 B5, 2017 화학)로 구성. 분자량 같으면 끓는점 같음·쌍극자 모멘트 크기 오개념(HCl < $H_2S$), 두 교과서 공통의 $NH_3$ 과잉 진술($SbH_3$가 더 높음)을 오류 찾기로 재구성, [12물에01-03] 성취기준·탐구 활동 원문 빈칸.

## 3번 모범 답안 및 해설 [2022 화학 B3 (브루너 표현 양식·자료 변환) · 2023 화학 A6 (증기 압력·브루너) · 2025 화학 B5 (측정 타당도) 변형] ★★★★★

## ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅱ-2 디지털 탐구 '설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기' (온도 센서·스프레드시트) · 미래엔 탐구 '설탕물의 농도에 따른 끓는점과 어는점 측정하기'



디지털 탐구

실험

### 설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기

목표 온도 센서를 이용하여 몰랄 농도에 따른 설탕물의 끓는점과 어는점을 측정할 수 있다.

준비물
- 설탕
- 얼음
- 비커
- 삼각 플라스크
- 눈금실린더
- 시험관
- 유리 막대
- 시약포지
- 전자저울
- 스탠드
- 집게 잡이
- 알루미늄 포일
- 보안경
- 스마트 기기
- 증류수
- 소금
- 스포이트
- 약숟가락
- 온도 센서
- 가열 장치
- 집게
- 실험용 장탁

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 화상과 동상을 입지 않도록 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.
- 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 지정된 곳에 모아 처리한다.

문제 인식 설탕물의 끓는점과 어는점은 몰랄 농도와 어떤 관련이 있을까?

탐구 수행

**실험 (가) 여러 가지 농도의 설탕물 만들기**

1. 몰랄 농도가 다른 설탕물을 만들 때 필요한 설탕의 질량을 구해 보자. (단, 설탕의 몰질량은 342.0 g/mol이다.)

| 몰랄 농도($m$) | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 증류수의 질량(g) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 설탕의 질량(g) | | | | | | |

2. 모둠별로 과정 1의 농도 중 하나를 선택하여 설탕물을 만든다.


**실험 (다) 설탕물의 끓는점 측정하기**

1. 실험 (가)에서 만든 설탕물 80 mL를 삼각 플라스크에 넣고 가열 장치 위에 올려놓는다.
2. 스탠드와 집게를 이용하여 온도 센서를 설치한 뒤 설탕물에 온도 센서를 꽂는다.
   주의 온도 센서가 삼각 플라스크의 바닥과 벽면에 닿지 않도록 주의한다.
3. 온도 센서를 스마트 기기와 연결한 뒤 MBL(Microcomputer Based Laboratory) 프로그램을 실행한다.
4. 시간에 따른 설탕물의 온도를 측정한다.
5. 과정 4의 측정값에서 설탕물의 끓는점을 찾아보자.

? 설탕물의 끓는점: ..... ℃



비상교육 물질과 에너지 Ⅱ-2 디지털 탐구 '설탕물의 끓는점과 어는점 측정하기'



**실험 (다) 설탕물의 어는점 측정하기**

1. 실험 (가)에서 만든 설탕물 20 mL를 시험관에 넣는다.
2. 스탠드와 집게를 이용하여 온도 센서를 설치한 뒤 과정 1의 시험관에 온도 센서를 꽂는다.
   주의 온도 센서가 시험관의 바닥과 벽면에 닿지 않도록 주의한다.
3. 온도 센서를 스마트 기기와 연결한 뒤 MBL(Microcomputer Based Laboratory) 프로그램을 실행한다.
4. *한계가 담긴 비커에 과정 2의 시험관을 넣은 뒤 시간에 따른 설탕물의 온도를 측정한다.
5. 과정 4의 측정값에서 설탕물의 어는점을 찾아보자.

? 설탕물의 어는점: ..... ℃

* 한계
두 종류 이상의 물질을 섞어 사용하는 냉각제로, 얼음과 소금을 3 : 1로 섞으면 약 −20 ℃까지 냉각할 수 있다.



의사소통과 협업

1. 각 모둠의 실험 결과를 스프레드시트 프로그램에 공유해 보자.
2. 각 모둠의 실험 결과를 이용하여 설탕물의 몰랄 농도에 따른 끓는점과 어는점의 그래프를 나타내 보자.

결론 도출

1. 설탕물의 몰랄 농도, 끓는점, 어는점은 서로 어떤 관계가 있는지 설명해 보자.

2. 설탕물의 끓는점과 어는점이 물과 다른 까닭을 설명해 보자.


나의 활동 돌아보기

지식·이해 › 설탕물의 끓는점과 어는점에 관해 무엇을 알게 되었는가?

과정·기능 › 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › 온도 센서를 이용하여 탐구를 수행할 때 어떤 점이 흥미로웠는가?

같은 탐구 (계속)



탐구

탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

탐구 수행 / 결론 도출

### 설탕물의 농도에 따른 끓는점과 어는점 측정하기

준비물
- 증류수
- 설탕물(0.5 $m$(몰랄 농도), 1 $m$(몰랄 농도))
- 비커
- 스포이트
- 온도 센서
- 스탠드
- 얼음과 소금
- 스마트 기기
- 보안경
- 실험용 고무장갑
- 안전 장갑
- 눈금실린더
- 약숟가락
- 가열 장치
- 집게
- 시험관
- 실험복

**목표**

다양한 농도 조건에서 온도 센서를 이용하여 설탕물의 끓는점과 어는점을 측정할 수 있다.

**과정**

**실험 1 설탕물의 끓는점 측정하기**

1. 증류수 50 mL를 비커에 넣고 그림과 같이 장치하자.
2. 온도 센서의 데이터를 얻기 위한 프로그램을 실행하고 초기 온도를 측정하자.
3. **과정 1**의 비커를 가열하면서 온도 센서의 데이터를 수집해 시간에 따른 온도 변화 그래프를 확인하자.
4. 물이 끓기 시작하면 2 분 정도 더 온도를 측정한 후, 끓는점을 찾아 기록하자.
5. 증류수 대신 0.5 $m$(몰랄 농도) 설탕물, 1 $m$(몰랄 농도) 설탕물을 이용하여 **과정 1**~**4**를 각각 반복하자.



**원하는 몰랄 농도의 설탕물 제조 방법**

몰랄 농도는 용매 1 kg에 들어 있는 용질의 양(mol)이고, 설탕의 몰질량은 342 g/mol이다.


증류수 100 g에 설탕 0.05 mol(17.1 g)을 녹인 설탕물의 몰랄 농도는 0.5 $m$(몰랄 농도)이다.

$$\frac{0.05(\text{mol})}{0.1(\text{kg})}=\frac{\frac{17.1(\text{g})}{342(\text{g/mol})}}{0.1(\text{kg})}=0.5\ m$$

증류수 100 g에 설탕 0.1 mol(34.2 g)을 녹인 설탕물의 몰랄 농도는 1 $m$(몰랄 농도)이다.

$$\frac{0.1(\text{mol})}{0.1(\text{kg})}=\frac{\frac{34.2(\text{g})}{342(\text{g/mol})}}{0.1(\text{kg})}=1\ m$$

미래엔 물질과 에너지 Ⅱ-2 탐구 '설탕물의 농도에 따른 끓는점과 어는점 측정하기'



**실험 2 설탕물의 어는점 측정하기**

1. 500 mL 비커에 얼음과 소금을 약 3 : 1의 질량비로 섞어 *한제를 만들자.
2. 증류수 5 mL를 시험관에 넣고 그림과 같이 장치하자.
3. 온도 센서의 데이터를 얻기 위한 프로그램을 실행하고 초기 온도를 측정하자.
4. 온도 센서의 데이터를 수집해 시간에 따른 온도 변화 그래프를 확인하자.
5. 물이 얼기 시작하면 2 분 정도 더 온도를 측정한 후, 어는점을 찾아 기록하자.
6. 증류수 대신 0.5 $m$(몰랄 농도) 설탕물, 1 $m$(몰랄 농도) 설탕물을 이용하여 **과정 2**~**5**를 각각 반복하자.

안전
- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 가열 장치를 다룰 때는 반드시 안전 장갑을 착용한다.

● 한제
두 가지 이상의 물질을 혼합해서 만드는 냉각제이다.



**결과**

실험 1과 실험 2에서 얻은 끓는점과 어는점 그래프를 공유 플랫폼을 활용하여 공유하고, 농도에 따른 끓는점과 어는점을 써 보자.

| 구분 | 증류수 | 0.5 $m$(몰랄 농도) 설탕물 | 1 $m$(몰랄 농도) 설탕물 |
|---|---|---|---|
| 끓는점(℃) | | | |
| 어는점(℃) | | | |

**정리**

1. 실험 1과 실험 2의 결과를 바탕으로 하여 용액의 농도와 끓는점, 어는점의 관계를 설명해 보자.

2. 심화 1.5 $m$(몰랄 농도) 설탕물의 끓는점과 어는점을 예상해 보자.

스스로 평가하기

| 지식·이해 | 용액의 농도와 끓는점, 어는점의 관계를 옳게 설명했는가? | ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| 과정·기능 | 온도 센서를 이용해 설탕물의 농도에 따른 끓는점과 어는점을 측정했는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 가치·태도 | 용액의 끓는점, 어는점 변화에 관심을 갖고 실험에 적극적으로 참여했는가? | ☆☆☆☆☆ |

같은 탐구 (계속)

**3번 모범 답안 및 해설 (계속) [2022 화학 B3 (브루너 표현 양식·자료 변환) · 2023 화학 A6 (증기 압력·브루너) · 2025 화학 B5 (측정 타당도) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- (가) 작동적(행동적) 표상, (나) 영상적 표상, (다) 상징적 표상. 학습자의 인지 발달과 이해 과정에 맞추어 구체적 조작 경험에서 시각적 표현, 추상적 기호로 나아가야 개념을 의미 있게 구성할 수 있기 때문이다.
- 어는점 내림은 1.86 × m(예: 1.0 m에서 1.86 ℃)과 거의 일치한다. 끓는점 오름은 0.51 × m(1.0 m에서 0.51 ℃, 3.0 m에서 1.53 ℃)의 약 2배로 크게 측정되었다. 입구를 막지 않고 오래 가열하여 물이 증발하면서 용액이 진해져(몰랄 농도 증가) 끓는점이 계속 올라갔기 때문이다(입구를 알루미늄 포일로 막고 온도가 일정하게 유지되는 구간을 끓는점으로 정함).
- 끓는점 오름과 어는점 내림은 용질의 종류와 관계없이 용질 입자 수(몰랄 농도)에만 비례하는 성질이므로, 같은 몰랄 농도의 비전해질 포도당 수용액도 어는점 내림이 같다. ㉢ 몰 분율, ㉣ 데이터 기반.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 브루너의 표현 양식: 작동적(행동) → 영상적(그림·그래프) → 상징적(기호·식). 끓는점 오름($\Delta T_b = K_b \cdot m$)과 어는점 내림($\Delta T_f = K_f \cdot m$)은 용질의 종류와 무관하게 용질 입자 수에만 의존하는 총괄성이다. 끓는점 측정 시 용매가 증발하면 몰랄 농도가 커져 측정값이 커진다.

**[교육과정 근거]** [12물에02-02] 성취기준(실험 데이터로 증기압·끓는점·어는점 변화 비교), 해설(몰랄 농도 또는 몰 분율 도입), 고려 사항(디지털 센서로 온도 데이터 수집·저장·처리, 데이터 기반 탐구), 탐구 활동(온도 센서로 설탕물의 끓는점·어는점 측정).


**[채점 포인트]** 세 표상의 순서 대응과 이유. 어는점 자료는 이론과 일치, 끓는점 자료가 약 2배임을 수치로 비교하고 '증발 → 농도 증가'로 설명. ㉡은 '용질 종류 무관'. ㉢ 몰 분율, ㉣ 데이터 기반.

**[두 교과서 비교]** 미래엔 '설탕물의 농도에 따른 끓는점과 어는점 측정하기'도 온도 센서로 측정하고 원하는 몰랄 농도의 설탕물 제조 방법을 따로 제시한다. 두 교과서 모두 끓는점 측정 시 용매 증발에 따른 농도 변화와 센서 위치(바닥·벽면 접촉)가 오차의 핵심이며, 한제를 다룰 때 저온 화상 주의가 필요하다.


**[출제 포인트]** 교과서 디지털 탐구(0.5~3.0 m 설탕물, 온도 센서, 스프레드시트 표1·표2)의 끓는점 자료가 $K_b$의 약 2배인 점을 오차 분석으로 활용, 브루너 표현 양식(2022 B3, 2023 A6 화학)으로 구성. '수소 결합 방해' 오개념(용질 종류 의존), [12물에02-02] 성취기준·해설·고려 사항 원문 빈칸(몰 분율, 데이터 기반).

## 4번 모범 답안 및 해설 [2023 화학 A7 (SAPA 탐구 기능) · 2023 화학 B3 (조작·종속 변인) · 2026 물리 B4 (실험 설계 타당성) 변형] ★★★★★


### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅱ-3 탐구 '농도와 삼투 현상의 관계 탐색하기' (실험 설계) · 미래엔 탐구 '농도와 삼투 현상의 관계를 찾기 위한 실험을 설계하고 수행하기'




비상교육 물질과 에너지 Ⅱ-3 탐구 '농도와 삼투 현상의 관계 탐색하기'




같은 탐구 (계속)




미래엔 물질과 에너지 Ⅱ-3 탐구 '농도와 삼투 현상의 관계를 찾기 위한 실험을 설계하고 수행하기'

**4번 모범 답안 및 해설 (계속) [2023 화학 A7 (SAPA 탐구 기능) · 2023 화학 B3 (조작·종속 변인) · 2026 물리 B4 (실험 설계 타당성) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- 한 가지 농도(1 M)만 만들면 조작 변인인 몰농도가 변하지 않아 농도와 삼투 현상의 관계를 찾을 수 없다(여러 농도의 설탕물을 만들어야 함). 통제 변인 예: 양쪽 용액의 처음 부피(높이), 반투막의 종류와 면적, 측정 시간, 같은 실험 장치.
- $\pi = CRT = 1 \times 0.082 \times 298 \approx 24$ atm으로, 물기둥 약 240 m에 해당하므로 실험실 장치에서 액면 높이가 멈출 때까지(평형) 기다릴 수 없다. 수정 예: 0.05~0.2 M 정도의 묽은 설탕물을 여러 농도로 준비하고, '같은 시간(예: 10분) 동안 생긴 액면의 높이 차'를 종속 변인으로 정의하여 측정한다.
- $\pi = CRT$는 비휘발성·비전해질 용질의 묽은 용액에 적용된다. NaCl은 물에서 $Na^+$과 $Cl^-$으로 이온화하여 용질 입자 수가 약 2배가 되므로 같은 몰농도의 설탕물보다 삼투압이 크다. ㉤ 삼투현상, ㉥ 학생 중심의.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** SAPA의 통합 탐구 과정: 문제 인식, 가설 설정, 변인 통제, 조작적 정의, 실험 설계, 자료 해석, 결론 도출. 관계를 찾는 실험은 조작 변인을 여러 수준으로 변화시켜야 하며, 그 외 변인은 통제해야 한다. 판트호프 식 $\pi = CRT$는 비휘발성·비전해질 용질의 묽은 용액에 적용된다.

**[교육과정 근거]** [12물에02-03] 성취기준(용액의 농도에 따른 삼투현상 이해, 일상 사례), 탐구 활동(농도와 삼투현상의 관계를 찾기 위한 실험 설계하고 수행하기), 교수·학습 방법 (나): 교사 중심의 실험보다 학생 중심의 탐구 활동 설계.

**[채점 포인트]** ㉡은 '조작 변인이 변하지 않음', 통제 변인 2가지(처음 부피, 반투막, 시간 등). $\pi \approx 24$ atm(물기둥 약 240 m)과 ㉢ 불가 이유, 일정 시간 $\Delta h$로 조작적 정의 + 묽은 농도 범위. ㉣은 이온화로 입자 수 증가. ㉤ 삼투현상, ㉥ 학생 중심의.

**[두 교과서 비교]** 두 교과서 모두 학생 설계형 탐구이다. 미래엔은 성취기준 탐구 활동 문구를 그대로 제목으로 쓴다. 고농도 설탕물로는 평형 높이 차를 수업 시간에 얻을 수 없다는 점은 두 교과서 공통의 설계 검토 지점이다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(설탕물, 삼투압 실험 장치, 모둠 설계 → 스프레드시트 공유)의 예시 설계에 있는 결함(단일 농도, 통제 변인 1개, 1 M에서 약 24 atm)을 SAPA 통합 탐구 과정(2023 화학 A7)·변인(2023 화학 B3)·설계 타당성(2026 물리 B4)으로 구성. 전해질 용액의 삼투압 오개념, [12물에02-03] 성취기준·탐구 활동·교수·학습 방법 원문 빈칸.

## 5번 모범 답안 및 해설 [2026 화학 A6 (가설-연역적 탐구) · 2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2015 화학 (교육과정 수준 벗어남: 엔탈피) 변형] ★★★★★

## ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅲ-2 탐구 '중화 반응으로 헤스 법칙 확인하기' (두 교과서 동명 탐구)



탐구

실험

중화 반응으로 헤스 법칙 확인하기

목표 화학 반응의 반응 엔탈피는 반응 경로에 관계없이 일정함을 설명할 수 있다.

준비물
- 수산화 나트륨
- 1 M 염산
- 증류수
- 비커
- 간이 열량계
- 온도계
- 전자저울
- 약숙가락
- 시약포지
- 보안경
- 실험용 장갑

안전
안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다. 특히 염산과 수산화 나트륨은 독성이 강하고 부식성이 있으므로 피부에 묻지 않게 주의한다.
- 실험이 끝난 뒤 남은 물질은 지정된 곳에 모아 처리한다.

문제 인식 화학 반응에서 반응 경로가 달라지면 반응 엔탈피도 달라질까?

탐구 수행


실험 가
1. 간이 열량계에 증류수 200 g을 넣은 뒤 온도($t_1$)를 측정한다.
2. 수산화 나트륨(NaOH) 8 g을 넣고 젓개로 저어 모두 녹인 뒤 최고 온도($t_2$)를 측정한다.
주의 수산화 나트륨은 공기 중의 수분을 흡수하는 성질이 있으므로 시약병 뚜껑을 잘 닫고, 꺼낸 뒤에는 바로 사용한다.
3. 과정 2의 용액을 실온으로 식혀 온도($t_3$)를 측정한다.
4. 실온으로 식힌 용액에 1 M 염산(HCl(aq)) 200 g을 넣고 젓개로 저어 섞은 뒤 최고 온도($t_4$)를 측정한다.



실험 나
1. 간이 열량계에 증류수 200 g을 넣고 온도($t_5$)를 측정한다.
2. 과정 1의 증류수에 수산화 나트륨 8 g과 1 M 염산 200 g을 함께 넣고 젓개로 잘 저어 녹인 뒤 최고 온도($t_6$)를 측정한다.



비상교육 물질과 에너지 Ⅲ-2 탐구 '중화 반응으로 헤스 법칙 확인하기'



자료 해석과 논의

1. 실험에서 측정한 온도를 기록해 보자.

| 실험 가 | | | | 실험 나 | |
|---|---|---|---|---|---|
| $t_1$ | $t_2$ | $t_3$ | $t_4$ | $t_5$ | $t_6$ |
| | | | | | |

2. 실험에서 방출한 열량(kJ)과 수산화 나트륨 1 몰이 반응할 때의 반응 엔탈피(kJ)를 구해 보자. (단, 모든 용액의 비열은 4.2 J/(g·°C)라고 가정하고, NaOH의 몰질량은 40.0 g/mol이다.)

| 구분 | 실험 가 | | 실험 나 |
|---|---|---|---|
| | 과정 1, 2 | 과정 3, 4 | |
| 방출한 열량(kJ) | | | |
| 반응 엔탈피(kJ) | | | |

3. 실험에서 일어나는 반응을 열화학 반응식으로 나타내고, 그림에 각 경로의 엔탈피 변화를 표현해 보자.

실험 가 과정 1, 2
과정 3, 4
실험 나



결론 도출

화학 반응에서 반응 경로가 달라지면 반응 엔탈피는 어떻게 되는지 설명해 보자.

나의 활동 돌이보기
지식·이해 › 헤스 법칙에 관해 무엇을 알게 되었는가?
과정·기능 › 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?
가치·태도 › 탐구를 수행하면서 느낀 점은 무엇인가?

같은 탐구 (계속)



탐구

탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

중화 반응으로 헤스 법칙 확인하기

탐구 수행 / 결론 도출

준비물
- 수산화 나트륨(NaOH(s))
- 1.0 M 염산(HCl(aq))
- 증류수
- 간이 열량계
- 비커
- 전자저울
- 온도계
- 시약포지
- 약숙가락
- 젓개
- 실험복
- 보안경
- 실험용 장갑

안전
- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 수산화 나트륨은 조해성이 강하므로 시약을 덜어 낸 후 뚜껑을 빠르게 닫는다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

목표

염산과 고체 수산화 나트륨의 중화 반응에서 출입하는 열량을 측정해 헤스 법칙을 확인할 수 있다.


과정

실험 ① 고체 수산화 나트륨이 물에 녹아 수산화 나트륨 수용액이 되고, 이 수용액이 염산과 반응하는 [경로 1]

1. 간이 열량계에 증류수 100 g을 넣고 온도($T_1$)를 측정하자.
2. 과정 1의 증류수에 고체 수산화 나트륨 4.0 g을 넣고 젓개로 저어 모두 녹인 후 최고 온도($T_2$)를 측정하자.
3. 과정 2의 용액을 실온으로 식힌 후 온도($T_3$)를 측정하고, 이 용액에 1.0 M 염산 100 g을 넣고 섞은 후 최고 온도($T_4$)를 측정하자.



미래엔 물질과 에너지 Ⅲ-2 탐구 '중화 반응으로 헤스 법칙 확인하기'



실험 ② 고체 수산화 나트륨이 직접 염산과 반응하는 [경로 2]

1. 간이 열량계에 증류수 100 g과 1.0 M 염산 100 g을 넣고 섞은 후 온도($T_5$)를 측정하자.
2. 과정 1의 염산에 고체 수산화 나트륨 4.0 g을 넣고 녹인 후 최고 온도($T_6$)를 측정하자.



결과

측정한 온도를 기록하고 실험 ①의 과정 2와 3, 실험 ②의 과정 2에서 발생한 열량을 계산해 보자. (단, HCl(aq)의 밀도는 1 g/mL, 모든 용액의 비열은 4.2 J/(g·°C)라고 가정하고, NaOH의 몰질량은 40.0 g/mol이다.)

| 구분 | 실험 ① | | | | 실험 ② | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | $T_1$ | $T_2$ | $T_3$ | $T_4$ | $T_5$ | $T_6$ |
| 온도(°C) | | | | | | |
| 온도 변화(°C) | | | | | | |
| 발생한 열량(kJ) | | | | | | |
| 반응 엔탈피(kJ/mol) | | | | | | |

정리

1. 실험 ①의 과정 2와 3, 실험 ②의 과정 2에서 일어난 변화를 열화학 반응식으로 써 보자.
2. [경로 1]과 [경로 2]에서의 반응 엔탈피를 비교해 반응 경로와 반응 엔탈피의 관계를 토의해 보자.

도움 자료
탐구 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.
- 128 쪽~129 쪽 실험실 안전 수칙

스스로 평가하기
| 지식·이해 |
실험 결과로 반응 경로와 반응 엔탈피의 관계를 설명했는가?
☆☆☆☆☆
| 과정·기능 |
간이 열량계를 사용 방법에 맞게 사용하여 실험하고, 반응 엔탈피를 정확하게 계산했는가?
☆☆☆☆☆
| 가치·태도 |
실험 결과를 이해하여 헤스 법칙의 유용성을 인식했는가?
☆☆☆☆☆

같은 탐구 (계속)

**5번 모범 답안 및 해설 (계속) [2026 화학 A6 (가설-연역적 탐구) · 2026 화학 A5 (실험 과정 오류·오차) · 2015 화학 (교육과정 수준 벗어남: 엔탈피) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- 가설(경로와 무관하게 ΔH 일정)에서 '가설이 옳다면 실험 가의 두 단계 ΔH 합은 실험 나의 ΔH와 같을 것이다'라는 예측을 연역하고, 실험으로 검증하였다. A: $Q = 4.2 \times 408 \times 11.2 \approx 19.2$ kJ, 0.20 mol이므로 $\Delta H \approx -96.0$ kJ/mol.
- ① ㉠ 실험 나의 처음 온도(24.0 ℃)가 실험 가(22.0 ℃)와 다르고 염산의 처음 온도를 측정하지 않았다(처음 온도 통제 필요). ② 간이 열량계의 열 손실, 용액의 비열·밀도를 물로 가정, 1 M 염산 200 g(약 196 mL)의 HCl이 약 0.196 mol로 NaOH 0.20 mol보다 적어 한계 반응물이 바뀌는 문제 등. ㉡ 차이(약 1 %)는 측정 오차 범위로 해석할 수 있으므로, 오차 원인을 분석하지 않고 법칙 전체를 기각하는 것은 성급하다.
- ㉣ 열역학 함수. 성취기준 해설에서 엔탈피는 화학 반응에서 열의 출입과 관련된 내용으로 제한하고 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않도록 하였으므로, 상태 함수 유도는 교육과정 범위를 벗어난다.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 가설-연역적 탐구: 가설 설정 → 가설로부터 검증 가능한 예측 연역('만약 …라면 …일 것이다') → 실험 → 결과와 예측 비교 → 결론. 헤스 법칙: 반응물과 생성물의 종류와 상태가 같으면 반응 경로와 관계없이 반응 엔탈피의 총합은 일정하다.

**[교육과정 근거]** [12물에03-02] 성취기준(측정하기 어려운 반응의 엔탈피를 헤스 법칙으로 구함), 탐구 활동(중화 반응으로 헤스 법칙을 확인하는 실험하기), [12물에03-01] 해설(열의 출입으로 제한, 열역학 함수로서의 엔탈피는 다루지 않음).

**[채점 포인트]** 가설 → 예측 연역의 진술과 A = −96.0 kJ/mol. 설계 문제는 처음 온도 불일치(㉠)와 열 손실·비열 가정·한계 반응물 중 1가지. ㉡은 오차 범위 해석. ㉣ 열역학 함수와 ㉢의 범위 판단.

**[두 교과서 비교]** 미래엔은 결과표의 반응 엔탈피를 양수(41.50/55.69/97.68 kJ/mol)로 적고 정리에서는 음수로 합산한다. '방출된 열량($Q > 0$)'과 '$\Delta H < 0$'의 구분을 지도할 소재이다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(물 200 g, NaOH 8 g, 1 M 염산 200 g, −43.7/−51.5/−96.0)를 가설-연역적 탐구(2026 화학 A6)와 실험 설계 오류(처음 온도 불일치, 한계 반응물, 2026 화학 A5)로 구성. '값이 다르면 법칙이 틀림' 판단, [12물에03-02] 성취기준·[12물에03-01] 해설 원문 빈칸(열역학 함수).

## 6번 모범 답안 및 해설 [2015 화학 논술 (엔트로피·드라이버 개념 변화) · 2025 화학 A7 (드라이버 생각의 재구성) · 2023 화학 B4 (교육과정 범위 위배) 변형]

★★★★★

### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅲ-3 해 보기 '저절로 일어나는 변화의 특징 알아보기' · 탐구 '자발적 변화의 특징 찾아보기' · 미래엔 해 보기 '자발적 변화의 특징 알아보기' · '엔트로피 변화의 부호 예측하기'

**해 보기** 저절로 일어나는 변화의 특징 알아보기

그림은 저절로 일어나는 변화의 예와 이때 일어나는 분자 배열의 변화를 나타낸 것이다.



▲ 물의 증발

▲ 잉크의 확산 ▲ 설탕의 용해

각 예에서 분자 배열이 변할 때의 공통점을 토의해 보자.

비상교육 물질과 에너지 Ⅲ-3 해 보기 '저절로 일어나는 변화의 특징 알아보기'

**탐구** 자료 해석

자발적 변화의 특징 찾아보기

목표 자발적 변화에서 엔트로피 외에 다른 특징을 찾을 수 있다.

다음은 자발적 변화의 예를 나타낸 것이다.



(가) 하이드라진($N_2H_4$)과 산소($O_2$)의 반응

로켓의 연료로도 사용되는 하이드라진은 고온에서 산소와 반응하여 열을 방출한다.

$N_2H_4(g) + O_2(g) \longrightarrow N_2(g) + 2H_2O(g)$



(나) 철(Fe)과 산소($O_2$)의 반응

손난로 안의 철 가루는 산소와 만나 열을 내며 반응한다.

$4Fe(s) + 3O_2(g) \longrightarrow 2Fe_2O_3(s)$



(다) 수소($H_2$)와 산소($O_2$)의 반응

연료 전지에서는 수소와 산소가 반응하여 물이 생성되며, 이 반응은 발열 반응이다.

$2H_2(g) + O_2(g) \longrightarrow 2H_2O(l)$

정리

1. (가)~(다) 반응에서 엔트로피 변화를 각각 설명해 보자.
2. (가)~(다) 반응의 공통점을 찾아 토의해 보자.
3. 엔트로피 외에 변화의 자발성에 영향을 주는 요인에 관해 토의해 보자.

비상교육 물질과 에너지 Ⅲ-3 탐구 '자발적 변화의 특징 찾아보기'

**해 보기** 자발적 변화의 특징 알아보기 — 탐구 능력 | 의사 결정 능력

그림은 일상생활에서 관찰할 수 있는 자발적 변화를 나타낸 것이다.



(가) 냄새가 공기 중으로 퍼져 나간다.




(나) 잉크가 물속으로 퍼져 나간다.

1. (가)와 (나)에서 일어나는 현상의 공통점을 입자의 관점에서 설명해 보자.
2. (가)와 (나)에서와는 반대로 냄새나 잉크가 한쪽으로 다시 모이는 현상이 일어날 수 있는지 토의해 보자.
3. 일상생활에서 관찰할 수 있는 자발적 변화의 예를 더 찾아보자.

미래엔 물질과 에너지 Ⅲ-3 해 보기 '자발적 변화의 특징 알아보기'

**해 보기** 엔트로피 변화의 부호 예측하기 — 탐구 능력

다음 변화가 일어날 때 엔트로피가 어떻게 변하는지 쓰고, 그렇게 답한 까닭을 써 보자.

| 공기 중의 수증기가 얼어 눈결정이 된다. | 아연과 염산이 반응하여 수소 기체가 발생한다. | 질소와 수소를 반응시켜 암모니아를 합성한다. |
|---|---|---|
|  |   |  |

미래엔 물질과 에너지 Ⅲ-3 해 보기 '엔트로피 변화의 부호 예측하기'

**6번 모범 답안 및 해설 (계속) [2015 화학 논술 (엔트로피·드라이버 개념 변화) · 2025 화학 A7 (드라이버 생각의 재구성) · 2023 화학 B4 (교육과정 범위 위배) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- (가) 생각의 표현(학생의 선개념을 드러냄), (나) 생각의 재구성 중 갈등 상황에의 노출. ㉠은 흡열 과정인데도 자발적으로 일어나는 반례로, '자발적 변화 = 발열'이라는 생각과 모순되는 상황을 제시하여 인지 갈등을 일으킨다.
- 하이드라진 연소: 기체 분자 수 2 → 3으로 증가하여 $\Delta S > 0$, 손난로: 기체가 소모되어 고체가 생성되므로 $\Delta S < 0$. 두 반응 모두 열을 방출($\Delta H < 0$)하며, 엔탈피 감소가 자발성에 기여한다($\Delta S < 0$인 손난로 반응도 발열 효과가 커서 자발적). ㉡ 기체가 두 용기 전체로 퍼진 상태가 입자들이 차지하는 공간이 넓고 배열이 더 무질서하므로 엔트로피가 더 크다(일부가 아닌 계 전체를 보아야 함).
- ㉣ 깁스 자유 에너지, ㉤ 정성적. 성취기준 해설에서 깁스 자유 에너지를 다루지 않고 엔트로피는 정성적으로 다루도록 하였으므로, $\Delta G$ 식을 이용한 정량적 온도 계산은 교육과정 범위를 벗어난다.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 드라이버의 개념 변화 학습 모형: 오리엔테이션 → 생각의 표현 → 생각의 재구성(명료화와 교환 → 갈등 상황에의 노출 → 새로운 생각의 구성 → 새로운 생각의 평가) → 생각의 적용 → 생각의 검토. 자발성은 엔탈피 감소와 엔트로피 증가가 함께 관여하며, 계 전체의 입자 배열을 기준으로 엔트로피를 판단한다.

**[교육과정 근거]** [12물에03-03] 성취기준(엔탈피와 엔트로피의 변화로 자발성 설명), 해설(깁스 자유 에너지는 다루지 않으며, 엔트로피는 정성적으로 다룸).

**[채점 포인트]** (가) 생각의 표현, (나) 갈등 상황에의 노출과 ㉠의 반례 역할. $\Delta S$ 부호 2개와 '발열($\Delta H < 0$)이 자발성에 기여'. ㉡은 계 전체가 퍼진 상태가 엔트로피 큼. ㉣ 깁스 자유 에너지, ㉤ 정성적과 ㉢ 범위 판단.

**[두 교과서 비교]** 미래엔은 '자발적 변화의 특징 알아보기'와 '엔트로피 변화의 부호 예측하기' 두 해 보기로 구성한다. '나무가 탄다' 같은 예는 '자발적이면 빠르다'는 오개념을 부를 수 있으므로 자발성과 반응 속도를 구분하여 지도한다.

**[출제 포인트]** 교과서 해 보기(잉크 확산·증발·용해)와 탐구(하이드라진·손난로·연료 전지의 $\Delta S$ 비교)를 드라이버 모형(2015 논술, 2025 화학 A7)으로 구성. '자발 = 발열', '모인 기체가 더 무질서' 오개념, [12물에03-03] 성취기준·해설 원문 빈칸(깁스 자유 에너지, 정성적)과 범위 판단(2023 화학 B4).

## 7번 모범 답안 및 해설 [2026 화학 B4 (오수벨: 유의미 수용 vs 유의미 발견) · 2022 화학 A7 (귀납) · 2025 화학 B3 (반응 속도, 물질과 에너지) 변형] ★★★★★

### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅳ-1 탐구 '반응물의 농도로 반응 속도 나타내기' · 탐구 '1차 반응의 특징 알아보기' · 미래엔 해 보기 '일차 반응의 특징 알아보기'

탐구

자료 해석

**반응물의 농도로 반응 속도 나타내기**

목표 반응물의 농도를 이용하여 반응 속도를 나타낼 수 있다.

이산화 질소($NO_2$)와 일산화 탄소(CO)가 반응하면 일산화 질소(NO)와 이산화 탄소($CO_2$)가 생성된다.

$$NO_2(g) + CO(g) \longrightarrow NO(g) + CO_2(g)$$

표는 일정한 온도에서 이산화 질소와 일산화 탄소의 초기 농도를 다르게 하면서 초기 반응 속도를 측정한 결과이다.

| 실험 | 반응물의 초기 농도(M) | | 초기 반응 속도(M/s) |
|---|---|---|---|
| | $[NO_2]$ | $[CO]$ | |
| 1 | 0.10 | 0.10 | $2.1\times10^{-3}$ |
| 2 | 0.20 | 0.10 | $8.4\times10^{-3}$ |
| 3 | 0.20 | 0.20 | $1.7\times10^{-2}$ |

정리

1. $[CO]$가 일정할 때 $[NO_2]$를 2 배로 하면 초기 반응 속도가 어떻게 변하는지 설명해 보자.

2. $[NO_2]$가 일정할 때 $[CO]$를 2 배로 하면 초기 반응 속도가 어떻게 변하는지 설명해 보자.

3. 이 반응의 반응 속도를 다음과 같이 나타낼 때 $m$과 $n$은 각각 얼마일지 토의해 보자.

$$v \propto [NO_2]^m[CO]^n$$

비상교육 물질과 에너지 Ⅳ-1 탐구 '반응물의 농도로 반응 속도 나타내기'

탐구

자료 해석

**1차 반응의 특징 알아보기**

목표 1차 반응에서 시간에 따른 반응물의 농도 변화의 특징을 설명할 수 있다.

다음은 1차 반응인 오산화 이질소($N_2O_5$)의 분해 반응이고, 표는 일정한 온도에서 오산화 이질소의 농도 변화를 나타낸 것이다.

$$2N_2O_5(g) \longrightarrow 4NO_2(g) + O_2(g)$$

| 반응 시간(s) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|---|
| $[N_2O_5](M)$ | 0.40 | 0.28 | 0.20 | 0.14 | 0.10 |

정리

1. 오산화 이질소의 농도가 초기 농도의 절반으로 되는 데 걸린 시간을 구해 보자.

2. 100 초에서 오산화 이질소의 농도가 다시 절반으로 되는 데 걸린 시간을 구해 보자.

3. 시간이 지남에 따라 오산화 이질소의 농도가 절반으로 되는 데 걸린 시간은 어떤 특징을 나타내는지 설명해 보자.

비상교육 물질과 에너지 Ⅳ-1 탐구 '1차 반응의 특징 알아보기'

해보기 — 탐구 능력

**반응물의 농도로 반응 속도 나타내기**

일산화 질소(NO)와 산소($O_2$)가 반응하면 이산화 질소($NO_2$)가 생성된다.

$$2NO(g) + O_2(g) \longrightarrow 2NO_2(g)$$

표는 일정한 온도에서 두 반응물의 초기 농도를 달리하면서 측정한 초기 반응 속도이다.

| 실험 | 반응물의 초기 농도(mol/L) | | 초기 반응 속도(mol/(L·s)) |
|---|---|---|---|
| | $[NO]$ | $[O_2]$ | |
| 1 | 0.020 | 0.020 | 0.056 |
| 2 | 0.020 | 0.040 | 0.112 |
| 3 | 0.040 | 0.020 | 0.224 |

1. $[NO]$는 일정하게 유지하고 $[O_2]$를 2 배 증가시키면 반응 속도가 어떻게 변하는지 써 보자.

2. $[O_2]$는 일정하게 유지하고 $[NO]$를 2 배 증가시키면 반응 속도가 어떻게 변하는지 써 보자.

3. 이 반응의 반응 속도($v$)를 다음과 같은 식으로 나타낼 때 $m$과 $n$이 각각 얼마인지 써 보자.

$$v = k[NO]^m[O_2]^n$$

미래엔 물질과 에너지 Ⅳ-1 해 보기 '반응물의 농도로 반응 속도 나타내기'

해보기 — 탐구 능력

**일차 반응의 특징 알아보기**

아질산 암모늄($NH_4NO_2$) 분해 반응의 화학 반응식과 반응 속도식은 다음과 같다.

$$NH_4NO_2(aq) \longrightarrow N_2(g) + 2H_2O(l) \qquad v = k[NH_4NO_2]$$

표는 일정한 온도에서 시간에 따른 아질산 암모늄의 농도를 나타낸 것이다.

| 시간(h) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| $[NH_4NO_2]$(mol/L) | 0.100 | 0.050 | 0.025 | 0.012 | 0.006 |

1. 이 반응이 몇 차 반응인지 써 보자.

2. $[NH_4NO_2]$가 0.100 M에서 0.050 M가 되는 데 걸리는 시간과 0.050 M에서 0.025 M가 되는 데 걸리는 시간을 비교해 보자.

3. $[NH_4NO_2]$가 절반으로 줄어드는 데 걸리는 시간은 어떤 특징이 있는지 설명해 보자.

미래엔 물질과 에너지 Ⅳ-2 해 보기 '일차 반응의 특징 알아보기'

**7번 모범 답안 및 해설 (계속) [2026 화학 B4 (오수벨: 유의미 수용 vs 유의미 발견) · 2022 화학 A7 (귀납) · 2025 화학 B3 (반응 속도, 물질과 에너지) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- 교사 A: 유의미 수용 학습(학습할 내용을 최종 형태로 제시), 교사 B: (유의미) 발견 학습(학습자가 자료에서 규칙을 스스로 발견). 조건: ① 학습 과제의 논리적 유의미가(실사성·구속성)와 학습자 인지 구조 내 관련 정착 지식의 존재(잠재적 유의미가), ② 학습자의 유의미 학습 태세(새 내용을 기존 지식과 관련지으려는 의도).
- [CO] 일정, [$NO_2$] 2배 → 속도 4배이므로 $NO_2$ 2차, [$NO_2$] 일정, [CO] 2배 → 속도 2배이므로 CO 1차: $v = k[NO_2]^2[CO]$. 반응 차수는 반응식의 계수가 아니라 실험으로 결정된다. $N_2O_5$: 0.40 → 0.20 M(100 s), 0.20 → 0.10 M(100 s)이므로 반감기 100 s로, 처음 농도와 관계없이 일정하다(1차 반응).
- ㉢ 적분 속도식. 성취기준 해설에서 적분 속도식 유도는 다루지 않고 자료 해석으로 반감기를 찾도록 하였으므로, 미분 방정식 유도는 교육과정 범위를 벗어난다.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 오수벨: 학습은 제시 방식에 따라 수용/발견, 인지 구조와의 관련 여부에 따라 유의미/기계적으로 구분된다. 유의미 학습의 조건은 학습 과제의 논리적 유의미가, 학습자의 관련 정착 지식(잠재적 유의미가), 유의미 학습 태세이다. 반응 차수는 반응식의 계수가 아니라 실험 자료로 결정된다.

**[교육과정 근거]** [12물에04-01] 성취기준(자료 해석을 통하여 반응 속도식을 구함), [12물에04-02] 성취기준(1차 반응 반감기의 농도 무관성)과 해설(적분 속도식 유도는 다루지 않으며 자료 해석으로 반감기를 찾도록 함).

**[채점 포인트]** A 유의미 수용, B 발견과 유의미 조건 2가지. m = 2, n = 1 계산과 '차수 ≠ 계수'. 반감기 100 s의 농도 무관성. ㉢ 적분 속도식과 ㉡ 범위 판단.

**[두 교과서 비교]** 미래엔은 일차 반응 해 보기와 반감기 활용 사례 조사를 둔다. 반응 차수는 반응식 계수가 아닌 실험으로 정한다는 점은 두 교과서가 같다.


**[출제 포인트]** 교과서 자료 해석 탐구($NO_2$ + CO 초기 속도, $N_2O_5$ 반감기 100 s)를 오수벨 유의미 수용 vs 발견 학습(2026 화학 B4)으로 대비. '차수 = 계수' 오개념, [12물에04-01] 성취기준·[12물에04-02] 해설 원문 빈칸(적분 속도식).

## 8번 모범 답안 및 해설 [2025 화학 A7 (하슈웨 C1·C2·R1·R2) · 2022 화학 B4 (촉매) · 2026 물리 B5 (인지 갈등 유형 변형)] ★★★★★


### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 물질과 에너지] Ⅳ-3 탐구 '온도와 반응 속도의 관계 실험하기' · 탐구 '촉매와 반응 속도의 관계 실험하기' · 미래엔 탐구 '온도에 따른 반응 속도 측정하기' · '반응 속도에 영향을 주는 물질 알아보기'





비상교육 물질과 에너지 Ⅳ-3 탐구 '온도와 반응 속도의 관계 실험하기'




비상교육 물질과 에너지 Ⅳ-3 탐구 '촉매와 반응 속도의 관계 실험하기'




미래엔 물질과 에너지 Ⅳ-4 탐구 '온도에 따른 반응 속도 측정하기'




미래엔 물질과 에너지 Ⅳ-4 탐구 '반응 속도에 영향을 주는 물질 알아보기'

**8번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 A7 (하슈웨 C1·C2·R1·R2) · 2022 화학 B4 (촉매) · 2026 물리 B5 (인지 갈등 유형) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- C1: '온도에 따른 속도 증가는 충돌 횟수 증가 때문이다.' R2: 10 ℃ 상승 시 충돌 횟수는 약 2 %만 늘지만 속도는 약 2배가 되는 현상(C1으로 설명 불가), C2: 활성화 에너지 이상의 에너지를 가진 분자 수 증가(운동 에너지 분포 곡선). 교사의 자료는 C1과 R2 사이의 갈등 1을 유발한다(이후 C1과 C2의 갈등 2).
- 온도가 높아지면 분자 운동 에너지 분포 곡선이 오른쪽으로 넓게 퍼져, 활성화 에너지($E_a$) 이상의 에너지를 가진 분자의 비율이 크게 증가하므로 유효 충돌이 많아져 반응 속도가 빨라진다($E_a$ 자체는 변하지 않음).
- 촉매는 반응물과 반응하여 활성화 에너지가 더 낮은 새로운 반응 경로를 만들고 반응 후 다시 생성(재생)되므로 소모되지 않는 것이다(예: $I^- + H_2O_2 \rightarrow IO^- + H_2O$, $IO^- + H_2O_2 \rightarrow I^- + H_2O + O_2$). 촉매는 반응 엔탈피(반응열)를 변화시키지 않는다. ㉢ 활성화 에너지, ㉣ 촉매나 효소.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 하슈웨의 인지 갈등 모형: C1(선개념)·R1(C1으로 설명되는 현상), C2(과학 개념)·R2(C1으로 설명되지 않고 C2로 설명되는 현상). 갈등 1은 C1-R2, 갈등 2는 C1-C2. 온도가 높아지면 E_a 이상의 에너지를 가진 분자 비율이 크게 늘어 반응 속도가 빨라진다. 촉매는 반응에 참여해 E_a가 낮은 경로를 제공하고 재생되며, ΔH는 변하지 않는다.

**[교육과정 근거]** [12물에04-03] 성취기준(유효 충돌과 활성화 에너지의 의미), 탐구 활동(농도, 온도, 촉매와 반응 속도의 관계를 탐구하는 실험하기), 고려 사항(생태전환교육 연계, 촉매나 효소로 환경 문제 해결).

**[채점 포인트]** C1, R2, C2를 정확히 대응하고 '갈등 1'. ㉠은 운동 에너지 분포와 E_a 이상 분자 수. ㉡은 '촉매도 반응에 참여하고 재생'과 'ΔH 불변' 두 가지. ㉢ 활성화 에너지, ㉣ 촉매나 효소.


**[두 교과서 비교]** 미래엔은 온도 실험에 $CaCl_2$ + $NaHCO_3$(레이저 투과), 촉매 실험에 $H_2O_2$ + KI를 쓴다. 실제 촉매 작용은 $I^-$이 하며, 10 % 과산화 수소수의 발열·거품 넘침에 대한 안전 지도가 필요하다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(시계 반응 얼음물·실온·뜨거운 물, $H_2O_2$ 7 mL + KI 0.05 g)와 '충돌 횟수 증가'·'촉매는 반응하지 않음/ΔH 변화' 오개념(지도서 기술의 문제점 재구성)을 하슈웨 모형(2025 화학 A7)으로 구성. [12물에04-03] 성취기준·고려 사항 원문 빈칸(활성화 에너지, 촉매나 효소).

## 9번 모범 답안 및 해설 [2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) · 2026 화학 A5 (실험 오류) 변형]

★★★★★

### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅰ-1 탐구 '여러 가지 산과 염기 수용액의 pH 측정하기' · 미래엔 Ⅰ-2 탐구 '0.1 M 산과 염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교하기'



탐구

실험

여러 가지 산과 염기 수용액의 pH 측정하기

목표 강산, 약산, 강염기, 약염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교할 수 있다.

준비물
- 0.1 M 염산
- 0.1 M 아세트산 수용액
- 0.1 M 수산화 나트륨 수용액
- 0.1 M 암모니아수
- 증류수
- pH 측정기
- pH 보정용 용액
- 눈금실린더
- 비커
- 씻기병
- 보안경
- 실험용 장갑

부록 122 쪽 pH 측정기 사용 방법

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 반드시 환기가 잘되는 장소에서 실험한다.
- 염산과 수산화 나트륨은 독성이 강하고 부식성이 있으므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 염산이나 암모니아수의 증기를 흡입하지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

문제 인식

산 수용액이나 염기 수용액의 농도가 같으면 pH도 같을까?

탐구 수행

1. 비커 4 개에 다음의 수용액을 20 mL씩 넣는다.
   - 0.1 M 염산($HCl(aq)$)
   - 0.1 M 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$)
   - 0.1 M 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)
   - 0.1 M 암모니아수($NH_3(aq)$)
2. 각 수용액의 pH를 3 회 측정하여 표에 기록한 뒤 pH의 평균값을 구한다.


주의
- pH 측정기의 전극이 깨지지 않도록 조심한다.
- 다른 용액을 측정하기 전에 pH 측정기의 전극을 증류수로 씻는다.

pH 측정기

결과 정리

| 수용액 | | 0.1 M $HCl(aq)$ | 0.1 M $CH_3COOH(aq)$ | 0.1 M $NaOH(aq)$ | 0.1 M $NH_3(aq)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | 1 회 | | | | |
| | 2 회 | | | | |
| | 3 회 | | | | |
| | 평균 | | | | |

비상교육 화학 반응의 세계 Ⅰ-1 탐구 '여러 가지 산과 염기 수용액의 pH 측정하기'



자료 해석과 논의

1. 같은 농도의 산 수용액이나 같은 농도의 염기 수용액에서 pH가 다른 까닭을 설명해 보자.

2. 표는 25 ℃에서 각 수용액의 pH를 산의 이온화 상수($K_a$) 또는 염기의 이온화 상수($K_b$)를 이용하여 계산한 값이다.

| 수용액 | 0.1 M $HCl(aq)$ | 0.1 M $CH_3COOH(aq)$ | 0.1 M $NaOH(aq)$ | 0.1 M $NH_3(aq)$ |
|---|---|---|---|---|
| pH | 1.0 | 약 2.9 | 13.0 | 약 11.1 |

우리 모둠의 실험 결과를 위의 값과 비교해 보자.


나의 활동 돌아보기

지식·이해 » 농도가 같은 산과 염기의 pH를 측정하고 비교하면서 산과 염기의 어떤 성질을 알게 되었는가?

과정·기능 » pH의 이론값을 어떠한 방법으로 계산하여 실험값과 비교하였는가?

가치·태도 » pH의 실험값을 이론값과 비교하면서 느낀 점은 무엇인가?

같은 탐구 (계속)



탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

탐구

예측 / 탐구 수행

0.1 M 산과 염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교하기

준비물
- 0.1 M 염산
- 0.1 M 아세트산 수용액
- 0.1 M 수산화 나트륨 수용액
- 0.1 M 암모니아 수용액
- 증류수
- 계산기
- 비커
- pH 측정기
- 실험복
- 보안경
- 실험용 고무장갑

안전
- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

도움 자료

탐구 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.
- 114 쪽 ~ 115 쪽 실험실 안전 수칙
- 118 쪽 ~ 119 쪽 주요 시약별 주의 사항
- 120 쪽 산의 이온화 상수

강산이나 강염기 수용액의 pH는 수용액의 농도만 알아도 구할 수 있어!

목표

산 또는 염기 수용액의 pH를 이온화 상수를 이용해 계산하고, 측정한 pH값과 비교할 수 있다.

과정

1. 모둠별로 산 또는 염기 수용액의 pH를 구해 보자.
   - 모둠원끼리 다음 수용액을 각각 하나씩 나누어 선택하자.
     - (가) 0.1 M 염산($HCl(aq)$)
     - (나) 0.1 M 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$)
     - (다) 0.1 M 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)
     - (라) 0.1 M 암모니아 수용액($NH_3(aq)$)
   - 25 ℃에서 선택한 수용액의 pH를 구해 보자.


도움말 pH를 구하는 데 필요한 약산이나 약염기의 이온화 상수를 찾아본다.

- 선택한 수용액: _____
- pH를 구하는 데 필요한 정보(이온화 반응식과 이온화 상수 등)
- pH 구하기

2. pH 계산 과정을 다른 모둠원들에게 설명하고 계산한 pH값을 공유해 보자.
3. 염산, 아세트산 수용액, 수산화 나트륨 수용액, 암모니아 수용액을 비커에 각각 20 mL씩 담자.
4. pH 측정기로 수용액의 pH를 각각 측정하자.

도움말 한 수용액의 pH를 측정한 다음 다른 수용액의 pH를 측정할 때는 증류수로 pH 측정기를 잘 씻어 사용한다.

미래엔 화학 반응의 세계 Ⅰ-2 탐구 '0.1 M 산과 염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교하기'



결과 및 정리

1. 계산한 pH값과 측정한 pH값을 정리해 보자.

| 수용액 | $HCl(aq)$ | $CH_3COOH(aq)$ | $NaOH(aq)$ | $NH_3(aq)$ |
|---|---|---|---|---|
| 계산한 pH값 | | | | |
| 측정한 pH값 | | | | |

2. 계산한 pH값과 측정한 pH값을 비교해 보고, 이온화 상수를 이용해 pH를 계산하는 것이 유용한지 이야기해 보자.

$HCl(aq)$ $CH_3COOH(aq)$ $NaOH(aq)$ $NH_3(aq)$

스스로 평가하기

| 지식·이해 | 0.1 M 산 또는 염기 수용액의 pH를 정확히 계산했는가? | ☆☆☆☆☆ |
|---|---|---|
| 과정·기능 | pH 측정기를 올바르게 사용하여 수용액의 pH를 측정했는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 가치·태도 | 수용액의 pH를 계산하고 공유하는 과정에서 모둠원이 이해하기 쉽게 설명했는가? | ☆☆☆☆☆ |

같은 탐구 (계속)

**9번 모범 답안 및 해설 (계속) [2023 화학 A7 (헤론 탐구 수준) · 2025 화학 B5 (측정 신뢰도) · 2026 화학 A5 (실험 오류) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- 교사 A: 1수준(문제와 방법은 제시, 결과·결론은 학생이 찾음). 교사 B: 2수준(문제만 제시, 방법과 결과는 학생이 정함). 0수준은 결과까지 제시, 3수준은 문제까지 학생이 정한다.
- 전극에 남은 염산이 아세트산 수용액에 섞여 $[H_3O^+]$가 커져서 pH가 작게 측정되었다. 개선: 용액을 바꿀 때마다 전극을 증류수로 헹구고 물기를 닦은 뒤 측정한다. 반복 측정·평균은 측정의 신뢰도(일관성, 우연 오차 감소)를 높인다.
- 아세트산은 약산이라 일부만 이온화한다. $x^2/(0.1 - x) \approx x^2/0.1 = 1.8\times10^{-5} \rightarrow x = [H_3O^+] \approx 1.3\times10^{-3}$ M → pH ≈ 2.9(5 % 근사 성립). ㉢ 이론값, ㉣ 화학 평형.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 헤론의 탐구 수준: 0수준(문제·방법·결과 모두 제시, 확인 실험), 1수준(문제·방법 제시), 2수준(문제만 제시), 3수준(문제·방법·결과 모두 학생). 약산은 일부만 이온화하므로 $[H_3O^+] = \sqrt{}(K_a \cdot C)$로 근사한다. 반복 측정과 평균은 측정의 신뢰도를 높인다.

**[교육과정 근거]** (1) 산 염기 평형 탐구 활동(0.1M의 강산, 강염기, 약산, 약염기 수용액의 pH를 측정하고 이론값과 비교하기), 고려 사항(브뢴스테드-라우리 정의에서 약산·약염기 pH까지 화학 평형의 개념이 바탕).

**[채점 포인트]** A 1수준, B 2수준과 제시 요소 근거. ㉠은 전극 미세척(염산 혼입)과 개선, 반복 측정 = 신뢰도. ㉡ 수정은 $K_a$를 이용한 계산 과정과 pH ≈ 2.9. ㉢ 이론값, ㉣ 화학 평형.

**[두 교과서 비교]** 미래엔도 같은 성취기준 탐구(0.1 M 네 용액의 pH 측정 후 이론값 비교)를 둔다. 10배 희석 시 0.001 M 아세트산의 pH는 근사식이 성립하지 않아 3.87이 아니라 약 3.90이 되는 점을 함께 검토할 수 있다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(0.1 M 네 용액 pH 3회 측정, 이론값 1.0/2.9/13.0/11.1)를 헤론 탐구 수준(2023 화학 A7)으로 대비하고, 전극 미세척 오류(2026 화학 A5)·반복 측정의 신뢰도(2025 화학 B5), 약산 완전 이온화 오개념을 구성. [12반응] 탐구 활동·고려 사항 원문 빈칸(이론값, 화학 평형).

## 10번 모범 답안 및 해설 [2021 화학 A5 (비고츠키 비계·ZPD) · 2025 화학 A5 (컴퓨팅 사고력·디지털 소양) · 2021 화학 A7 (당량점 = 중성 오개념) 변형] ★★★★★

### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅰ-2 탐구 '중화 적정 곡선 나타내기' (디지털 탐구: MBL pH 센서) · 미래엔 Ⅰ-3 탐구 '중화 적정 곡선 그리기'



탐구

실험

중화 적정 곡선 나타내기

목표 강산을 강염기로 중화 적정 할 때 pH를 측정하여 중화 적정 곡선을 나타낼 수 있다.

Ⅰ 준비물
- 농도를 모르는 염산
- 0.1 M 수산화 나트륨 수용액
- 페놀프탈레인 용액
- pH 측정기
- pH 보정용 용액
- 뷰렛 / 뷰렛 집게
- 피펫 / 피펫 필러
- 비커 / 깔때기
- 자석 젓개 / 자석
- 스탠드 / 집게
- 집게 집이 / 보안경
- 실험용 장갑

Ⅰ 부록 122 쪽 피펫과 뷰렛 사용 방법

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 반드시 환기가 잘되는 장소에서 실험한다.
- 염산과 수산화 나트륨은 독성이 강하고 부식성이 있으므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

「문제 인식」 강산을 강염기로 중화 적정 할 때 pH는 어떻게 변할까?


「탐구 수행」
1. 농도를 모르는 염산(HCl(aq)) 30 mL를 피펫으로 정확하게 취하여 비커에 넣는다.
2. 과정 1의 비커에 페놀프탈레인 용액을 2 방울~3 방울 떨어뜨린 뒤 자석을 넣는다.
3. 0.1 M 수산화 나트륨 수용액(NaOH(aq)) 약 50 mL를 깔때기를 이용하여 뷰렛에 넣는다.
   주의 뷰렛에 용액을 넣을 때에는 뷰렛 꼭지가 잠겨 있는지 확인하고, 깔때기를 살짝 들어 용액이 잘 들어가도록 한다.
4. 뷰렛 아래에 빈 비커를 놓고, 뷰렛 꼭지를 열어 수산화 나트륨 수용액을 약간 흘린 뒤 뷰렛 꼭지를 잠근다.
5. 뷰렛의 처음 눈금을 읽는다.
6. 뷰렛 아래에 자석 젓개를 놓고, 과정 2의 비커를 올려놓는다.
7. pH 측정기를 설치한 뒤 처음 pH를 측정하여 표에 기록한다.
8. 자석 젓개를 작동한 뒤 뷰렛 꼭지를 열어 수산화 나트륨 수용액을 넣으면서 pH를 측정하여 표에 기록하는 과정을 반복한다.

주의
- 자석이 돌아갈 때 pH 측정기의 전극이 깨지지 않도록 조심한다.
- 비커 속 혼합 용액의 붉은색이 나타났다 사라지기 시작하는 순간부터 붉은색이 사라지지 않는 순간까지, 넣어 주는 수산화 나트륨 수용액의 부피를 0.5 mL~0.2 mL로 줄이는 것이 좋다.

| 넣어 준 NaOH(aq)의 부피(mL) | 0.00 | | … | | 45.00 |
|---|---|---|---|---|---|
| pH | | | | | |

뷰렛 / 수산화 나트륨 수용액 / 뷰렛 꼭지 / pH 측정기 / 염산 / 자석 젓개

비상교육 화학 반응의 세계 Ⅰ-2 탐구 '중화 적정 곡선 나타내기'



「자료 해석과 논의」
1. 디지털 활용 그래프 작성 프로그램을 이용하여 $x$축을 넣어 준 수산화 나트륨 수용액의 부피(mL), $y$축을 pH로 하는 그래프를 그려 보고, 완전히 중화가 일어난 지점을 찾아 보자.
2. 그래프를 보고 넣어 준 수산화 나트륨 수용액의 부피에 따라 혼합 용액의 pH가 어떻게 변하는지 설명해 보자.
3. 실험 결과로부터 염산의 몰농도(M)를 구해 보자.

「의사소통과 협업」
디지털 활용 우리 모둠의 중화 적정 곡선을 온라인 협업 플랫폼에 공유하고, 다른 모둠의 중화 적정 곡선과 비교해 보자.


디지털 탐구
❶ 과정 7에서 pH 측정기 대신 MBL pH 센서를 설치한다.
❷ MBL pH 센서를 스마트 기기와 연결한 뒤 MBL 프로그램을 실행한다.
❸ 뷰렛 꼭지를 조절하여 수산화 나트륨 수용액을 한 방울씩 떨어뜨리면서 시간에 따른 혼합 용액의 pH 변화 그래프를 관찰한다.

생각해 보기 | MBL 프로그램을 이용하여 얻은 그래프와 「자료 해석과 논의」에서 얻은 그래프의 공통점과 차이점을 생각해 보자.

pH 센서 / 스마트 기기

나의 활동 돌아보기
지식·이해 > 강산을 강염기로 중화 적정하면서 무엇을 알게 되었는가?
과정·기능 > 중화 적정 과정에서 어떤 역할을 하였는가?
가치·태도 > 중화 적정 곡선을 다른 모둠과 비교하면서 어떤 점이 흥미로웠는가?

같은 탐구 (계속)



탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

탐구

정보 수집·변환·해석

중화 적정 곡선 그리기

준비물
- 0.1 M 수산화 나트륨 표준 용액
- 0.1 M 염산
- 뷰렛
- 뷰렛 집게
- 집게
- 스탠드
- 깔때기
- 비커
- pH 센서
- 자석 젓개
- 자석
- 피펫
- 피펫 필러
- 스마트 기기
- 실험복
- 보안경
- 실험용 고무장갑

안전


- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

목표
중화 적정 실험을 수행해 pH 데이터를 얻고, 이를 시각화해 중화 적정 곡선으로 나타낼 수 있다.

예상
0.1 M 염산(HCl(aq))에 0.1 M 수산화 나트륨 수용액(NaOH(aq))을 넣어 줄 때, 넣어 준 수산화 나트륨 수용액의 부피에 따라 pH가 어떻게 변할지 이야기해 보자.

과정
1. 스탠드에 고정한 뷰렛에 깔때기를 이용해 수산화 나트륨 표준 용액을 넣고, 꼭지를 열어 용액을 3 방울 정도 흘린 다음 꼭지를 닫고 눈금을 읽자.
   - 처음 눈금은 몇 mL인가?

미래엔 화학 반응의 세계 Ⅰ-3 탐구 '중화 적정 곡선 그리기'



2. 염산 20 mL를 비커에 담고 자석을 넣은 다음 그림과 같이 장치하자.
   도움말 자석이 돌아갈 때 pH 센서의 전극과 닿지 않도록 장치한다.
3. pH 센서로 측정한 데이터를 받을 수 있는 프로그램을 열고 초기 pH를 측정하자.
   도움말 스마트 기기에 pH 센서의 데이터를 받을 수 있는 프로그램을 설치한다.
4. 자석 젓개를 켜고 수산화 나트륨 수용액을 1 방울씩 떨어뜨리면서 pH 센서의 데이터를 확인하자. 이때 수산화 나트륨 수용액이 1 mL 들어갈 때마다 pH를 기록하자.
   도움말 수산화 나트륨 수용액의 부피와 pH를 동시에 확인해야 하므로 모둠원끼리 역할을 분담한다.
5. 용액의 pH가 크게 변한 다음 수산화 나트륨 수용액이 2 mL~3 mL 더 들어가면 측정을 멈추자.

뷰렛 / pH 센서 / NaOH(aq) / HCl(aq) / 자석 / 자석 젓개

그래프는 프로그램을 이용해서 그릴 수도 있고, 스프레드시트를 이용해서 그릴 수도 있어.

결과 및 정리
1. 모둠별로 넣어 준 수산화 나트륨 수용액의 부피에 따른 pH를 스프레드시트를 이용해 그래프로 나타내 보자.
2. 넣어 준 수산화 나트륨 수용액의 부피에 따른 pH 변화를 설명하고, 중화점에서 그래프 모양이 어떤 특징을 나타내는지 설명해 보자.
3. 농도를 모르는 산 또는 염기 수용액을 염기 또는 산 표준 용액으로 중화 적정 할 때 중화점을 찾는 방법을 토의해 보자.

도움 자료
탐구 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.
- 114 쪽~115 쪽 실험실 안전 수칙
- 116 쪽~117 쪽 실험 기구 사용 방법
- 118 쪽~119 쪽 주요 시약별 주의 사항

스스로 평가하기
| 지식·이해 |
중화 적정 실험에서 pH 변화를 실험 데이터에 근거해 해석하고 설명했는가? ☆☆☆☆☆
| 과정·기능 |
수산화 나트륨 수용액의 부피에 따른 pH 데이터를 수집해 그래프로 잘 나타냈는가? ☆☆☆☆☆
| 가치·태도 |
중화 적정 실험을 수행해 pH 데이터를 수집하고 시각화하는 과정에 적극적으로 참여했는가? ☆☆☆☆☆

같은 탐구 (계속)

**10번 모범 답안 및 해설 (계속) [2021 화학 A5 (비고츠키 비계·ZPD) · 2025 화학 A5 (컴퓨팅 사고력·디지털 소양) · 2021 화학 A7 (당량점 = 중성 오개념) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- ZPD는 혼자 해결할 수 있는 실제적 발달 수준과 도움을 받아 해결할 수 있는 잠재적 발달 수준 사이의 영역이다. 교사는 (가) 발문으로 사고의 방향을 제시하고 (나) 함께 시범을 보이며 비계를 제공하였다. (다)는 학생이 스스로 할 수 있게 되자 비계를 점진적으로 제거(fading)하여 자기 조절로 넘기는 과정이다.
- MBL 그래프의 가로축은 시간이며, NaOH를 넣는 속도가 일정하지 않으면 시간이 넣은 NaOH의 부피에 비례하지 않으므로 시간으로는 중화점의 부피를 알 수 없다(가로축을 NaOH 부피로 변환해야 함). 중화점 30.0 mL: $M \times 30.0\ mL = 0.1\ M \times 30.0\ mL \rightarrow M = 0.1\ M$.
- 약산을 강염기로 적정하면 중화점에서 생성된 $CH_3COO^-$이 물과 반응(가수 분해)하여 $OH^-$을 내놓으므로 중화점의 pH는 7보다 크다(염기성). ㉢ 중화 적정 곡선, ㉣ 컴퓨팅 사고력.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 비고츠키: 근접 발달 영역(ZPD)은 실제적 발달 수준과 잠재적 발달 수준 사이의 영역이며, 교사·유능한 동료의 비계(발문, 시범, 부분 수행)가 학습을 돕는다. 학습자가 숙달되면 비계를 점차 제거하여 자기 조절로 이양한다. 약산-강염기 적정의 중화점은 생성된 짝염기의 가수 분해로 염기성이다.

**[교육과정 근거]** [12반응01-03] 성취기준(중화 적정 실험의 pH 변화를 데이터에 근거하여 해석), 탐구 활동(실험 데이터에 근거하여 중화 적정 곡선 시각화하기), 고려 사항(수학적 사고에 기반한 컴퓨팅 사고력과 디지털 소양).


**[채점 포인트]** ZPD 정의, (가)·(나)의 비계 기능, (다) 비계의 점진적 제거. ㉠은 '시간 ≠ 부피'와 가로축 변환, 0.1 M 계산. ㉡은 $CH_3COO^-$ 가수 분해 → pH > 7. ㉢ 중화 적정 곡선, ㉣ 컴퓨팅 사고력.

**[두 교과서 비교]** 미래엔 '중화 적정 곡선 그리기'는 1 mL 간격으로 일정하게 넣어, 종말점 근처에서 0.5~0.2 mL로 줄이는 비상교육보다 급격한 변화 구간 자료가 적다. 데이터 간격 설계가 곡선 해석에 주는 영향을 비교하게 할 수 있다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(30 mL 염산, 0.1 M NaOH, pH 1.1→7.1→12.3)와 디지털 탐구(MBL '시간-pH')의 자료 변환 문제를 비고츠키 비계(2021 화학 A5)로 구성. 중화점 = 중성 오개념(2021 화학 A7), 탐구 활동·고려 사항 원문 빈칸(중화 적정 곡선, 컴퓨팅 사고력, 2025 화학 A5).

## 11번 모범 답안 및 해설 [2016 화학 (CH₃COONa 가수 분해) · 2017 화학 논술 (포스너 조건) · 2026 화학 B3 (포스너 유용성) 변형] ★★★★★

### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅰ-3 탐구 '여러 가지 염 수용액의 액성 알아보기' · 미래엔 Ⅰ-4 탐구 '염 수용액의 액성을 예측하고 확인하기'



탐구

실험

여러 가지 염 수용액의 액성 알아보기

목표 짝산-짝염기의 이온화 상수를 바탕으로 염 수용액의 액성을 예측하고, 실험 결과와 비교할 수 있다.

Ⅰ 준비물
- 염화 나트륨 수용액
- 아세트산 나트륨 수용액
- 염화 암모늄 수용액
- 증류수 / pH 측정기
- pH 보정용 용액
- 눈금실린더 / 비커
- 씻기병 / 보안경
- 실험용 장갑 / 스마트 기기

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 시약이 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

문제 인식 염이 물에 녹으면 수용액의 액성은 어떠할까?

탐구 수행

실험 (가) 염 수용액의 액성 예측하기


1. 염화 나트륨(NaCl), 아세트산 나트륨($CH_3COONa$), 염화 암모늄($NH_4Cl$)은 수용액에서 모두 이온으로 존재한다. 다음 화학 반응식을 완성해 보자.

- $NaCl(aq) \longrightarrow$ ( ) + ( )
- $CH_3COONa(aq) \longrightarrow$ ( ) + ( )
- $NH_4Cl(aq) \longrightarrow$ ( ) + ( )

2. 25 ℃에서 각 이온의 산의 이온화 상수($K_a$)와 염기의 이온화 상수($K_b$)를 조사해 보자.

| 이온 | $K_a$ | 이온 | $K_b$ |
|---|---|---|---|
| $Na^+$ | | $Cl^-$ | |
| $NH_4^+$ | | $CH_3COO^-$ | |

비상교육 화학 반응의 세계 Ⅰ-3 탐구 '여러 가지 염 수용액의 액성 알아보기'



3. 나트륨 이온($Na^+$)의 $K_a$와 염화 이온($Cl^-$)의 $K_b$는 매우 작아 수용액에서 물과 반응하지 않는다. 그러나 아세트산 이온($CH_3COO^-$)과 암모늄 이온($NH_4^+$)은 수용액에서 각각 물과 반응하여 평형을 이룬다. 다음 화학 반응식을 완성해 보자.

- $CH_3COO^-(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows$ ( ) + ( )
- $NH_4^+(aq) + H_2O(l) \rightleftarrows$ ( ) + ( )

4. $K_a$와 $K_b$를 이용하여 과정 1의 염 수용액의 액성을 예측하고, 그 까닭을 토의해 보자.

| 염 수용액 | 액성 | 까닭 |
|---|---|---|
| $NaCl(aq)$ | | |
| $CH_3COONa(aq)$ | | |
| $NH_4Cl(aq)$ | | |

실험 (나) 염 수용액의 액성 측정하기

1. 비커 3 개에 염화 나트륨, 아세트산 나트륨, 염화 암모늄 수용액을 각각 20 mL 정도 넣는다.
2. pH 측정기를 이용하여 pH를 측정하고, pH와 액성을 표에 기록한다.

주의
- pH 측정기의 전극이 깨지지 않도록 조심한다.
- 다른 용액을 측정하기 전에 pH 측정기의 전극을 증류수로 씻는다.




결과 정리

| 염 수용액 | pH | 액성 |
|---|---|---|
| $NaCl(aq)$ | | |
| $CH_3COONa(aq)$ | | |
| $NH_4Cl(aq)$ | | |

자료 해석과 논의

1. 실험 (가)에서 예측한 액성과 실험 (나)의 결과를 비교해 보자.

같은 탐구 (계속)



2. 염을 이루는 양이온과 음이온의 $K_a$와 $K_b$는 염 수용액의 액성과 어떤 관계가 있는지 설명해 보자.


나의 활동 돌아보기

지식·이해 > 염 수용액의 액성을 예측하는 과정에서 무엇을 알게 되었는가?

과정·기능 > 염 수용액의 pH를 측정할 때 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 > 예측한 액성과 실험 결과를 비교하면서 느낀 점은 무엇인가?

같은 탐구 (계속)



탐구 염 수용액의 액성을 예측하고 확인하기

탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

예측 / 탐구 수행

목표

짝산 또는 짝염기의 이온화 상수를 바탕으로 하여 염 수용액의 액성을 예측하고, 실험 결과와 비교할 수 있다.

과정 및 결과

1. 25 ℃에서 이온화 상수를 이용해 0.1 M 아세트산 나트륨 수용액($CH_3COONa(aq)$)과 0.1 M 염화 암모늄 수용액($NH_4Cl(aq)$)의 pH를 구하고, 수용액의 액성을 예측해 보자.

2. 두 가지 염 수용액을 각각 pH 시험지에 묻히고, pH 시험지의 색 변화를 관찰해 수용액의 pH와 액성을 결정해 보자.




| 구분 | 0.1 M $CH_3COONa(aq)$ | | 0.1 M $NH_4Cl(aq)$ | |
|---|---|---|---|---|
| | pH | 액성 | pH | 액성 |
| 예측한 결과 | | | | |
| 실험 결과 | | | | |

정리

1. 염 수용액의 액성이 서로 다른 까닭을 설명해 보자.

2. 예측한 결과와 실험 결과를 비교하고, 차이가 있다면 그 까닭을 토의해 보자.

준비물
- 0.1 M 아세트산 나트륨 수용액
- 0.1 M 염화 암모늄 수용액
- pH 시험지 / 비커
- 유리 막대 / 계산기
- 실험복 / 보안경
- 실험용 고무장갑

안전

- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

도움 자료

탐구 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.
- 114 쪽~115 쪽 실험실 안전 수칙
- 120 쪽 산의 이온화 상수

스스로 평가하기

| 지식·이해 |
실험에 사용한 염 수용액의 액성이 서로 다른 까닭을 옳게 설명했는가? ☆☆☆☆☆

| 과정·기능 |
염 수용액의 액성을 옳게 판단했는가? ☆☆☆☆☆

| 가치·태도 |
염 수용액의 액성을 예측하고 확인하는 과정에 적극적으로 참여했는가? ☆☆☆☆☆

미래엔 화학 반응의 세계 Ⅰ-4 탐구 '염 수용액의 액성을 예측하고 확인하기'

**11번 모범 답안 및 해설 (계속) [2016 화학 ($CH_3COONa$ 가수 분해) · 2017 화학 논술 (포스너 조건) · 2026 화학 B3 (포스너 유용성) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- (가) 기존 개념에 대한 불만족: '염은 모두 중성'이라는 생각으로 설명할 수 없는 측정 결과를 접하게 한다. (다) 유용성(생산성): 새 개념(가수 분해)으로 새로운 상황($NaHCO_3$)을 예측·설명할 수 있음을 경험하게 한다. ((나)는 이해 가능성·그럴듯함)
- ㉠ $Cl^-$은 강산(HCl)의 짝염기이다. $Na^+$과 $Cl^-$은 물과 거의 반응하지 않으므로 중성이다. ㉡ '산성염'은 화학식에 내놓을 수 있는 H가 남아 있다는 분류일 뿐 수용액의 액성과 무관하다. $HCO_3^-$의 $K_b(2.2\times10^{-8})$가 $K_a(4.7\times10^{-11})$보다 커서 $OH^-$을 내놓는 반응이 우세하므로 염기성이다.
- ㉢ 이온화 상수. $NH_4^+$의 $K_a$와 $CH_3COO^-$의 $K_b$가 $5.6\times10^{-10}$으로 같으므로 $H_3O^+$과 $OH^-$이 생기는 정도가 같아 중성(pH ≈ 7)으로 예측된다.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 포스너 등의 개념 변화 조건: 기존 개념에 대한 불만족, 새 개념의 이해 가능성, 그럴듯함, 유용성(생산성). 염 수용액의 액성은 양이온의 K_a와 음이온의 K_b의 상대적 크기로 결정된다(가수 분해). '산성염/염기성염'은 화학식에 남은 H·OH에 따른 분류로 액성과 무관하다.

**[교육과정 근거]** [12반응01-04] 성취기준(이온화 상수를 이용하여 염의 가수 분해 설명), 탐구 활동(짝산 짝염기의 이온화 상수를 바탕으로 염 수용액의 액성을 예측하고 실험 결과와 비교하기).


**[채점 포인트]** (가) 불만족, (다) 유용성과 각각의 근거. ㉠ '짝염기', ㉡ 명명과 액성 무관 + K_b > K_a → 염기성. ㉢ 이온화 상수와 $CH_3COONH_4$ 중성 예측($K_a = K_b$).

**[두 교과서 비교]** 미래엔 '염 수용액의 액성을 예측하고 확인하기'도 예측 후 확인 구조로, 포스너의 불만족·유용성 단계를 설계하기에 적합하다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(NaCl, $CH_3COONa$, $NH_4Cl$ 예측 후 측정)와 제산제 $NaHCO_3$ 맥락을 포스너 개념 변화 조건(2017·2026 화학)으로 구성. 짝산·짝염기 용어 혼동, '산성염 = 산성' 오개념, [12반응01-04] 성취기준·탐구 활동 원문 빈칸(이온화 상수).

## 12번 모범 답안 및 해설 [2026 생물 B4 (선행조직자: 설명 조직자 vs 비교 조직자) · 2026 화학 B4 (오수벨 유의미 학습) ★★★★★ · 2021 화학 A6 (성취기준 해설 범위) 변형]

### ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅰ-4 탐구 '물과 완충 용액의 pH 변화 비교하기' (미래엔 Ⅰ-5 동명 탐구)



탐구

실험

물과 완충 용액의 pH 변화 비교하기

목표 물과 완충 용액에 강산이나 강염기를 넣을 때 나타나는 pH 변화를 비교할 수 있다.

준비물
- 증류수
- pH가 7인 완충 용액
- 1 M 염산
- 1 M 수산화 나트륨 수용액
- pH 측정기
- pH 보정용 용액
- 눈금실린더
- 비커
- 스포이트
- 유리 막대
- 씻기병
- 보안경
- 실험용 장갑

안전 안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 반드시 환기가 잘되는 장소에서 실험한다.
- 염산과 수산화 나트륨은 독성이 강하고 부식성이 있으므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

문제 인식 물과 완충 용액에 소량의 강산이나 강염기를 넣으면 pH는 어떻게 될까?

탐구 수행
1. 비커 A와 B에 증류수를 50 mL씩 넣고, 비커 C와 D에 완충 용액을 50 mL씩 넣는다.
2. 증류수와 완충 용액의 pH를 측정하여 표에 기록한다.
   주의 다른 용액을 측정하기 전에 pH 측정기의 전극을 증류수로 씻는다.
3. 비커 A와 C에 1 M 염산($HCl(aq)$)을 한 방울씩 떨어뜨리고 충분히 저은 뒤 pH를 측정하여 표에 기록한다.
4. 비커 B와 D에 1 M 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$)을 한 방울씩 떨어뜨리고 충분히 저은 뒤 pH를 측정하여 표에 기록한다.




결과 정리

| | 구분 | 증류수 | 완충 용액 |
|---|---|---|---|
| pH | 처음 | | |
| | 염산을 넣었을 때 | | |
| | 수산화 나트륨 수용액을 넣었을 때 | | |

자료 해석과 논의
1. 증류수와 완충 용액에 염산을 넣었을 때 pH 변화를 비교해 보자.

비상교육 화학 반응의 세계 Ⅰ-4 탐구 '물과 완충 용액의 pH 변화 비교하기'




2. 증류수와 완충 용액에 수산화 나트륨 수용액을 넣었을 때 pH 변화를 비교해 보자.

3. 실험 결과를 바탕으로 완충 용액의 특징을 설명해 보자.

나의 활동 돌아보기
- 지식·이해 › 물과 완충 용액의 pH 변화를 비교하는 실험에서 무엇을 알게 되었는가?
- 과정·기능 › 실험 과정에서 어떤 역할을 하였는가?
- 가치·태도 › 완충 용액의 특징을 설명하면서 어떤 점이 흥미로웠는가?

같은 탐구 (계속)



탐구

탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

탐구 수행 / 자료 분석·추론

물과 완충 용액의 pH 변화 비교하기

준비물
- 0.2 M 아세트산 수용액
- 0.2 M 아세트산-나트륨 수용액
- 0.2 M 수산화 나트륨 수용액
- 0.2 M 염산
- 증류수
- 비커
- 눈금실린더
- 스포이트
- pH 측정기
- 유리 막대
- 실험복
- 보안경
- 실험용 고무장갑

안전
- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

목표

강산이나 강염기를 첨가할 때 물과 완충 용액의 pH 변화를 비교할 수 있다.

과정 및 결과


1. 비커에 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$)과 아세트산 나트륨 수용액($CH_3COONa(aq)$)을 50 mL씩 섞어 완충 용액을 만들자.
   - 이 완충 용액을 만들 때 사용된 물질 중 약산과 그 짝염기가 무엇일까?

약산 + 약산의 짝염기 → 완충 용액

2. 비커에 증류수($H_2O(l)$), 아세트산 수용액($CH_3COOH(aq)$), 아세트산 나트륨 수용액($CH_3COONa(aq)$), 1에서 만든 완충 용액을 50 mL씩 담고, pH 측정기로 각 액체의 pH를 측정하자.

도움말 한 수용액의 pH를 측정한 다음 다른 수용액의 pH를 측정할 때는 증류수로 pH 측정기를 잘 씻어 사용한다.

미래엔 화학 반응의 세계 Ⅰ-5 탐구 '물과 완충 용액의 pH 변화 비교하기'



3. 2의 증류수와 수용액에 각각 수산화 나트륨 수용액($NaOH(aq)$) 5 mL를 첨가해 섞은 다음 pH를 측정하자.

| 구분 | $H_2O(l)$ | $CH_3COOH(aq)$ | $CH_3COONa(aq)$ | 완충 용액 |
|---|---|---|---|---|
| 처음 pH | | | | |
| $NaOH(aq)$을 넣었을 때의 pH | | | | |

4. 2와 같이 비커에 증류수와 여러 가지 수용액을 50 mL씩 다시 담고, 각각 염산($HCl(aq)$) 5 mL를 첨가해 섞은 다음 pH를 측정하자.

도움말 공유 플랫폼을 활용하여 실험 결과를 공유한다.

| 구분 | $H_2O(l)$ | $CH_3COOH(aq)$ | $CH_3COONa(aq)$ | 완충 용액 |
|---|---|---|---|---|
| 처음 pH | | | | |
| $HCl(aq)$을 넣었을 때의 pH | | | | |

정리

1. 증류수, 아세트산 수용액, 아세트산 나트륨 수용액, 완충 용액의 pH 변화에 어떤 차이가 있는지 비교해 보자.
2. 정리 1과 같은 차이가 생기는 까닭을 모둠별로 토의해 보자.

도움 자료
탐구 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.
- 114 쪽~115 쪽 실험실 안전 수칙
- 116 쪽~117 쪽 실험 기구 사용 방법
- 118 쪽~119 쪽 주요 시약별 주의 사항

스스로 평가하기
- 지식·이해 | 강산이나 강염기를 첨가할 때 물과 완충 용액의 pH 변화를 비교해 설명했는가? ☆☆☆☆☆
- 과정·기능 | 약산과 그 짝염기가 포함된 염 수용액으로 완충 용액을 옳게 만들었는가? ☆☆☆☆☆
- 가치·태도 | 토의할 때 모둠원의 의견을 경청했는가? ☆☆☆☆☆

같은 탐구 (계속)

**12번 모범 답안 및 해설 (계속) [2026 생물 B4 (선행조직자: 설명 조직자 vs 비교 조직자) · 2026 화학 B4 (오수벨 유의미 학습) · 2021 화학 A6 (성취기준 해설 범위) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- 비교 조직자. 학습자에게 친숙한 개념(르샤틀리에 원리)과 새 학습 내용(완충 작용)의 유사점과 차이점을 비교하게 하여 변별을 돕는다. 설명 조직자는 학습 내용이 완전히 낯설 때 포괄적인 상위 개념을 먼저 설명하는 것이다.
- 공기 중의 $CO_2$가 녹아 탄산이 생기므로 증류수의 pH는 7보다 약간 작을 수 있다(측정기 고장이 아님). $5\times10^{-5}$ mol ÷ 0.050 L = $1.0\times10^{-3}$ M → pH = 3.0. 산을 넣으면 $CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O$, 염기를 넣으면 $CH_3COOH + OH^- \rightarrow CH_3COO^- + H_2O$로 넣어 준 $H_3O^+$·$OH^-$이 소모되어 pH 변화가 작다.
- ㉢ pH 계산, ㉣ 중요성. 성취기준 해설에서 완충 작용은 복잡한 pH 계산을 지양하고 생체 내 완충 용액의 중요성을 중심으로 다루도록 하였으므로, pH 계산 반복 문제는 해설의 취지에 맞지 않는다(혈액 완충 등 생체 사례 중심으로 지도).

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 오수벨의 선행조직자: 설명 조직자(낯선 내용에 앞서 포괄적 상위 개념 제시)와 비교 조직자(친숙한 내용과 새 내용의 유사점·차이점 비교로 변별 촉진). 완충 용액은 약산과 그 짝염기(또는 약염기와 그 짝산)로 이루어져 소량의 산·염기를 소모하여 pH 변화를 줄인다.

**[교육과정 근거]** [12반응01-05] 성취기준(화학 평형으로 생체 내 완충 작용 설명, 화학 원리의 신비로움)과 해설(복잡한 pH 계산은 지양하고 생체 내 완충 용액의 중요성 중심), 탐구 활동(강산이나 강염기를 첨가할 때 물과 완충 용액의 pH 변화 비교하기).

**[채점 포인트]** 비교 조직자와 '친숙한 개념과 비교' 근거, 설명 조직자와의 차이. ㉠은 $CO_2$ 용해. 이론 pH 3.0 계산. 완충 반응식 2개. ㉢ pH 계산, ㉣ 중요성과 ㉡ 부적절 이유.

**[두 교과서 비교]** 미래엔의 완충 용액 표는 NaOH·HCl 첨가 후 값(4.83/4.66)이 0.5 mmol 첨가에만 맞고, 다른 열은 1.0 mmol 기준이라 서로 일치하지 않는다(1.0 mmol이면 4.92/4.57). 자료 일관성 검토 소재이다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(증류수 6.53→3.74/10.51, 완충 용액 7.11→7.08/7.21)를 오수벨 비교 조직자(2026 생물 B4, 2026 화학 B4)로 구성. 증류수 pH 해석 오류, 한 방울 첨가 이론 pH(3.0), [12반응01-05] 성취기준·해설 원문 빈칸(pH 계산, 중요성)과 범위 판단(2021 화학 A6).

## ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육 화학 반응의 세계] Ⅱ-1 탐구 '색이 변하는 용액 관찰하기' (포도당 + NaOH + 메틸렌 블루)

탐구

실험

### 색이 변하는 용액 관찰하기

목표 색이 변하는 용액을 만들어 산화·환원 반응에 대한 흥미와 호기심을 느낄 수 있다.

**준비물**

- ☐ 증류수 ☐ 포도당
- ☐ 수산화 나트륨
- ☐ 1 % 메틸렌 블루 용액
- ☐ 삼각 플라스크
- ☐ 눈금실린더 ☐ 스포이트
- ☐ 유리 막대 ☐ 전자저울
- ☐ 약숟가락 ☐ 시약포지
- ☐ 고무마개 ☐ 보안경
- ☐ 실험용 장갑

**안전**하게 활동하기

- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 수산화 나트륨은 부식성이 있으므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 유리 기구를 떨어뜨리지 않게 주의한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

**나의 활동 돌아보기**

지식·이해 › 용액의 색이 변하는 원리는 무엇인가?

과정·기능 › 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 › 산화·환원 반응을 활용한 놀이를 체험하면서 어떤 점이 흥미로웠는가?

**문제 인식** 색이 변하는 용액에 숨겨진 비밀은 산화·환원 반응과 어떤 관련이 있을까?

**탐구 수행**

1. 삼각 플라스크에 증류수 100 mL를 넣고 포도당 1.5 g과 수산화 나트륨 2 g을 차례로 넣어 모두 녹인다.
2. 과정 **1**의 삼각 플라스크에 메틸렌 블루 용액을 2 mL 정도 넣고 잘 섞는다.
3. 삼각 플라스크의 입구를 고무마개로 막고 색이 어떻게 변하는지 관찰한다.
4. 삼각 플라스크의 용액을 흔들면서 색이 어떻게 변하는지 관찰한다.




| 구분 | 과정 3 | 과정 4 |
|---|---|---|
| 용액의 색 | | |




**자료 해석과 논의**

1. 과정 **3**에서 용액의 색이 변하는 까닭을 설명해 보자.

2. 산화와 환원은 항상 동시에 일어난다. 과정 **3**에서 포도당의 역할을 설명해 보자.

3. 과정 **4**에서 용액의 색이 변하는 까닭을 설명해 보자.

**13번 모범 답안 및 해설 (계속) [2025 화학 B3 · 2022 화학 B4 · 2020 화학 B3 (로슨 경험-귀추적 순환학습) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- 경험-귀추적 순환학습. 탐색 단계에서 학생들이 현상을 관찰하고, 익숙한 현상(사과의 갈변)에서 설명을 빌려 오는 귀추적 추론으로 원인 가설을 제시하였다. 이후 자료를 수집·비교하여 가설을 평가하고 개념을 도입하였다(대안 가설에서 결과를 연역해 통제 실험으로 검증하는 가설-연역적 순환학습과 구별).
- 마개를 막아 둘 때: 포도당(환원제)이 메틸렌 블루(산화제)에 의해 산화되고, 메틸렌 블루는 환원되어 무색이 된다(산소가 아니라 메틸렌 블루가 산화제). 흔들 때: 공기 중의 $O_2$(산화제)가 무색의 환원된 메틸렌 블루(환원제)를 산화시켜 다시 파란색이 된다.
- ㉡ 개방형 질문, ㉢ 심미적. 안전: 수산화 나트륨은 부식성이 있으므로 보안경·장갑을 착용하고 피부에 닿지 않게 한다(남은 용액은 폐수 처리 기준에 따라 처리).

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 로슨의 순환학습: 서술적(규칙성 기술), 경험-귀추적(현상의 원인을 귀추로 설명하는 가설 생성 → 자료로 평가 → 개념 도입), 가설-연역적(인과 질문 → 대안 가설 → 연역적 예측 → 통제 실험). 귀추는 익숙한 현상의 설명을 빌려 새 현상을 설명하는 추론이다. 산화·환원은 동시에 일어나며 산화제는 자신이 환원된다.

**[교육과정 근거]** 교수·학습 방법 (나): 지적 호기심과 학습 동기를 유발하는 발문, 개방형 질문 적극 활용. 내용 체계 가치·태도: 과학의 심미적 가치 등. (2) 고려 사항: 개인 보호 장구 착용, 폐수 처리.


**[채점 포인트]** 경험-귀추적과 학생 G의 귀추(사과 갈변 비유) 근거, 가설-연역적과의 구별. ㉠은 두 과정 각각의 산화제·환원제(메틸렌 블루 / $O_2$). ㉡ 개방형 질문, ㉢ 심미적, NaOH 안전.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(포도당 1.5 g, NaOH 2 g, 메틸렌 블루 2 mL, 마개·흔들기)를 로슨 경험-귀추적 순환학습(2020 B3, 2022 B4, 2025 B3 화학)으로 구성. 산화제 혼동 오개념, 교수·학습 방법(개방형 질문)·가치·태도(심미적 가치) 원문 빈칸, NaOH 안전.

## 14번 모범 답안 및 해설 [2024 화학 B4 (다니엘 전지: 문제 인식·가설·변인·오개념) · 2025 화학 B5 (측정 타당도) · 2022 화학 B5 (전지 오개념) 변형]

★★★★★

## ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅱ-2 탐구 '효율적인 전지의 조건 탐색하기' · 미래엔 Ⅱ-3 탐구 '효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색하기'



탐구

실험, 토의

### 효율적인 전지의 조건 탐색하기

목표 금속판과 전해질을 이용하여 전지를 구성하고, 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건을 탐색할 수 있다.

준비물
- 금속판(아연, 구리, 철)
- 1 M 황산 아연 수용액
- 1 M 황산 구리(Ⅱ) 수용액
- 1 M 황산 철(Ⅱ) 수용액
- 비커
- 염다리
- 핀셋
- 사포
- 멀티미터
- 집게 달린 전선
- 보안경
- 실험용 장갑

주의 금속판은 사포로 잘 문지른 뒤 사용한다.

안전하게 활동하기
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 환기가 잘되는 곳에서 실험한다.
- 사약이 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

「문제 인식」 화학 전지의 전위차는 금속의 종류에 따라 어떻게 달라지며, 효율적인 전지의 조건에는 어떤 것이 있을까?

활동 1 다양한 화학 전지의 전위차 측정하기

「탐구 수행」

1. 비커 3 개에 1 M 황산 아연 수용액, 1 M 황산 구리(Ⅱ) 수용액, 1 M 황산 철(Ⅱ) 수용액을 반 정도씩 넣는다.
2. 세 수용액에 아연판, 구리판, 철판을 각각 넣는다.
3. 아연판이 담긴 비커와 구리판이 담긴 비커를 염다리로 연결한다.
4. 아연판을 멀티미터의 (−)단자에, 구리판을 (+)단자에 연결하여 전압을 측정한다.




5. 금속판을 2 개씩 짝 지어 과정 3, 4를 반복한다.

| 전지 구성 | (−) | (+) | (−) | (+) | (−) | (+) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 아연판 | 구리판 | 아연판 | 철판 | 철판 | 구리판 |
| 측정 전압(V) | | | | | | |

「자료 해석과 논의」

1. 금속의 짝에 따라 전압의 크기가 다른 까닭을 표준 환원 전위와 관련하여 설명해 보자.
2. 실험 결과를 바탕으로 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건을 설명해 보자.

비상교육 화학 반응의 세계 Ⅱ-2 탐구 '효율적인 전지의 조건 탐색하기'



활동 2 효율적인 전지의 조건 탐색하기

「자료 수집과 논의」

1. 다음은 건전지의 광고 문구이다. 각각 전지의 어떤 성질을 나타낸 것인지 토의해 보자.

힘세고 오래가는 건전지 / 더욱 안전하고 더욱 강력하게 / 안심하고 오래 쓰는 건전지

2. 다음 자료를 읽고 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건에는 어떤 것이 있는지 토의하여 발표해 보자.

전지는 산화·환원 반응이 일어나는 전극과 전해질로 구성된다. 전지를 구성하는 물질과 조건에 따라 전지 전위, 즉 전지의 전압이 달라지며, 사용할 수 있는 시간도 달라진다.

전지는 충전할 수 없는 일차 전지와 충전할 수 있는 이차 전지로 나눌 수 있다. 일차 전지는 시계, 리모컨 등 소량의 전류가 필요한 기기에 사용되지만 재사용할 수 없다는 단점이 있다. 이차 전지는 반복적으로 오랜 기간 사용할 수 있고 작고 가볍게 만들 수 있어 다양한 분야에 활용된다. 특히 휴대용 전자 기기, 전기 자동차, 로봇 등의 산업 기술이 발전하면서 이차 전지의 중요성이 높아지고 있다. 이차 전지는 많은 장점이 있지만, 안정성, 금속 원소의 매장량 및 가격, 폐전지 재활용 문제 등 해결해야 할 과제도 많다.

「결과 정리」

다른 모둠의 발표를 듣고, 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건을 정리해 보자.

나의 활동 돌아보기
- 지식·이해 ▸ 화학 전지에 관해 무엇을 새롭게 알게 되었는가?
- 과정·기능 ▸ 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가?
- 가치·태도 ▸ 탐구를 수행하면서 어떤 점이 흥미로웠는가?

같은 탐구 (계속)



탐구

탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

탐구 설계 및 수행 / 결론 도출

### 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색하기

준비물
- 구리판
- 아연판
- 마그네슘판
- 1 M 황산 구리(Ⅱ) 수용액
- 1 M 황산 아연 수용액
- 1 M 황산 마그네슘 수용액
- 염화 칼륨 포화 용액
- 사포
- 거름종이
- 전압계
- 집게 전선
- 6홈판
- 페트리 접시
- 가위
- 핀셋
- 실험복
- 보안경
- 실험용 고무장갑
- 안전 장갑

안전
- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

목표

금속판과 전해질을 이용해 전지를 구성하고, 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건을 탐색할 수 있다.

과정 및 결과

1. 홈판, 몇 가지 금속판과 전해질 수용액을 이용하여 전지를 설계해 보자.

| 구분 | 금속판의 종류 | 전해질의 종류 |
|---|---|---|
| (−)극 | | |
| (+)극 | | |
| 전지 설계도 | | |



2. 우리 모둠에서 설계한 대로 화학 전지를 만들어 보자.


도움말 금속판은 표면의 불순물을 제거한 후 사용한다.

3. 화학 전지에서 일어나는 변화를 관찰하고, 전지 전위를 측정해 보자.

| 구분 | 금속판의 종류 | 전해질의 종류 | 전극에서 일어나는 변화 | 전지 전위(V) |
|---|---|---|---|---|
| (−)극 | | | | |
| (+)극 | | | | |



미래엔 화학 반응의 세계 Ⅱ-3 탐구 '효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색하기'



정리

1. 공유 플랫폼을 활용해 실험 결과를 공유해 보자.

| | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 모둠 | 전극 | 금속판의 종류 | 전해질의 종류 | 전극에서 일어나는 변화 | 전지 전위(V) | |
| 2 | 1 | (−)극 | | | | | |
| 3 | | (+)극 | | | | | |
| 4 | 2 | (−)극 | | | | | |
| 5 | | (+)극 | | | | | |
| 6 | 3 | (−)극 | | | | | |
| 7 | | (+)극 | | | | | |

2. 공유한 실험 결과를 바탕으로 하여 전지를 구성하는 금속판과 전해질의 종류에 따라 전압이 서로 다른 까닭을 표준 환원 전위 표를 참고하여 토의해 보자.

3. 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건을 정하고, 여러 모둠이 만든 전지 중 가장 효율적인 전지를 선정해 보자.

4. 전지의 효율을 높이기 위해 고려해야 하는 다양한 요소를 탐색해 보자.

도움 자료
탐구 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.
- 114 쪽~115 쪽 실험실 안전 수칙
- 118 쪽~119 쪽 주요 시약별 주의 사항
- 120 쪽 표준 환원 전위



스스로 평가하기

| | |
|---|---|
| 지식·이해 \| (−)극과 (+)극을 이루는 금속판과 전해질을 옳게 이해했는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 과정·기능 \| 설계한 전지를 옳게 구성하여 금속판과 전해질의 종류에 따른 전압을 측정했는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 가치·태도 \| 실험 결과를 분석하여 효율적인 전지가 갖추어야 할 조건을 인식했는가? | ☆☆☆☆☆ |

같은 탐구 (계속)

**14번 모범 답안 및 해설 (계속) [2024 화학 B4 (다니엘 전지: 문제 인식·가설·변인·오개념) · 2025 화학 B5 (측정 타당도) ★★★★★ · 2022 화학 B5 (전지 오개념) 변형]**

## ■ 모범 답안

- 조작 변인: (−)극과 (+)극 금속의 짝(종류), 종속 변인: 전위차. ㉠은 전극 표면 상태·담그는 면적이 통제되지 않아, 전위차의 차이가 금속 종류 때문인지 다른 조건 때문인지 구분할 수 없어 실험의 타당도가 낮아진다(같은 정도로 문지르고 같은 깊이로 담가야 함).
- ㉡ 표준 환원 전위는 수소 전극을 기준으로 한 상대적인 값이므로, 부호와 관계없이 E°가 다른 두 반쪽 전지를 연결하면 전지가 된다(E°가 큰 Fe 쪽이 (+)극). ㉢ 표준 환원 전위는 세기 성질로, 반응식의 계수에 따라 곱하지 않는다: 0.34 − (−0.76) = 1.10 V. Zn/Fe: −0.45 − (−0.76) = 0.31 V.
- ㉣ 효율적인 전지, ㉤ 화학 에너지. 원인 예: 금속 표면의 산화막·불순물, 염다리와 용액의 내부 저항, 실제 조건이 표준 상태(25 ℃, 1 M)와 다름.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 탐구 설계: 조작 변인 하나만 바꾸고 나머지 변인(농도, 온도, 전극 표면 상태·면적)을 통제해야 내적 타당도가 확보된다. 표준 환원 전위는 표준 수소 전극 기준의 상대값이며 세기 성질이므로 계수를 곱하지 않는다. $E°_{전지} = E°_{(환원\ 전극)} - E°_{(산화\ 전극)}$.

**[교육과정 근거]** (2) 산화·환원 반응 탐구 활동(금속판과 전해질로 전지를 구성하고 효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색), [12반응02-03] 성취기준·해설(화학 에너지가 전기 에너지로 전환되는 원리).

**[채점 포인트]** 조작 변인(금속 짝)·종속 변인(전위차)과 ㉠의 통제 실패 → 타당도. ㉡ 상대값, ㉢ 계수 불곱, 1.10 V와 0.31 V. ㉣ 효율적인 전지, ㉤ 화학 에너지, 실측값이 작은 원인.

**[두 교과서 비교]** 미래엔 '효율적인 전지가 갖추어야 하는 조건 탐색하기'에서 Mg-Cu 전지의 '측정값' 2.71 V가 표준 전지 전위와 정확히 같다. 실측값은 내부 저항·비표준 조건 때문에 이론값보다 작은 것이 일반적이므로 자료의 진정성을 검토하게 할 수 있다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구(1 M Zn/Cu/Fe 반쪽 전지, 측정 0.90/0.23/0.65 V)를 변인·타당도(2024 화학 B4, 2025 화학 B5)로 구성. 'E° 부호가 달라야 전지'·'E°에 계수를 곱함' 오개념, [12반응] 탐구 활동·해설 원문 빈칸(효율적인 전지, 화학 에너지).

## 15번 모범 답안 및 해설 [2018 화학 (실험 안전·평가표) · 2016 화학 (분석적 vs 총체적 채점) · 2026 지구 A7 (채점표 유형·피드백) 변형] ★★★★☆

## ■ 관련 교과서 탐구 — [비상교육·미래엔 화학 반응의 세계] Ⅱ-3 탐구 '은도금하기' (미래엔 Ⅱ-4 동명 탐구)

탐구

실험

### 은도금하기

목표 염 수용액과 전원 장치를 이용하여 금속 제품 표면에 은을 도금할 수 있다.

**준비물**
- ☐ 다이사이아노은산 칼륨 수용액
- ☐ 은판
- ☐ 구리 핀센트
- ☐ 증류수
- ☐ 6 홈판
- ☐ 스포이트
- ☐ 핀셋
- ☐ 건전지
- ☐ 전지 끼우개
- ☐ 집게 달린 전선
- ☐ 헝겊
- ☐ 보안경
- ☐ 실험용 장갑


**안전하게 활동하기**
- 실험복, 보안경, 실험용 장갑을 착용한다.
- 환기가 잘되는 곳에서 실험한다.
- 다이사이아노은산 칼륨은 독성이 강하므로 피부나 옷에 묻지 않게 주의한다. 특히 가열하면 분해되어 해로운 기체가 나오므로 가열하지 않도록 주의한다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.

**문제 인식**

금속 제품 표면에 다른 금속을 전기 도금 하는 원리는 무엇일까?

**탐구 수행**

1. 홈판의 한 홈에 다이사이아노은산 칼륨 수용액($K[Ag(CN)_2](aq)$)을 넣는다.
2. 전지의 (+)극에 은판을, (−)극에 구리 펜던트를 연결한다.
   주의 도금하기 전에 구리 펜던트를 헝겊으로 깨끗하게 닦고, 맨손으로 만지지 않는다.
3. 은판과 구리 펜던트를 홈판의 수용액에 담그고 변화를 관찰한다.
   주의 은판과 구리 펜던트가 서로 닿지 않게 주의한다.
4. 구리 펜던트의 표면이 모두 은색으로 변하면 증류수로 씻어 말린다.




**자료 해석과 논의**

1. 은판과 구리 펜던트에서 일어나는 변화를 각각 화학 반응식으로 나타내 보자.
   - 은판((+)극):
   - 구리 펜던트((−)극):

비상교육 화학 반응의 세계 Ⅱ-3 탐구 '은도금하기'

탐구 능력 | 문제 해결 능력 | 의사 결정 능력

탐구

탐구 수행 / 결론 도출

### 은도금하기

**준비물**
- ☑ 구리 펜던트
- ☑ 은판
- ☑ 다이사이아노은산 칼륨 용액
- ☑ 6홈판
- ☑ 건전지(1.5 V AA 3 개)
- ☑ 스위치형 집게 달린 건전지 받침
- ☑ 핀셋
- ☑ 증류수
- ☑ 실험복
- ☑ 보안경
- ☑ 실험용 고무장갑

**안전**
- 실험할 때는 반드시 실험복, 보안경, 실험용 고무장갑을 착용한다.
- 다이사이아노은산 칼륨 용액이 손에 닿지 않도록 주의하고, 손에 묻은 경우 흐르는 물로 즉시 씻는다.
- 실험 후 남은 용액은 폐수 처리 기준과 방법에 따라 처리한다.
- 반드시 환기가 잘되는 곳에서 실험한다.

**도움 자료**

탐구 전에 다음 자료를 먼저 읽어 보자.
- 114 쪽~115 쪽 실험실 안전 수칙
- 118 쪽~119 쪽 주요 시약별 주의 사항

**목표**

금속 염 수용액과 건전지를 이용하여 구리 표면에 은을 도금하고, 도금의 원리를 설명할 수 있다.

**과정**

1. 다이사이아노은산 칼륨($K[Ag(CN)_2]$) 용액을 6홈판의 한 홈에 넣자.
2. 전지의 (+)극에 은판을, (−)극에 구리 펜던트를 연결한 후 구리 펜던트와 은판을 홈판의 용액에 넣고 전원을 켜자.

   도움말 ☑ 은판과 구리 펜던트가 닿지 않도록 하고, 펜던트 표면이 은색으로 바뀌면 방향을 돌려 가며 확인해 도금되지 않은 부분이 없도록 한다.
3. 펜던트 표면이 모두 은색으로 바뀌면 전원을 끄고 펜던트와 은판을 꺼내어 증류수로 씻어 말리자.




**정리**

1. 구리 펜던트와 은판에서 일어나는 변화를 각각 화학 반응식으로 나타내 보자.
   - 구리 펜던트:
   - 은판:
2. 은판의 변화와 용액 속 은 이온 수의 변화를 토의해 보자.

**스스로 평가하기**

| | |
|---|---|
| 지식·이해 \| 전기 분해의 원리를 이해하고 도금에서 일어나는 전자의 이동을 설명했는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 과정·기능 \| (+)극과 (−)극에 연결하는 물질을 옳게 선택하여 도금을 완성했는가? | ☆☆☆☆☆ |
| 가치·태도 \| 실험 결과로 도금의 유용성을 깨달았는가? | ☆☆☆☆☆ |

미래엔 화학 반응의 세계 Ⅱ-4 탐구 '은도금하기'

2. 물체에 금속을 전기 도금 할 때 (+)극과 (−)극에서 일어나는 변화를 산화·환원 반응으로 설명해 보자.

**나의 활동 돌아보기**

| | |
|---|---|
| 지식·이해 > 전기 도금에 관해 무엇을 알게 되었는가? | |
| 과정·기능 > 탐구 과정에서 어떤 역할을 하였는가? | |
| 가치·태도 > 은도금 실험을 하면서 어떤 점이 흥미로웠는가? | |

같은 탐구 (계속)

**15번 모범 답안 및 해설 (계속) [2018 화학 (실험 안전·평가표) · 2016 화학 (분석적 vs 총체적 채점) · 2026 지구 A7 (채점표 유형·피드백) 변형]** ★★★★☆

## ■ 모범 답안

- $K[Ag(CN)_2]$는 독성이 매우 강하고 가열하면 분해되어 유독한 기체(사이안화 수소 등)가 발생할 수 있으므로 절대 가열하면 안 된다(환기, 보안경·장갑 착용). ㉣ 개인 보호 장구. 대체 실험 예: 황산 구리(Ⅱ) 수용액에서 구리판(+)·철 못(−)으로 구리 도금하기.
- 전기 분해에서는 (+)극에서 산화, (−)극에서 환원이 일어난다(화학 전지와 반대). (+)극 은판: $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$(산화), (−)극 펜던트: $Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$(환원). 은 원자가 직접 옮겨 가는 것이 아니라 은판의 Ag가 산화되어 $Ag^+$으로 녹아 나오고, 용액의 $Ag^+$이 펜던트 표면에서 환원되어 석출된다(한 금속의 산화와 환원이 동시에 일어남).
- 총체적 채점(전체적인 인상으로 하나의 점수 부여). 분석적 채점은 평가 요소별 수행 수준을 구체적으로 진단해 피드백을 줄 수 있고 채점자 간 신뢰도가 높아진다. 평가 요소 예: ① 두 전극의 반응식을 산화·환원으로 옳게 쓰는가, ② 전극 연결(은판 (+), 제품 (−))을 옳게 하는가, ③ 보호 장구 착용·폐액 처리를 지키는가.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 총체적 채점은 수행 전체를 하나의 점수로 판단하여 빠르지만 진단 정보가 적고, 분석적 채점은 평가 요소별로 점수를 부여해 구체적 피드백과 채점 신뢰도 확보에 유리하다. 전기 분해에서는 (+)극(산화 전극)에서 산화, (−)극에서 환원이 일어난다.

**[교육과정 근거]** (2) 산화·환원 반응 탐구 활동(염 수용액과 전원 장치를 이용하여 금속 제품 표면에 도금하기), 고려 사항(화학 전지 만들기 및 도금 실험 시 개인 보호 장구 착용, 폐수 처리).


**[채점 포인트]** 사이안화물 독성·가열 시 유독 기체와 ㉣ 개인 보호 장구, 대체 실험. ㉡·㉢은 두 전극 반응식과 '같은 금속의 산화와 환원'. 총체적 채점 → 분석적 채점의 장점과 평가 요소 2가지.

**[두 교과서 비교]** 미래엔 '은도금하기'도 사이안화물 도금액을 쓰는데, 산과 만나면 사이안화 수소가 발생한다는 경고와 전류 조절 장치가 없다. 크로뮴을 '이온화 경향이 작은 금속'으로 묶은 서술은 부동태 산화막으로 바로잡아야 한다.

**[출제 포인트]** 교과서 탐구($K[Ag(CN)_2]$, 은판 (+), 구리 펜던트 (−), 가열 금지)의 안전 요소(2018 화학)와 전기 분해 전극 오개념, 총체적→분석적 채점(2016 화학, 2026 지구 A7). [12반응] 탐구 활동·고려 사항 원문 빈칸(개인 보호 장구).

## 16번 모범 답안 및 해설 [2022 화학 A6 (기초 탐구 과정: 관찰·추리) · 2021 화학 B5 (추리·실험 안전) · 2023 화학 B4 (교육과정 범위 위배) 변형] ★★★★★

### ■ 관련 교과서 탐구 — [미래엔·비상교육 화학 반응의 세계] Ⅲ-2 탐구 '은거울 반응으로 작용기의 변화 탐구하기' · '음주 측정기로 작용기 변화 탐구하기' · 비상교육 Ⅲ-2 탐구 '음주 측정기를 만들어 작용기의 변화 탐구하기'


은거울 반응으로 작용기의 변화 탐구하기

목표

알데하이드의 반응을 통해 작용기의 변화를 탐구할 수 있다.

예비 학습

은거울 반응은 알데하이드가 은 이온($Ag^+$), 수산화 이온($OH^-$)과 반응해 산화되어 카복실산이 되고, 은 이온은 환원되어 은이 생성되는 반응이다.

$$H-C(=O)-H + 2Ag^+ + 2OH^- \rightarrow H-C(=O)-O-H + 2Ag + H_2O$$

포도당은 수용액에서 작용기 −OH를 갖는 고리 구조와 작용기 −CHO를 갖는 사슬 구조를 변갈아 나타내므로 환원성이 있다.




• 위의 구조에서 작용기 −OH와 −CHO를 찾아 표시해 보자.

과정

1. 투명이 있는 유리병에 질산 은 수용액을 5 mL 넣고, 진한 암모니아수를 한 방울씩 가하여 갈색 침전이 생기면 흔들어 주면서 침전이 모두 녹을 때까지 암모니아수를 계속 가한다.
2. 과정 1의 유리병에 포도당 수용액과 수산화 칼륨 수용액을 각각 2 mL씩 넣고 투명을 닫자.
3. 과정 2의 유리병을 60 °C의 뜨거운 물에 넣고, 존들어 반응시키자.



미래엔 화학 반응의 세계 Ⅲ-2 탐구 '은거울 반응으로 작용기의 변화 탐구하기'



결과 및 정리

1. 과정 3에서 뚜껑이 있는 유리병 벽에 어떤 변화가 생기는지 써 보자.
2. 실험 과정에서 산화되는 물질과 환원되는 물질을 각각 찾아 써 보자.
3. 이 변화를 통해 알 수 있는 포도당의 작용기 변화를 써 보자.

스스로 평가하기

| 지식·이해 | 은거울 반응 실험에서 일어나는 작용기의 변화를 옳게 설명했는가? ☆☆☆☆☆
| 과정·기능 | 실험을 과정에 따라 정확히 수행하고 일어나는 변화를 잘 관찰했는가? ☆☆☆☆☆
| 가치·태도 | 유독 물질과 뜨거운 물을 조심히 다루며 안전하게 실험했는가? ☆☆☆☆☆

같은 탐구 (계속)


같은 원리 다른 탐구

음주 측정기로 작용기 변화 탐구하기

과정

1. 실리카 젤에 0.1 M 다이크로뮴산 칼륨 수용액과 6 M 황산 수용액을 2 : 1의 부피비로 섞은 용액을 흡수시키자.
2. 플라스틱 관의 한쪽 끝을 마개로 막고 과정 1의 실리카 젤을 넣자.
   ⚠ 실리카 젤이 손에 닿지 않도록 주의한다.
3. 에탄올을 적신 솜을 관의 끝 쪽에 끼워 넣고, 마개를 닫아 밀폐한 다음 실리카 젤에 일어나는 변화를 관찰하자.

결과 및 정리

1. 실리카 젤에 일어나는 변화를 써 보자.
2. 결과 및 정리 1과 같은 변화가 일어나는 까닭을 조사해 보자.

에탄올을 적신 솜

용액을 흡수시킨 실리카 젤

미래엔 화학 반응의 세계 Ⅲ-2 같은 원리 다른 탐구 '음주 측정기로 작용기 변화 탐구하기'


탐구

음주 측정기를 만들어 작용기의 변화 탐구하기

목표 음주 측정기의 원리를 에탄올의 산화 반응을 이용하여 설명할 수 있다.

문제 인식 음주 측정기로 어떻게 에탄올을 확인할까?

탐구 수행

[탐구 가] 음주 측정기의 원리 알아보기

1. 다이크로뮴산 칼륨 수용액($K_2Cr_2O_7(aq)$) 20 mL와 황산 수용액($H_2SO_4(aq)$) 10 mL를 섞어 혼합 용액을 만든다.
2. 혼합의 홍 A와 B에 과정 1의 혼합 용액을 2 mL씩 넣는다.
3. 홍 B에 에탄올($C_2H_5OH$) 2 mL를 넣고 색 변화를 관찰한다.

생각 열기 용액의 색은 어떻게 변하는가?


[탐구 나] 긴이 음주 측정기 만들기

1. 탐구 가의 과정 1에서 만든 혼합 용액에 실리카 젤 약 10 g을 넣는다.
2. 잠시 후 혼합 용액이 실리카 젤에 스며들면 용액을 거름종이에 부어 실리카 젤을 분리한다.
3. 투명 빨대를 반으로 잘라 한쪽을 솜으로 막는다.
4. 과정 2에서 분리한 실리카 젤을 빨대에 넣고 다른 쪽도 솜으로 막는다.

실리카 젤

빨대

비상교육 화학 반응의 세계 Ⅲ-2 탐구 '음주 측정기를 만들어 작용기의 변화 탐구하기'


5. 스포이드를 이용하여 작은 풍선에 에탄올을 조금 넣고 공기 펌프로 풍선에 바람을 넣는다.
6. 풍선의 입구에 빨대를 연결하고 풍선의 바람이 빨대로 빠져나가게 하면서 실리카 젤의 색 변화를 관찰한다.

생각 열기 풍선에서 바람이 빠져나올 때 액에 확산되어 직접 빨대로 들어가지 않도록 주의한다.

생각 열기 실리카 젤의 색은 어떻게 변하는가?

풍선 확산과 농도

다이크로뮴산 칼륨($K_2Cr_2O_7$)에 포함된 다이크로뮴산 이온($Cr_2O_7^{2-}$)과 에탄올($C_2H_5OH$)의 반응을 화학 반응식으로 나타내면 다음과 같다.

$$3C_2H_5OH + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ \longrightarrow 3CH_3COOH + 4Cr^{3+} + 11H_2O$$

1. 탐구 가와 탐구 나에서 관찰한 색 변화를 크로뮴($Cr$)의 산화수 변화를 이용하여 설명해 보자.
2. 탐구 가와 탐구 나에서 에탄올의 작용기 변화를 산화·환원 반응으로 설명해 보자.

나의 학습 돌아보기

지식·이해 : 탐구를 수행하면서 무엇을 알게 되었는가?

과정·기능 : 긴이 음주 측정기를 만들 때 어떤 역할을 하였는가?

가치·태도 : 긴이 음주 측정기를 만들면서 어떤 점이 흥미로웠는가?

같은 탐구 (계속)

알데하이드는 쉽게 산화되므로 다른 물질을 환원시키는 성질이 있다. 알데하이드를 은 이온($Ag^+$)이 포함된 수용액에 넣으면 알데하이드가 카복실산으로 산화되면서 은 이온은 은($Ag$)으로 환원된다. 이때 생성된 은이 유리벽에 붙어 거울처럼 보이는데 이러한 반응을 은거울 반응이라고 한다.


| 그림 Ⅲ-8 | 은거울 반응

비상교육 화학 반응의 세계 Ⅲ-2 본문 '은거울 반응' (그림 Ⅲ-8, 탐구 활동 아님)

**16번 모범 답안 및 해설 (계속) [2022 화학 A6 (기초 탐구 과정: 관찰·추리) · 2021 화학 B5 (추리·실험 안전) · 2023 화학 B4 (교육과정 범위 위배) 변형]** ★★★★★

## ■ 모범 답안

- 관찰: ①, ③(감각으로 직접 확인한 사실), 추리: ②, ④(관찰한 사실을 근거로 보이지 않는 원인·변화를 해석). 관찰은 감각 경험의 기술이고, 추리는 관찰 결과와 기존 지식을 바탕으로 한 설명이다.
- 포도당(-CHO)이 산화되고, 은 이온(다이아민 은 착이온)이 환원되어 은이 석출된다. ㉠ $Cr_2O_7^{2-}$은 주황색이며, Cr의 산화수가 +6 → +3으로 감소하여 초록색 $Cr^{3+}$이 된다(주황색 → 초록색). ㉡ 암모니아성 질산 은 용액은 오래 두면 폭발성 물질이 생길 수 있으므로 보관하지 말고 실험 직후 즉시 처리해야 한다. 실험 나: 다이크로뮴산 칼륨(6가 크로뮴)은 발암성·강한 산화제이고 6 M 황산은 부식성이므로 장갑·보안경을 착용하고 소량만 사용하며 폐액을 따로 모은다.
- ㉣ 작용기, ㉤ 성질. ① 성취기준 해설에서 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루도록 하였으므로 케톤·에터·아민은 범위를 벗어난다. ② 고려 사항에서 반응의 종류를 학습하기보다 반응을 활용한 유용한 화합물 개발에 중점을 두도록 하였으므로, 반응 메커니즘 정리는 취지에 맞지 않는다.

## ■ 해설

**[핵심 이론]** 기초 탐구 과정: 관찰(감각으로 사실을 지각·기술), 분류, 측정, 예상, 추리(관찰 사실과 기존 지식에 근거해 보이지 않는 원인을 설명). 은거울 반응에서 알데하이드기(-CHO)는 카복실기(-COOH)로 산화되고 은 이온은 은으로 환원된다. 음주 측정기에서는 $Cr_2O_7^{2-}$(주황, Cr +6)이 $Cr^{3+}$(초록, +3)으로 환원되며 에탄올이 산화된다.

**[교육과정 근거]** (3) 탄소 화합물과 반응 탐구 활동(음주 측정기 만들기, 은거울 반응 등 실험을 통해 작용기의 변화 탐구), 해설(작용기는 알코올·알데하이드·카복실산만, 작용기가 바뀌면 성질도 바뀐다는 수준), 고려 사항(반응의 종류보다 유용한 화합물 개발에 중점, 개인 보호 장구·폐수 처리).

**[채점 포인트]** 관찰 ①③, 추리 ②④와 구분 기준. 산화(포도당)·환원(은 이온), ㉠은 '주황색'과 Cr +6 → +3. ㉡은 폭발성 물질 생성 위험 → 즉시 처리, 실험 나는 Cr(Ⅵ) 발암성·황산 부식성. ㉣ 작용기, ㉤ 성질과 범위 위배 근거 2가지(작용기 범위, 반응 종류 학습 지양).

**[두 교과서 비교]** 비상교육은 음주 측정기를 정식 탐구(홈판에서 다이크로뮴산 칼륨-황산 혼합액에 에탄올을 넣어 색 비교 → 실리카 겔 빨대에 에탄올 증기 통과)로, 은거울 반응은 본문 설명으로만 다룬다. 미래엔은 은거울 반응을 정식 탐구로, 음주 측정기를 '같은 원리 다른 탐구'로 둔다. 비상교육은 $Cr_2O_7^{2-}$을 주황색으로 옳게 쓰지만 $Cr^{3+}$ 그림을 진한 파란색으로 그려 본문(초록색)과 어긋나고, 두 교과서 모두 6가 크로뮴의 발암성과 크로뮴 폐액 분리 처리, 톨런스 시약(다이아민은 착이온)을 즉시 만들어 쓰고 폐기해야 한다는 안전 사항을 다루지 않는다. 은거울 반응에서 NaOH를 '촉매'로 쓰는 표현도 반응물로 바로잡아야 한다.

**[출제 포인트]** 미래엔 탐구(질산 은 5 mL + 암모니아수, 포도당·KOH 2 mL, 60 ℃; 다이크로뮴산 칼륨 + 황산 실리카 겔)를 기초 탐구 과정의 관찰·추리(2022 화학 A6, 2021 화학 B5)로 구성. $Cr_2O_7^{2-}$ 색 오류(교과서 기술 재구성), 암모니아성 질산 은 보관 위험, Cr(Ⅵ) 안전, [12반응03] 탐구 활동·해설·고려 사항 원문과 범위 판단(2023 화학 B4).