

全流程

✓ 助理收集个人信息

- 姓名
- 性别：男（NAN） /女(NUV)
- 年龄NIAN(岁数)
- 身高SHG(cm)
- ✓ 体重SHZ(kg)
 - BMI计算公式： $BMI=10000*SHG/SHZ/SHZ$
- 手机号
- ✓ 填写完后核对
 - ✓ 信息异常
 - ✓ 提示核对单位/数值
 - 重新填写
 - ✓ 信息正常
 - ✓ 首次手机号
 - 新朋友欢迎语
 - ✓ 历史手机号
 - 老朋友欢迎语

✓ 判断主诊

- ✓ 第一阶段：就诊意图判断
 - ✓ 中医师提问：您是有突发不适症状，还是想调理亚健康状态？
 - ✓ 屏幕选项：
 - A. 都不是
 - B. 突发不适
 - C. 调理亚健康

- ✓ 第二阶段：根据选择分流
 - ✓ 分支一：客户选择【都不是】
 - ✓ 中医师：如果您有其他需求，也可以告诉我？
 - ✓ 客户回答：重大疾病
 - 中医师：咱们这里只是调理，不治病，建议您及时就医
 - 流程结束，建议退出
 - ✓ 客户回答：想继续使用咱们的产品
 - 中医师：咱们有调理气机的三款药食同源茶饮，有调理肠道的三款产品，还有其他产品，您可以联系客服咨询
 - 流程结束，转客服
 - ✓ 客户回答：其它问题
 - 中医师：咱们通过中医望闻问切帮助辨证调理，不做其它服务，请理解
 - 让客户退出系统
 - ✓ 分支二：客户选择【突发不适】
 - ✓ 中医师：请问您具体是哪种突发不适？请从以下选项选择：
 - 屏幕选项：感冒 / 头痛 / 咳嗽
 - ✓ 客户选择其中一种症状
 - 进入统一回答模式（程度判断）
 - ✓ 客户回答：都不是
 - ✓ 中医师：请问哪种不适？
 - 客户回答：伤风 / 外感 / 发热 / 怕冷 / 流鼻涕 / 浑身不适
 - 中医师：不好意思，咱们目前没有针对该症状的调理问诊呢，请理解
 - ✓ 客户回答：其它话题（非症状）
 - 中医师：仅对日常突发不适症状辨证调理，建议医院就医
 - 流程结束
 - ✓ 分支三：客户选择【调理亚健康】

- ✓ 中医师：请问您亚健康具体表现是？
 - 屏幕选项：慢性疲劳 / 失眠
- ✓ 客户选择其中一种症状
 - 进入统一回答模式（程度判断）
- ✓ 客户回答：都不是
- ✓ 中医师：请问有什么不适？
 - 客户回答：血压高 / 乏力 / 脂肪肝 / 肚子大 / 沉重 / 生气 / 肝郁
 - 中医师：不好意思，咱们目前没有针对该症状的调理问诊呢，请理解
- ✓ 客户回答：其它话题（非症状）
 - 中医师：仅对日常亚健康不适症状辨证调理，建议医院就医
 - 流程结束
- ✓ 第三阶段：统一回答模式（程度判断与调理承接）
 - ✓ 中医师：请问您的【具体症状】严重吗？
 - ✓ 客户回答：很严重
 - 中医师：仅调理不治病，建议及时就医
 - 流程结束
 - ✓ 客户回答：较重或较轻
 - 中医师：我们可以帮您调理
 - 主症确认完毕，准备进入详细问诊
 - ✓ 客户回答：能保证给我看好吗？
 - 中医师：互相配合，精确辨证，优良茶饮，自然调理，望尽快康复
 - 等待客户确认，若继续，进入下一步问诊
 - ✓ 客户回答：其它问题
 - 中医师：仅提供常见症状调理，其他症状请医院就医
 - 让客户退出系统
- ✓ 第四阶段：边界情况处理

- ✓ 客户回答：其它问题（非症状、非购买、非病情描述）
 - 中医师：仅为常见症状调理，其他症状请正规医院就诊
 - 让客户退出系统

✓ 舌脉信息

- ✓ 第一阶段：舌象采集（舌面）
 - ✓ 1.1 准备工作
 - ✓ 中医师说明采集目的和要求
 - 请客户找光线充足处
 - 面对摄像头，自然伸出舌头
 - 系统启动摄像头自动拍摄舌面照片
 - 系统显示拍摄成功
 - ✓ 1.2 舌下拍摄
 - 中医师指导客户将舌头向上卷起，舌尖抵住上颚或上牙根部，露出舌下脉络
 - 系统启动摄像头自动拍摄舌下照片
 - 系统显示拍摄成功
- ✓ 第二阶段：脉象采集
 - ✓ 2.1 测量脉搏
 - 中医师指导客户将手腕自然平放桌面，掌心向上，脉搏跳动处贴近设备感应区
 - 系统启动脉诊设备自动采集脉象数据
 - 系统显示采集进度
 - 采集完成后，系统提示脉象数据采集完毕
- ✓ 第三阶段：系统分析结果与确认
 - ✓ 3.1 系统自动生成分析结果
 - ✓ 舌象分析
 - 舌苔厚薄（薄苔 / 厚苔 / 腻苔）

- 舌质颜色（淡红 / 红 / 暗红 / 淡白 / 紫暗）
- 舌质大小（正常 / 胖大 / 瘦薄 / 有齿痕）
- 舌下状态（正常 / 青紫 / 迂曲 / 粗张）
- ✓ 脉象分析
 - 脉象特征（迟脉 / 数脉 / 浮脉 / 沉脉 / 无力脉 / 弦脉 / 细脉 等）
 - 脉搏次数判断（<60提示寒，阳气不足；>85提示有热）
- ✓ 3.2 结果确认与分流
 - ✓ 情况1：舌脉信息清晰，无明显极端异常
 - 中医师记录舌脉情况
 - 结合主症进行详细辨证
 - 进入下一阶段详细问诊
 - ✓ 情况2：舌脉信息存在明显异常
 - 中医师提示气血运行异常特征
 - 建议严重不适者优先医院检查
 - 客户确认继续调理则进入下一阶段
 - 客户不适严重则引导就医
 - ✓ 情况3：采集失败或信息不全
 - 中医师提示光线或设备问题
 - 引导客户重新采集
 - 多次失败建议线下就诊
- ✓ 3.3 根据采集的舌像和脉象数据计算针对性提问
 - 计算问诊心脏---IF(MBJD=1,1,0)---屏幕右侧显示：心悸，心痛，胸闷
 - 1、心悸PXZ1---较轻PXZ1A，较重PXZ1B
 - 2、心中闷痛PXZ2---较轻PXZ2A，较重PXZ2B；
心中刺痛PXZ3---较轻PXZ3A，较重PXZ3B；
心中冷痛PXZ4---较轻PXZ4A，较重PXZ4B；
心中胀痛PXZ5---较轻PXZ5A，较重PXZ5B
 - 3、胸闷PQZ2---较轻PQZ2A，较重PQZ2B

- 计算问诊血热---IF(OR(LSZ5=1,LSZ8=1,LSZ9=1),1,0)---屏幕右侧显示：皮肤红疹，皮肤疮，心烦，出血发热，小便热痛（1）
 - 1、皮肤红疹PXR1---较轻PXR1A，较重PXR1B
 - 2、皮肤疮红肿PXR2---较轻PXR2A，较重PXR2B
 - 3、心烦夜间加重PXR3---较轻PXR3A，较重PXR3B
 - 4、各种出血（鲜红发热）PXR4---较轻PXR4A，较重PXR4B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B
- 计算问诊阴虚---IF(OR(BMI<22,LSZ3=1),1,0)---屏幕右侧显示：皮肤干燥，心胸烦躁，耳鸣，多梦（1）
 - 1、皮肤干燥PYW1---较轻PYW1A，较重PYW1B
 - 2、心胸烦热PYW2---较轻PYW2A，较重PYW2B
 - 3、耳鸣如蝉PYW3---较轻PYW3A，较重PYW3B
 - 4、多梦PYW4---较轻PYW4A，较重PYW4B
- 计算问诊阴盛湿---IF(OR(BMI>27,LSZ1=1,LSZ2=1),1,0)---屏幕右侧显示：肚子大，沉重，局部肿，晨僵（1）
 - 1、肚子大PSQ1---较轻PSQ1A，较重PSQ1B
 - 2、沉重PSQ2---较轻PSQ2A，较重PSQ2B
 - 3、局部肿胀PSQ3---较轻PSQ3A，较重PSQ3B
 - 4、晨僵PSQ4---较轻PSQ4A，较重PSQ4B
- 计算问诊痰---IF(OR(BMI>27,LSZ1=1,LSZ2=1),1,0)---屏幕右侧显示：咳吐痰涎---喉中痰鸣---头重昏蒙---皮下结节（按之不痛）（1）
 - 1、咳嗽PQN2---较轻PQN2A，较重PQN2B---痰白PQN2C，痰黄PQN2D，说不清楚PQN2E
 - 2、喉中痰鸣PTZ2---较轻PTZ2A，较重PTZ2B
 - 3、头重昏蒙PTZ3---较轻PTZ3A，较重PTZ3B
 - 4、皮下结节（按之不痛）PTZ4---较轻PTZ4A，较重PTZ4B
- 计算问诊血瘀---IF(OR(LSZ10=1,LSZ20=1),1,0)---屏幕右侧显示：皮下瘀斑，皮肤甲错，口唇紫暗（1）
 - 1、皮下瘀斑（按之疼痛）PXY1---较轻PXY1A，较重PXY1B
 - 2、皮肤甲错PXY2---较轻PXY2A，较重PXY2B
 - 3、口唇紫暗PXY3---较轻PXY3A，较重PXY3B
- ✓ 第四阶段：舌脉信息确认完毕，过渡详细问诊
 - 中医师感谢配合，确认舌脉信息无误
 - 询问客户是否方便继续详细问诊

✓ 客户确认后进入详细问诊阶段

- 详细问诊内容包括二便、睡眠、寒热、出汗、情绪、饮食等

✓ 详细问诊

✓ 感冒问诊

✓ 1. 中医师询问寒热表现

✓ 选项包括：

- 单独怕冷
- 单独发热
- 怕冷同时发热
- 寒热往来
- 夜热早凉
- 寒热不明显

✓ 备注：

- 当用户不明白时，中医师需详细解释

✓ 2. 根据寒热表现进入相应诊断分支

✓ 单独怕冷、怕冷同时发热、寒热往来、夜热早凉、寒热不明显

✓ 中医师询问是否流涕

- 流清涕
- 流浊涕
- 无流涕

✓ 继续询问口渴情况

- 口不渴
- 口渴喜热饮
- 口渴喜凉饮
- 口干不想喝水
- 口中水多

- ✓ 询问口味
 - 口苦、口臭、口酸、口涩、口咸、口淡无味、口甜
- ✓ 询问食欲
 - 食欲不振、能吃、见食而烦
- ✓ 询问出汗情况
 - 不出汗
 - ✓ 出汗
 - 出汗粘腻
 - 出汗不粘腻
 - ✓ 盗汗
 - 盗汗粘腻
 - 盗汗不粘腻
- ✓ 询问大便
 - 稀溏不热、稀溏发热、干结、先干后稀、时干时稀、带血
- ✓ 询问小便
 - 发热发黄、清长、不利、带血发热、带血不热
- ✓ 询问睡眠
 - 入睡困难、睡后易醒、嗜睡
- ✓ 询问体力
 - 神疲乏力劳累加重、遇湿加重、遇热加重
- ✓ 询问心烦
 - 白天心烦、夜间心烦、白天心烦夜间安静
- ✓ 单独怕热
- ✓ 询问出汗情况
 - 不出汗
 - ✓ 出汗
 - 出汗粘腻

- 出汗不粘腻
- ✓ 盗汗
 - 盗汗粘腻
 - 盗汗不粘腻
- ✓ 继续询问口渴情况
 - 口不渴
 - 口渴喜热饮
 - 口渴喜凉饮
 - 口干不想喝水
 - 口中水多
- ✓ 询问口味
 - 口苦、口臭、口酸、口涩、口咸、口淡无味、口甜
- ✓ 询问食欲
 - 食欲不振、能吃、见食而烦
- ✓ 询问出汗情况
 - 不出汗、自汗、盗汗
- ✓ 询问大便
 - 稀溏不热、稀溏发热、干结、先干后稀、时干时稀、带血
- ✓ 询问小便
 - 发热发黄、清长、不利、带血发热、带血不热
- ✓ 询问睡眠
 - 入睡困难、睡后易醒、嗜睡
- ✓ 询问体力
 - 神疲乏力劳累加重、遇湿加重、遇热加重
- ✓ 询问心烦
 - 白天心烦、夜间心烦、白天心烦夜间安静
- ✓ 头痛问诊

✓ 询问头痛位置

- 前额痛
- 偏头痛
- 后头痛
- 颠顶头痛
- 全头痛

✓ 针对每种头痛的位置，询问疼痛性质

- 冷痛（遇冷加重）
- 热痛（遇热加重）
- 遇风加重
- 胀痛
- 剧痛
- 隐隐痛

✓ 询问寒热感觉

- 整体怕冷
- 整体怕热
- 胃脘喜温喜按
- 胃脘胀满拒按
- 头部怕冷

✓ 询问口渴及喝水情况

- 口不渴
- 口渴喜热饮
- 口渴喜凉饮
- 口干但不想喝水
- 口中水多

✓ 询问口味表现

- 口苦

- 口臭
- 口酸
- 口涩
- 口咸
- 口淡无味
- 口甜
- ✓ 询问饮食情况
 - 食欲不振
 - 能吃
 - 见食而烦
- ✓ 询问出汗情况
 - 不出汗
 - 自汗
 - 盗汗
- ✓ 询问大便情况
 - 大便稀溏不热
 - 大便稀溏发热
 - 大便干结
 - 先干后稀
 - 时干时稀
 - 大便带血
- ✓ 询问小便情况
 - 小便发热发黄
 - 小便清长
 - 小便不利
 - 小便带血发热
 - 小便带血不热

- ✓ 询问睡眠情况
 - 入睡困难
 - 睡后易醒
 - 嗜睡
- ✓ 询问体力状况
 - 神疲乏力劳累加重
 - 神疲乏力遇湿加重
 - 神疲乏力遇热加重
- ✓ 询问心烦情况
 - 白天心烦
 - 夜间心烦
 - 白天心烦夜间安静
- ✓ 咳嗽问诊
 - ✓ 一、干咳与有痰表现
 - ✓ 选择咳嗽类型
 - ✓ 干咳 (KSG)
 - ✓ 询问有无血丝
 - 有血丝 (KSGA)
 - 无血丝 (KSGB)
 - ✓ 询问夜间咳嗽是否加重
 - 是 (KSGC)
 - 否
 - ✓ 询问是否阵发性、刺激性呛咳
 - 是 (KSGC)
 - 否
 - ✓ 询问生气时干咳是否严重
 - 是 (KSGE)

- 否
- ✓ 咳痰发白色 (KSB)
 - ✓ 询问痰的性质
 - ✓ 痰清稀 (KSBA)
 - ✓ 询问咳嗽声音是否沉闷
 - 是 (KSBF)
 - ✓ 痰成块 (KSBB)
 - ✓ 询问咳嗽声音是否沉闷
 - 是 (KSBF)
 - ✓ 痰粘不易咳出 (KSBC)
 - ✓ 询问咳嗽声音是否沉闷
 - 是 (KSBF)
- ✓ 咳痰发黄色 (KSH)
 - ✓ 询问痰是否有臭味
 - ✓ 有臭味 (KSHA)
 - ✓ 询问咳嗽声音是否响亮
 - 是 (KSHB)
 - 无臭味
- ✓ 咳痰发青绿色 (KSL)
 - ✓ 询问痰是否有臭味
 - 有臭味 (KSLA)
 - 无臭味
- ✓ 二、咳嗽咽喉表现
 - ✓ 询问是否咽痒而咳 (KSY)
 - 是 (KSBF)
- ✓ 三、咽喉红肿表现
 - ✓ 询问是否咽部红肿 (KSZ)

- 是 (KSBF)
- ✓ 寒热问诊 (BHR)
 - ✓ 问整体怕冷发热情况
 - ✓ 整体怕冷BHR1
 - 程度较轻BHR1A
 - 程度较重BHR1B
 - ✓ 整体怕热BHR2
 - 程度较轻BHR2A
 - 程度较重BHR2B
 - ✓ 局部怕热
 - 心胸烦热BHR3、头发热BHR4、胃脘热BHR5、腹部热BHR6、手心发热BHR7、脚心发热BHR8
 - ✓ 局部怕冷
 - 头怕冷BHR10、胃脘怕冷BHR11、腹部怕冷BHR12、手怕冷BHR13、脚怕冷BHR14、腰怕冷BHR15、背怕冷BHR16、膝盖怕冷BHR17、牙齿怕冷BHR18
 - 追加问诊：夜尿多、小便清长
 - ✓ 问特别冷热情况
 - ✓ 忽冷忽热BHR21
 - 程度较轻BHR21A
 - 程度较重BHR21B
 - 追加问诊：胁肋胀满（轻重）、胸闷（轻重）
 - ✓ 潮热
 - 午后潮热BHR22、傍晚潮热BHR23、夜间潮热BHR24
 - 怕冷同时发热BHR25
 - ✓ 口渴与喝水 (BKH)
 - ✓ 口渴状态
 - ✓ 口不渴BKH1

- 程度较轻BKH1A
- 程度较重BKH1B
- ✓ □渴喜喝热水BKH2
 - 程度较轻BKH2A
 - 程度较重BKH2B
- ✓ 上面两条确认一条就追加问诊：夜尿多、小便清长
 - ✓ 夜尿多PYX1
 - 较轻PYX1A
 - 较重PYX1B
 - ✓ 小便清长PYX2
 - 较轻PYX2A
 - 较重PYX2B
- ✓ □渴喜喝凉水BKH3
 - 程度较轻BKH3A
- ✓ 程度较重BKH3B
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 小便黄赤有热PSR1
 - 较轻PSR1A
 - 较重PSR1B
 - ✓ 气喘粗有热PSR2
 - 较轻PSR2A
 - 较重PSR2B
- ✓ □渴不欲饮BKH4
 - 程度较轻BKH4A
- ✓ 程度较重BKH4B
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 湿疹PSD1

- 较轻PSD1A
 - 较重PSD1B
- ✓ 脚臭PSD2
 - 较轻PSD2A
 - 较重PSD2B
- ✓ 小便混浊有热PSD3
 - 较轻PSD3A
 - 较重PSD3B
- ✓ 小便黄赤有热PSR1
 - 较轻PSR1A
 - 较重PSR1B
- ✓ 小便热痛PXR5
 - 较轻PXR5A
 - 较重PXR5B
- ✓ 口中状况 (BKZ)
 - ✓ 口中异味
 - ✓ 口苦BKZ1
 - 程度较轻BKZ1A
 - 程度较重BKZ1B
 - ✓ 口臭BKZ2
 - 程度较轻BKZ2A
 - 程度较重BKZ2B
 - ✓ 口酸BKZ3
 - 程度较轻BKZ3A
 - 程度较重BKZ3B
 - ✓ 以上这三条确定一条就追加问诊
 - ✓ 偏头痛PQZ3

- 较轻PQZ3A
- 较重PQZ3B
- ✓ 腹胀想放屁放不出来PQZ5
 - 较轻PQZ5A
 - 较重PQZ5B
- ✓ 呃逆暖气PQN1
 - 较轻PQN1A
 - 较重PQN1B
- ✓ 胁肋胀满PQZ1
 - 较轻PQZ1A
 - 较重PQZ1B
- ✓ 胃脘胀满疼痛，拒按PSJ1
 - 较轻PSJ1A
 - 较重PSJ1B
- ✓ 呃逆暖气PQN1
 - 较轻PQN1A
 - 较重PQN1B
- ✓ 上腹部（心口窝）顶得慌PSJ2
 - 较轻PSJ2A
 - 较重PSJ2B
- ✓ 矢气奇臭PSJ3
 - 较轻PSJ3A
 - 较重PSJ3B
- ✓ 口咸BKZ4
 - 程度较轻BKZ4A
- ✓ 程度较重BKZ4B
- ✓ 追加问诊

- ✓ 皮肤干燥PYW1
 - 较轻PYW1A
 - 较重PYW1B
- ✓ 心胸烦热PYW2
 - 较轻PYW2A
 - 较重PYW2B
- ✓ 耳鸣如蝉PYW3
 - 较轻PYW3A
 - 较重PYW3B
- ✓ 多梦PYW4
 - 较轻PYW4A
 - 较重PYW4B
- ✓ 口甜BKZ5
 - 程度较轻BKZ5A
 - 程度较重BKZ5B
- ✓ 口涩BKZ6
 - 程度较轻BKZ6A
 - 程度较重BKZ6B
- ✓ 口淡无味BKZ7
 - 程度较轻BKZ7A
 - 程度较重BKZ7B
- ✓ 口中水多与口咽干燥
 - ✓ 口中水多BKZ8
 - 程度较轻BKZ8A
 - ✓ 程度较重BKZ8B
- ✓ 追加问诊
 - ✓ 肚子大PSQ1

- 较轻PSQ1A
 - 较重PSQ1B
- ✓ 沉重PSQ2
 - 较轻PSQ2A
 - 较重PSQ2B
- ✓ 局部肿胀PSQ3
 - 较轻PSQ3A
 - 较重PSQ3B
- ✓ 晨僵PSQ4
 - 较轻PSQ4A
 - 较重PSQ4B
- ✓ 口咽干燥BKZ9
 - 程度较轻BKZ9A
- ✓ 程度较重BKZ9B
- ✓ 追加问诊
 - ✓ 小便黄赤有热PSR1
 - 较轻PSR1A
 - 较重PSR1B
 - ✓ 气喘粗有热PSR2
 - 较轻PSR2A
 - 较重PSR2B
- ✓ 口中粘腻BKZ10
 - 程度较轻BKZ10A
- ✓ 程度较重BKZ10B
- ✓ 追加问诊
 - ✓ 湿疹PSD1
 - 较轻PSD1A

- 较重PSD1B
- ✓ 脚臭PSD2
 - 较轻PSD2A
 - 较重PSD2B
- ✓ 小便混浊有热PSD3
 - 较轻PSD3A
 - 较重PSD3B
- ✓ 小便黄赤有热PSR1
 - 较轻PSR1A
 - 较重PSR1B
- ✓ 小便热痛PXR5
 - 较轻PXR5A
 - 较重PXR5B
- ✓ 大便情况（BDB）
 - ✓ 便秘
 - ✓ 大便干结BDB1
 - 程度较轻BDB1A
 - ✓ 程度较重BDB1B
 - ✓ 脐周或腹部疼痛，拒按PCJ1
 - 较轻PCJ1A
 - 较重PCJ1B
 - ✓ 大便稀溏BDB2
 - 肛门不热BDB2A
 - 肛门灼热BDB2B
 - ✓ 先干后稀BDB3
 - 肛门不热BDB3A
 - 肛门灼热BDB3B

✓ 时干时稀BDB4

- 肛门不热BDB4A
- 肛门灼热BDB4B
- 以上四条确定一条就追加问诊
 - 1、咳嗽PQN2---较轻PQN2A，较重PQN2B---痰白PQN2C，痰黄PQN2D，说不清楚PQN2E
 - 2、气喘PQN3---较轻PQN3A，较重PQN3B
- 最后三条有一条确定肛门灼热时就追加问诊：
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B

✓ 腹泻

✓ 五更泻BDB5

- 肛门不热BDB5A
- 肛门灼热BDB5B

✓ 完谷不化BDB6

- 肛门不热BDB6A
- 肛门灼热BDB6B

✓ 稀溏粘腻BDB7

- 肛门不热BDB7A
- 肛门灼热BDB7B
- 以上这三条确定一条就追加问诊：
 - 1、夜尿多PYX1---较轻PYX1A，较重PYX1B
 - 2、小便清长PYX2---较轻PYX2A，较重PYX2B

✓ 大便不成形

- 不粘腻BDB8
- 粘腻不发热BDB9
- ✓ 粘腻发热BDB10

- 追加问诊：
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B
- ✓ 排便不适
 - ✓ 便意频频BDB11
 - 程度较轻BDB11A
 - 程度较重BDB11B
 - ✓ 排便不净BDB12
 - 程度较轻BDB12A
 - 程度较重BDB12B
 - 以上两条确定一条就追加问诊：
 - 1、肛门下坠PQX2---较轻PQX2A，较重PQX2B
 - 2、肛门下坠PQX3---较轻PQX3A，较重PQX3B
- ✓ 专问
 - ✓ 男子特定问诊（BNZ，适合16-65岁男子）
 - ✓ 阳痿
 - ✓ 遇热阳痿BNZ1
 - 程度较轻BNZ1A
 - ✓ 程度较重BNZ1B
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B
 - ✓ 阳痿与热无关BNZ2
 - 程度较轻BNZ2A
 - ✓ 程度较重BNZ2B

- 男子阴头寒PYX4---较轻PYX4A，较重PYX4B

✓ 早泄

✓ 遇热早泄BNZ3

- 程度较轻BNZ3A

✓ 程度较重BNZ3B

- 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
- 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
- 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
- 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
- 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B

✓ 早泄与热无关BNZ4

- 程度较轻BNZ4A
- 程度较重BNZ4B

✓ 遗精

✓ 遇热遗精BNZ5

- 程度较轻BNZ5A

✓ 程度较重BNZ5B

- 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
- 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
- 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
- 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
- 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B

✓ 遗精与热无关BNZ6

- 程度较轻BNZ6A
- 程度较重BNZ6B

✓ 精少BNZ7

- 程度较轻BNZ7A

✓ 程度较重BNZ7B

- 1、皮肤干燥PYW1---较轻PYW1A，较重PYW1B
- 2、心胸烦热PYW2---较轻PYW2A，较重PYW2B
- 3、耳鸣如蝉PYW3---较轻PYW3A，较重PYW3B
- 4、多梦PYW4---较轻PYW4A，较重PYW4B

✓ 睾丸不适

✓ 睾丸胀BNZ8

- 程度较轻BNZ8A
- 程度较重BNZ8B

✓ 睾丸胀痛BNZ9

- 程度较轻BNZ9A
- 程度较重BNZ9B

• 以上两条确定一条就追加问诊：

- 1、胁肋胀满PQZ1---较轻PQZ1A，较重PQZ1B
- 2、胸闷PQZ2---较轻PQZ2A，较重PQZ2B
- 3、偏头痛PQZ3---较轻PQZ3A，较重PQZ3B
- 4、咽部异物感PQZ4---较轻PQZ4A，较重PQZ4B

✓ 睾丸热痛BNZ10

- 程度较轻BNZ10A

✓ 程度较重BNZ10B

- 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
- 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
- 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
- 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
- 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B

✓ 女子特定问诊（BNV，适合15-50岁女子）

✓ 月经周期

- 月经先期BNV1
- 月经后期BNV2
- 先后不定期BNV3

✓ 月经多少

- ✓ 量多时间长BNV4
 - 程度较轻
 - 程度较重
- ✓ 量少时间短BNV5
 - 程度较轻
 - ✓ 程度较重
 - 1、皮肤干燥PYW1---较轻PYW1A, 较重PYW1B
 - 2、心胸烦热PYW2---较轻PYW2A, 较重PYW2B
 - 3、耳鸣如蝉PYW3---较轻PYW3A, 较重PYW3B
 - 4、多梦PYW4---较轻PYW4A, 较重PYW4B
- ✓ 月经颜色
 - 淡红BNV6
 - 深红BNV7
 - ✓ 紫暗BNV8
 - 1、皮下瘀斑（按之疼痛）PXY1---较轻PXY1A, 较重PXY1B
 - 2、皮肤甲错PXY2---较轻PXY2A, 较重PXY2B
 - 3、口唇紫暗PXY3---较轻PXY3A, 较重PXY3B
- ✓ 带下情况
 - 带下清晰量多BNV9
 - 带下黄稠BNV10
 - 带下红白相间BNV11
 - 最后两条确认一条就追问：
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A, 较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A, 较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A, 较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A, 较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A, 较重PXR5B
- ✓ 乳房不适
 - 乳房胀BNV12
 - 乳房胀痛BNV13

- 乳房增生BNV14
- 上面的三条均问轻重程度（确认一条就追问）：
 - 1、胁肋胀满PQZ1---较轻PQZ1A，较重PQZ1B
 - 2、胸闷PQZ2---较轻PQZ2A，较重PQZ2B
 - 3、偏头痛PQZ3---较轻PQZ3A，较重PQZ3B
 - 4、咽部异物感PQZ4---较轻PQZ4A，较重PQZ4B

✓ 失眠问诊

✓ 一、入睡困难情况

✓ 有困意入睡困难（BSM1）

- 程度较轻（BSM1A）
- 程度较重（BSM1B）

✓ 无困意入睡困难（BSM2）

- 程度较轻（BSM2A）
- 程度较重（BSM2B）

✓ 以上两条确定一条就追加问诊

✓ 皮肤红疹（PXR1）

- 较轻（PXR1A）
- 较重（PXR1B）

✓ 皮肤痤疮红肿（PXR2）

- 较轻（PXR2A）
- 较重（PXR2B）

✓ 心烦夜间加重（PXR3）

- 较轻（PXR3A）
- 较重（PXR3B）

✓ 各种出血（鲜红发热）（PXR4）

- 较轻（PXR4A）
- 较重（PXR4B）

✓ 小便热痛（PXR5）

- 较轻 (PXR5A)
- 较重 (PXR5B)
- ✓ 二、睡后易醒
 - ✓ 11-1点易醒 (BSM3)
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 皮肤红疹 (PXR1)
 - 较轻 (PXR1A)
 - 较重 (PXR1B)
 - ✓ 皮肤痤疮红肿 (PXR2)
 - 较轻 (PXR2A)
 - 较重 (PXR2B)
 - ✓ 心烦夜间加重 (PXR3)
 - 较轻 (PXR3A)
 - 较重 (PXR3B)
 - ✓ 各种出血 (鲜红发热) (PXR4)
 - 较轻 (PXR4A)
 - 较重 (PXR4B)
 - ✓ 小便热痛 (PXR5)
 - 较轻 (PXR5A)
 - 较重 (PXR5B)
 - ✓ 1-3点易醒 (BSM4)
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 皮肤红疹 (PXR1)
 - 较轻 (PXR1A)
 - 较重 (PXR1B)
 - ✓ 皮肤痤疮红肿 (PXR2)
 - 较轻 (PXR2A)

- 较重 (PXR2B)
- ✓ 心烦夜间加重 (PXR3)
 - 较轻 (PXR3A)
 - 较重 (PXR3B)
- ✓ 各种出血 (鲜红发热) (PXR4)
 - 较轻 (PXR4A)
 - 较重 (PXR4B)
- ✓ 小便热痛 (PXR5)
 - 较轻 (PXR5A)
 - 较重 (PXR5B)
- 3-5点易醒 (BSM5)
- 不定时易醒 (BSM6)
- ✓ 三、心脏相关问诊
 - ✓ 触发条件: IF(MBJD=1,1,0)
 - 结代脉用代码MBJD表示:
结代脉具体计算: 观察15个脉搏, 取两个最大的脉搏时间间隔做最平均值, 用代码LMB2表示; 同时取两个最小的脉搏时间间隔做最平均值, 用代码LMB3表示; 差值LMB4=LMB2-LMB3,
MBJD=IF(LMB4>LMB3/4,1,0))
 - ✓ 主要症状
 - ✓ 心悸 (PXZ1)
 - 较轻 (PXZ1A)
 - 较重 (PXZ1B)
 - ✓ 心中各类疼痛
 - ✓ 闷痛 (PXZ2)
 - 较轻 (PXZ2A)
 - 较重 (PXZ2B)
 - ✓ 刺痛 (PXZ3)

- 较轻 (PXZ3A)
 - 较重 (PXZ3B)
- ✓ 冷痛 (PXZ4)
 - 较轻 (PXZ4A)
 - 较重 (PXZ4B)
- ✓ 胀痛 (PXZ5)
 - 较轻 (PXZ5A)
 - 较重 (PXZ5B)
- ✓ 胸闷 (PQZ2)
 - 较轻 (PQZ2A)
 - 较重 (PQZ2B)
- ✓ 四、血热相关问诊
 - 触发条件: IF(OR(LSZ5=1,LSZ8=1,LSZ9=1),1,0)
- ✓ 追加问诊
 - ✓ 皮肤红疹 (PXR1)
 - 较轻 (PXR1A)
 - 较重 (PXR1B)
 - ✓ 皮肤痤疮红肿 (PXR2)
 - 较轻 (PXR2A)
 - 较重 (PXR2B)
 - ✓ 心烦夜间加重 (PXR3)
 - 较轻 (PXR3A)
 - 较重 (PXR3B)
 - ✓ 各种出血 (鲜红发热) (PXR4)
 - 较轻 (PXR4A)
 - 较重 (PXR4B)
 - ✓ 小便热痛 (PXR5)

- 较轻 (PXR5A)
- 较重 (PXR5B)
- ✓ 大便情况 (BDB)
 - ✓ 便秘
 - ✓ 大便干结BDB1
 - 程度较轻BDB1A
 - ✓ 程度较重BDB1B
 - ✓ 脐周或腹部疼痛，拒按PCJ1
 - 较轻PCJ1A
 - 较重PCJ1B
 - ✓ 大便稀溏BDB2
 - 肛门不热BDB2A
 - 肛门灼热BDB2B
 - ✓ 先干后稀BDB3
 - 肛门不热BDB3A
 - 肛门灼热BDB3B
 - ✓ 时干时稀BDB4
 - 肛门不热BDB4A
 - 肛门灼热BDB4B
 - 以上四条确定一条就追加问诊
 - 1、咳嗽PQN2---较轻PQN2A，较重PQN2B---痰白PQN2C，痰黄PQN2D，说不清楚PQN2E
 - 2、气喘PQN3---较轻PQN3A，较重PQN3B
 - 最后三条有一条确定肛门灼热时就追加问诊：
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B

- ✓ 腹泻
 - ✓ 五更泻BDB5
 - 肛门不热BDB5A
 - 肛门灼热BDB5B
 - ✓ 完谷不化BDB6
 - 肛门不热BDB6A
 - 肛门灼热BDB6B
 - ✓ 稀溏粘腻BDB7
 - 肛门不热BDB7A
 - 肛门灼热BDB7B
 - 以上这三条确定一条就追加问诊：
 - 1、夜尿多PYX1---较轻PYX1A，较重PYX1B
 - 2、小便清长PYX2---较轻PYX2A，较重PYX2B
- ✓ 大便不成形
 - 不粘腻BDB8
 - 粘腻不发热BDB9
 - ✓ 粘腻发热BDB10
 - 追加问诊：
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B
- ✓ 排便不适
 - ✓ 便意频频BDB11
 - 程度较轻BDB11A
 - 程度较重BDB11B
 - ✓ 排便不净BDB12
 - 程度较轻BDB12A

- 程度较重BDB12B
- 以上两条确定一条就追加问诊：
 - 1、肛门下坠PQX2---较轻PQX2A，较重PQX2B
 - 2、肛门下坠PQX3---较轻PQX3A，较重PQX3B
- ✓ 寒热问诊（BHR）
 - ✓ 问整体怕冷发热情况
 - ✓ 整体怕冷BHR1
 - 程度较轻BHR1A
 - 程度较重BHR1B
 - ✓ 整体怕热BHR2
 - 程度较轻BHR2A
 - 程度较重BHR2B
 - ✓ 局部怕热
 - 心胸烦热BHR3、头发热BHR4、胃脘热BHR5、腹部热BHR6、手心发热BHR7、脚心发热BHR8
 - ✓ 局部怕冷
 - 头怕冷BHR10、胃脘怕冷BHR11、腹部怕冷BHR12、手怕冷BHR13、脚怕冷BHR14、腰怕冷BHR15、背怕冷BHR16、膝盖怕冷BHR17、牙齿怕冷BHR18
 - 追加问诊：夜尿多、小便清长
 - ✓ 问特别冷热情况
 - ✓ 忽冷忽热BHR21
 - 程度较轻BHR21A
 - 程度较重BHR21B
 - 追加问诊：胁肋胀满（轻重）、胸闷（轻重）
 - ✓ 潮热
 - 午后潮热BHR22、傍晚潮热BHR23、夜间潮热BHR24
 - 怕冷同时发热BHR25

- ✓ 口渴与喝水 (BKH)
 - ✓ 口渴状态
 - ✓ 口不渴BKH1
 - 程度较轻BKH1A
 - 程度较重BKH1B
 - ✓ 口渴喜喝热水BKH2
 - 程度较轻BKH2A
 - 程度较重BKH2B
 - ✓ 上面两条确认一条就追加问诊：夜尿多、小便清长
 - ✓ 夜尿多PYX1
 - 较轻PYX1A
 - 较重PYX1B
 - ✓ 小便清长PYX2
 - 较轻PYX2A
 - 较重PYX2B
 - ✓ 口渴喜喝凉水BKH3
 - 程度较轻BKH3A
 - ✓ 程度较重BKH3B
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 小便黄赤有热PSR1
 - 较轻PSR1A
 - 较重PSR1B
 - ✓ 气喘粗有热PSR2
 - 较轻PSR2A
 - 较重PSR2B
 - ✓ 口渴不欲饮BKH4
 - 程度较轻BKH4A

- ✓ 程度较重BKH4B
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 湿疹PSD1
 - 较轻PSD1A
 - 较重PSD1B
 - ✓ 脚臭PSD2
 - 较轻PSD2A
 - 较重PSD2B
 - ✓ 小便混浊有热PSD3
 - 较轻PSD3A
 - 较重PSD3B
 - ✓ 小便黄赤有热PSR1
 - 较轻PSR1A
 - 较重PSR1B
 - ✓ 小便热痛PXR5
 - 较轻PXR5A
 - 较重PXR5B
- ✓ 口中状况（BKZ）
 - ✓ 口中异味
 - ✓ 口苦BKZ1
 - 程度较轻BKZ1A
 - 程度较重BKZ1B
 - ✓ 口臭BKZ2
 - 程度较轻BKZ2A
 - 程度较重BKZ2B
 - ✓ 口酸BKZ3
 - 程度较轻BKZ3A

- 程度较重BKZ3B
- ✓ 以上这三条确定一条就追加问诊
 - ✓ 偏头痛PQZ3
 - 较轻PQZ3A
 - 较重PQZ3B
 - ✓ 腹胀想放屁放不出来PQZ5
 - 较轻PQZ5A
 - 较重PQZ5B
 - ✓ 呃逆暖气PQN1
 - 较轻PQN1A
 - 较重PQN1B
 - ✓ 胁肋胀满PQZ1
 - 较轻PQZ1A
 - 较重PQZ1B
 - ✓ 胃脘胀满疼痛，拒按PSJ1
 - 较轻PSJ1A
 - 较重PSJ1B
 - ✓ 呃逆暖气PQN1
 - 较轻PQN1A
 - 较重PQN1B
 - ✓ 上腹部（心口窝）顶得慌PSJ2
 - 较轻PSJ2A
 - 较重PSJ2B
 - ✓ 矢气奇臭PSJ3
 - 较轻PSJ3A
 - 较重PSJ3B
- ✓ 口咸BKZ4

- 程度较轻BKZ4A
- ✓ 程度较重BKZ4B
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 皮肤干燥PYW1
 - 较轻PYW1A
 - 较重PYW1B
 - ✓ 心胸烦热PYW2
 - 较轻PYW2A
 - 较重PYW2B
 - ✓ 耳鸣如蝉PYW3
 - 较轻PYW3A
 - 较重PYW3B
 - ✓ 多梦PYW4
 - 较轻PYW4A
 - 较重PYW4B
- ✓ □甜BKZ5
 - 程度较轻BKZ5A
 - 程度较重BKZ5B
- ✓ □涩BKZ6
 - 程度较轻BKZ6A
 - 程度较重BKZ6B
- ✓ □淡无味BKZ7
 - 程度较轻BKZ7A
 - 程度较重BKZ7B
- ✓ □中水多与口咽干燥
 - ✓ □中水多BKZ8
 - 程度较轻BKZ8A

- ✓ 程度较重BKZ8B
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 肚子大PSQ1
 - 较轻PSQ1A
 - 较重PSQ1B
 - ✓ 沉重PSQ2
 - 较轻PSQ2A
 - 较重PSQ2B
 - ✓ 局部肿胀PSQ3
 - 较轻PSQ3A
 - 较重PSQ3B
 - ✓ 晨僵PSQ4
 - 较轻PSQ4A
 - 较重PSQ4B
- ✓ 口咽干燥BKZ9
 - 程度较轻BKZ9A
 - ✓ 程度较重BKZ9B
 - ✓ 追加问诊
 - ✓ 小便黄赤有热PSR1
 - 较轻PSR1A
 - 较重PSR1B
 - ✓ 气喘粗有热PSR2
 - 较轻PSR2A
 - 较重PSR2B
- ✓ 口中粘腻BKZ10
 - 程度较轻BKZ10A
 - ✓ 程度较重BKZ10B

- ✓ 追加问诊
 - ✓ 湿疹PSD1
 - 较轻PSD1A
 - 较重PSD1B
 - ✓ 脚臭PSD2
 - 较轻PSD2A
 - 较重PSD2B
 - ✓ 小便混浊有热PSD3
 - 较轻PSD3A
 - 较重PSD3B
 - ✓ 小便黄赤有热PSR1
 - 较轻PSR1A
 - 较重PSR1B
 - ✓ 小便热痛PXR5
 - 较轻PXR5A
 - 较重PXR5B
- ✓ 出汗情况 (BCH)
 - ✓ 从不出汗BCH1
 - 程度较轻BCH1A
 - ✓ 程度较重BCH1B
 - 1、皮肤瘙痒PFE1---较轻PFE1A, 较重PFE1B
 - 2、肢体麻木, 如有蚁行PFE2---较轻PFE2A, 较重PFE2B
 - 3、游走性疼痛PFE3---较轻PFE3A, 较重PFE3B
- ✓ 自汗BCH2
 - 不粘腻BCH2A
 - 粘腻BCH2B
- ✓ 盗汗BCH3
 - 不粘腻BCH3A

- 粘腻BCH3B
- 上两条确定一条就追加问诊
 - 1、汗后心慌PHS1---较轻PHS1A, 较重PHS1B
 - 2、遗尿PHS2---较轻PHS2A, 较重PHS2B
 - 3、出血不热PQX6---较轻PQX6A, 较重PQX6B
 - 4、皮肤红疹PXR1---较轻PXR1A, 较重PXR1B
 - 5、皮肤痤疮红肿PXR2---较轻PXR2A, 较重PXR2B
 - 6、心烦夜间加重PXR3---较轻PXR3A, 较重PXR3B
 - 7、各种出血（鲜红发热）PXR4---较轻PXR4A, 较重PXR4B
 - 8、小便热痛PXR5---较轻PXR5A, 较重PXR5B
- ✓ 局部有汗
 - 腋下有汗BCH4（不粘腻BCH4A, 粘腻BCH4B）
 - 阴部有汗BCH5（不粘腻BCH5A, 粘腻BCH5B）
 - 上两条有一条确定就追加问诊：
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A, 较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A, 较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A, 较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A, 较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A, 较重PXR5B
- ✓ 头汗BCH6（不粘腻BCH6A, 粘腻BCH6B）
 - 确认就追加问诊
 - 1、汗后心慌PHS1---较轻PHS1A, 较重PHS1B
 - 2、遗尿PHS2---较轻PHS2A, 较重PHS2B
 - 3、出血不热PQX6---较轻PQX6A, 较重PQX6B
- ✓ 半身出汗BCH7（不粘腻BCH7A, 粘腻BCH7B）
 - 确认就追加问诊
 - 1、胁肋胀满PQZ1---较轻PQZ1A, 较重PQZ1B
 - 2、胸闷PQZ2---较轻PQZ2A, 较重PQZ2B
 - 3、偏头痛PQZ3---较轻PQZ3A, 较重PQZ3B
 - 4、咽部异物感PQZ4---较轻PQZ4A, 较重PQZ4B
- ✓ 劳累乏力（BFL）
 - ✓ 神疲乏力情况
 - ✓ 劳累加重BFL1

- 程度较轻BFL1A
- 程度较重BFL1B
- ✓ 遇湿加重BFL2
 - 程度较轻BFL2A
 - 程度较重BFL2B
- ✓ 遇热加重BFL3
 - 程度较轻BFL3A
 - ✓ 程度较重BFL3B
 - 追加问诊：
 - 1、肚子大PSQ1---较轻PSQ1A，较重PSQ1B
 - 2、沉重PSQ2---较轻PSQ2A，较重PSQ2B
 - 3、局部肿胀PSQ3---较轻PSQ3A，较重PSQ3B
 - 4、晨僵PSQ4---较轻PSQ4A，较重PSQ4B
- ✓ 生气发生BFL4
 - 程度较轻BFL4A
 - ✓ 程度较重BFL4B
 - 追加问诊：
 - 1、胁肋胀满PQZ1---较轻PQZ1A，较重PQZ1B
 - 2、胸闷PQZ2---较轻PQZ2A，较重PQZ2B
 - 3、偏头痛PQZ3---较轻PQZ3A，较重PQZ3B
 - 4、咽部异物感PQZ4---较轻PQZ4A，较重PQZ4B
- ✓ 少气懒言、易感冒
 - ✓ 少气懒言BFL5
 - 程度较轻BFL5A
 - 程度较重BFL5B
 - ✓ 易感冒BFL6
 - 程度较轻BFL6A
 - 程度较重BFL6B
- 以上所有条确定一条就追加问诊：
出血不热PQX4---较轻PQX4A，较重PQX4B

✓ 专问

✓ 男子特定问诊（BNZ，适合16-65岁男子）

✓ 阳痿

✓ 遇热阳痿BNZ1

- 程度较轻BNZ1A

✓ 程度较重BNZ1B

- 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
- 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
- 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
- 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
- 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B

✓ 阳痿与热无关BNZ2

- 程度较轻BNZ2A

✓ 程度较重BNZ2B

- 男子阴头寒PYX4---较轻PYX4A，较重PYX4B

✓ 早泄

✓ 遇热早泄BNZ3

- 程度较轻BNZ3A

✓ 程度较重BNZ3B

- 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
- 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
- 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
- 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
- 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B

✓ 早泄与热无关BNZ4

- 程度较轻BNZ4A
- 程度较重BNZ4B

✓ 遗精

✓ 遇热遗精BNZ5

- 程度较轻BNZ5A
- ✓ 程度较重BNZ5B
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B
- ✓ 遗精与热无关BNZ6
 - 程度较轻BNZ6A
 - 程度较重BNZ6B
- ✓ 精少BNZ7
 - 程度较轻BNZ7A
 - ✓ 程度较重BNZ7B
 - 1、皮肤干燥PYW1---较轻PYW1A，较重PYW1B
 - 2、心胸烦热PYW2---较轻PYW2A，较重PYW2B
 - 3、耳鸣如蝉PYW3---较轻PYW3A，较重PYW3B
 - 4、多梦PYW4---较轻PYW4A，较重PYW4B
- ✓ 睾丸不适
 - ✓ 睾丸胀BNZ8
 - 程度较轻BNZ8A
 - 程度较重BNZ8B
 - ✓ 睾丸胀痛BNZ9
 - 程度较轻BNZ9A
 - 程度较重BNZ9B
 - 以上两条确定一条就追加问诊：
 - 1、胁肋胀满PQZ1---较轻PQZ1A，较重PQZ1B
 - 2、胸闷PQZ2---较轻PQZ2A，较重PQZ2B
 - 3、偏头痛PQZ3---较轻PQZ3A，较重PQZ3B
 - 4、咽部异物感PQZ4---较轻PQZ4A，较重PQZ4B
- ✓ 睾丸热痛BNZ10

- 程度较轻BNZ10A
- ✓ 程度较重BNZ10B
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A, 较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A, 较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A, 较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A, 较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A, 较重PXR5B
- ✓ 女子特定问诊 (BNV, 适合15-50岁女子)
 - ✓ 月经周期
 - 月经先期BNV1
 - 月经后期BNV2
 - 先后不定期BNV3
 - ✓ 月经多少
 - ✓ 量多时间长BNV4
 - 程度较轻
 - 程度较重
 - ✓ 量少时间短BNV5
 - 程度较轻
 - ✓ 程度较重
 - 1、皮肤干燥PYW1---较轻PYW1A, 较重PYW1B
 - 2、心胸烦热PYW2---较轻PYW2A, 较重PYW2B
 - 3、耳鸣如蝉PYW3---较轻PYW3A, 较重PYW3B
 - 4、多梦PYW4---较轻PYW4A, 较重PYW4B
 - ✓ 月经颜色
 - 淡红BNV6
 - 深红BNV7
 - ✓ 紫暗BNV8
 - 1、皮下瘀斑 (按之疼痛) PXY1---较轻PXY1A, 较重PXY1B
 - 2、皮肤甲错PXY2---较轻PXY2A, 较重PXY2B
 - 3、口唇紫暗PXY3---较轻PXY3A, 较重PXY3B

✓ 带下情况

- 带下清晰量多BNV9
- 带下黄稠BNV10
- 带下红白相间BNV11
- 最后两条确认一条就追问：
 - 1、湿疹PSD1---较轻PSD1A，较重PSD1B
 - 2、脚臭PSD2---较轻PSD2A，较重PSD2B
 - 3、小便混浊有热PSD3---较轻PSD3A，较重PSD3B
 - 4、小便黄赤有热PSR1---较轻PSR1A，较重PSR1B
 - 5、小便热痛PXR5---较轻PXR5A，较重PXR5B

✓ 乳房不适

- 乳房胀BNV12
- 乳房胀痛BNV13
- 乳房增生BNV14
- 上面的三条均问轻重程度（确认一条就追问）：
 - 1、胁肋胀满PQZ1---较轻PQZ1A，较重PQZ1B
 - 2、胸闷PQZ2---较轻PQZ2A，较重PQZ2B
 - 3、偏头痛PQZ3---较轻PQZ3A，较重PQZ3B
 - 4、咽部异物感PQZ4---较轻PQZ4A，较重PQZ4B

✓ 慢性疲劳问诊

✓ 时间及寒热感觉

- 询问持续时间

✓ 寒热感觉分类

- 整体怕冷（TB3A）
- 整体怕热（TB3B）
- 脘腹喜温喜按（TB3C）
- 局部肌肉怕冷（TB3G）
- 头部怕冷（TB3E）
- 手脚怕冷（TB3F）

✓ 口渴与喝水

- 口不渴 (TA3A)
- 口渴喜热饮 (TA3B)
- 口渴喜凉饮 (TA3C)
- 口干但不想喝水 (TA3D)
- 口中水多 (TA3E)
- ✓ 口味
 - 口苦 (TA4A)
 - 口臭 (TA4B)
 - 口酸 (TA4C)
 - 口涩 (TA4D)
 - 口咸 (TA4E)
 - 口淡无味 (TA4F)
 - 口甜 (TA4G)
- ✓ 饮食情况
 - 食欲不振 (TA5A)
 - 能吃 (TA5B)
 - 见食而烦 (TA5C)
- ✓ 出汗情况
 - 不出汗 (TA6A)
 - 自汗 (TA6B)
 - 盗汗 (TA6C)
- ✓ 大便情况
 - 大便稀溏不热 (TA7A)
 - 大便稀溏发热 (TA7B)
 - 大便干结 (TA7C)
 - 先干后稀 (TA7D)
 - 时干时稀 (TA7E)

- 大便带血 (TA7F)
- ✓ 小便情况
 - 小便发热发黄 (TA8A)
 - 小便清长 (TA8B)
 - 小便不利 (TA8C)
 - 小便带血发热 (TA8D)
 - 小便带血不热 (TA8E)
- ✓ 睡眠状况
 - 入睡困难 (TA9A)
 - 睡后易醒 (TA9B)
 - 嗜睡 (TA9C)
- ✓ 心烦情况
 - 白天心烦 (TA11A)
 - 夜间心烦 (TA11B)
 - 白天心烦夜间安静 (TA11C)
- ✓ **患者自主说明纯自选症状**
 - ✓ 指定位置
 - 上部位
 - 中部位
 - 下部位
 - ✓ 说明性质

- 热痛---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SRT,MRT,XRT；
冷痛---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SLT,MLT,XLT；
胀痛---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SZT,MZT,XZT；
窜痛---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SMT,MMT,XMT；
刺痛---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SCT,MCT,XCT；
酸痛---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SST,MST,XST；
痒痛---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SYT,MYT,XYT；
攻痛（剧痛）---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SGT,MGT,XGT；
游走痛---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SUT,MUT,XUT；
隐隐痛---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SYY,MY,YXY；
重痛（沉重感痛）---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SZZ,MZZ,XZZ；
掣痛（牵扯痛）---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SQT,MQT,XQT；
空痛（有空虚感）---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SKT,MKT,XKT；
绞痛---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SKK,MKK,XKK；
麻木---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SMM,MMM,XMM；
酸---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SSU,MSU,XSU；
胀---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SZH,MZH,XZH；
痒---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SYA,MYA,XYA；
闷（憋闷感）---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SME,MME,XME；
蚁走感（虫行感）---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SYE,MYE,XYE；
重坠感---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SZU,MZU,XZU；
浮肿---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SFZ,MFZ,XFZ；
红肿---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SHO,MHO,XHO；
结节---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SJJ,MJJ,XJJ；
增生---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SZE,MZE,XZE；
萎缩---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SWS,MWS,XWS；
囊肿---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SNZ,MNZ,XNZ；
红疹---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SHZ,MHZ,XHZ；
白疹---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SBZ,MBZ,XBZ；
瘀斑---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SYB,MYB,XYB；
出血有热感（鲜红）---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SCX,MCX,XCX；
出血无热感（淡红）---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SCXD,MCXD,XCX；
出汗---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SCH,MCH,XCH；
发黑---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SFH,MFH,XFH；
发黄---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SHH,MHH,XHH；
发红---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SFO,MFO,XFO；
紫黑---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SZI,MZI,XZI；

发白---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SFB,MFB,XFB；
干燥---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SGZ,MGZ,XGZ；
脱屑---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：STX,MTX,XTX；
水疱---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SSB,MSB,XSB；
脓疱---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SNP,MNP,XNP；
风团（荨麻疹）---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SFT,MFT,XFT；
皲裂---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SQL,MQL,XQL；
无力（局部乏力）---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：
SWL,MWL,XWL；
怕冷（局部畏寒）---经络辨证：(JM1-14)X；八维辨证：SPL,MPL,XPL；
发热（局部灼热）---经络辨证：(JM1-14)K；八维辨证：SFR,MFR,XFR；
僵硬（活动不利）---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SJY,MJY,XJY；
震颤（抖动）---经络辨证：(JM1-14)P；八维辨证：SZC,MZC,XZC；

✓ 判定轻重

- 较轻 -> +1
- 较重 -> +2

✓ 累计经脉/八维变量

✓ 映射最近经脉

- 亢奋 K
- 虚弱 X
- 平 P

✓ 映射八维上下中

✓ 上 S

- 胸膈以上（包括手臂）

✓ 中 M

- 肚脐和胸膈之间

✓ 下 X

- 肚脐以下

✓ 问诊结束

✓ 汇中

- 个人信息
- 主症
- 必问症状代码
- 配合自选代码
- 纯自选代码
- 舌脉代码
- ✓ 计算证型后输出
 - 病种+主症
 - 主要症状
 - 辨证结果
 - 图示
 - 调理方案
 - 产品配套