

10. Sea  $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$  una matriz de la forma  $A = I + uu^t$ , con  $u \in \mathbb{R}^n$ . Luego de realizar el primer paso de la factorización  $LU$  (eliminando la primera columna) se obtiene

$$A^{(1)} = \begin{pmatrix} a_{11}^{(1)} & A_{12}^{(1)} \\ 0 & A_{22}^{(1)} \end{pmatrix}$$

con  $A_{22}^{(1)} \in \mathbb{R}^{(n-1) \times (n-1)}$ . Demostrar:

a)  $A_{22}^{(1)} = I_{n-1} + \tilde{u}\tilde{u}^t$ , donde  $\tilde{u}^t = (u_2, \dots, u_n)/(\sqrt{1+u_1^2})$ , siendo  $I_{n-1}$  la matriz identidad de la misma dimensión que  $A_{22}^{(1)}$ .

b)  $A$  tiene factorización  $LU$  sin pivoteo, para cualquier  $u \in \mathbb{R}^n$ .

*Sugerencia: inducción en la dimensión de la matriz.*

a)  $A_{ij} = I_{ij} + u_i u_j$

$$A_{ij}^{(1)} = A_{ij} - \frac{(m_1)_i}{A_{11}} \cdot A_{1j}$$

$$= I_{ij} + u_i u_j - \frac{(I_{i1} + u_i u_1)}{(I_{11} + u_1 u_1)} \cdot (I_{1j} + u_1 u_j)$$

$i, j > 1$

$$= I_{ij} + u_i u_j - \frac{u_1^2 u_i u_j}{(1 + u_1^2)}$$

$$I_{i1} = I_{1j} = 0 \quad \forall i, j > 1$$

$$= I_{ij} + \left(1 - \frac{u_1^2}{(1 + u_1^2)}\right) \cdot u_i u_j$$

$$= I_{ij} + \frac{1}{(1 + u_1^2)} \cdot u_i u_j$$

$$1 - \frac{u_1^2}{1 + u_1^2} = \frac{1}{1 + u_1^2}$$

$$= I_{ij} + \frac{u_i}{\sqrt{1 + u_1^2}} \cdot \frac{u_j}{\sqrt{1 + u_1^2}}$$

$$= I_{ij} + \tilde{u}_i \tilde{u}_j \quad \forall i, j = 2 \dots n$$

$$\Rightarrow A_{22}^{(1)} = I_{n-1} + \tilde{u} \tilde{u}^t$$

b)

QVQ:  $A = LU$  sin pivoteo  $\forall u \in \mathbb{R}^n$

$$A^{(1)} = M_1 A = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & A_{12}^{(1)} \\ 0 & A_{22}^{(1)} \end{bmatrix}$$

$$A_{22}^{(1)} = I_{n-1} + \tilde{u} \tilde{u}^t$$

$$A_{22}^{(1)} = \tilde{L} \tilde{U} \quad \hat{L} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ l & \tilde{L} \end{bmatrix}$$

$$\hat{U} = \begin{bmatrix} u & b^t \\ 0 & \tilde{U} \end{bmatrix}$$

$$\hat{L} \hat{U} = \begin{bmatrix} u & b^t \\ ul & lb^t + \tilde{L} \tilde{U} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11}^{(1)} & A_{12}^{(1)} \\ 0 & A_{22}^{(1)} \end{bmatrix}$$

$\uparrow$   
 $\tilde{L} \tilde{U}$

$$\begin{cases} u = a_{11}^{(1)} & \Rightarrow u \neq 0 \text{ porque } a_{11}^{(1)} = I_{11} + u_1^2 = 1 + u_1^2 \geq 1 \\ b^t = A_{12}^{(1)} \\ ul = 0 & \Rightarrow l = 0 \\ lb^t + \tilde{L} \tilde{U} = \tilde{L} \tilde{U} \end{cases}$$

Podemos encontrar  $\hat{L} \hat{U} = A^{(1)} = M_1 A$

$$\Rightarrow A = \underbrace{M_1^{-1}}_L \underbrace{\hat{L} \hat{U}}_U$$

Falta caso base?