

2. Sea $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}$. Probar que son equivalentes:

- a) $Q^{-1} = Q^T$
- b) Las columnas de Q forman un conjunto ortonormal¹.
- c) Las filas de Q forman un conjunto ortonormal¹.
- d) $\|Qx\|_2 = \|x\|_2$

Interpretar (d) geométicamente.

Sugerencia: para demostrar la implicación $(d \Rightarrow b)$ usar que $x^t y = \frac{1}{4}(\|x+y\|_2^2 - \|x-y\|_2^2)$.

¹ $\{v_1, \dots, v_n\}$ con $v_i \in \mathbb{R}^n$ se dice ortonormal si $v_i^t v_j = 0$ ($\forall i \neq j$) y $v_i^t v_i = 1$ ($\forall i : 1 \leq i \leq n$).

Camino: $a \leftrightarrow b \leftrightarrow c$
 $\downarrow \quad \nearrow$
 d

a) \Leftrightarrow b) $Q^{-1} = Q^T \Leftrightarrow$ columnas de Q son ortonormales

$$Q^{-1}Q = I \quad \Leftrightarrow \quad Q^T Q = I \quad \Leftrightarrow \quad (Q^T Q)_{ij} = I_{ij}$$

$$\begin{aligned} (Q^T Q)_{ij} &= \text{Fila}_i(Q^T) \cdot \text{col}_j(Q) \\ &= \text{col}_i(Q)^T \cdot \text{col}_j(Q) \\ &= I_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{aligned} &\text{col}_i(Q)^T \cdot \text{col}_i(Q) = 1 \\ &\text{col}_i(Q)^T \cdot \text{col}_j(Q) = 0 \end{aligned} \end{aligned}$$

$\therefore Q^{-1} = Q^T \Leftrightarrow$ Las columnas de Q son ortonormales.

b) \Leftrightarrow c)

$Q^T Q$: Q columnas ortonormales \Leftrightarrow Q filas ortonormales

$$\text{col}_i(Q^T) \cdot \text{col}_j(Q) = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \forall i, j = 1 \dots n$$

$$\Leftrightarrow \text{Fil}_i(Q^T) \cdot \text{col}_j(Q) = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \forall i, j = 1 \dots n$$

$$\Leftrightarrow Q^T Q = I \quad \Leftrightarrow Q Q^T = I$$

$$\Leftrightarrow \text{Fil}_i(Q) \cdot \text{col}_j(Q^T) = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \forall i, j = 1 \dots n$$

$$\Leftrightarrow \text{Fil}_i(Q) \cdot \text{Fil}_j(Q)^T = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \quad \forall i, j = 1 \dots n$$

$\therefore Q$ columnas ortonormales $\Leftrightarrow Q$ filas ortonormales

a) \Rightarrow d) $Q^T Q = I \Rightarrow \|Qx\|_2 = \|x\|_2$

$$\|Qx\|_2^2 = (Qx)^T(Qx) = x^T \underbrace{Q^T Q}_I x = x^T x = \|x\|_2^2$$

$$\therefore \|Qx\|_2^2 = \|x\|_2^2 \Rightarrow \|Qx\|_2 = \|x\|_2$$

d) \Rightarrow b) $Q^T Q = I \Rightarrow Q$ columnas ortonormales

Sugerencia: $x^T y = \frac{1}{4}(\|x+y\|_2^2 - \|x-y\|_2^2)$

$$\begin{aligned} \text{col}_i(Q)^T \cdot \text{col}_j(Q) &= (Qe_i)^T (Qe_j) \\ &= \frac{1}{4}(\|Qe_i + Qe_j\|_2^2 - \|Qe_i - Qe_j\|_2^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|Q(e_i + e_j)\|_2^2 - \|Q(e_i - e_j)\|_2^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|e_i + e_j\|_2^2 - \|e_i - e_j\|_2^2) \end{aligned}$$

Sugerencia

$$\|Qx\|_2 = \|x\|_2$$

Caso $i=j$

$$\frac{1}{4}(\|e_i + e_i\|_2^2 - \|e_i - e_i\|_2^2) = \frac{1}{4}(4 - 0) = 1$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ &\|(\dots 2 \dots)\|_2^2 = 2^2 = 4 \\ &\qquad \qquad \|(\dots 0 \dots)\|_2^2 = 0 \end{aligned}$$

Caso $i \neq j$

$$\frac{1}{4}(\|e_i + e_j\|_2^2 - \|e_i - e_j\|_2^2) = \frac{1}{4}(2 - 2) = 0$$

$$\begin{aligned} &\downarrow \qquad \qquad \downarrow \\ &\|(\dots 1 \dots 1 \dots)\|_2^2 = 1^2 + 1^2 = 2 \\ &\qquad \qquad \|(\dots 1 \dots -1 \dots)\|_2^2 = 1^2 + (-1)^2 = 2 \end{aligned}$$

$$\therefore \text{col}_i(Q)^T \cdot \text{col}_j(Q) = \begin{cases} 1 & \text{si } i=j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases} \Rightarrow Q \text{ columnas ortonormales}$$