

Teoría de Lenguajes

Clase Teórica 3

Lema de "Pumping" y Propiedades de Lenguajes Regulares

Primer Cuatrimestre 2024

Bibliografía: Capítulo 4, *Introduction to Automata Theory, Languages and Computation*, J. Hopcroft, R. Motwani, J. Ullman, Second Edition, Addison Wesley, 2001.

Lema ("Pumping", Scott & Rabin 1959, Bar Hillel, Perles & Shamir 1961)

Sea L un lenguaje regular. Existe una longitud n tal que para toda $z \in L$ con $|z| \geq n$ existe $u, v, w \in \Sigma^$ tales que*

$$z = uvw,$$

$$|uv| \leq n,$$

$$|v| \geq 1,$$

$$\forall i \geq 0, uv^i w \in L.$$

Ejemplo

$L = \{a^k b^k : k \geq 0\}$ sobre $\Sigma = \{a, b\}$ no es regular.

Demostración.

Supongamos L es regular. Sea n la constante del Lema de Pumping. Sea $z = a^n b^n$. Por el Lema de Pumping, hay una descomposición $z = uvw$ con $|uv| \leq n$ y $|v| \geq 1$ tal que $uv^i w \in L$, para $i \geq 0$.

Usando que $|uv| \leq n$, concluimos que v consiste solamente de a 's. Más aún, como $|v| \geq 1$, v contiene al menos una a .

Ahora bombeamos v y obtenemos $uv^2 w$.

Por Lema de Pumping, $uv^2 w$ está en L .

Pero $uv^2 w$ tiene más a 's que b 's, entonces no está en L .

Llegamos a una contradicción que provino de asumir que L es regular. Por lo tanto, L no es regular. □

Ejemplo

$L = \{0^{k^2} : k \geq 1\}$ sobre $\Sigma = \{0\}$ no es regular.

Demostración.

Supongamos L es regular. Sea n la constante del Lema de Pumping. Sea $z = 0^{n^2}$. Por el Lema de Pumping, hay una descomposición $z = uvw$ con $|uv| \leq n$ y $|v| \geq 1$ tal que $uv^i w$ en L , para $i \geq 0$.

Entonces $v = 0^m$ para algun valor de m entre 1 y n . Por el Lema de Pumping, $uw = 0^{n^2-m}$ está en L .

Dado que $1 \leq m < n + 1$, y asumiendo que $n \geq 2$

$$n^2 - m > n^2 - (n + 1) \geq n^2 - (2n - 1) = n^2 - 2n + 1 = (n - 1)^2$$

Entonces $n^2 - m$ no es cuadrado perfecto y por lo tanto uw no está en L .

La contradicción que provino de asumir que L es regular. Por lo tanto, L no es regular.



Ejemplo

$L = \{w : w \text{ tiene la misma cantidad de 0s que de 1s}\}$ no es regular.

Demostración.

Supongamos L es regular. Sea n la constante del Lema de Pumping.

Sea $z = 0^n 1^n$. Por el Lema de Pumping, hay una descomposición

$z = uvw$ con $|uv| \leq n$ y $|v| \geq 1$ tal que $uv^i w \in L$, para $i \geq 0$.

Entonces v tiene exclusivamente 0s.

Luego, uw tiene distinta cantidad de 0s que de 1s.

Por lo tanto, uw no está en L .

La contradicción que provino de asumir que L es regular.



Definición (Configuración instantánea de un AFD)

Sea AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. Una configuración instantánea es un par (q, α) en $Q \times \Sigma^*$ donde q es el estado en el que está el autómata y α es la cadena de entrada aún no consumida.

Definición (Transición entre configuraciones instantáneas \vdash)

Llamamos transición a la siguiente relación sobre $Q \times \Sigma^*$:

$(q, \alpha) \vdash (p, \beta)$ si $(\delta(q, a) = p \wedge \alpha = a\beta)$.

De lo anterior tenemos que $(q, \alpha\beta) \vdash^* (p, \beta)$ si y sólo si $\delta(q, \alpha) = p$ se puede pasar del estado q al estado p consumiendo la cadena α .

Lema

Sea el AFD $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$

Para todo $q \in Q$ y $\alpha, \beta \in \Sigma^*$,

si $(q, \alpha\beta) \stackrel{*}{\vdash} (q, \beta)$ entonces $\forall i \geq 0, (q, \alpha^i\beta) \stackrel{*}{\vdash} (q, \beta)$.

Demostración.

Queremos probar, $q \in Q$ y $\alpha, \beta \in \Sigma^*$:

Si $(q, \alpha\beta) \vdash^* (q, \beta)$ entonces $\forall i \geq 0, (q, \alpha^i\beta) \vdash^* (q, \beta)$.

Fijemos $\alpha \in \Sigma^*$ y $q \in Q$. Asumamos $\forall \beta \in \Sigma^*, (q, \alpha\beta) \vdash^* (q, \beta)$.

Demostración por inducción en i .

Caso base ($i = 0$) $(q, \alpha^0\beta) \vdash^0 (q, \beta)$

Caso inductivo. Supongamos que vale para i , es decir,

Si $(q, \alpha\beta) \vdash^* (q, \beta)$ entonces $(q, \alpha^i\beta) \vdash^* (q, \beta)$.

Veamos que vale para $i + 1$.

Por definición, $(q, \alpha^{i+1}\beta) = (q, \alpha\alpha^i\beta)$

Asumimos, $(q, \alpha\alpha^i\beta) \vdash^* (q, \alpha^i\beta)$,

Por hipótesis inductiva, $(q, \alpha^i\beta) \vdash^* (q, \beta)$.


Por lo tanto, $(q, \alpha^{i+1}\beta) \vdash^* (q, \beta)$.



Demostración del Lema de Pumping para lenguajes regulares. Sea AFD M tal que $\mathcal{L}(M) = L$. Sea n su cantidad de estados. Sea z una cadena de longitud $m \geq n$, $z = a_1 \cdots a_m$.

Para aceptar z usamos m transiciones , por lo tanto $m + 1$ estados. (estado inicial, estado luego de consumir el primer símbolo, estado luego de consumir el segundo símbolo, etc). Como $m + 1 > n$, para aceptar z el autóma pasa DOS ó más veces por un mismo estado.

Sea $q_{\ell_0}, q_{\ell_1}, \dots, q_{\ell_m}$, con $q_{\ell_0} = q_0$ y q_{ℓ_m} un estado final, la sucesión de estados desde q_0 hasta aceptar z .



Existen j y k mínimos tales que $q_{\ell_j} = q_{\ell_k}$ con $0 \leq j < k \leq n$. El máximo valor posible de k es n , porque M tiene n estados distintos, entonces al recorrerlo, antes de que se repita tenemos $q_{\ell_0}, q_{\ell_1}, \dots, q_{\ell_{n-1}}$, pero necesariamente q_{ℓ_n} será repetido.

Esto determina z en tres cadenas u , v y w tales que

$$u = \begin{cases} a_1 \cdots a_j & \text{si } j > 0 \\ \lambda & \text{si } j = 0 \end{cases}$$

$$v = a_{j+1} \cdots a_k$$

$$w = \begin{cases} a_{k+1} \cdots a_m & \text{si } k < m \\ \lambda & \text{si } k = m. \end{cases}$$

Entonces,

$$|uv| \leq n$$

$$|v| \geq 1$$

$$\text{y} \quad (q_0, uvw) \stackrel{*}{\vdash} (q_{\ell_j}, vw) \stackrel{*}{\vdash} (q_{\ell_k}, w) \stackrel{*}{\vdash} (q_{\ell_m}, \lambda).$$

Pero, como $q_{\ell_j} = q_{\ell_k}$,

$$\forall i \geq 0, \quad (q_{\ell_j}, v^i w) \stackrel{*}{\vdash} (q_{\ell_j}, w) = (q_{\ell_k}, w).$$

Por lo tanto, $uv^i w \in L, \forall i \geq 0$

□.

Decidir Verdadero o Falso

Sea AFD $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$, con $|Q| = n$.

1. $\mathcal{L}(M)$ es no vacío si y solo si existe w en Σ^* tal que $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$ y $|w| < n$.

Es verdadero

2. $\mathcal{L}(M)$ es infinito si y solo si existe w en Σ^* tal que $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$ y $n \leq |w| < 2n$.

Es Verdadero

Veamos la demostración de las afirmaciones.

Demostración.

1. Debemos ver que $\mathcal{L}(M)$ es no vacío si y solo si existe w en Σ^* tal que $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$ y $|w| < n$, donde $n = |Q|$.

\Rightarrow). Supongamos $\mathcal{L}(M)$ es no vacío. Sabemos que es regular.

Sea z en $\mathcal{L}(M)$ de longitud mayor o igual a n y supongamos que no hay ninguna más corta en $\mathcal{L}(M)$.

El Lema de Pumping garantiza que hay u, v, w apropiados tal que $|v| \geq 1$, $z = uvw$ y $\forall i \geq 0$, $uv^i w$ en $\mathcal{L}(M)$.

Entonces uw está en $\mathcal{L}(M)$. Pero uw es más corta que z , lo que contradice nuestra suposición de que z era la más corta.

Concluimos que en $\mathcal{L}(M)$ hay cadenas más cortas que n .

\Leftarrow). Es obvio que L es no vacío.

2. Debemos ver que $\mathcal{L}(M)$ es infinito si y solo si existe w en Σ^* tal que $\hat{\delta}(q_0, w) \in F$ y $n \leq |w| < 2n$, donde $n = |Q|$.

\Rightarrow). Supongamos $\mathcal{L}(M)$ es infinito.

Supongamos que no hay ninguna cadena en $\mathcal{L}(M)$ de longitud entre n y $2n - 1$.

Sin pérdida de generalidad, sea z en $\mathcal{L}(M)$ de longitud $2n$ (si la longitud es otra aplica el mismo argumento, usandolo tantas veces como haga falta hasta llegar a la contradicción buscada).

Por Lema de Pumping, hay u, v, w tal que $z = uvw$, con $|uv| \leq n$, $|v| \geq 1$ y $\forall i \geq 0$ $uv^i w$ está en $\mathcal{L}(M)$. Entonces $uw \in \mathcal{L}(M)$.

Como $|uvw| = 2n$ y $1 \leq |v| \leq n$ tenemos $n \leq |uw| \leq 2n - 1$, contradiciendo que no había ninguna en $\mathcal{L}(M)$ de esta longitud.

\Leftarrow). Supongamos z pertenece a $\mathcal{L}(M)$ y $n \leq |z| < 2n$.

Por el Lema de Pumping $z = uvw$ y para todo $i \geq 0$, $uv^i w$ esta en $\mathcal{L}(M)$. Luego $\mathcal{L}(M)$ es infinito.

Teorema

El conjunto de lenguajes regulares incluido en Σ^ es cerrado respecto de la unión.*

Demostración.

Sean L_1 y L_2 lenguajes regulares. Debemos probar que $L_1 \cup L_2$ es un lenguaje regular.

Sean $M_1 = \langle Q_1, \Sigma, \delta_1, q_1, F_1 \rangle$ y $M_2 = \langle Q_2, \Sigma, \delta_2, q_2, F_2 \rangle$, donde $Q_1 \cap Q_2 = \emptyset$ tales que $L_1 = \mathcal{L}(M_1)$ y $L_2 = \mathcal{L}(M_2)$.

Definimos $M = \langle Q_1 \cup Q_2 \cup \{q_0\}, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$, con $\{q_0\} \cap Q_1 = \emptyset$ y $\{q_0\} \cap Q_2 = \emptyset$, donde

- ▶ q_0 es un nuevo estado.
- ▶ si $\lambda \notin L_1$ y $\lambda \notin L_2$ $F = F_1 \cup F_2$. Sino, $F = F_1 \cup F_2 \cup \{q_0\}$.
- ▶ $\delta(q_0, a) = \delta(q_1, a) \cup \delta(q_2, a)$.
- ▶ $\forall q \in Q_1, \forall a \in \Sigma, \delta(q, a) = \delta_1(q, a)$.
- ▶ $\forall q \in Q_2, \forall a \in \Sigma, \delta(q, a) = \delta_2(q, a)$.

El autómata M así construido es no-determinístico.

Se demuestra por inducción en el largo $i \geq 1$ de la cadena w :

$(q_0, w) \stackrel{i}{\underset{M}{\vdash}} (q, \lambda)$ si y solo si

$$\left(q \in Q_1 \wedge (q_1, w) \stackrel{i}{\underset{M_1}{\vdash}} (q, \lambda) \right) \vee \left(q \in Q_2 \wedge (q_2, w) \stackrel{i}{\underset{M_2}{\vdash}} (q, \lambda) \right).$$



Teorema

El conjunto de lenguajes regulares incluido en Σ^ es cerrado respecto de la concatenación.*

Teorema

El conjunto de lenguajes regulares incluido en Σ^ es cerrado respecto de la complemento.*

Demostración.

Sea $L \subseteq \Delta^*$ regular, con $\Delta \subseteq \Sigma$.

Sea $M = \langle Q, \Delta, \delta, q_0, F \rangle$ tal que $L = \mathcal{L}(M)$.

El AFD $M' = \langle Q, \Delta, \delta, q_0, Q - F \rangle$ acepta $\Delta^* - \mathcal{L}(M)$.

Es decir, $\mathcal{L}(M') = \Delta^* - \mathcal{L}(M)$.

En caso de que $\Delta = \Sigma$, $\overline{\mathcal{L}(M)} = \mathcal{L}(M')$,
por lo tanto es regular.

En caso de que $\Delta \subset \Sigma$, $\overline{\mathcal{L}(M)} = \mathcal{L}(M') \cup \Sigma^* (\Sigma - \Delta) \Sigma^*$,
que es la unión de dos lenguajes regulares y por lo tanto regular.



Teorema

El conjunto de lenguajes regulares incluido en Σ^ es cerrado respecto de la intersección.*

Demostración.

Sean L_1 y L_2 regulares.

$$L_1 \cap L_2 = \overline{\overline{L_1} \cap \overline{L_2}} = \overline{\overline{L_1} \cup \overline{L_2}}.$$

Dado que los lenguajes regulares están cerrados por unión y complemento, concluimos que $L_1 \cap L_2$ es regular. □

Una demostración alternativa de que el conjunto de lenguajes regulares está cerrado por intersección.

Demostración.

Dados M_1 y M_2 AFDs, definiremos M' tal que

$$\mathcal{L}(M') = \mathcal{L}(M_1) \cap \mathcal{L}(M_2).$$

Sea $M' = \langle Q', \Sigma, \delta', q'_0, F' \rangle$ con

- ▶ $Q' = Q_1 \times Q_2$
- ▶ $\delta'((q, r), a) = (\delta_1(q, a), \delta_2(r, a))$ para $q \in Q_1$ y $r \in Q_2$
- ▶ $q'_0 = (q_{0_1}, q_{0_2})$
- ▶ $F' = F_1 \times F_2$

entonces

$$\begin{aligned} \alpha \in \mathcal{L}(M') &\Leftrightarrow \widehat{\delta'}((q_{0_1}, q_{0_2}), \alpha) \in F' \\ &\Leftrightarrow \left(\widehat{\delta_1}(q_{0_1}, \alpha), \widehat{\delta_2}(q_{0_2}, \alpha) \right) \in F_1 \times F_2 \\ &\Leftrightarrow \left(\widehat{\delta_1}(q_{0_1}, \alpha) \in F_1 \right) \wedge \left(\widehat{\delta_2}(q_{0_2}, \alpha) \in F_2 \right) \\ &\Leftrightarrow \alpha \in \mathcal{L}(M_1) \wedge \alpha \in \mathcal{L}(M_2). \end{aligned}$$



De los teoremas anteriores podemos afirmar:

El conjunto de los lenguajes regulares incluidos en Σ^* es un álgebra Booleana de conjuntos.

Teorema

La unión finita y la intersección finita de lenguajes regulares dan por resultado un lenguaje regular.

Demostración.

Debemos ver que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \bigcup_{i=1}^n L_i \text{ es regular, y } \forall n \in \mathbb{N}, \bigcap_{i=1}^n L_i \text{ es regular.}$$

Por inducción en n .

► Caso base $n = 0$: $\bigcup_{i=1}^0 L_i = \emptyset$ es regular.

► Caso inductivo:

Supongamos que para $n > 0$, $\bigcup_{i=1}^n L_i$ es regular. Veamos que vale para $n + 1$.

$\bigcup_{i=1}^{n+1} L_i = \bigcup_{i=1}^n L_i \cup L_{n+1}$ es regular, por ser la unión de dos regulares.

La demostración para \cap es similar.



Observación

Los lenguajes regulares no están clausurados por unión infinita.

Demostración.

Damos un contraejemplo.

Para cada $i \geq 1$ sea el lenguaje regular $L_i = \{a^i b^i\}$.

Si los lenguajes regulares estuvieran clausurados por unión infinita, $\bigcup_{i=1}^{\infty} L_i$ debería ser regular.

$$\bigcup_{i=1}^{\infty} L_i = \bigcup_{i=1}^{\infty} \{a^i b^i\} = \{a^k b^k : k \in \mathbb{N}\}$$

Usando el el Lema de Pumping se demuestra que no es regular.



Teorema

Todo lenguaje finito es regular.

Demostración.

Sea L un lenguaje finito, con n cadenas, $L = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$.

Para cada $i = 1, 2, \dots, n$, sea $L_i = \{\alpha_i\}$.

Entonces $L = \bigcup_{i=1}^n \{\alpha_i\}$.

Como cada $\{\alpha_i\}$ es regular, entonces L también lo es.



Definición

Un conjunto A de números naturales es decidible si hay un algoritmo que para cualquier número natural responde si pertenece o no al conjunto A .

La definición de decidibilidad se extiende a otros conjuntos que los naturales, y a otros problemas que la pertenencia. En cada caso significa la existencia de un algoritmo que resuelve la pregunta por sí o por no.

Sea L un lenguaje regular sobre Σ . Decidir cuales de los siguientes problemas sobre lenguajes regulares son decidibles.

1. (Pertenencia) Para toda $\alpha \in \Sigma^*$, ¿pertenece α a L ?

Sí es decidable

2. (Finitud) ¿es L finito?

Sí es decidable

3. (Vacuidad) ¿es L vacío?

Sí es decidable

4. (Equivalencia) Dados los lenguajes regulares L_1 y L_2 , ¿son L_1 y L_2 equivalentes?

Sí es decidable

Demostremos estas afirmaciones.

Demostración

1. Pertenencia: Dado el lenguaje regular L ,
 - se construye su AFD M tal que $\mathcal{L}(M) = L$.
 - *si* α es aceptada, *entonces* pertenece a L y *sino* no.

2. Finitud: El lenguaje regular L es infinito si y solo si cada AFD

$M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$ tal que $\mathcal{L}(M) = L$ acepta al menos una cadena de longitud ℓ donde

$$|Q| \leq \ell < 2|Q|.$$

3. Vacuidad: Dado el lenguaje regular L ,
- se construye su AFD M tal que $\mathcal{L}(M) = L$
 - se determina el conjunto A de estados alcanzables.
 - si $F \cap A = \emptyset$ entonces el lenguaje L es vacío y sino no.

4. Equivalencia: Dados los lenguajes regulares L_1 y L_2 , aceptados por los autómatas M_1 y M_2 respectivamente, si el lenguaje regular

$$(L_1 \cap \overline{L_2}) \cup (\overline{L_1} \cap L_2)$$

es vacío entonces L_1 y L_2 son equivalentes, sino no lo son.

Ejercicios

1. Demostrar que los siguientes lenguajes no son regulares

$$L = \{a^i b^j : i \neq j\}$$

$L_a = \{xay : x \in \Sigma^*, y \in \Sigma^*, |x| = |y|\}$, donde a es un elemento prefijado de Σ .

2. Sea L un lenguaje regular, y sea n la constante del Lema de Pumping para L . Indicar Verdadero o Falso y justificar.

- ▶ Para cada cadena z en L , con $|z| \geq n$, la descomposición de z en uvw , con $|v| \geq 1$ y $|uv| \leq n$, es única.
- ▶ Cada cadena z en L , con $|z| \geq n$, es de la forma $uv^i w$ para algún u, v, w , con $|v| \geq 1$ y $|uv| \leq n$ y algún i .
- ▶ Hay lenguajes no regulares que satisfacen la condición afirmada en el Lema de Pumping.

3. Indicar Verdadero o Falso y justificar:

Sean L_1 y L_2 lenguajes sobre el alfabeto Σ , tal que $L_1 \cup L_2$ es regular. Entonces, tanto L_1 como L_2 son regulares.

Ejercicios

4. Sea \mathcal{C} el mínimo conjunto que contiene a todos los lenguajes finitos, y está cerrada por unión finita, intersección, complemento y concatenación. ¿Cuál es la relación entre \mathcal{C} y el conjunto de todos los lenguajes regulares?
5. Dar un algoritmo de decisión que determine si el lenguaje aceptado por un autómata finito es el conjunto de todas las cadenas del alfabeto.
6. Dar un algoritmo de decisión que determine si el lenguaje aceptado por un autómata finito es cofinito.