

## Práctica 4: Expresiones regulares

Versión del 18 de marzo de 2024

**Ejercicio 1.** Dar expresiones regulares para los lenguajes de los ejercicios 1 a 3 de la práctica 2, a excepción de los incisos  $d$  y  $e$  del ejercicio 1.

**Ejercicio 2.** Calcular las siguientes derivadas:

- a.  $\partial_1(10^*1)$
- b.  $\partial_0(10^*1)$
- c.  $\partial_a(ab^*|ac|c^+)$
- d.  $\partial_a(a^+ba)$
- e.  $\partial_a(a^*ba)$
- f.  $\partial_1(\partial_0(0(1|\lambda)|1^+))$

**Ejercicio 3.** Pasar las siguientes expresiones regulares a autómatas finitos (mediante el método de las derivadas):

- a.  $(0|1)^*01$
- b.  $(a(b|\lambda)|b^+)$

**Ejercicio 4.** Pasar del autómata finito a la expresión regular los siguientes autómatas (mediante el método de las ecuaciones):

- a.  $M_1 = \langle Q_1, \Sigma_1, \delta_1, q_1, F_1 \rangle$ , donde:

$$Q_1 = \{0, 1\}, \quad \Sigma_1 = \{a, b\}, \quad q_1 = 0, \quad F_1 = \{1\}, \quad \delta_1 = \begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{array}$$

- b.  $M_2 = \langle Q_2, \Sigma_2, \delta_2, q_2, F_2 \rangle$ , donde:

$$Q_2 = \{1, 2, 3\}, \quad \Sigma_2 = \{a, b\}, \quad q_2 = 1, \quad F_2 = \{2\}, \quad \delta_2 = \begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 3 & 2 & 2 \end{array}$$

- c. El autómata no determinístico  $M_3 = \langle Q_3, \Sigma_3, \delta_3, q_3, F_3 \rangle$ , donde:

$$Q_3 = \{0, 1, 2, 3\}, \quad \Sigma_3 = \{a, b\}, \quad q_3 = 0, \quad F_3 = \{2\}, \quad \delta_3 = \begin{array}{c|cc} & a & b \\ \hline 0 & \{1\} & \emptyset \\ 1 & \{1, 2\} & \emptyset \\ 2 & \{3\} & \{2\} \\ 3 & \{3\} & \{3, 0\} \end{array}$$

**Ejercicio 5.** Demostrar que valen las siguientes identidades, es decir, que los lenguajes denotados en cada caso por las dos expresiones regulares son iguales.  $R$  y  $S$  son expresiones regulares.

- a.  $(R^*|R) = R^*$
- b.  $R.R^* = R^*.R$
- c.  $R.R^*.R = R.R.R^*$
- d.  $(R^*)^* = R^*$
- e.  $R(S.R)^* = (R.S)^*.R$

**Ejercicio 6.** Dar ejemplos de expresiones regulares  $R$ ,  $S$  y  $T$  que demuestren las siguientes desigualdades (es decir, que no valen las igualdades en general):

- a.  $R|\lambda \neq R$
- b.  $R.S \neq S.R$
- c.  $R.R \neq R$
- d.  $R|(S.T) \neq (R|S).(R|T)$

**Ejercicio 7.** Las siguientes igualdades no son válidas en general. Encontrar ejemplos de expresiones regulares para las cuales sean válidas. Buscar condiciones bajo las cuales sean válidas.

- a.  $R|\lambda = R$
- b.  $R.S = S.R$  (aun si  $R \neq S$ )
- c.  $R.R = R$
- d.  $R|(S.T) = (R|S).(R|T)$
- e.  $R|S = R.S$

**Ejercicio 8.** Dado el AFD  $M = \langle \{0, 1, 2, 3\}, \{a, b, c\}, \delta, 0, \{2, 3\} \rangle$ , donde:

	$a$	$b$	$c$
0	1	3	—
1	—	—	2
2	—	1	—
3	3	—	1

Dar una expresión regular que denote el lenguaje  $(\text{Ini}(\mathcal{L}(M)))^*$ .

**Ejercicio 9.** Para el AFND  $M = \langle \{0, 1, 2\}, \{a, b, c\}, \delta, 0, \{2\} \rangle$ , donde:

	$a$	$b$	$c$
0	$\{0, 1\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
1	$\{2\}$	$\emptyset$	$\emptyset$
2	$\emptyset$	$\{2\}$	$\emptyset$

Sea  $\mathcal{L} = \mathcal{L}(M)$ . Encontrar una expresión regular que denote el lenguaje  $(\mathcal{L}^c)^3$  (donde  $\mathcal{L}^c$  es el complemento de  $\mathcal{L}$ ).

**Ejercicio 10.** Sea  $\mathcal{L} = \mathcal{L}((12|2)^*(\lambda|1))$ . Dar una expresión regular que denote  $\mathcal{L}^c$ , tomando el complemento con respecto al alfabeto  $\{1, 2\}$ .

**Ejercicio 11.** Dar una expresión regular que denote el siguiente lenguaje:

$$\mathcal{L} = \{\omega \in \{a, b\}^* \mid bab \text{ no es subcadena de } \omega\}.$$

**Ejercicio 12.**

- a. Dar un método que, dada una expresión regular  $E$ , permita obtener una expresión regular para las cadenas iniciales de  $\mathcal{L}(E)$ . Es decir, obtener  $E'$  tal que

$$\mathcal{L}(E') = \text{Ini}(\mathcal{L}(E)) = \{\alpha \mid \exists \beta \text{ tal que } \alpha\beta \in \mathcal{L}(E)\}.$$

El método se puede definir por inducción sobre la estructura de  $E$ .

- b. Aplicar el método propuesto para obtener una expresión regular para  $\text{Ini}(\mathcal{L}((aa|bb)^*))$ .