# 뇌와 뇌낄완의 이해

의과대악 생리학교실

김의정

우울증?

우울안 기분

응미의 상실

식욕됐아

무기력과

수면깔해

까알

우울증 증상

기억력 강퇴

슬픔, 불쾌감

흥미, 익욕앙실

수동잭, 비왈동성


수면깡애

성기능장애

식욕앙실

제중감소

질병에 의안 부담 - 세계보건기구(WHO)



• 우울증에 걸릴 확률

5명중 1명


여까>남자 : 호르몬, 임인, 피임약, 정별 스트레스 등

신체필완자>신체 건강안 사람

이혼, 사별>기혼자

치료를 요하는 우울증은 연재 전체 인구의 3-5%차지

#### 정신건강장애의 심각성 정도별 전문의 치료를 받는 사람들, 2010년



출처: Sick on the Job? Myths and Realities about Mental Health and Work, OECD 발간, 파리

- o Bipolar disorders(양극경 장에) 때에
- 일반적인 건강 상태로 인한 기분장애
- 물질(Substance) 유발 기분장에 (= 개度で成 장네)

### 양극성 장애 (BIPOLAR DISORDER)


- 이 제1영 양극성 장애
  - : 쪼증과 우울증이 교대로 또는 쪼증이 반복적으로 발생
- 제11영 양극성 장애
  - : 쪼증의 정도가 심하지 않아 경조증 수준일 때
- 순완성 장애

비영 양극성 장애의 경안 상태
경쪼증과 경우울증이 교대로 나타나는 것
경계성 인격장애 등 인격 장애가 동반되는 경우가 많아 기분장애라 보다는 인격장애로 보는 견해

# 양극성 장애의 지료



- 지료효과는 ~5일에 시작되며, 수주간의 치료기간이 요구됨.
- 고놓도에서는 독성이 있음.
- <u>Valproic acid</u> and <u>other anticonvulsants</u> ( N紹 場 型)
- 완전한 효과를 위해서는 수 주간의 치료기간이 요구됨.



### 우울깡애

우울증의 개념
우울안 상태의 강도 또는 심각도
우울안 상태가 지속되는 기간
우울 상태로 인해 파생되는 부정적 결과
작절요인에 비해 과도안 우울증상 (如한제) (如한제)

우울증의 하위유형
주요우울장애와 기분부전장애
단극성 우울증과 양극성 우울증
내인성 우울증과 외인성 우울증
재씨와

산우 우울증 (postpartum depression) 계절성 우울증 (seasonal depression) (원) 위장된 우울증 (masked depression)

### 우울장애

○ 우울증의 원인

생물학적 요인


우울증을 유발하는 생활 사건

정신분석 이론

- 인간의 심리적 문제를 무익식적 동기와 갈등의 문제로 설명
- 우울증 : 무의식적으로 분노가 자기에게 양해진 연상

#### 앵동꾸의 이론

- 인간의 행동을 <del>환경적</del> 요인에 의한 학습의 결과로 설명
- 우울증: 사회환경으로부터 긍정적 강화가 약화되어 나타난 연상



### 연령에 따른 특이안 우울증상

- 소아기
  - A에() - 이별불안, 약교공포증, 애작앵동, 과잉앵동(hyperactivity), 성적(제)
- 사춘기
  - 반사외적 앵동, 가술, 무단 결석, 알코올 및 물질 남용, 성적 문란, acting-out
- 정인기
- 알코올 및 물질 남용, 도박, 정신인제장에 기주리 (각부 건녕) 아 노년기 바라 전자, 의신 바라 (자나 독실시 해)
  - では、かれた × ) - **プトダイル** (pseudodementia) 、 岩北 では、アイス・イ

## 노인 우울증

-2000년 65세 이상 노인: 국민의 7%→ 고령화 <u>사외에 진입</u> 2008년 노인 인구수가 9.9%

-통계청 장래인구 특별측계 결과

2000년 : 7.2% 고령와 사외(Ageing Society) 진입

2018년 : 14.3%인 고령사외(Aged Society)

2026년 : 20.8%인 조고령 사외(Super-Aged Society)

#### 노인 우울증

- 노년기 우울
- 과정치매
- 우리나라 노인 중 20%정도가 우울증 →까살


姚为, 瑶(财舰×), 弱似 ◆



### 노인 우울증의 원인

신체적 측면 - 신체적으로 취약한 시기

- 1. 반응성 우울증 : 신체적 질병→우울증
- 2. 우울증→식욕감퇴→건강약화



장인엽. 최정재 (2002) 노인복지약

- 3. 가면성 우울증 : 심리적 증상부인→수면장애, 식욕부진, 신제적 통증 (생주상반 생해 (加) 2950 阿阿
- 4. 신체적 질병, 약물→생리적·대사성 변화→우울증
- 5. 뇌의 노화→화학물질(신경전달 물질) 일부에 양적 변화→우울증

#### 사외적 측면

- -유영 또는 무영의 상일 제엄
  - **퇴직에 <del>따라 일어나</del>} 스트레스 때문에 우울증발병.**
  - 신체의 병or수술이 우울증을 직접 일으키는 경우

심리잭 측면

노년→성격변화→스트레스의 대응력 저하→우울증

#### 노년에 따라 일어나기 쉬운 성격 변화

①까기 중심적

②쉼게 의심

③**보**수적

④인제를 걱정


⑤**무**념

- 6 무감동
- ① 감정의 유동성 · 탄력성이 줄어든다

### 기분장애의 원인

- 생화학적 요인
- 신경세포막의 불안정성
- 뇌의 신경전달물질의 과부쪽:

Serotonin & Norepinephrine 등 양우울제 (antidepressants)들은 이 신경전달물질을 쪼절



### 기분짱애의 원인

# 女 片部!

○ 유전적 요인들

우울증 환자의 50% - 기분장애의 **마계사를 가짐.** 쪼울증 환자의 80-90% - 기분장애의 **마계사를 가짐.** 

• 완경적 요인

심인성 요인들

# Beck의 우울에 관안 이론