
정신질완

뇌와 뇌낄완의 이에



심리깡애의 분류


Diagnostic and Statistical manual of mental disorders, **DSM (정신장에 진단 통계 편람)**

处 翻 剂剂 → 16 加 超 200

DSM-I (1952년)

- → DSM-IV (1994년)
- → DSM-IV-TR (2000년)(질완분류세계 및 진단)
- → DSM-V (2013년)

(생물학적으로 장애를 야기하는 구분법으로 진단 그룹을 깨구성)



DSM-V의 주요 진단 범주

- o 신경발달장에 Neurodevelopmental disorders
- o 조연병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애 Schizophrenia spectrum and other psychotic disorders
- o/ 양극성 관련 장에 Bipolar and related disorders
 - 우울장에 Depressive disorders
- o 불안장에 Anxiety Disorders
- o 강박 관련 장애 Obsessive-compulsive and related disorders
- o 와장 및 스트레스 관련 장애 Trauma and stressor related disorders
- o 예리장에 Dissociative Disorders
- o 신체공장 및 관련 장애 Somatic symptom and related disorders
- o 급정 및 접식장에 Feeding and eating disorders
- o 배설장에 Flimination disorder
- o 수면각성 장에 Sleep-wake disorders
- o 정기능 장애 Sexual dysfunction
- o 정별 불쾌감 Gender dysphoria
- o 파괴적 충동조절 및 품앵장애 Disruptive, impulse-control, and conduct disorders
- o 물질 관련 및 중독성 장애 Substance-related and addictive disorders
- o **인명인지장에** Neurocognitive disorder
- o 성격장에 Personality disorder
- o 변태성욕 장애/성도착 장애 Paraphilic disorder

신경발달장애

만성적으로 영유아기, 소아기, 청소년기에 시작되는 <u>지적,</u> 정서적, 신체적 및 발달적 장애들

- o <u>지적발달장애</u> Intellectual developmental disorder
- o 의사소통장애 Communication disorders
- o 주의력결핍 과잉앵동장애 Attention Deficit Hyperactivity Disorder
- o 특정 약습장에 Specific learning disorder
- 운동기술 장애 Motor skills disorders
- o 특정에 Tic disorders 됐지 < 분명
- o 기타 others of infancy, childhood or adolescence

신경발달장애

자폐스펙트럼장애 Autism spectrum disorder, ASD

자폐성장애인 (발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 제 2조)



영와 말아톤

: 소아기 자폐증, 비전영적 자폐증에 따른 언어 · 신체표연 · 자기조절 · 사외적응 기능 및 능력의 장애로 인하여 일상생활이나 사외생활에 상당한 제약을 받아 다른 사람의 도움이 필요한 사람

大叶叶 禁己: 水 なけ、叶で の間におよる trouble 女(NEURO)。 CECHL HERE では 集... (近州区、改造上、 (近州区、改造上、 (近州区、改造上、 (近州区、改造上、 (近州区、)

주의력결핍 과잉앵동짱애 ADHD

소아나 청소년이 나타내는 주의집중력의 문제, 과잉행동의 문제, 파괴적이고 공격적인 비행의 문제

- √ 공감능력은 정상, 표현에 어려움이 있다.
- 가 해야 하거나 하고 있는 일에 부꾸의하다.
- 3) 규칙을 따르지 않고 쪼직에 적응하기 어렵다
- 🏑 관심이 여기저기 급하게 변한다.



조연병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애

조연병 (SCHIZOPHRENIA)

정의

망상, 완청, 와해된 언어, 정서적 둔감 등의 증상과 더불어 **사외적 기능에 장애** 를 일으키는 질완

평생유병률: 0.5-1%, 우리나라 경우, 0.5% (매년 4000명 발병)

발병시기: 10대 우반-30대 중반 발병. 남(15-24세)>여(25-34세),

발병률: 사외적 계층이 비교적 낮은 가정 발병률이 상대적으로 높음

大麦 叶红针 3%

발병 원인

생물학적 원인: 유전적인 경향성

뇌의 구쪼적인 이상이나 기능적인 이상

신경전달 물질의 불균영(특이 도파민) 등

가쪽적 원인: 가쪽관계 문제

행동주의적 원인: 사외적 단서에 대한 적절한 반응을 학습하지 못함

조연병 (SCHIZOPHRENIA)

0位子号3 (規划的)

위생관리가 엉망이고 옷을 이상하게 입는다. 깊은 대와를 나누는 것 같지만, 논리나 일관성이 없다 노려보거나 멍하게 있는다 단어나 언어 사용이 이상하다 부꺽절안 웃음을 웃는다 불압리안 말을 안다 사외관계를 피아고 고립되어 지내거나 은둔안다 사외관계가 악와된다. 오리나 빚 등 자극에 지나치게 민감하다. 쉽게 흥분한다. 심안 피로나 졸음 또는 불면이 있다. 약물이나 알코올을 남용한다. 영적인 것이나 종교적인 것에 지나치게 몰두한다. 의미 없는 글을 쓴다. 이상한 까세와 행동을 한다.

조연병 (SCHIZOPHRENIA)

• 52


小卫의 30m: 似绕 铜蜡 (叫悠X)

प्रहा था : १८ स्ति । स्ति, स्ति, स्ति

지각의 장이 : 행사생

나**앵동의 장에**: 의학제가, 기리·왕 행

1521C



(ANT BAIE!!)

组织 吸忆加强吧 强剂 哥州一时十分公司



조연병 스펙트럼 및 기타 정신병적 장애

진단
 증상들이 6 개월 이상 지속
 사외적, 직업적 기능에 연제한 장애, 정신분열증으로 진단

경과
 :치료에 호전(75%), 거의 완쾌 (25%),
 외복이 되지 않고 만성적인 경과 (25%).

• 기료 : 약물기료, 정인기료

불안장에 (ANXIETY DISORDERS)

- 만성적으로 걱정, 근심이 많은 병, 여러 가지 신체적인 증상이나 정신적인 증상이 나타나는 질환
- ·/ 특정한 상황이나 대상에 국한되어 나타나는 공포증
- · 대상이 뚜렷하지 않은 채로 불안감을 경험하는 불안 상태
- 일반인구의 약 25% 정도 : 불안장애를 경험한다.
 특이 여성이 남성보다 2배 정도 더 많다.
 우울증과 병발하는 경우도 많다.
- * 주요 증상 몸이 떨리거나 후들거림, 발안, 숨 막이는 느낌, 숨이 답답안 느낌.
 - 当 智, 慰, 则是, 则, 则是, 处则,

불안깡애

- 일반와된 불안 장애
 - 불안이 6개월 이상 지속되고 최근의 생활경험에서 일어난 것이 아닌 경우
 - 운동 긴장, 자율 신경계의 과활동성, 미래에 대한 심한 공포감, 과도한 경계성 등의 증상이 있음
- * 범불안 장애의 경우, 다음 중 6가지 증상들 가운데 3가지 이상의 증상을 동반
 - (1) 안절부절못함 또는 긴장이 고조되거나 가장자리에 선 느낌
 - (2) 쉽게 피로에짐
 - (3) 집중 곤란 또는 마음이 멍해지는 느낌
 - (4) 과민안 기분상태
 - (5) 근육 긴장
 - (6) 수면 장애

불안 깡애

○ 공왕 장애

- 때때로 일어나는 극심한 공포감 (공왕 발짝)
- 증상이 아꾸 심하고 갑짝스럽다는 점만 제외하면 일반와된 불안 장애와 특징이 유사암
- 여자, 젊은이들에게 더 많이 일어남
- 다시 발짝이 일어날까봐 두려워함
- 예기불안으로 발달
 - 걱정을 많이 아고 긴장, 공왕증상이 다시 올까봐 두려워함
- 공왕불안의 경우 우울증 약물의 깨발 방지 효과

불안장애의지료



- 정신 분석적 조망
- 앵동꺽 꼬망
 - 노출 치료 (체계적 둔감화, 노출법 등)

र्भाष्य यप नामाना स्थापन नि

- 생물학적 꼬망
 - 유전적 요인
 - 약물 치료 -벤쪼다이아제핀, 앙우울제 등

공포증 (PHOBIA)

- 정확하게 자신이 무엇을 두려워하는지 안다.
- 앙앙만으로도 강한 심리적, 신체적 반응을 유발할 수 있음
- 두려워하는 대상이나 상황을 피할 수 있다면 불안이 심각한 수준으로 올라가지는 않음
- 보통 단독으로 일어나지 않고 다른 꾸요 문제들과 함께 일어남
- 비교적 은하고 불안장애보다 유병률이 더 높음
- 광장공포증 끊장성
- 小의공모증 促促啊 等级况
- **특정공포증** 및 대통에

강박 및 관련 장애

- 심각안 수준으로 반복적으로 떠오르는 강박적인 생각이나 행동 혹은 심안 고
 통과 손상
- 높은 경제 수순, 지적 능력이 높은 사람들에게 더욱 은함
- 강박관념

40% : 더러운 것, 병균, 독극물에 대안 걱정

24%: 끔찍한 일이 일어날 것 같은 생각

17%: 대청성, 순서, 정확성에 대한 생각

외앙- 및 스트레스 사건-관련 장에 한 151

- 사건에 대해 반복적이고 집요하게 떠오르는 고통스런 외상(영상이나 생 각, 지각을 포함)
- 사건에 대한 반복적이고 괴로운 꿈
- 마치 외상성 사건이 재발하고 있는 것 같은 행동이나 느낌(사건을 다시 경엄하는 듯한 지각, 착각, 완각, 애리적인 완각 재연의 압화들, 이런 경 엄은 잠에서 깨어날 때 혹은 중독 상태에서의 경엄을 포함한다.)
- 외상적 사건과 유사하거나 상징적인 내적 또는 외적 단서에 노출되었을
 때 심각안 심리적 고통
- 외상적 사건과 유사하거나 상징적인 내적 또는 외적 단서에 노출되었을
 때의 생리적 재반응

신제증상 및 관련 장애

- 0
- 신체증상장애

뚜렷한 신체적 문제가 없음에도 통증, 소화기 증상, 성기능 장애, 연기증 등의 증상을 호소함

질병불안장애

대수롭지 않은 증상이나 인제의 변화를 질병의 뚜렷한 증상으로 확대해석하고 두려워함

② 전완장애

뚜렷한 신체적 이상 없이 팔, 다리가 마비되거나 감각이 없어지는 등의 신체기능 상일이 뚜렷한 장애

(4) 어위성(가장성 또는 인위성) 장애 등

정격 장애

- 완경에 대한 지속적이고 부적응적이고 융통성 없는 관계 방식
 - 거의 일생 동안 꾸준이 지속되며 개선 또는 변화의 시기가 없음
 - 증상장애들과 밀접한 관련 뭐는 거나?
- A군, 기이영, 기묘아고 괴팍안 앵동
 편집성, 분열성, 분열영
 - B군, 충동영, 연극적인, 정서적인, 변덕이 심안 행동 반사외정, 경계선, 연기정, 자기애적
 - C군, 불안영, 불안안 또는 두려워하는 앵동 외피성, 의존성, 강박적

반사외적 성격 장애

- ▶ 15세 이후에 다른 사람들의 권리를 무시하고 침해하는 행동이 만연될 때
- ▶ 15세 이전에 만성적으로 계속되어 온 품행장에의 경력이 액심
- 사외적 기준에 동쪼하지 못함 (법을 위반함)
- 사기성, 조정성
- 충동성, 미리 계획을 세우지 못함
- 참을성이 없고 공격적임
- 무모하여 자신 및 다른 사람들의 안전을 고려하지 않음
- 앙앙 무책임암
- 다른 사람을 다치게 하거나 학대하거나 물건을 훔친 뒤에도 후회하지 않음

싸이코때△(PSYCHOPATH)

- 반사외적 인격장에까
- · 성적 욕망, 범죄 및 공격성에 대한 통제력이 부족하고 과거의 실수(잘못)에 대해 반성하지 못하는 정신병적 특성을 가진 사람들 않았★, 오늘이 씨옷
- 1801년 필리프 피넬(Philippe Pinel)
 사이코패스(Psychopath) 증상 최초 제술
 1920년대 독일의 심리학자 유나이더
 사이코패시(Psychopathy) 개념 설명
- 원인
- ╱선전적 요인: 호르몬 분비 이상으로 전두엽 기능이 비정상적
 - 우선적 요인:
 - 사고에 따른 전투엽 손상, 기타 호르몬 이상, 장기간 극도의 스트레스 노출.
- o 사이코패스 감별 PCL- R(Psychopathy Checklist-Revised)
 - Robert D. Hare가 고안
 - 국내 사이코패스 범죄자: 연쇄살인범 등이 사이코패스로 진단된 인물