



Primera Reunión Conjunta de Botánica, Ecología y Evolución

XXIII Reunión Anual de la Sociedad de Botánica de Chile
XIX Reunión Anual de la Sociedad de Ecología de Chile
VI Reunión Anual de la Sociedad Chilena de Evolución



Concepción, Chile 6 al 9 de Octubre, 2012

Tipo: Póster

Área temática: Ecología

Análisis multitemporal de imágenes en la cordillera pelada: cuantificando el bosque nativo pre y post creación de la Reserva Costera Valdiviana

García C*, Díaz I & Samaniego H.

Laboratorio de Sustentabilidad Urbana y Cambio Global - UACH, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales - UACH, Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales - UACH

crisobal.garcia.vera@gmail.com

La superficie de los bosques costeros del centro-sur de Chile (33 a 40°S), ha sufrido una considerable disminución en los últimos años, quedando hoy sólo pequeños remanentes aislados de vegetación natural. Sin embargo, al sur de esta área geográfica, en el año 2003 se establece la Reserva Costera Valdiviana, la cual mantiene 40.000 hectáreas continuas de bosque nativo. Esto constituye un importante laboratorio natural, que permite evaluar la recuperación natural de ecosistemas únicos y perturbados por plantaciones forestales. El objetivo de este trabajo, fue caracterizar la variación espacio-temporal de la deforestación y regeneración de bosque nativo pre y post establecimiento de la reserva. Usando una combinación de registros históricos, fotografías aéreas e imágenes satelitales adquiridas antes y después del establecimiento de la RCV (1988, 2003, 2011), se cuantificó el cambio en la superficie y distribución de las plantaciones forestales insertas en una matriz de bosque nativo. Se analizó la cobertura de tierras en cada período y se estimaron diversas métricas de paisaje, concluyendo que la recuperación de la cobertura original ha sido sólo parcial. Si bien el establecimiento de la Reserva, ha permitido frenar la deforestación de 2 mil hectáreas, ocurrida en el periodo 1988-2003 en su extremo costero norte, sólo se han regeneraron 800 hectáreas en el período posterior (2003-2011). Este análisis permite cuantificar una alta tasa de regeneración natural, producto de la disminución de intervención antrópica posterior al establecimiento de la RCV.