Országos Kórházi Főigazgatóság

"Korlátozott terjesztésű!"

<u>Érvényességi idő</u>: az írásbeli vizsga befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Dr. Páva Hanna

A minősítő beosztása: igazgató

JAVÍTÁSI – ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Központi írásbeli vizsgatevékenység

54 723 01 Gyakorló mentőápoló

2022. szeptember 5.

A vizsgafeladat időtartama: 120 perc

A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 25%

OKFŐ

TÁJÉKOZTATÓ

az értékelő tanár részére

- A vizsgázó csak a kiosztott feladatlapon, illetve a vizsgaszervező által biztosított, a vizsgaszervező intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat.
- Tévedés esetén csak az egyértelmű javítás a helytelen válasz áthúzása, a vizsgázó aláírásával és a dátummal ellátva - fogadható el.
- Az írásbeli vizsgatevékenység értékelése a központi javítási-értékelési útmutató alapján történik.
- Kérjük, hogy minden feladat esetén a maximálisan adható pontszám melletti négyzetbe írja be az elért pontszámot a javítást végző tanár!
- A csillaggal (*) jelölt kérdéseknél a javítási-értékelési útmutatótól eltérő, de tartalmában azonos/szakmailag megfelelő egyéb helyes megoldás is elfogadható a ponthatáron belül.
- A feladatlap szerkesztésénél Dr. Fábián Pál Dr. Magasi Péter Orvosi Helyesírási Szótár (Akadémia Kiadó, Országos Orvostudományi Információs Intézet és Könyvtár Budapest, 1992.) útmutatásait vettük figyelembe.
- Maximálisan adható pontszám: 100 pont
- Ponthatárok:

80 - 100 (%) - jeles 60 - 79 (%) - jó 50 - 59 (%) - közepes 40 - 49 (%) - elégséges 39 - 0 (%) - elégtelen

Maximálisan adható pontszám:

1.					4 pont
	_		 	 	

Párosítsa a különböző testhőmérséklet értékeket latin megfelelőikkel! Írja a sorszámokhoz a helyes válasz betűjelét!

$$3.39 - 40 \, ^{\circ}\text{C}$$

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

2. 4 pont Húzza alá az egészségügyi dokumentációra vonatkozó helyes megállapításokat!

- Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 30, a zárójelentést 50 évig meg kell őrizni.
- Az egészségügyi dokumentációt az adatfelvételtől számított legalább 3, a zárójelentést 5 évig meg kell őrizni.
- Az egészségügyi dokumentációnak valósághűen, rendezetten, időrendben kell tükröznie az ellátás teljes folyamatát.
- Az egészségügyi dokumentáció tárolása bárhol történhet, azt nem szükséges elzárni.
- Az egészségügyi dokumentáció az egészségügyi dolgozó aláírása nélkül is hiteles, amennyiben pecsét van rajta.
- Objektíven kell vezetni a dokumentációt, az esetleges hibákat ki lehet hagyni a leírásból.
- Objektíven kell vezetni a dokumentációt, még akkor is, ha hibák merültek fel az ellátás során.
- <u>Az esetleges dokumentációs hibák javítását aláírással és dátummal kell</u> ellátni.

(Csak a 4 helyes válasz együttes aláhúzása esetén adható pont! Egyéb megoldás esetén pontszám nem adható!)

3.*	6 pont	I
Soroljon fel hat élettani változást	, melyet a heveny fájdalom válthat ki!	

- tachycardia
- vérnyomás-emelkedés
- verejtékezés
- pupillatágulat
- perifériás vasoconstrictio
- hűvös, nyirkos tapintatú bőr
- tachypnoe
- nyugtalanság

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

4. 6 pont // Írja le a szakkifejezések latin, vagy magyar megfelelőjét! Egészítse ki a táblázatot!

Szakkifejezések			
latinul	magyarul		
pelvis	medence		
femur	combcsont		
os pubis	szeméremcsont		
acetabulum	medencecsont ízületi árka		
spina iliaca anterior superior	elülső-felső csípőtövis		
vertebra	csigolya		

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

5. 5 p	nt

Nevezze meg a gyulladás helyi tüneteit magyarul!

- bőrpír
- melegség
- duzzanat
- fájdalom
- működészavar/funkciókárosodás

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

6.* Ismertesse a bordatörést a megadott szempontok szerint! 7 pont			
A bordatörés formái:			
 egyszeres bordatörés (egy borda egy helyen törik) többszörös bordatörés (kettőnél több borda törik egyenként egy helyen) sorozat-bordatörés (három, vagy több borda egy vonal mentén törik) ablakos bordatörés (egy, vagy több borda több helyen is eltörik) 			
A bordatörés lehetséges tünetei, jelei: Írjon hármat!			
 szúró fájdalom, amely mozgáskor, légvételkor, köhögéskor fokozódik a beteg légzése felületes, szapora az érintett területen duzzanat, vérömleny látható a sérült rész a mellkas mozgásaiban (légzőmozgás) korlátozottan vesz részt néha, a törtvégek elmozdulásakor tapintható a törés 			
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)			
7.* 6 pont			
Koponyasérült:hanyatt fektetés, 15-30°-ban megemelt felsőtesttel			
Dyspnoes beteg:félig ülő helyzet			
Akut hasi katasztrófa:hanyatt fektetés, felhúzott, alátámasztott térdekkel Várandós, vagy vena cava szindrómás beteg:bal oldalra fektetés Arckoponyasérült:hason fektetés, a beteg homlokát és állát alátámasztva Sokkos beteg:hanyatt fektetés, megemelt alsó végtagokkal			
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)			
8.* 2 pont Írja le az egészség fogalmát a WHO szerint!			
Az egészség nem csupán a betegség hiánya, hanem a testi, lelki, szociális jóllét állapota.			

9.* 7 pont Sorolja fel azokat a tényezőket, melyek nehezíthetik a helyszíni ellátást! Írjon hetet!
 veszélyes helyszín, környezet nehéz megközelíthetőség a beteg "kiemelhetősége" nehezített az adott környezetből nincsenek rendelkezésre álló információk, vagy azok hiányosak korlátozott diagnosztikai és terápiás eszköztár fertőzésveszély kezdeti tünetek jellegtelensége, melyet gyors állapotromlás követhet a beteg alkoholos befolyásoltsága
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
10. 4 pont Csoportosítsa a megadott jellemzőket a megfelelő eszközhöz! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!
 A. Könnyen tisztítható. B. Fémvázas eszköz. C. Egyszerhasználatos eszköz. D. A megfelelő rögzítéshez vákuumpumpára van szükség.
Vákuum-sín:A., D
Cramer-sín: <i>B.</i> , <i>C</i>
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
11. 3 pont Nevezze meg a liquorcsurgás helyét koponyaalapi törések esetén a törés lokalizációja szerint!
Elülső koponyagödör:liquorcsurgás az orrból
Középső koponyagödör:liquorcsurgás a fülből
Hátsó koponyagödör:liquorcsurgás a garat hátsó falán
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

12.*	8 pont	
Határozza meg a mérgezés témaköréből az alábbi fogalmak	ielentés	ét!

Hatásösszegződés: A szervezetbe jutó két, vagy több méreg hatása megegyezik az egyes mérgek külön-külön várható hatásának összegével.

Ellentétes hatás: A két méreg egyidejű jelenléte a szervezetben egymással ellentétes (csökkenő, vagy megszüntető) hatást idéz elő.

Hatásfokozódás: A két méreg együttes hatása nagyobb, mint az a két anyagtól várható lenne.

Együttes méreghatás: Ehhez a fogalomkörhöz két, vagy több méreg bejutásakor létrejövő kölcsönhatások tartoznak.

(Helyes válaszonként 2-2 pont adható!)

13.* 9 pont // Írja le a csonttörésekkel kapcsolatos ismereteit az alábbi szempontok alapján!

Csonttörés lényege: Az erőbehatás miatt a csont folytonossága megszakad.

Két fő formája:

- nyílt törés
- zárt törés

Csonttörés lehetséges tünetei: Írjon hármat!

- fájdalom
- duzzanat
- deformitás
- funkciókiesés
- látható csontvég

Használható rögzítőeszközök: Írjon hármat!

- Cramer-sin
- vákuum sín
- habosított műanyag sín
- háromszögletű kendő

(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

14. 7 pont
Írja le a súlyos sérült vizsgálatának algoritmusának megfelelően a betűjelek jelentését!
c: kritikus vérzés csillapítása
c: nyaki gerinc rögzítése
A: légút vizsgálata
B: légzés vizsgálata
C: keringés vizsgálata
D: eszmélet/tudat vizsgálata
E: egész test, egész eset vizsgálata
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
15. 4 pont Csoportosítsa az alábbi állításokat a megadott szempontok alapján! Írja a betűjeleket a megfelelő helyre!
 A. Rutinszerűen alkalmazzuk betegvizsgálat során. B. A korrekt endotrachealis tubushelyzet bizonyítására alkalmas. C. szén-monoxid-mérgezésnél hamis értéket mutathat. D. A kilélegzett levegő szén-dioxid-tartalmát méri.
Kapnometria jellemzői:B., D
Pulzoximetria jellemzői:A., C
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható! Egyéb megoldások esetén pontszám nem adható!)
16.* 4 pont
Ismertesse a mérgezettek ellátásakor alkalmazható terápiás lehetőségeket! Írjon négyet!
 keringés, légzés fenntartása, illetve helyreállítása a méreg további behatásának megakadályozása
 a mereg tovabbi benatasanak megakaaaiyozasa a gyomor-bélrendszerben lévő méreg eltávolítása
- a felszívódott méreg kiürülésének gyorsítása
- antidotum adása, a méreg hatástalanítása
(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)

17.*	6 pont
Nevezzen meg az agyrázkódás lehetséges tünete	ei közül hatot!
- fejfájás	
- szédülés	
- emlékezetvesztés	
- hányinger	
- hányás	
- látászavar	
- aluszékonyság	
- rövid ideig tartó eszméletvesztés	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
18.*	5 pont
Soroljon fel az ízületek összetartó tényezői közi	
- a külső levegő nyomása/légnyomás	
- porcfelszínek közötti tapadás (adhézió)	
- ízületi tok	
- ízületi szalagok	
- ízületet körülvevő izmok, az ízület mozgatását is	s végző izmok tónusa
- ízületet körülvevő egyéb lágyrészek, zsír, kötősz	övet és a bőr
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
19.*	3 pont
Írjon le a rühesség jellemző tünetei közül hárm	
- apró, vörös kiütések	
- hólyagok/papulák megjelenése	
- erős viszketés, különösen az éjszakai órákban	
- apró járatok a bőrben	
- vakarózás okozta sebek, hámsérülések	
	(Helyes válaszonként 1-1 pont adható!)
	(Treffet variablesines 1 1 point admitter)