
A
Spot niche composition
OPC-like
AC-like
OC-like
MES-like
cycling
hypoxia
ciliated (MP9)
myeloid
T/NK
oligodendrocyte
astrocyte
neuron
vascular
0.18 0.25 0.16
0.21 0.37 0.17 0.23 0.20
0.19 0.16 0.21 0.33 0.62
0.24 0.24 0.51 0.18 0.25 0.18 0.28
0.37
0.26
0.39
0.16 0.18
0.17 0.22
0.18 0.41 0.21 0.18
0.23 0.17 0.28
0.19
6 (21%) 7 (19%) 8 (8%) 5 (8%) 0 (6%) 11 (5%) 3 (5%) 2 (5%) 4 (4%) 1 (4%) 10 (4%) 12 (4%) 14 (3%) 9 (2%) 15 (0%) 13 (0%)
niche (share of DMG spots)
mean spot proportion
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
B
Per-section co-localisation
per-section Spearman ρ
0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
AC-like – astrocyte
ciliated (MP9) – astrocyte
AC-like – oligodendrocyte
MES-like – vascular
MES-like – myeloid
ciliated (MP9) – oligodendrocyte
C
Brainstem-autopsy sensitivity
state × microenvironment
state × state
pooled ρ, brainstem autopsy excluded (11 patients)
pooled ρ, all 12 DMG patients
0.6 0.4 0.2 0.0 −0.2 −0.4
−0.4 −0.2 0.0 0.2 0.4 0.6