

# Analyse I - Résumé

Mahel Coquaz

Semestre d'automne 2025

# Contents

0.1	Organisation par cours . . . . .	6
<b>1</b>	<b>Prérequis</b>	<b>9</b>
1.1	Identités algébriques . . . . .	9
1.2	Exponentielles & Logarithmes . . . . .	9
1.2.1	Exponentielles . . . . .	9
1.2.2	Logarithmes . . . . .	10
1.3	Trigonométrie . . . . .	10
1.4	Fonctions élémentaires . . . . .	10
1.4.1	Types de fonctions . . . . .	10
1.4.2	Injectivité, surjectivité, bijectivité . . . . .	11
1.4.3	Fonctions réciproques . . . . .	11
1.4.4	Fonctions composées . . . . .	11
<b>2</b>	<b>Nombre réels</b>	<b>13</b>
2.1	Ensembles . . . . .	13
2.1.1	Opération ensemblistes . . . . .	13
2.2	Nombres naturels, rationnels, réels . . . . .	13
2.2.1	Borne inférieure et supérieure . . . . .	13
2.2.2	Supremum et infimum . . . . .	14
2.2.3	Notations d'intervalles . . . . .	14
2.3	Nombres complexes . . . . .	14
2.3.1	Propriétés des nombres complexes . . . . .	14
2.3.2	Les 3 formes de nombres $\mathbb{C}$ . . . . .	15
2.3.3	Conjugué . . . . .	16
2.3.4	Racines de $\mathbb{C}$ . . . . .	17
2.3.5	Équations polynomiales dans $\mathbb{C}$ . . . . .	17
<b>3</b>	<b>Suites de nombres réels</b>	<b>19</b>
3.1	Définition . . . . .	19
3.2	Raisonnement par récurrence . . . . .	19
3.3	Limite des suites . . . . .	19
3.3.1	Quotient de deux suites polynomiales . . . . .	20
3.3.2	Théorème des deux gendarmes . . . . .	20
3.3.3	Cas des suites géométriques . . . . .	21
3.3.4	Remarques sur les limites . . . . .	21
3.3.5	Critère de D'Alembert . . . . .	21
3.3.6	Limites infinies . . . . .	21
3.3.7	Formes indéterminées . . . . .	22
3.3.8	Convergence de suites monotones . . . . .	22

---

3.4	Le nombre $e$ . . . . .	22
3.5	Suites définies par récurrence . . . . .	22
3.6	Sous-suites de Cauchy . . . . .	23
3.6.1	Suites de Cauchy . . . . .	23
3.7	Limite supérieure et limite inférieure d'une suite bornée . . . . .	23
<b>4</b>	<b>Séries numériques</b>	<b>25</b>
4.1	Définitions et exemples . . . . .	25
4.2	Critères de convergence . . . . .	26
4.2.1	Critère de Leibniz . . . . .	26
4.2.2	Critère de comparaison . . . . .	26
4.2.3	Critère d'Alembert . . . . .	26
4.2.4	Critère de Cauchy . . . . .	26
4.2.5	Remarques . . . . .	27
<b>5</b>	<b>Fonctions réelles</b>	<b>29</b>

# Cours

Cours 1 - 8 septembre 2025 . . . . .	9
Cours 2 - 10 septembre 2025 . . . . .	13
Cours 3 - 15 septembre 2025 . . . . .	14
Cours 4 - 17 septembre 2025 . . . . .	14
Cours 5 - 24 septembre 2025 . . . . .	16
Cours 6 - 29 septembre 2025 . . . . .	19
Cours 7 - 1 octobre 2025 . . . . .	20
Cours 8 - 6 octobre 2025 . . . . .	21
Cours 9 - 8 octobre 2025 . . . . .	22
Cours 10 - 13 octobre 2025 . . . . .	23
Cours 11 - 15 octobre 2025 . . . . .	25
Cours 12 - 27 octobre 2025 . . . . .	29

## Introduction

Ce qui suit se veut être un résumé condensé du cours d'Analyse I pour IN (MATH-101e) donné au semestre d'automne 2025 à l'EPFL. Le contenu de ce cours ne m'appartient pas et est quasiment intégralement extrait du cours de la Professeur Anna Lachowska qui l'a enseigné. J'ai cependant pris la liberté de sauter/raccourcir certains passages et d'ajouter des notes lorsqu'il me semblait pertinent de le faire.

Il faut également noter que la nature de résumé de ce qui suit ne permet pas d'appréhender toutes les notions ou subtilités du cours, rien de ce qui est fait à l'EPFL ne peut être considéré comme "trivial" contrairement à ce que l'ont peut régulièrement entendre dans la bouche des professeurs, ce document à donc plus vocation à être un aide mémoire ou complément plutôt qu'un support complet de cours.

Ce résumé/polycopié n'est pas exempt d'erreurs, si vous en trouvez une, vous pouvez me contacter sur mon adresse EPFL [mahel.coquaz@epfl.ch](mailto:mahel.coquaz@epfl.ch) ou via le repo GitHub <https://github.com/hotwraith/LectureNotes>.

Le repository GitHub est aussi où se trouvent les dernières versions des fichiers PDFs et  $\text{\TeX}$  pour ce cours (et éventuellement d'autres).

Rendons à César ce qui appartient à César, merci à Joachim Favre et Faust dont les notes et polycopiés dactylographiés m'ont inspiré dans la réalisation de ces résumés.

## 0.1 Organisation par cours

1

- Cours 1 - 8 septembre 2025: "C'est trivial ça" p.9
  - Présentation et explications du cours et de sa forme
  - Révisions et passage en revue des prérequis
- Cours 2 - 10 septembre 2025: For  $\mathbb{R}$  ? p.13
  - Notations ensemblistes
  - Opérations ensemblistes
  - Nombres & théorème des bornes inférieure et supérieure
- Cours 3 - 15 septembre 2025: Élisabeth Born(é)e p.14
  - Supremum et infimum
  - Notations d'intervalles
- Cours 4 - 17 septembre 2025: ça se complique... p.14
  - Arguments et modules de nombres complexes
  - Les 3 formes de nombres complexes
  - Formule de Moivre et puissance de nombres complexes
- Cours 5 - 24 septembre 2025: C'est du français ou des maths ? p.16
  - Conjugué d'un complexe
  - Racines de complexes
  - Équations polynomiales dans  $\mathbb{C}$
- Cours 6 - 29 septembre 2025: Classé sans suite p.19
  - Définition des suites
  - Le raisonnement par récurrence
  - Limites de suites
- Cours 7 - 1 octobre 2025: C'est limite ça p.20
  - Limites finies
  - Quotient de suites polynomiales
  - Théorème des deux gendarmes
- Cours 8 - 6 octobre 2025: Le roi d'Alembert... p.21
  - Suites géométriques
  - Critère d'Alembert
  - Limites infinies & formes indéterminées

---

<sup>1</sup>À cause d'une skill issue il faut cliquer sur le **numéro** de page pour être envoyé sur la section correspondante du pdf.

- Cours 9 - 8 octobre 2025: eeeeeaooo p.22
  - Convergence de suites monotones
  - Le nombre  $e$
  - Suites définies par récurrence
- Cours 10 - 13 octobre 2025: Netflix p.23
  - Sous-suites et suites de Cauchy
  - Limite supérieure et inférieure
  - Définition et exemples de séries numériques
- Cours 11 - 15 octobre 2025: Critères p.25
  - Convergence absolue
  - Critère de Leibniz et de comparaison
  - Critère de Cauchy et d'Alembert
- Cours 12 - 27 octobre 2025: "Cours le plus facile" -Lachowska p.29





# Chapter 1

## Prérequis

Cours 1 - 8 septembre 2025: "C'est trivial ça"

### 1.1 Identités algébriques

- $(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$
- $(x + y)(x - y) = x^2 - y^2$
- $(x - y)(x^2 + xy + y^2) = x^3 - y^3$
- $(x + y)(x^2 - xy + y^2) = x^3 + y^3$

### 1.2 Exponentielles & Logarithmes

#### 1.2.1 Exponentielles

Avec  $a, b \in \mathbb{R}$

- $a^x a^y = a^{x+y}$
- $\frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$
- $(ab)^x = a^x b^x$
- $a^0 = 1$
- $(a^x)^y = a^{xy}$
- $\sqrt[n]{a} = a^{1/n}$
- $\left(\frac{a}{b}\right)^x = \frac{a^x}{b^x}$
- $a^1 = a$

### 1.2.2 Logarithmes

Avec  $\ln = \log$  le logarithme naturel

- $\ln(xy) = \ln(x) + \ln(y)$
- $\ln\left(\frac{x}{y}\right) = \ln(x) - \ln(y)$
- $\ln(x^c) = c \cdot \ln(x)$
- $\ln(1) = 0$
- $\log_a(a) = 1$

## 1.3 Trigonométrie

Avec  $\sin(x), \cos(x) \forall x \in \mathbb{R}$

- $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$  &  $\cot x = \frac{\cos x}{\sin x}$
- $\sin(x \pm y) = \sin(x) \cos(y) \pm \cos(x) \sin(y)$
- $\cos(x \pm y) = \cos(x) \cos(y) \mp \sin(x) \sin(y)$
- $\cos(0) = \cos(x - x) = \cos^2(x) + \sin^2(x) = 1$
- $\sin(2x) = \sin(x + x) = \sin(x) \cos(x) + \cos(x) \sin(x) = 2 \sin(x) \cos(x)$
- $\cos(2x) = \cos(x + x) = \cos^2(x) - \sin^2(x)$

## 1.4 Fonctions élémentaires

### 1.4.1 Types de fonctions

#### 1. Polynomiales

- Linéaire:  $f(x) = ax + b; a, b \in \mathbb{R}$
- Quadratiques:  $f(x) = ax^2 + bx + c; a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$

#### 2. Fonctions rationnelles: $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ où $P(x)$ et $Q(x)$ sont des polynômes, et $Q(x) \neq 0$

#### 3. Fonctions algébriques: Toute fonction qui est une solution d'une équation polynomiale, ex: $f(x) = \sqrt{x}$

#### 4. Fonctions transcendantes: fonctions non algébriques

- (a) Exponentielles et logarithmiques:  $f(x) = e^x, g(x) = \ln(x)$
- (b) Fonctions trigos et réciproques:  $f(x) = \sin(x), g(x) = \cos(x)$

### 1.4.2 Injectivité, surjectivité, bijectivité

**Définition 1.4.1**  $D(f) = \{x \in \mathbb{R} : f(x) \text{ est bien définie} \} = \text{le } \mathbf{domaine de définition} \text{ de } f$

$f(D) = \{y \in \mathbb{R} : \exists x \in D(f) : f(x) = y\} = \text{l'ensemble image de } f$

**Définition 1.4.2 Surjectivité**

$f : E \rightarrow F$  est **surjective** si  $\forall y \in F, \exists$  au moins un  $x \in E : f(x) = y$

**Définition 1.4.3 Injectivité**

$f : E \rightarrow F$  est **injective** si  $\forall y \in F, \exists$  au plus un  $x \in E : f(x) = y$

Autrement dit: Soit  $x_1, x_2 \in D_f : f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2$

**Définition 1.4.4 Bijectivité** Si  $f : E \rightarrow F$  est **injective ET surjective**, alors elle est **bijective**

### 1.4.3 Fonctions réciproques

**Définition 1.4.5** N'existent que si  $f : E \rightarrow F$  est **bijective** et est définie par  $f^{-1} : F \rightarrow E$  donc  $f(x) = y \Leftrightarrow x = f^{-1}(y)$

### 1.4.4 Fonctions composées

Soit  $f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : D_g \rightarrow \mathbb{R}$  avec  $f(D_f) \subset D_g$  on peut alors définir la fonction composée  $g \circ f : D_f \rightarrow \mathbb{R}$  par  $g \circ f(x) = g(f(x))$ <sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Il est bon de noter que de manière générale:  $g \circ f \neq f \circ g$



## Chapter 2

# Nombre réels

Cours 2 - 10 septembre 2025: For  $\mathbb{R}$  ?

### 2.1 Ensembles

Un ensemble est une "Collection des objets définis et distincts" (G. Cantor)

**Définition 2.1.1**  $X \subset Y$  Soit  $\forall b \in X \Rightarrow b \in Y$

Sa négation:  $X \not\subset Y$

$\exists a \in X : a \notin Y$

**Définition 2.1.2**  $X = Y \Leftrightarrow Y \subset X$  et  $X \subset Y$

**Définition 2.1.3**  $\emptyset$  l'ensemble vide:  $\emptyset = \{\}$

$\forall X : \emptyset \subset X$

$\forall X : X \subset X$

#### 2.1.1 Opération ensemblistes

- Réunion:  $X \cup Y = \{a \in \cup : a \in X \text{ ou } a \in Y\}$
- Intersection:  $X \cap Y = \{a \in \cap : a \in X \text{ et } a \in Y\}$
- Différence:  $X \setminus Y = \{a \in \setminus : a \in X \text{ et } a \notin Y\}$

**Propriété**  $A \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \cup (A \cap C)$

### 2.2 Nombres naturels, rationnels, réels

#### 2.2.1 Borne inférieure et supérieure

**Définition 2.2.1** Soit  $S \subset \mathbb{R}, S \neq \emptyset$ . Alors  $a \in \mathbb{R} (b \in \mathbb{R})$  est un mino-  
rant/majorant de  $S$  si  $\forall x \in S$  on a:  $a \leq x$  ou  $x \leq b$

Si  $S$  possède un minorant/majorant on dit que  $S$  est **minoré/majoré**.

Si  $S$  est majoré et minoré, alors  $S$  est dit **borné**.

## Cours 3 - 15 septembre 2025: Élisabeth Born(é)e

### 2.2.2 Supremum et infimum

**Théorème 2.2.1** *Tout sous-ensemble non-vidé majoré/minoré  $S \subset \mathbb{R}$  admet un supremum/infimum qui est unique.*

**Unicité** *Si  $\inf/\sup S$  existe alors il est le plus grand minorant/majorant de  $S$*

### 2.2.3 Notations d'intervalles

Soit  $a < b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Intervalles bornés

- $\{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\} = [a, b]$  intervalle fermé borné
- $\{x \in \mathbb{R} : a < x < b\} = ]a, b[$  intervalle ouvert borné
- $\{x \in \mathbb{R} : a \leq x < b\} = [a, b[$  intervalle borné ni ouvert ni fermé
- $\{x \in \mathbb{R} : a < x \leq b\} = ]a, b]$  intervalle borné ni ouvert ni fermé

Intervalles non-bornés:

- $\{x \in \mathbb{R} : x \geq a\} = [a, +\infty[$  fermé
- $\{x \in \mathbb{R} : x > a\} = ]a, +\infty[$  ouvert
- $\{x \in \mathbb{R} : x \leq b\} = ]-\infty, b]$  fermé
- $\{x \in \mathbb{R} : x < b\} = ]-\infty, b[$  ouvert

## 2.3 Nombres complexes

### Cours 4 - 17 septembre 2025: ça se complique...

On sait que  $x^2 = -1$  n'a pas de solutions dans  $\mathbb{R}$ , alors on introduit  $i$  tel que  $i^2 = -1$ <sup>1</sup>

#### 2.3.1 Propriétés des nombres complexes

Prenons les  $\mathbb{C}^2$  de la forme  $\{z = a + ib\}$ , où  $a, b \in \mathbb{R}$

- (+)  $(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$ 
  - $\exists \in C : 0 + 0i = 0$  tel que  $(a + ib) + 0 + 0i = a + ib \forall a, b \in \mathbb{R}$
  - $\exists$  l'opposé pour  $(a + ib)$ :  $(-a + i(-b)) + (a + ib) = 0 + 0i = 0$
- ( $\cdot$ )  $(a + ib) \cdot (c + id) = ac - bd + i(ad + bc)$

<sup>1</sup>Oui, en maths quand un truc marche pas on invente un truc pour que ça marche, si seulement on pouvait faire ça en exam...

<sup>2</sup> $\mathbb{C}$  dénote l'ensemble des complexes

- $\exists 1 \in \mathbb{C} : 1 + 0i = 1 : (a + ib) \cdot (1 + 0i) = a + ib$
- $z \in \mathbb{C}, z \neq 0 \Rightarrow \exists z^{-1} \in \mathbb{C} : z \cdot z^{-1} = z^{-1} \cdot z = 1$
- Pour  $z = a + ib \in \mathbb{C}^* \Rightarrow z^{-1} = \frac{a-ib}{a^2+b^2}$
- $z_1(z_2 + z_3) = z_1z_2 + z_1z_3$
- $\mathbb{C}$  n'est pas ordonné:  $i > 0 \Rightarrow i^2 = -1 > 0$  et  $i < 0 \Rightarrow (-i)^2 = -1 > 0$ , on voit qu'on a  $-1 > 0$  ce qui est absurde.

### 2.3.2 Les 3 formes de nombres $\mathbb{C}$

#### Forme cartésienne

$z = a + ib, a, b \in \mathbb{R}$

$z = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)i$  (Re et Im respectivement les parties réelles et imaginaires de  $z$ )

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2} = \sqrt{a^2 + b^2} \geq 0$$

Trouver  $\varphi$  et  $\arg(z)$ :

- $a > 0 : \arg(z) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) \in ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$  à  $2k\pi$  près,  $k \in \mathbb{Z}$
- $a < 0 : \arg(z) = \arctan\left(\frac{b}{a}\right) + \pi \in ]\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}[$  à  $2k\pi$  près,  $k \in \mathbb{Z}$
- Si  $a = 0$ :

- $\arg(z) = \frac{\pi}{2}$  si  $\operatorname{Im}(z) = b > 0$
- $\arg(z) = \frac{3\pi}{2}$  si  $\operatorname{Im}(z) = b < 0$

#### Forme polaire trigonométrique

$z = \rho(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) \rho \geq 0, \varphi \in \mathbb{R}$

$|z| = \rho \geq 0 \rho \neq 0 \Rightarrow \sin(\varphi) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{\rho}, \cos(\varphi) = \frac{\operatorname{Re}(z)}{\rho}, \tan(\varphi) = \frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)} = \frac{a}{b}$  si  $a = \operatorname{Re}(z) \neq 0$

#### Forme polaire exponentielle

$$e^{iy} = \cos(y) + i \sin(y) \quad (\text{Formule d'Euler})$$

$$z = \rho(\cos(\varphi) + i \sin(\varphi)) = \rho e^{i\varphi}$$

#### Les trois formes

$$z = \operatorname{Re}(z) + \operatorname{Im}(z)i = |z|(\cos(\arg(z)) + i \sin(\arg(z))) = |z| \cdot e^{i \cdot \arg(z)}$$

où

$$|z| = \sqrt{(\operatorname{Re}(z))^2 + (\operatorname{Im}(z))^2} \quad (\text{module de } z)$$

---

<sup>3</sup> $|z| = 0 \Leftrightarrow z = 0$

$$\begin{aligned}
|z| \neq 0 \Rightarrow \arg(z) &= \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)}\right), \operatorname{Re}(z) > 0 \\
&= \arctan\left(\frac{\operatorname{Im}(z)}{\operatorname{Re}(z)}\right) + \pi, \operatorname{Re}(z) < 0 && (\text{argument de } z) \\
&= \frac{\pi}{2}, \operatorname{Re}(z) = 0, \operatorname{Im}(z) > 0 \\
&= \frac{3\pi}{2}, \operatorname{Re}(z) = 0, \operatorname{Im}(z) < 0
\end{aligned}$$

$$e^{i\pi} = -1 \quad (\text{Formule d'Euler})$$

$$\forall \rho > 0, \varphi \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}^*:$$

$$\begin{aligned}
(\rho(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)))^n &= \rho^n(\cos(n\varphi) + i\sin(n\varphi)) \\
(\rho e^{i\varphi})^n &= \rho^n e^{in\varphi} && (\text{Formule de Moivre})
\end{aligned}$$

## Cours 5 - 24 septembre 2025: C'est du français ou des maths ?

### 2.3.3 Conjugué

**Définition 2.3.1**  $z = a + ib \in \mathbb{C}$  alors le conjugué de  $z$  est  $\bar{z} = a - ib$

$$z\bar{z} = |z|^2 \in \mathbb{R}$$

En forme polaire le conjugué s'écrit:

$$\begin{aligned}
z = \rho(\cos(\varphi) + i\sin(\varphi)) &\Rightarrow \bar{z} = \rho(\cos(\varphi) - i\sin(\varphi)) \\
&= \rho(\cos(-\varphi) + i\sin(-\varphi)) \\
&= \rho e^{-i\varphi}
\end{aligned}$$

### Propriétés

$$\forall z \in \mathbb{C}:$$

1.  $\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$
2.  $\overline{z \cdot w} = \bar{z} \cdot \bar{w}$
3.  $\overline{\left(\frac{z}{w}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}$
4.  $|\bar{z}| = |z|$
5.  $a = \operatorname{Re}(z) = \frac{z + \bar{z}}{2}$
6.  $b = \operatorname{Im}(z) = \frac{z - \bar{z}}{2i}$
7.  $\cos(\varphi) = \frac{e^{i\varphi} + e^{-i\varphi}}{2}$
8.  $\sin(\varphi) = \frac{e^{i\varphi} - e^{-i\varphi}}{2i}$



### 2.3.4 Racines de $\mathbb{C}$

**Proposition 2.3.1**  $w = s \cdot e^{i\varphi}$ ,  $w \in \mathbb{C}^*$  alors  $\forall n \in \mathbb{N}^*$   
 $\{z \in \mathbb{C}^* : z^n = w\} = \left\{ \sqrt[n]{s} e^{i \cdot \frac{\varphi + 2k\pi}{n}}, k = 0, 1, \dots, n-1 \right\}$

### 2.3.5 Équations polynomiales dans $\mathbb{C}$

#### Quadratiques

$$az^2 + bz + c = 0, a, b, c \in \mathbb{C}, a \neq 0$$

$$z = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$b^2 - 4ac = 0 \Rightarrow z = -\frac{b}{2a}$$

$$\neq 0 \Rightarrow 2 \text{ solutions}$$

#### Théorème fondamental de l'algèbre

**Théorème 2.3.1** Tout polynôme  $P(z) = a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z + a_0$ ,  
 $a_n, a_{n-1}, \dots, a_0 \in \mathbb{C}$ .

$$P(z) = a_n(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n) \text{ où } z_1, \dots, z_n \in \mathbb{C}$$

$$= a_n(z - w_1)^{m_1}(z - w_2)^{m_2} \dots (z - w_p)^{m_p}$$

#### Polynômes à coefficients réels

**Proposition 2.3.2** Si  $z \in \mathbb{C}$  est une racine de  $P(z)$  à coefficients réels, alors  $\bar{z}$  l'est aussi.

Donc  $P(z) = P(\bar{z}) = 0$  et  $(x - z)(x - \bar{z})$  divise le polynôme



## Chapter 3

# Suites de nombres réels

Cours 6 - 29 septembre 2025: Classé sans suite

### 3.1 Définition

**Définition 3.1.1** On définit une suite de nombre réels comme une application  $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$  définie pour tout nombre naturel ( $\forall n \leq n_0 \in \mathbb{N}$ )

**Définition 3.1.2** Une suite  $(a_n)$  est majorée (minorée) s'il existe un nombre  $M(m) \in \mathbb{R}$  tel que  $a_n \leq M \forall n \in \mathbb{N}$  ( $a_n \geq m \forall n \in \mathbb{N}$ ).

On dit que la suite est **bornée** si elle est majorée **et** minorée.

**Définition 3.1.3** Une suite  $(a_n)$  est croissante (strictement croissante) si  $\forall n \in \mathbb{N}$  on a  $a_{n+1} \geq a_n$  ( $a_{n+1} > a_n$ ).

Une suite  $(a_n)$  est décroissante (strictement décroissante) si  $\forall n \in \mathbb{N}$  on a  $a_{n+1} \leq a_n$  ( $a_{n+1} < a_n$ ).

Une suite est dite (strictement) **monotone** si elle est (strictement) croissante ou (strictement) décroissante.

### 3.2 Raisonnement par récurrence

Soit  $P(n)$  une proposition dépendant d'un entier naturel  $n$ , telle que:

1. **Initialisation:**  $P(n_0)$  est vraie, et...
2. **Hérédité:**  $\forall n \geq n_0$ ,  $P(n)$  implique  $P(n+1)$ , alors  $P(n)$  est **vraie** pour tout  $n \geq n_0$ .

Il est *très* important de bien démontrer les deux étapes de la récurrence, autrement il est facile d'obtenir une preuve qui est fausse.

### 3.3 Limite des suites

**Définition 3.3.1** On dit que la suite  $(x_n)$  est **convergente** et admet pour **limite** le nombre réel  $l \in \mathbb{R}$  si pour tout  $\epsilon > 0$ ,  $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \geq n_0$  on a  $|x_n - l| \leq \epsilon$ .

Une suite qui n'est **pas** convergente est dite **divergente**.

## Cours 7 - 1 octobre 2025: C'est limite ça

**Proposition 3.3.1** Si elle existe, la limite  $l$  d'une suite  $(a_n)$  est **unique**.

**Proposition 3.3.2** Toute suite convergente est bornée. **Attention**, la réciproque est fausse, ex:  $a_n = (-1)^n$  est bornée mais non convergente.

$$|x + y| \geq |x| + |y| \quad (\text{Inégalité triangulaire})$$

**Proposition 3.3.3** Soient  $(a_n)$  et  $(b_n)$  deux suites convergentes:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$ .

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$$

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = a \cdot b$$

$$3. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \frac{a}{b}, \forall b \neq 0$$

### 3.3.1 Quotient de deux suites polynomiales

Prenons:

$$\begin{aligned} x_n &= a_p n^p + \dots + a_1 n + a_0 \\ y_n &= b_q n^q + \dots + b_1 n + b_0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_n}{y_n}\right) &= 0, \quad p < q \\ &= \frac{a_p}{b_q}, \quad p = q \\ &= \text{diverge}, \quad p > q \end{aligned}$$

L'idée est la suivante:

$$\frac{x_n}{y_n} = \frac{a_p n^p + \dots + a_1 n + a_0}{b_q n^q + \dots + b_1 n + b_0} = \frac{n^p}{n^q} \cdot \frac{(a_p + a_{p-1} \frac{1}{n} + \dots + a_0 \frac{1}{n^p})}{(b_q + b_{q-1} \frac{1}{n} + \dots + b_0 \frac{1}{n^q})}$$

Le terme de droite tendant vers  $\frac{a_p}{b_q}$  et le terme de gauche tendant vers différentes possibilités listées plus haut selon  $p$  et  $q$ .

### 3.3.2 Théorème des deux gendarmes

Soient  $(a_n)$ ,  $(b_n)$ ,  $(c_n)$ , trois suites telles que:

$$1. \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = l$$

$$2. \exists k \in \mathbb{N} : \forall n \geq k \Rightarrow a_n \geq b_n \geq c_n$$

Alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = l$

## Cours 8 - 6 octobre 2025: Le roi d'Alembert...

### 3.3.3 Cas des suites géométriques

Les suites géométriques ont la forme  $a_n = a_0 \cdot r^n$ ,  $a_0 \in \mathbb{R}$  et  $a_0 \neq 0$ ,  $r \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} a_0 r^n &= 0, |r| < 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_0 r^n &= a_0, r = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} a_0 r^n &= \text{divergente}, |r| > 1 \text{ ou } r = -1\end{aligned}$$

### Intermède notation

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \text{ avec } 0 \leq k \leq n$$

### 3.3.4 Remarques sur les limites

1. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l \in \mathbb{R}$  alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = |l|$
2. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$
3. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} |x_n| = l \neq 0$  n'implique pas la convergence de  $x_n$  (ex  $a_n = (-1)^n$ )
4. Si  $(a_n)$  est bornée et  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$ , alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n b_n = 0$

### 3.3.5 Critère de D'Alembert

Soit  $(a_n)$  une suite telle que  $a_n \neq 0 \forall n \in \mathbb{N}$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \geq 0$ , alors:

- Si  $\rho < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
- Si  $\rho > 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$  diverge

### 3.3.6 Limites infinies

**Définition 3.3.2** On dit que  $(a_n)/(b_n)$  tends vers  $+\infty/-\infty$  si  $\forall A > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n \leq n_0, a_n \geq A/b_n \leq -A$

Notation:  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = -\infty$

Attention: les suites  $(a_n)$  et  $(b_n)$  sont **divergentes**.

Propriétés:

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = \infty$
2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \pm\infty$  et  $(b_n)$  est bornée  $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \pm\infty$
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \infty/-\infty$  et  $a_n \geq / \leq b_n \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty/-\infty$ <sup>1</sup>
4.  $(a_n)$  bornée et  $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \pm\infty \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$
5.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}, a_n \neq 0 \forall n \Rightarrow$  alors  $(a_n)$  diverge<sup>2</sup>.

<sup>1</sup>C'est la "règle d'un seul gendarme" ou théorème du chien méchant, ou etc...

<sup>2</sup>Extension du critère d'Alembert

### 3.3.7 Formes indéterminées

1.  $\infty - \infty$
2.  $\frac{\infty}{\infty}$
3.  $\frac{0}{0}$
4.  $0 \cdot \infty$

## Cours 9 - 8 octobre 2025: eeeeeaaaao

### 3.3.8 Convergence de suites monotones

**Théorème 3.3.1** *Toute suite croissante/décroissante qui est majorée/minorée converge vers son supremum/infimum.*

*Toute suite croissante/décroissante qui n'est **pas** majorée/minorée tend vers  $+\infty/-\infty$ .*

*On utilise  $(a_n) \uparrow = (a_n)$  est croissante,  $(b_n) \downarrow = (b_n)$  est décroissante.*

## 3.4 Le nombre $e$

Soit  $(x_n) : x_0 = 1, x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \forall n \geq 1$   
 $(y_n) : y_0 = 1, y_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} \forall n \geq 1, (y_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!})$   
 Alors:

1.  $x_n \leq y_n \forall n \in \mathbb{N}$
2.  $y_n \leq 3 \forall n \in \mathbb{N}$
3.  $(y_n) \uparrow \forall n \in \mathbb{N}$
4.  $(x_n) \uparrow \forall n \in \mathbb{N}$

Donc  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = l \leq 3 \Rightarrow \exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l' \leq 3$ .

On peut prouver ceci par récurrence, on se rend compte qu'en vrai  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e$ .

**Définition 3.4.1**  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \stackrel{\text{def}}{=} e$

## 3.5 Suites définies par récurrence

Soit  $x_0 = a \in \mathbb{R}$  et  $x_{n+1} = g(x_n)$  où  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction.

**Proposition 3.5.1** *Récurrence linéaire*

*Soit  $a_0 \in \mathbb{R}, a_{n+1} = qa_n + b$ , où  $q, b \in \mathbb{R}$ .*

*Alors*

1. si  $|q| < 1 \Rightarrow (a_n)$  converge vers  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{b}{1-q}$
2. si  $|q| \geq 1 \Rightarrow (a_n)$  diverge sauf si  $(a_n)$  est une suite constante.

**Proposition 3.5.2** *Si  $x_0 \in \mathbb{R}, x_{n+1} = g(x_n)$  et  $g : E \rightarrow E \subset \mathbb{R}$  telle que:*

$$1. \exists m, M \in \mathbb{R} : m \leq g(x) \leq M \forall x \in E$$

$$2. g \text{ est croissante: } \forall x_1, x_2 \in E : x_1 \leq x_2 \Rightarrow g(x_1) \leq g(x_2)$$

Alors la suite  $(x_n)$ ,  $x_{n+1} = g(x_n)$  est bornée et monotone  $\Rightarrow$  convergente.

Remarque: Si (2) est remplacé par  $x_1 \leq x_2 \Rightarrow g(x_1) \geq g(x_2)$  ( $g$  décroissante)  
 $\Rightarrow$  alors  $(x_n)$  n'est pas monotone (mais peut être convergente).

## Cours 10 - 13 octobre 2025: Netflix

### 3.6 Sous-suites de Cauchy

**Définition 3.6.1** Une sous suite d'une suite  $(a_n)$  est une suite  $k \mapsto a_{n_k}$  où  $k \mapsto n_k$  est suite strictement croissante de nombres naturels.

Ex:

$$\begin{aligned} a_n &= (-1)^n \forall n \in \mathbb{N} \Rightarrow a_{2k} = (-1)^{2k}, (a_{2k}) \subset (a_n) \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = 1 \\ a_{2k+1} &= (-1)^{2k+1}, (a_{2k+1}) \subset (a_n) \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = -1 \\ (a_n) &\text{ est divergente} \end{aligned}$$

**Proposition 3.6.1** Convergence d'une sous-suite

Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l \Rightarrow$  toute sous-suite  $(a_{n_k})$  converge aussi vers  $l$ .

**Théorème 3.6.1** Théorème de Bolzano-Weierstrass

Dans toute suite bornée il existe une sous-suite convergente.

#### 3.6.1 Suites de Cauchy

**Définition 3.6.2** La suite  $(a_n)$  est une suite de Cauchy si  $\forall \epsilon > 0$  il existe  $n_0 \in \mathbb{N}$  tel que  $\forall n \geq n_0$  et  $\forall m \geq n_0$ ,  $|a_n - a_m| \leq \epsilon$

**Proposition 3.6.2** Une suite  $(a_n)$  est une suite de Cauchy  $\Leftrightarrow (a_n)$  est convergente.

### 3.7 Limite supérieure et limite inférieure d'une suite bornée

**Définition 3.7.1** Soit  $(x_n)$  une suite bornée:  $\exists m, M \in \mathbb{R} : m \leq x_n \leq M \forall n \in \mathbb{N}$ .

$$\begin{aligned} \text{On définit la suite } y_n &= \sup \{x_k, k \geq n\} \quad y_n \downarrow \quad y_n \geq x_n \geq m \quad \forall n \in \mathbb{N} \\ \text{la suite } z_n &= \inf \{x_k, k \geq n\} \quad y_n \uparrow \quad z_n \leq x_n \leq M \quad \forall n \in \mathbb{N} \end{aligned}$$

Alors:

$$\exists \lim y_n \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \sup x_n, (y_n) \downarrow, \text{ minorée par } m$$

$$\exists \lim z_n \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \inf x_n, (z_n) \uparrow, \text{ majorée par } M$$

$$z_n \leq x_n \leq y_n, \forall n \in \mathbb{N}$$

**Remarque:** Si  $\liminf x_n = \limsup x_n = l \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} z_n = l$ .  
On a, par les deux gendarmes,  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$

**Remarque** Si  $\liminf x_n = l_1$ ,  $\limsup x_n = l_2 \Rightarrow \exists$  une sous-suite  $\{x_{n_k}\}$  convergente vers  $l_1$  et une sous-suite  $\{x_{n_j}\}$  convergente vers  $l_2$



## Chapter 4

# Séries numériques

### 4.1 Définitions et exemples

**Définition 4.1.1** La série de terme général  $a_n$  est un couple:

1. la suite  $(a_n)$
2. La suite des sommes partielles  $S_n \stackrel{\text{def}}{=} \sum_{k=0}^n a_k = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n$

Notation:

- $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$ : Série de terme général  $a_k$
- $S_n = \sum_{k=0}^n a_k$ : 'n'ième somme partielle

**Définition 4.1.2** Série  $\sum_{k=0}^{\infty} a_k$  est convergente  $\stackrel{\text{def}}{\Leftrightarrow}$  la suite  $(S_n)$  des sommes partielles est convergente.

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = l &\implies \sum_{k=0}^{\infty} a_k = l \\ &= \pm\infty \qquad \qquad \qquad = \pm\infty \end{aligned}$$

#### Exemples

- $\sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{1}{1-r} \quad |r| < 1$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k} = \infty$
- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2}$  converge
- $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} \quad \forall p > 1$

#### Cours 11 - 15 octobre 2025: Critères

**Définition 4.1.3** Une série  $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$  est dite **absolument convergente** si la série  $\sum_{k=1}^{\infty} |a_k|$  est convergente.

**Proposition:** Une série absolument convergente est convergente.

**Proposition:** Si la série  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  converge, alors  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

**Remarque:**  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  n'implique pas la convergence.

## 4.2 Critères de convergence

### 4.2.1 Critère de Leibniz

**Proposition 4.2.1** Soit  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  une série telle que:

1.  $\exists p \in \mathbb{N}: \forall n \geq p \Rightarrow |a_{n+1}| \leq |a_n|$
2.  $\exists q \in \mathbb{N}: \forall n \geq q \Rightarrow |a_{n+1}| \cdot |a_n| \leq 0$
3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Alors  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  est convergente.

### 4.2.2 Critère de comparaison

**Proposition 4.2.2** Soit  $(a_n)$  et  $(b_n)$  deux suites telles que  $\exists k \in \mathbb{N}: 0 \leq a_n \leq b_n \quad \forall n \geq k$  Alors:

- Si  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$  converge  $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  converge.
- Si  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  diverge  $\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} b_n$  diverge.

**Remarque** Si  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  ne possède que des termes positifs/négatifs, et la suite des sommes partielles est **majorée/minorée**, alors la série  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  est convergente.

### 4.2.3 Critère d'Alembert

Soit  $(a_n)$  une suite:  $a_n \neq 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho \in \mathbb{R}$  Alors si:

- $p < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  converge absolument.
- $p > 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$  diverge.
- $p = 1 \Rightarrow$  pas de conclusion.

### 4.2.4 Critère de Cauchy

<sup>1</sup>

Soit  $(a_n)$  une suite et  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho \in \mathbb{R}$ .

$$\begin{aligned} \text{Alors si } p < 1 &\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ converge absolument} \\ p > 1 &\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n \text{ diverge} \end{aligned}$$

---

<sup>1</sup>de la racine

### 4.2.5 Remarques

1. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = r$  et  $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}} = l$  alors  $r = l$
2. Parfois  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$  existe, mais  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$  n'existe pas.
3. Si  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1$  ou  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1$ , alors pas de conclusion sur la convergence de  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ .



## Chapter 5

# Fonctions réelles

Cours 12 - 27 octobre 2025: "Cours le plus facile" -Lachowska