

集合的笛卡儿积和二元关系

- 有序对
- 笛卡儿积及其性质
- 二元关系的定义
- 二元关系的表示

有序对

定义 由两个元素 x 和 y ，按照一定的顺序组成的二元组称为**有序对**（也称**序偶**），记作 $\langle x, y \rangle$

实例：点的直角坐标 $(3, -4)$

有序对性质

有序性 $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$ （当 $x \neq y$ 时）

$\langle x, y \rangle$ 与 $\langle u, v \rangle$ 相等的充分必要条件是

$$\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle \Leftrightarrow x = u \wedge y = v$$

例1 $\langle 2, x+5 \rangle = \langle 3y-4, y \rangle$ ，求 x, y .

解 $3y-4 = 2, x+5 = y \Rightarrow y = 2, x = -3$

有序 n 元组

定义 一个有序 n ($n \geq 3$) 元组 $\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle$ 是一个有序对，其中第一个元素是一个有序 $n-1$ 元组，即

$$\langle x_1, x_2, \dots, x_n \rangle = \langle \langle x_1, x_2, \dots, x_{n-1} \rangle, x_n \rangle$$

当 $n=1$ 时, $\langle x \rangle$ 形式上可以看成有序 1 元组.

实例 n 维向量是有序 n 元组.

笛卡儿积

定义 设 A, B 为集合, A 与 B 的笛卡儿积记作 $A \times B$,
定义为 $A \times B = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in B \}$

例2 $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$

$$A \times B = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 1, c \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 2, c \rangle, \\ \langle 3, a \rangle, \langle 3, b \rangle, \langle 3, c \rangle \}$$

$$B \times A = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle, \langle c, 2 \rangle, \\ \langle a, 3 \rangle, \langle b, 3 \rangle, \langle c, 3 \rangle \}$$

$$A = \{\emptyset\}, \quad P(A) \times A = \{ \langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \{\emptyset\}, \emptyset \rangle \}$$

笛卡儿积的性质

若 A 或 B 中有一个为空集，则 $A \times B$ 就是空集.

$$A \times \emptyset = \emptyset \times B = \emptyset$$

不适合交换律 $A \times B \neq B \times A$

不适合结合律 $(A \times B) \times C \neq A \times (B \times C)$

对于并或交运算满足分配律

$$A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

$$(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$$

$$A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$$

$$(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$$

若 $|A|=m$, $|B|=n$, 则 $|A \times B|=mn$

性质的证明

证明 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$

证 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\langle x, y \rangle \in A \times (B \cup C)$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in B \cup C$$

$$\Leftrightarrow x \in A \wedge (y \in B \vee y \in C)$$

$$\Leftrightarrow (x \in A \wedge y \in B) \vee (x \in A \wedge y \in C)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in A \times B \vee \langle x, y \rangle \in A \times C$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (A \times B) \cup (A \times C)$$

所以有 $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$.

例题

例3 (1) 证明 $A=B \wedge C=D \Rightarrow A \times C = B \times D$

(2) $A \times C = B \times D$ 是否推出 $A=B \wedge C=D$? 为什么?

解 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle \in A \times C &\Leftrightarrow x \in A \wedge y \in C \\ &\Leftrightarrow x \in B \wedge y \in D \Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in B \times D\end{aligned}$$

(2) 不一定. 反例如下:

$A=\{1\}$, $B=\{2\}$, $C=D=\emptyset$, 则 $A \times C = B \times D$ 但是 $A \neq B$.

例题

例3 (3) 证明 $A \subseteq B \wedge C \subseteq D \Rightarrow A \times C \subseteq B \times D$
逆命题在什么情况下成立？

例题

例3 (4) 设 A 、 B 、 C 、 D 为任意集合，以下等式是否成立？

- $(A \cap B) \times (C \cap D) = (A \times C) \cap (B \times D)$
- $(A \cup B) \times (C \cup D) = (A \times C) \cup (B \times D)$
- $(A - B) \times (C - D) = (A \times C) - (B \times D)$
- $(A \oplus B) \times (C \oplus D) = (A \times C) \oplus (B \times D)$

二元关系的定义

定义 如果一个集合满足以下条件之一：

- (1) 集合非空, 且它的元素都是有序对
- (2) 集合是空集

则称该集合为一个**二元关系**, 简称为**关系**, 记作 **R** .

如 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy ;

实例: $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle\}$, $S = \{\langle 1, 2 \rangle, a, b\}$.

R 是二元关系, 当 a, b 不是有序对时, S 不是二元关系

根据上面的记法, 可以写 $1R2$, aRb 等.

从 A 到 B 的关系与 A 上的关系

定义 设 A, B 为集合, $A \times B$ 的任何子集所定义的二元关系叫做**从 A 到 B 的二元关系**, 当 $A=B$ 时则叫做 **A 上的二元关系**.

例4 $A=\{0,1\}, B=\{1,2,3\}, R_1=\{<0,2>\}, R_2=A \times B, R_3=\emptyset, R_4=\{<0,1>\}$. 那么 R_1, R_2, R_3, R_4 是从 A 到 B 的二元关系, R_3 和 R_4 同时也是 A 上的二元关系.

计数

$|A|=n, |A \times A|=n^2, A \times A$ 的子集有 2^{n^2} 个. 所以 A 上有 2^{n^2} 个不同的二元关系.

例如 $|A|=3$, 则 A 上有=512个不同的二元关系.

A 上重要关系的实例

设 A 为任意集合,

\emptyset 是 A 上的关系, 称为空关系

E_A, I_A 分别称为全域关系与恒等关系, 定义如下:

$$E_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x \in A \wedge y \in A \} = A \times A$$

$$I_A = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \}$$

例如, $A = \{1, 2\}$, 则

$$E_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

$$I_A = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$$

A 上重要关系的实例（续）

小于等于关系 L_A , 整除关系 D_A , 包含关系 R_{\subseteq} 定义:

$L_A = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y \}$, 这里 $A \subseteq \mathbf{R}$, \mathbf{R} 为实数集合

$D_B = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in B \wedge x \text{ 整除 } y \}$, 这里 $B \subseteq \mathbf{Z}^*$, \mathbf{Z}^* 为非0整数集

$R_{\subseteq} = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \subseteq y \}$, 这里 A 是集合族.
类似的还可以定义大于等于关系, 小于关系, 大于关系, 真包含关系等等.

实例

例如 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{a, b\}$, 则

$$L_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

$$D_A = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$$

$A = P(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$, 则 A 上的包含关系是

$$R_{\subseteq} = \{\langle \emptyset, \emptyset \rangle, \langle \emptyset, \{a\} \rangle, \langle \emptyset, \{b\} \rangle, \langle \emptyset, \{a, b\} \rangle, \langle \{a\}, \{a\} \rangle, \\ \langle \{a\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{b\}, \{b\} \rangle, \langle \{b\}, \{a, b\} \rangle, \langle \{a, b\}, \{a, b\} \rangle\}$$

关系的表示

表示方式：关系的集合表达式、关系矩阵、关系图

关系矩阵：若 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, R 是从 A 到 B 的关系, R 的关系矩阵是布尔矩阵 $M_R = [r_{ij}]_{m \times n}$, 其中 $r_{ij} = 1 \Leftrightarrow \langle a_i, b_j \rangle \in R$.

关系图：若 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_m\}$, R 是 A 上的关系, R 的关系图是 $G_R = \langle V, E \rangle$, 其中 $V = A$ 为顶点集, E 为边集. 如果 $\langle x_i, x_j \rangle$ 属于关系 R , 在图中就有一条从 x_i 到 x_j 的有向边.

注意： A, B 为有穷集, 关系矩阵适于表示从 A 到 B 的关系或者 A 上的关系, 关系图适于表示 A 上的关系


实例

$$A=\{1,2,3,4\},$$

$$R=\{<1,1>,<1,2>,<2,3>,<2,4>,<4,2>\},$$

R 的关系矩阵 M_R 和关系图 G_R 如下:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



关系的运算

- 基本运算定义

- 定义域、值域、域
- 逆、合成、限制、像

- 基本运算的性质

- 幂运算

- 定义
- 求法
- 性质

关系的基本运算定义

定义域、值域 和 域

$$\text{dom}R = \{ x \mid \exists y (<x,y> \in R) \}$$

$$\text{ran}R = \{ y \mid \exists x (<x,y> \in R) \}$$

$$\text{fld}R = \text{dom}R \cup \text{ran}R$$

例1 $R=\{<1,2>, <1,3>, <2,4>, <4,3>\}$, 则

$$\text{dom}R=\{1, 2, 4\}$$

$$\text{ran}R=\{2, 3, 4\}$$

$$\text{fld}R=\{1, 2, 3, 4\}$$

关系的基本运算定义（续）

逆与合成

$$R^{-1} = \{ \langle y, x \rangle \mid \langle x, y \rangle \in R \}$$

$$R \circ S = \{ \langle x, z \rangle \mid \exists y (\langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, z \rangle \in S) \}$$



例2 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$
 $S = \{ \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$
 $R^{-1} = \{ \langle 2, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$
 $R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$
 $S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$

合成运算的图示方法

利用图示（不是关系图）方法求合成

$$R \circ S = \{ \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle \}$$

$$S \circ R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$$



限制与像

定义 F 在 A 上的**限制**

$$F \upharpoonright A = \{ \langle x, y \rangle \mid x F y \wedge x \in A \}$$

A 在 F 下的**像**

$$F[A] = \text{ran}(F \upharpoonright A)$$

实例 $R = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 4 \rangle, \langle 2, 2 \rangle \}$

$$R \upharpoonright \{1\} = \{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 4 \rangle \}$$

$$R[\{1\}] = \{2, 4\}$$

$$R \upharpoonright \emptyset = \emptyset$$

$$R[\{1, 2\}] = \{2, 3, 4\}$$

注意: $F \upharpoonright A \subseteq F$, $F[A] \subseteq \text{ran} F$

关系基本运算的性质

定理1 设 F 是任意的关系, 则

(1) $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) $\text{dom}F^{-1}=\text{ran}F, \text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$

证 (1) 任取 $\langle x,y \rangle$, 由逆的定义有

$$\langle x,y \rangle \in (F^{-1})^{-1} \Leftrightarrow \langle y,x \rangle \in F^{-1} \Leftrightarrow \langle x,y \rangle \in F$$

所以有 $(F^{-1})^{-1}=F$

(2) 任取 x ,

$$x \in \text{dom}F^{-1} \Leftrightarrow \exists y(\langle x,y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \exists y(\langle y,x \rangle \in F) \Leftrightarrow x \in \text{ran}F$$

所以有 $\text{dom}F^{-1}=\text{ran}F$. 同理可证 $\text{ran}F^{-1}=\text{dom}F$.

关系基本运算的性质

令 $R, S \subseteq A \times B$ ，则有

性质1:

$$\text{dom}(R \cup S) = \text{dom } R \cup \text{dom } S$$

$$\text{ran}(R \cup S) = \text{ran } R \cup \text{ran } S$$

$$\text{dom}(R \cap S) \subseteq \text{dom } R \cap \text{dom } S$$

$$\text{ran}(R \cap S) \subseteq \text{ran } R \cap \text{ran } S$$

性质2:

$$(R \cup S)^{-1} = R^{-1} \cup S^{-1}$$

$$(R \cap S)^{-1} = R^{-1} \cap S^{-1}$$

$$(R - S)^{-1} = R^{-1} - S^{-1}$$

$$R \subseteq S \Rightarrow R^{-1} \subseteq S^{-1}$$

关系基本运算的性质（续）

定理2 设 F, G, H 是任意的关系, 则

$$(1) (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$$

$$(2) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

证 (1) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned} \langle x, y \rangle \in (F \circ G) \circ H &\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \circ G \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists t (\exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G) \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists t \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H) \\ &\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \exists t (\langle s, t \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)) \\ &\Leftrightarrow \exists s (\langle x, s \rangle \in F \wedge \langle s, y \rangle \in G \circ H) \\ &\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ (G \circ H) \end{aligned}$$

所以 $(F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H)$

关系基本运算的性质（续）

(2) 任取 $\langle x, y \rangle$,

$$\langle x, y \rangle \in (F \circ G)^{-1}$$

$$\Leftrightarrow \langle y, x \rangle \in F \circ G$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle y, t \rangle \in F \wedge \langle t, x \rangle \in G)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in G^{-1} \wedge \langle t, y \rangle \in F^{-1})$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in G^{-1} \circ F^{-1}$$

$$\text{所以 } (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1}$$

关系基本运算的性质（续）

$$(1) F \circ (G \cup H) = (F \circ G) \cup (F \circ H)$$

$$(2) F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H)$$

证(1):

任取 $\langle x, y \rangle$, 有

$$\langle x, y \rangle \in F \circ (G \cup H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \cup H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge (\langle t, y \rangle \in G \vee \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Leftrightarrow \exists t ((\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \vee (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \vee \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \vee \langle x, y \rangle \in F \circ H$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (F \circ G) \cup (F \circ H)$$

关系基本运算的性质（续）

$$(1) F \circ (G \cup H) = (F \circ G) \cup (F \circ H)$$

$$(2) F \circ (G \cap H) \subseteq (F \circ G) \cap (F \circ H)$$

证(2):

任取 $\langle x, y \rangle$, 有

$$\langle x, y \rangle \in F \circ (G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \cap H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \exists t ((\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H))$$

$$\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in G) \wedge \exists t (\langle x, t \rangle \in F \wedge \langle t, y \rangle \in H)$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in F \circ G \wedge \langle x, y \rangle \in F \circ H$$

$$\Leftrightarrow \langle x, y \rangle \in (F \circ G) \cap (F \circ H)$$

A 上关系的幂运算

设 R 为 A 上的关系, n 为自然数,则 R 的 n 次幂定义为:

$$(1) R^0 = \{ \langle x, x \rangle \mid x \in A \} = I_A$$

$$(2) R^{n+1} = R^n \circ R$$

注意:

对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 都有

$$R_1^0 = R_2^0 = I_A$$

对于 A 上的任何关系 R 都有

$$R^1 = R$$

幂的求法

对于集合表示的关系 R ，计算 R^n 就是 n 个 R 右复合。
矩阵表示就是 n 个矩阵相乘，其中相加采用逻辑加。

例3 设 $A=\{a,b,c,d\}$, $R=\{<a,b>, <b,a>, <b,c>, <c,d>\}$,

求 R 的各次幂，分别用矩阵和关系图表示。

解 R 与 R^2 的关系矩阵分别为

$$M = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

幂的求法（续）

同理， $R^0=I_A$, R^3 和 R^4 的矩阵分别是：

$$M^0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad M^3 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad M^4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

因此 $M^4=M^2$, 即 $R^4=R^2$. 因此可以得到


$$R^2=R^4=R^6=..., \quad R^3=R^5=R^7=...$$

幂的求法（续）


$R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图如下图所示



R^0



R^1



$R^2 = R^4 = \dots$



$R^3 = R^5 = \dots$

幂运算的性质

定理3 设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系,则存在自然数 s 和 t ,使得 $R^s = R^t$.

证 R 为 A 上的关系,由于 $|A|=n$, A 上的不同关系只有 2^{n^2} .

当列出 R 的各次幂

$$R^0, R^1, R^2, \dots, , \dots,$$

必存在自然数 s 和 t 使得 $R^s = R^t$.

幂运算的性质（续）

定理4 设 R 是 A 上的关系, $m, n \in \mathbf{N}$, 则

$$(1) R^m \circ R^n = R^{m+n}$$

$$(2) (R^m)^n = R^{mn}$$

证 用归纳法

(1) 对于任意给定的 $m \in \mathbf{N}$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$R^m \circ R^0 = R^m \circ I_A = R^m = R^{m+0}$$

假设 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$, 则有

$$R^m \circ R^{n+1} = R^m \circ (R^n \circ R) = (R^m \circ R^n) \circ R = R^{m+n+1},$$

所以对一切 $m, n \in \mathbf{N}$ 有 $R^m \circ R^n = R^{m+n}$.

幂运算的性质（续）

(接上页证明)

(2) 对于任意给定的 $m \in \mathbf{N}$, 施归纳于 n .

若 $n=0$, 则有

$$(R^m)^0 = I_A = R^0 = R^{m \times 0}$$

假设 $(R^m)^n = R^{mn}$, 则有

$$(R^m)^{n+1} = (R^m)^n \circ R^m = (R^{mn}) \circ R^m = R^{mn+m} = R^{m(n+1)}$$

所以对一切 $m, n \in \mathbf{N}$ 有 $(R^m)^n = R^{mn}$.

幂运算的性质（续）

定理5 设 R 是 A 上的关系, 若存在自然数 s, t ($s < t$) 使得 $R^s = R^t$, 则

(1) 对任何 $k \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+k} = R^{t+k}$

(2) 对任何 $k, i \in \mathbb{N}$ 有 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $p = t-s$

(3) 令 $S = \{R^0, R^1, \dots, R^{t-1}\}$, 则对于任意的 $q \in \mathbb{N}$ 有 $R^q \in S$

证明 (1) $R^{s+k} = R^s \circ R^k = R^t \circ R^k = R^{t+k}$

(2) 对 k 归纳. 若 $k=0$, 则有

$$R^{s+0p+i} = R^{s+i}$$

假设 $R^{s+kp+i} = R^{s+i}$, 其中 $p = t-s$, 则

$$R^{s+(k+1)p+i} = R^{s+kp+i+p} = R^{s+kp+i} \circ R^p$$

$$= R^{s+i} \circ R^p = R^{s+p+i} = R^{s+t-s+i} = R^{t+i} = R^{s+i}$$

由归纳法命题得证.

幂运算的性质（续）

(3) 任取 $q \in \mathbb{N}$, 若 $q < t$, 显然有 $R^q \in S$.

若 $q \geq t$, 则存在自然数 k 和 i 使得

$$q = s + kp + i, \text{ 其中 } 0 \leq i \leq p-1.$$

于是

$$R^q = R^{s+kp+i} = R^{s+i}$$

而 $s+i \leq s+p-1 = s+t-s-1 = t-1$


这就证明了 $R^q \in S$.

重新审视前例：


$R^0, R^1, R^2, R^3, \dots$ 的关系图如下图所示



R^0



R^1



$R^2 = R^4 = \dots$



$R^3 = R^5 = \dots$