

Памятка по приёму препаратов

Женщина, 31 год · терапия волос (андрогенная алопеция), СПКЯ, профилактика циститов, болевой синдром малого таза, холестерин, запоры

Это информационная памятка, а не назначение. Дозы и сроки определяет врач. Перед стартом покажите эту схему лечащему врачу (особенно пункты разделов 5 и 6).

1. Расписание по времени дня

Время	Препарат	Как принимать
Утром, натощак за 30–60 мин до еды	Gentle Iron 25 мг + Витамин С 500 мг	Железо + витамин С лучше усваиваются натощак. Без кофе, чая, молочного. Если тошнит — с лёгким немолочным перекусом.
Завтрак с едой	Дуксет 60 мг	С едой = меньше тошноты. Принимать в привычное вам время каждый день.
Обед с едой, желательно с жирами	Перфектил + Омега-3 (2 капс.) + Витамин D	Жирорастворимым нужна еда с жирами. Перфектил отделён от утреннего железа — это снижает конкуренцию минералов.
Полдник ~15:00–16:00	Форлакс растворить в воде	Отдельно от всех таблеток: минимум за 1–2 часа до и после других препаратов.
Ужин с едой, желательно с жирами	Zinkorot 25 мг + Ниацинамид 500 мг + А+Е Medana (2 капс.)	Цинк отделён от утреннего железа. А+Е Medana — с едой с жирами и отдельно от витамина С/селена (поэтому вечером, а не в обед с Перфектилом).
21:00	Ярина	Строго в одно и то же время каждый день (ваше привычное время — 21:00).
Перед сном	Цистениум + Био Фимейл (пробиотик)	Цистениум на ночь дольше работает в мочевом пузыре. Пробиотик запивать прохладной/тёплой (не горячей) водой.

2. Чай, кофе, молочные продукты, кальций, алкоголь

- Чай и кофе** содержат танины, сильно снижающие усвоение железа. Не пить за 1 час до и минимум 1–2 часа после железа. Утренний кофе — через 1–2 часа после Gentle Iron.
- Молочные продукты и кальций** конкурируют с железом и цинком. Не сочетать с железом и с цинком — разносить минимум на 2 часа.
- Запивать железо** водой или соком (витамин С помогает), а не молоком или чаем.
- Кальций / магний** отдельными добавками — минимум за 2 часа от железа и цинка.
- Кофеин + Ярина + Дуксет:** эстроген замедляет выведение кофеина — от кофе может сильнее «потряхивать». При тревоге/сердцебиении уменьшите кофе.
- Грейпфрут** в больших количествах может влиять на гормоны Ярины — избегать больших количеств.
- Алкоголь** минимизировать: нагрузка на печень (Дуксет + Ниацинамид) и риски на фоне Ярины.

3. Сколько пить воды и когда

- **Ориентир:** ~1,5–2 л чистой воды в день (≈ 30 мл на кг веса), больше в жару и при нагрузке.
- **Форлакс:** пакетик растворять в ~125 мл воды и пить достаточно жидкости в течение дня — иначе эффект не сработает, а запор может усилиться.
- **Профилактика циститов:** пить воду регулярно и не терпеть позывы — регулярное опорожнение пузыря — часть профилактики.
- **Капсулы** (особенно Омега-3 и А+Е) запивать полным стаканом воды и не ложиться сразу.
- **Дуксет** даёт сухость во рту — держите воду под рукой.
- Распределяйте воду равномерно; большой объём перед сном — по самочувствию, чтобы не нарушать сон.

4. Важные предостережения по препаратам

- **Дуксет (дулоксетин):** НЕ бросать резко — синдром отмены; отменять только постепенно с врачом. Несовместим со **зверобоем**, трамadolом, триптанами от мигрени (серотониновый синдром). Осторожно с НПВС/аспирином. Может повышать давление (важно для кардиолога).
- **Ярина:** риск тромбозов, особенно при курении — **курить нельзя**. Срочно к врачу при боли/отёке голени, боли в груди, одышке, резкой головной боли, нарушении зрения. Дроспиренон удерживает калий — не сочетать с препаратами калия и регулярными НПВС без контроля. При рвоте/диарее вскоре после таблетки возможна потеря эффекта.
- **А+Е Medana (2500 ME + 200 мг, 2 капсулы):** доза витамина А безопасная (5000 ME/сутки, это половина верхнего предела). Но витамин Е 400 мг + эстроген (Ярина) + Омега-3 + Дуксет вместе слегка снижают свёртываемость крови — инструкция просит осторожности при приёме эстрогенов. Сообщите врачу и предупреждайте хирурга/стоматолога перед процедурами.
- **Железо:** тёмный стул — норма; возможен дискомфорт в животе. Не сочетать с антацидами.
- **Цинк:** на пустой желудок может тошнить — с едой; длительный избыток ведёт к дефициту меди (см. раздел 5).
- **Ниацинамид:** с едой; это НЕ ниацин — на холестерин не влияет (за холестерин отвечают Омега-3 и диета).
- **Витамин D:** жирорастворимый — с едой; не превышать высокие суммарные дозы длительно без контроля 25(OH)D.
- **Форлакс:** при сильном вздутии/диарее — снизить дозу; длительный приём — под контролем врача.

5. Обязательно обсудить с врачами

- ✓ **А+Е уточнён.** Польский Vitaminum A+E Medana 2500 ME + 200 мг — низкая доза витамина А, опасности передозировки нет. Остаётся лишь мягкий «разжижающий кровь» эффект витамина Е (см. раздел 4).
- ✓ **Цинк согласован с трихологом** — приём Zinkorot вместе с Перфектилом одобрен.
- ✓ **Ферритин 28 нг/мл** — на нижней границе и ниже оптимума для волос, поэтому Gentle Iron обоснован; ждать перед стартом не нужно.

Цинк на радаре. Суммарно (Перфектил + Zinkorot) ~40 мг/сут — верхняя граница нормы. На время 2-месячного курса следите за признаками избытка: стойкая тошнота, металлический привкус — повод сказать врачу.

Пересдать ферритин через ~3 месяца — убедиться, что он растёт, и не передозировать железо.

Показать весь список одному врачу (терапевт или гинеколог) для общей оценки совместимости.

6. Как начинать новые препараты (порядок ввода)

Не начинать всё в один день. Вводить группами раз в 3–4 дня — если появится побочный эффект (тошнота, расстройство ЖКТ, головная боль, сыпь), будет понятно, на что именно. Ярину и Дуксет продолжаете как обычно.

- **Сб 30 мая (старт):** Форлакс (днём, в воде; эффект через 24–48 ч) + Zinkorot (вечером с едой). 25 мг цинка — это норма.
- **Вт 2 июня:** Gentle Iron + Витамин С (утром натощак). Ферритин 28 это подтверждает; Форлакс уже работает, если железо подкрепит запор.
- **Сб 6 июня:** «обеденная» жирорастворимая группа — Перфектил + Омега-3 + Витамин D; и Ниацинамид (ужин).
- **Пн 8 июня:** А+Е Medana (ужин, с этой даты доступен) + Цистениум и Био Фимейл (на ночь) — переносятся легко.

Памятка носит справочный характер и не заменяет очную консультацию врача. Сверяйте дозы с инструкциями к препаратам и назначениями врачей.