

Дифференциальные Уравнения

Семинарские занятия

Вадим Гринберг
по семинарам Войнова А. С.

Содержание

1 Семинар 1, 10 января	2
1.1 Общие факты	2
1.2 Изоклины	3
1.3 Диффуры с разделяющимися переменными	5
1.4 n -параметрическое семейство кривых	6
1.5 Замена переменных	7
1.5.1 Линейная замена	7
1.5.2 Общий вид	7
1.6 Домашнее задание №1	8
2 Семинар 2, 17 января	12
2.1 Специальные замены. Однородные уравнения.	12
2.2 Однородные уравнения: $y = \frac{x}{t}$	12
2.3 Однородные уравнения: дробно-линейный вид	13
2.4 Однородные уравнения: $x = y^m$	15
2.5 Домашнее задание №2	16
3 Семинар 3, 24 января	17
3.1 Линейные уравнения. Базовый случай	17
3.1.1 Метод замены	17
3.1.2 Метод вариации произвольной постоянной	18
3.1.3 Функция от x , сведение к линейному	20
3.2 «Обратное» решение: $t = t(x)$	20
3.3 Уравнение Бернулли	21
3.4 Уравнение Рикатти	22
3.5 Домашнее задание №3	22
4 Common Tasks	23

Семинар 1, 10 января

Общие факты

Пусть у нас имеется функция $x(t)$ (вообще говоря, вектор-функция $x = (x_1, \dots, x_d)$) от переменной $t \in \mathbb{R}$, действующая из интервала (a, b) (по умолчанию считаем всей числовой прямой), такая, что для переменной t , функции $x(t)$ и n её первых производных выполнено уравнение:

$$F(t, x(t), \dot{x}(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0$$

— это и есть дифференциальное уравнение n -го порядка. F в данном случае, грубо говоря, «функция от $n + 1$ переменной», которая неявно задаёт $x(t)$ (за точным определением — на лекцию).

Решить диффур означает найти такую функцию $x(t)$, что выполняется вышеуказанное равенство.

Тупой пример: $\dot{x}(t) = x(t)$. Функция совпадает со своей производной. Решением, очевидно, будет $x(t) = \lambda \cdot e^t$, $\lambda \in \mathbb{R}$.



Любой диффур можно привести к удобоваримому виду:

$$\dot{x}(t) = f(t, x)$$

где f — некая хорошая функция (доказательство на лекции). С такими диффурами мы в основном и будем иметь дело.

Разберёмся, а как вообще можно решать диффуры. Пусть у нас имеется диффур $\dot{x} = f(t, x)$, который мы хотим решить. Попробуем приблизить график нашей кривой $x(t)$ некоей ломаной линией. Возьмём какую-то начальную точку (t_0, x_0) , и будем смотреть на направление движения, то бишь на направление вектора (dt, dx) . Будем делать маленькие шаги вдоль этого направления. Тогда каждый раз, находясь в точке (t, x) , мы будем переходить в точку $(t + dt, x + dx)$.

После многих таких шагов мы получим ломаную линию, приближающую график нашей кривой $x(t)$. Эта ломаная называется **Ломаной Эйлера**.



Для удобства можно делать шаг dt всегда равным 1, поделив вектор направления на dt . Тогда соответственно шаг dx станет $\frac{dx}{dt} = \dot{x} = f(t, x)$, и вектор направления в точке (t, x) будет иметь вид $(1, f(t, x))$.

Пример: $\dot{x} = tx$. Построим Ломаную Эйлера, стартуя из точки $(t_0, x_0) = (0, 1)$:

$$1. \ t = 0, \ x = 1 \Rightarrow \dot{x} = 0 \cdot 1 = 0 \Rightarrow (1, f(t, x)) = (1, 0) \Rightarrow (t + dt, x + dx) = (1, 1)$$

2. $t = 1, x = 1 \Rightarrow \dot{x} = 1 \cdot 1 = 1 \Rightarrow (1, f(t, x)) = (1, 1) \Rightarrow (t + dt, x + dx) = (2, 2)$
3. $t = 2, x = 2 \Rightarrow \dot{x} = 2 \cdot 2 = 4 \Rightarrow (1, f(t, x)) = (1, 4) \Rightarrow (t + dt, x + dx) = (3, 6)$
4.

Изоклины

Определение 1. Пусть у нас есть диффура $\dot{x} = f(t, x)$.

Интегральная кривая — график функции $x(t)$ — решения диффура. Тогда \dot{x} — это угловой коэффициент интегральной кривой в точке $(t, x(t))$, то бишь тангенс угла наклона касательной к $x(t)$ в данной точке.

Изоклина — геометрическое место точек плоскости, в которых одно и то же направление движения (направление касательных), то есть, угол наклона вектора (dt, dx) один и тот же для любой точки (t, x) изоклины. Иными словами, $\dot{x} = \text{const}$.

Изолиния поля — подмножество точек изоклины (являющееся линией), в которых вектор (dt, dx) один и тот же для любой точки (t, x) изолинии. То есть, вектор $(dt, dx) \sim (1, f(t, x)) = \text{const}$. Для каждой изолинии константа своя.

Семейство изоклин определяется уравнением

$$\dot{x} = k = f(t, x)$$

где k — параметр. Придавая параметру k близкие значения, получаем достаточно густую сеть изоклин, с помощью которых можно приближенно построить интегральные кривые дифференциального уравнения.

Для примера выше изоклинами будут являться множества $\left\{ xt = k \iff x = \frac{k}{t}, k \in \mathbb{R} \right\}$ — гиперболы.

Научимся находить приближённые решения диффура, строя интегральную кривую при помощи изоклин. Стоит отметить сразу же, что **нулевая изоклина** $f(t, x) = 0$ даёт уравнение линий, на которых могут находиться точки максимума и минимума интегральных кривых.

Для большей точности построения интегральных кривых хорошо находить ГМТ точек перегиба, исследуя вторую производную \ddot{x} при помощи уравнения:

$$\ddot{x} = \frac{df}{dt} + \frac{df}{dx} \cdot \dot{x} = \frac{df}{dt} + f(t, x) \cdot \frac{df}{dx} = 0$$

Линия, определяемая данным уравнением, и есть возможное ГМТ точек перегиба.

Пример №1

Изоклинами найти приближённое решение диффура

$$\dot{x} = 2t - x$$


Для получения изоклин положим $\dot{x} = \text{const} = k$, откуда:

$$2t - x = k \iff x = 2t - k$$

— параллельные прямые.

Пусть $k = 0$, тогда получим изоклину $x = 2t$ — эта прямая делит плоскость на две части, в каждой из которых производная \dot{x} имеет один и тот же знак — интегральные кривые, пересекая $x = 2t$, из области убывания $x(t)$ переходят в область возрастания. Отсюда получаем, что на данной прямой лежат точки минимума.

Возьмём ещё две изоклины: $x = 2t + 1, k = -1$ и $x = 2t - 1, k = 1$. Изобразим их на графике. Касательные, проведённые к интегральным кривым в точках пересечения с изоклинами $k = -1, k = 0$ и $k = 1$ образуют с осью абсцисс углы в 135, 0 и 45 градусов соответственно. На графике направление показано чёрточками.



Вторая производная: $\ddot{x} = 2 - \dot{x} = 2 - 2t + x$.

Рассмотрим прямую $x = 2t - 2$, на которой $\ddot{x} = 0$. Это изоклина при $k = 2$. Заметим, что в таком случае угол наклона касательной равен углу наклона самой изоклины. Значит, ни одна интегральная кривая не будет пересекать эту изоклину, но при этом они будут к ней стремиться на бесконечности.

Прямая $x = 2t - 2$ делит плоскость на две части, в одной из которых (над прямой) $\ddot{x} > 0$, а значит, интегральные кривые выпуклы вниз, а в другой $\ddot{x} < 0$, и интегральные кривые выпуклы вверх. Кроме того, поскольку точки минимума расположены над этой прямой, то интегральные кривые, проходящие ниже изоклины $x = 2t - 2$ не имеют точек экстремума.

Рассмотрим также изоклину $x = 2t - 4$, $k = 4$. В данном случае угол наклона касательной будет равен 75 градусов. При этом интегральные кривые будут также стремиться к $x = 2t - 2$, но являясь выпуклыми вверх. Тем самым мы получили другое семейство решений диффура.

На графике выше изображены интегральные кривые, приближающие $x(t)$, полученные в соответствии с проведённым исследованием. Как видим, в точках пересечения с изоклинами кривые параллельны направлению касательных в точках пересечения.

Диффуры с разделяющимися переменными

Это суть дифференциальные уравнения вида:

$$\dot{x} = \frac{dx}{dt} = \frac{a(t)}{b(x)}$$

В данном случае стоит быть осторожным и проверять вырожденные случаи ($b(x) = 0$, $a(t) = 0$, чтобы нечаянно не убить некоторые решения).

Проверив особые случаи, перемножим крест-накрест и получим:

$$b(x)dx = a(t)dt$$

\int теперь интегрируем каждую часть независимо от другой \int

$B(x) = A(t) + C$ — это и будет решением диффура

Пример №2

$$\dot{x} = tx$$


$$\dot{x} = tx = \frac{dx}{dt} \Rightarrow \frac{dx}{x} = t \cdot dt \Rightarrow \int \frac{dx}{x} = \int t \cdot dt$$

$$\ln |x| = \frac{t^2}{2} + C \Rightarrow |x| = e^{\frac{t^2}{2}} \cdot \underbrace{e^C}_{\text{какая-то константа}} \Rightarrow |x| = \lambda \cdot e^{\frac{t^2}{2}}, \lambda > 0 \Rightarrow x = \lambda \cdot e^{\frac{t^2}{2}}, \lambda \in \mathbb{R}$$

В последних двух действиях мы взяли экспоненту от обеих частей и избавились от модуля.

Пример №3

Найдите кривую $x(t)$, такую, что для любой $t_0 \in \mathbb{R}$ отрезки, соединяющую точку касания $(t_0, x(t_0))$ с точками пересечения касательной в данной точке с осями координат, будут равны.



Пусть мы касаемся нашей кривой $x(t)$ в точке (t_0, x_0) — обозначим её M . Можно заметить, что тогда OM — медиана. Отсюда следует, что координаты точек пересечения с осями абсцисс и ординат равны соответственно $(2t_0, 0)$ и $(0, 2x_0)$. Тогда тангенс угла наклона касательной $\tan \angle MPO = -\frac{2x_0}{2t_0} = -\frac{x_0}{t_0} = \dot{x}(t_0)$, так как тангенс угла наклона касательной к функции $x(t)$ в точке t_0 есть не что иное, как производная $x(t) - \dot{x}(t)$ — в данной точке. Таким образом, мы получили диффуры:

$$\dot{x} = -\frac{x}{t}$$

Решим его, тем самым найдя $x(t)$.

$$\dot{x} = -\frac{x}{t} = \frac{dx}{dt} \Rightarrow -\frac{dx}{x} = \frac{dt}{t} \Rightarrow \int = \int$$
$$-\ln |x| = \ln |t| + C \Rightarrow \frac{1}{|x|} = |t| \cdot \lambda, \lambda > 0 \Rightarrow x = \frac{\lambda}{t}, \lambda \in \mathbb{R}$$

Пример №4

$$xt + (t + 1) \cdot \dot{x} = 0 \implies xt + (t + 1) \cdot \frac{dx}{dt} = 0 \implies \frac{dx}{dt} = -\frac{xt}{t + 1} \implies -\frac{dx}{x} = \frac{t \cdot dt}{t + 1} \implies \int = \int$$

Возьмём правый интеграл.

$$\int \frac{t \cdot dt}{t+1} = \int 1 - \frac{1}{t+1} dt = t - \ln |t+1|$$

Тогда:

$$-\ln|x| = t - \ln|t+1| + C \implies \frac{1}{|x|} = \lambda \cdot \frac{e^t}{t+1}, \lambda > 0 \implies x = \lambda \cdot e^{-t} \cdot (t+1), \lambda \in \mathbb{R}$$

n -параметрическое семейство кривых

Это система дифференциальных уравнений вида:

[illegible]

– всего $n + 1$ уравнение, константы c_1, \dots, c_n неизвестны. Необходимо, как и раньше, найти подходящую $x(t)$.

Метод решения таков: сначала мы выражаем константы c_1, \dots, c_n через $t, x(t), \dot{x}(t), \dots, x^{(n)}(t)$, и потом подставляем всё в одно уравнение, тем самым получая диффур вида:

$$G(t, x(t), \dot{x}(t), \dots, x^{(n)}(t)) = 0$$

который мы умеем решать.

Пример №5

Необходимо найти диффур, задающий множество окружностей, касающихся оси абсцисс.

Чего делать, сходу и не вдуплишь, да?) Однако, выход есть — если видим слово "окружность" нужно тут же писать её уравнение.

Пусть у нас есть окружность радиуса R , касающаяся оси абсцисс в точке t_0 . Тогда выполнено тождество:

$$(x - R)^2 + (t - t_0)^2 = R^2$$

В данном случае R и t_0 и есть наши неизвестные константы. Составим систему уравнений из производных:

$$\begin{cases} (x-R)^2 + (t-t_0)^2 - R^2 = 0 \\ (2x \cdot \dot{x} - 2R \cdot \dot{x}) + 2t - 2t_0 = 0 \\ 2(\dot{x})^2 + 2x \cdot \ddot{x} - 2R \cdot \ddot{x} + 2 = 0 \end{cases}$$

Осталось выразить R через \dot{x} и \ddot{x} из последнего уравнения, подставить во второе и выразить t_0 , после чего загнать всё в первое уравнение и получить нужный диффур.

Замена переменных

Разберём на примере. Пускай у нас есть диффур

$$\dot{x} = x - \sqrt{x}$$

Решать его в таком виде не очень приятно. Поэтому сделаем замену переменных (название – сущая формальность, так как вообще говоря мы заменяем одну функцию на другую, а не переменную):

$$y(t) = \sqrt{x(t)}$$

Тогда диффур примет вид:

$$2\dot{y} \cdot y = y^2 - y \implies 2\dot{y} = y - 1 \implies \frac{2dy}{y-1} = dt$$

— получили простое уравнение с разделяющимися переменными.

Рассмотрим ещё несколько примеров замен.

Линейная замена

Пускай у нас есть диффур вида:

$$\dot{x} = f(at + bx)$$

Можно сделать замену $u = at + bx$, получив уравнение $\dot{x} = f(u)$. Решим этот диффур относительно переменной u , получив функцию $x(u)$, после чего, сделав обратную замену, выразить искомую $x(t)$.

$$\begin{aligned} u &= at + bx \\ du &= a \cdot dt + b \cdot dx \implies dt = \frac{du - b \cdot dx}{a} \\ \dot{x} &= \frac{dx}{dt} = \frac{a \cdot dx}{du - b \cdot dx} = f(u) \\ a \cdot dx &= f(u)du - b \cdot f(u)dx \implies (a + b \cdot f(u))dx = f(u)du \\ dx &= \frac{f(u)}{a + b \cdot f(u)} du \end{aligned}$$

После этих махинаций всё легко решается как уравнение с разделяющимися переменными.

Пример №6

$$\dot{x} = \cos(x - t)$$

Ну тут совсем толсто: $u = x - t$. В данном случае $a = -1$, $b = 1$. По формуле выше:

$$dx = \frac{\cos u}{\cos u - 1} du$$

Теперь интегрируем, получаем $x(u)$ и делаем обратную замену.

Общий вид

Пускай у нас есть диффур:

$$\dot{x} = f(t, x)$$

Можно сделать замену $u = \varphi(t, x)$, получив новое уравнение (весьма удачно, если получится диффур вида $\dot{u} = f(t, u)$, но такое бывает далеко не всегда). Решаем его и делаем обратную замену, получая $x(t)$.

Пример №7

$$\dot{x} \cdot t = 2x^2 \cdot t^3 - x$$

Здесь можно сделать замену $u = xt$, откуда $\dot{u} = \dot{x} \cdot t + x \cdot 1$. Подставим:


$$\begin{aligned}\dot{x} \cdot t = 2x^2 \cdot t^3 - x &\iff \dot{x} \cdot t + x = 2x^2 \cdot t^3 \implies \dot{u} = 2u^2 \cdot t \\ \frac{du}{dt} = 2u^2 \cdot t &\implies \frac{du}{u^2} = 2t \cdot dt \implies \int = \int \\ -\frac{1}{u} = t^2 + C &\implies u = -\frac{1}{t^2 + C}\end{aligned}$$

Делаем обратную замену и выражаем $x(t)$:

$$u = xt \implies xt = -\frac{1}{t^2 + C} \implies x = -\frac{1}{t^3 + Ct}$$

Домашнее задание №1

Задача №1. Найти все кривые $x(t)$, такие, что длина отрезка, соединяющего точку касания и точку пересечения касательной в данной точке с одной из осей, была постоянной.



Решение.

Пусть длина отрезка $MP = l$. Рассмотрим треугольник MPQ – на рисунке выше. Мы знаем, что $PQ = t_0$. Известно, что $\tan \angle MPQ = \dot{x} = \frac{MQ}{PQ}$, откуда получаем, что

$$MQ = PQ \tan \angle MPQ = t_0 \dot{x}$$

. По условию, равенство можно продлить на всю числовую прямую, получая:

$$PQ = t \implies MQ = t \dot{x}$$

Теперь применим Теорему Пифагора, чтобы получить дифференциальное уравнение на искомую кривую:

$$\begin{aligned}MP^2 &= PQ^2 + MQ^2 \\ l^2 &= t^2 + t^2(\dot{x})^2 \implies l^2 - t^2 = t^2(\dot{x})^2 \\ (\dot{x})^2 &= \frac{l^2 - t^2}{t^2} \implies \dot{x} = \pm \frac{\sqrt{l^2 - t^2}}{t}\end{aligned}$$

Получили диффур (вообще говоря, два диффура). Будем рассматривать случай со знаком $+$, так как знак $-$ приведёт нас к почти аналогичному результату (это обговорится далее).

Итак, имеем диффур с разделяющимися переменными:

$$\frac{dx}{dt} = \frac{\sqrt{l^2 - t^2}}{t} \implies dx = \frac{\sqrt{l^2 - t^2}}{t} dt \implies \int dx = \int \frac{\sqrt{l^2 - t^2}}{t} dt$$

Возьмём правый интеграл, сделав замену переменных.

$$\begin{aligned} \int \frac{\sqrt{l^2 - t^2}}{t} dt &= \left\{ t = l \cdot \sin \beta, dt = l \cdot \cos \beta d\beta \right\} = \int \frac{\sqrt{l^2(1 - \sin^2 \beta)}}{l \cdot \sin \beta} \cdot l \cdot \cos \beta d\beta = \\ &= \int \frac{l \cdot \cos \beta \cdot \cos \beta}{\sin \beta} d\beta = l \cdot \int \frac{1 - \sin^2 \beta}{\sin \beta} d\beta = l \left(\int \frac{d\beta}{\sin \beta} - \int \sin \beta d\beta \right) = \\ &= \left\{ \int \frac{d\beta}{\sin \beta} = \int \frac{d\beta}{2 \sin(\frac{\beta}{2}) \cos(\frac{\beta}{2})} = \int \frac{\cos(\frac{\beta}{2}) d\beta}{2 \sin(\frac{\beta}{2}) \cos^2(\frac{\beta}{2})} = \int \frac{d \tan(\frac{\beta}{2})}{\tan(\frac{\beta}{2})} = \ln \left| \tan\left(\frac{\beta}{2}\right) \right| + C \right\} = \\ &= l \cdot \ln \left| \tan\left(\frac{\beta}{2}\right) \right| + l \cdot \cos(\beta) + C \end{aligned}$$

Теперь сделаем обратную замену:

$$\begin{aligned} t = l \cdot \sin \beta \implies \sin \beta = \frac{t}{l} \implies \cos \beta = \pm \sqrt{1 - \frac{t^2}{l^2}} \\ \ln \left| \tan\left(\frac{\beta}{2}\right) \right| = \ln \left| \frac{\sin(\frac{\beta}{2})}{\cos(\frac{\beta}{2})} \right| = \ln \left| \frac{2 \cdot \sin(\frac{\beta}{2}) \cdot \cos(\frac{\beta}{2})}{2 \cdot \cos^2(\frac{\beta}{2})} \right| = \ln \left| \frac{l \cdot \sin \beta}{(1 + \cos \beta) \cdot l} \right| = \ln \left| \frac{t}{l \pm \sqrt{l^2 - t^2}} \right| \end{aligned}$$

Теперь запишем полный результат интегрирования обеих частей, помня, что $\int dx = x + C$:

$$x = \pm \sqrt{l^2 - t^2} + l \cdot \ln \left| \frac{t}{l \pm \sqrt{l^2 - t^2}} \right| + C$$

У нас тут есть модуль, что не очень хорошо. Кроме того, мы не рассмотрели случай с минусом. Убьём двух зайцев одним ударом, немного преобразовав ответ:

$$\begin{aligned} \pm \sqrt{l^2 - t^2} + l \cdot \ln \left| \frac{t}{l \pm \sqrt{l^2 - t^2}} \right| &= \pm \sqrt{l^2 - t^2} + \frac{l}{2} \cdot \ln \left| \frac{t}{l \pm \sqrt{l^2 - t^2}} \right|^2 = \\ &= \pm \sqrt{l^2 - t^2} + \frac{l}{2} \cdot \ln \left(\frac{t^2}{(l \pm \sqrt{l^2 - t^2}) \cdot (l \pm \sqrt{l^2 - t^2})} \right) = \\ &= \pm \sqrt{l^2 - t^2} + \frac{l}{2} \cdot \ln \left(\frac{t^2 \cdot (l \mp \sqrt{l^2 - t^2})}{(l \pm \sqrt{l^2 - t^2}) \cdot (l \pm \sqrt{l^2 - t^2}) \cdot (l \mp \sqrt{l^2 - t^2})} \right) = \\ &= \pm \sqrt{l^2 - t^2} + \frac{l}{2} \cdot \ln \left(\frac{t^2 \cdot (l \mp \sqrt{l^2 - t^2})}{(l \pm \sqrt{l^2 - t^2}) \cdot (l^2 - (l^2 - t^2))} \right) = \\ &= \pm \sqrt{l^2 - t^2} + \frac{l}{2} \cdot \ln \left(\frac{l \mp \sqrt{l^2 - t^2}}{(l \pm \sqrt{l^2 - t^2})} \right) \end{aligned}$$

Заметим, что если бы мы взяли случай с минусом, то тогда перед слагаемым с логарифмом стоял бы знак минус. Тогда, домножив на $-\frac{1}{2}$, мы бы возводили подлогарифменное выражение не в 2 степень, а в -2, соответственно абсолютно аналогичными преобразованиями получив под логарифмом такую же, но перевёрнутую дробь. Однако, и в числителе, и в знаменателе, у нас возникает по \pm или \mp – следовательно, рассмотрев случай с плюсом, мы уже получили все возможные варианты ответа.

Итоговый полный ответ:

$$x = \pm\sqrt{l^2 - t^2} + \frac{l}{2} \cdot \ln \left(\frac{l \mp \sqrt{l^2 - t^2}}{(l \pm \sqrt{l^2 - t^2})} \right) + C$$

Осталось лишь указать, что $t \in [-l, l]$, и $x(\pm l) = C$. □

Задача №2. Придумать диффур 1 порядка, не обладающий решением на всей прямой. То бишь, не для всех t решение $\dot{x} = f(t, x)$ должно существовать.

Решение. $f(t, x)$ должна быть всюду определённой функцией. Поэтому достаточно взять такую $x = x(t)$ в качестве решения диффура, чтобы она не была всюду определена, при выполнении условия выше.

Пример: $\dot{x} = -x^2$. Проверим, что подходит:

$$\begin{aligned} \dot{x} = -x^2 &\implies \frac{dx}{x^2} = -dt \implies \int = \int \\ \frac{1}{x} = t &\implies x = \frac{1}{t} \end{aligned}$$

□

Задача №3. Решите диффур:

$$(t^2 - 1) \cdot \dot{x} + 2tx^2 = 0, \text{ начальное условие: } x(0) = 1$$

Решение.

$$\begin{aligned} (t^2 - 1) \cdot \dot{x} + 2tx^2 = 0 &\implies (t^2 - 1) \cdot dx + 2tx^2 dt = 0 \\ \frac{dx}{x^2} = \frac{2t \cdot dt}{1 - t^2} &\implies \int = \int \\ \frac{1}{x} = \ln |1 - t^2| + C \end{aligned}$$

Найдём константу:

$$x(0) = 1 \implies 1 = \ln 1 + C \implies C = 1$$

Итоговая кривая:

$$\frac{1}{x} = \ln |1 - t^2| + 1 \implies x = \frac{1}{\ln |1 - t^2| + 1}$$

□

Задача №4. Изоклинами найти приближённое решение:

$$\dot{x} = \frac{x}{t + x}$$

Также изобразите изоклины на графике и покажите все различные (с точностью до топологии и асимптотики) решения (то есть, как рассмотрено выше в примере).

Решение. Уравнения изоклин:

$$\dot{x} = \frac{x}{t + x} = k \implies x = t \cdot \frac{k}{1 - k}$$

Получим прямые изменения характера роста и выпуклости, исследовав первые две производные:

$$\begin{aligned}\dot{x} = 0 &= \frac{x}{t+x} \implies x = 0 \\ \ddot{x} &= \frac{\dot{x}(t+x) - x(1+\dot{x})}{(t+x)^2} = \frac{\dot{x}t - x}{(t+x)^2} = 0 \implies \frac{\frac{x}{t+x} \cdot t - x}{(t+x)^2} = 0 \implies \\ &\implies \frac{-x^2}{(t+x)^3} = 0 \implies x = 0 \\ \ddot{x} > 0 &\implies t+x < 0 \implies x < -t \\ \ddot{x} < 0 &\implies t+x > 0 \implies x > -t\end{aligned}$$

Таким образом, характер роста функции меняется в нуле, а выпуклость изменяется, проходя через прямые $x = 0$, $x = -t$. На основании этого и нескольких изоклин можно построить приблизительный график кривой $x(t)$. \square

Задача №5. Придумайте (вообще говоря, найдите) диффур 1 порядка, задающий множество прямых, являющихся касательными к единичной окружности с центром в нуле.

Решение. Уравнение касательной к окружности в точке (t_0, x_0) — $x \cdot x_0 + t \cdot t_0 = 1$. Таким образом, у нас есть два уравнения:

$$\begin{cases} x_0^2 + t_0^2 = 1 \\ x \cdot x_0 + t \cdot t_0 = 1 \end{cases}$$

Будем выражать из них t_0 и x_0 , чтобы остались только переменные t и x . Для этого продифференцируем второе уравнение и преобразуем:

$$x \cdot x_0 + t \cdot t_0 = 1 \implies \dot{x}x_0 + t_0 = 0$$

$$\dot{x}x_0 = -t_0 \text{ — здесь возведём в квадрат, запоминая знак минус — } (\dot{x})^2 x_0^2 = t_0^2$$

Из уравнения окружности мы получаем выражение на квадрат t_0 :

$$x_0^2 + t_0^2 = 1 \implies t_0^2 = 1 - x_0^2$$

— теперь подставим t_0^2 в уравнение выше:

$$\begin{aligned}(\dot{x})^2 x_0^2 &= 1 - x_0^2 \implies x_0^2(1 + (\dot{x})^2) = 1 \\ x_0^2 &= \frac{1}{1 + (\dot{x})^2} \implies t_0^2 = 1 - x_0^2 = \frac{(\dot{x})^2}{1 + (\dot{x})^2} \\ x_0 &= \pm \frac{1}{\sqrt{1 + (\dot{x})^2}}, \quad t_0 = \pm \frac{\dot{x}}{\sqrt{1 + (\dot{x})^2}}\end{aligned}$$

Осталось подставить выраженные константы в уравнение касательной и получить некоторыми преобразованиями искомым диффур:

$$\begin{aligned}\pm \frac{x}{\sqrt{1 + (\dot{x})^2}} \pm \frac{\dot{x}t}{\sqrt{1 + (\dot{x})^2}} &= 1 \\ \pm x \pm \dot{x}t &= \sqrt{1 + (\dot{x})^2} \\ x^2 \pm 2\dot{x}xt + (\dot{x})^2 t^2 &= 1 + (\dot{x})^2 \\ (\dot{x})^2(t^2 - 1) \pm (2xt)\dot{x} + (x^2 - 1) &= 0 \text{ — квадратное уравнение} \\ \dot{x} &= \frac{\pm 2xt \pm \sqrt{4x^2 t^2 - 4(t^2 - 1)(x^2 - 1)}}{2(t^2 - 1)} \\ \dot{x} &= \frac{\pm xt \pm \sqrt{x^2 + t^2 - 1}}{t^2 - 1}\end{aligned}$$

\square

Семинар 2, 17 января

Специальные замены. Однородные уравнения.

Определение 2. Функцию $g(t, x)$ назовём *однородной*, если

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} : g(\lambda t, \lambda x) = \lambda \cdot g(t, x)$$

Функции $M(t, x)$ и $N(t, x)$ – *одинаково однородны*, если

$$\forall \lambda \in \mathbb{R} : M(\lambda t, \lambda x) = \lambda \cdot M(t, x) \iff N(\lambda t, \lambda x) = \lambda \cdot N(t, x)$$

Определение 3. *Однородное дифференциальное уравнение – это диффуры вида*

$$M(t, x)dt + N(t, x)dx = 0$$

где функции M и N – одинаково однородны.

Решать такие диффуры можно путём сведения к уравнению с разделяющимися переменными при помощи различных замен. О них, а также о том, как сводить иные уравнения к однородным, мы и поговорим.

Однородные уравнения: $y = \frac{x}{t}$

Пускай у нас имеется диффуры вида:

$$\dot{x} = f\left(\frac{x}{t}\right)$$

Оно уже однородное. Мы хотим привести его к уравнению с разделяющимися переменными. Следующая замена позволит нам это сделать: $y = \frac{x}{t}$:

$$y = \frac{x}{t} \implies x = y \cdot t \implies dx = ydt + tdy$$

– подставляем в однородное уравнение и решаем, находя $y(t)$. После этого обратная замена.

Пример №1

$$tdx = (x + t)dt$$

Данное уравнение уже является однородным. Преобразуем его и сделаем вышеуказанную замену (предварительно рассмотрев вырожденные случаи):

$$tdx = (x + t)dt \iff dx = \frac{x}{t} + dt, y = \frac{x}{t}$$

$$(ydt + tdy) = (y + 1)dt$$

$$tdy = dt \implies dy = \frac{dt}{t} \implies \int = \int$$

Осталось проинтегрировать, получить $y(t)$ и подставить $y = \frac{x}{t}$.

Пример №2

$$x^2 + \dot{x}t^2 = tx\dot{x}$$

Помня, что $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$, преобразуем диффур и сделаем ту же замену.

$$\begin{aligned}x^2 + \dot{x}t^2 &= tx\dot{x} \iff x^2 dt = (tx - t^2)dx, \quad y = \frac{x}{t} \\y^2 t^2 dt &= t^2(y - 1)(ydt + tdy) \\y^2 dt &= y^2 dt + ytdy - ydt - tdy \\ydt &= t(y - 1)dy \iff \frac{dt}{t} = \left(1 - \frac{1}{y}\right) dy \\ \ln |t| &= y - \ln |y| + C\end{aligned}$$

Теперь удобно делать обратную замену:

$$\ln |yt| = y + C \iff \ln |x| = \frac{x}{t} + C$$

и преобразовать получившееся выражение до вида $x = x(t)$.

Пример №3

$$t\dot{x} = x - t \cdot \exp\left(\frac{x}{t}\right)$$

— здесь руки сами просят поделить на t ($t \neq 0$, так как иначе уравнение не определено):

$$\begin{aligned}\dot{x} &= \frac{x}{t} - \exp\left(\frac{x}{t}\right), \quad y = \frac{x}{t} \\ \frac{ydt + tdy}{dt} &= y - e^y \implies \frac{tdy}{dt} = -e^y \\ \frac{dy}{e^y} &= -\frac{dt}{t} \implies \int = \int \\ e^{-y} &= -\ln |t| + C\end{aligned}$$

— далее обратная замена.

Однородные уравнения: дробно-линейный вид

Пускай мы имеем диффур вида:

$$\dot{x} = f\left(\frac{a_1 t + b_1 x + c_1}{a_2 t + b_2 x + c_2}\right), \quad a_1, a_2, b_1, b_2, c_1, c_2 \in \mathbb{R}$$

Ясно, что числитель и знаменатель суть уравнения прямых на координатной плоскости. Мы можем преобразовать уравнения такого типа к только что рассмотренным $\dot{x} = f\left(\frac{x}{t}\right)$, если перенесём систему координат в точку пересечения данных прямых.

Теперь подробнее о методе. Имеем систему уравнений:

$$\begin{cases} a_1 t + b_1 x + c_1 = 0 \\ a_2 t + b_2 x + c_2 = 0 \end{cases}$$

— решением данной системы будет точка пересечения двух прямых (t^*, x^*) . Теперь перенесём систему координат в данную точку, произведя замену:

$$\begin{aligned}\tilde{t} &= t - t^* \\ \tilde{x} &= x - x^*\end{aligned}$$

— теперь, произведя простые преобразования, получаем однородный диффур $(\dot{\tilde{x}}) = \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{t} \end{pmatrix}$. Решив его, осталось провести обратную замену, прибавив соответствующие константы.

Здесь стоит обговорить случай, когда выражения в числителе и знаменателе задают параллельные прямые, то есть:

$$\dot{x} = f\left(\frac{at + bx + c_1}{at + bx + c_2}\right)$$

— отличаются только на свободный член, ибо $c_2 = c_1 + c$, $c \in \mathbb{R}$. В данном случае уравнение тривиально сводится к уравнению вида $\dot{x} = \tilde{f}(at + bx)$, которое мы умеем решать, линейной заменой сводя к диффуру с разделяющимися переменными.

Пример №4

$$(x + 2)dt = (2t + x - 4)dx$$

Перезапишем в дробно-линейном виде:

$$\dot{x} = \frac{x + 2}{2t + x - 4}$$

Решим систему:

$$\begin{cases} x + 2 = 0 \\ 2t + x - 4 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = -2 \\ t = 3 \end{cases}$$

Делаем замену, получая однородное уравнение:

$$\begin{cases} \tilde{x} = x + 2 \\ \tilde{t} = t - 3 \end{cases} \implies \frac{dx}{dt} = \frac{d\tilde{x}}{d\tilde{t}} = \frac{\tilde{x}}{2\tilde{t} + \tilde{x}}$$

— осталось решить его как уравнение с разделяющимися переменными.

Пример №5

$$\dot{x} = \frac{5t - x - 3}{3t + 2x - 7}$$

Решим систему:

$$\begin{cases} 5t - x - 3 = 0 \\ 3t + 2x - 7 = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = 2 \\ t = 1 \end{cases}$$

Делаем замену, получая однородное уравнение:

$$\begin{cases} \tilde{x} = x - 2 \\ \tilde{t} = t - 1 \end{cases} \implies \frac{d\tilde{x}}{d\tilde{t}} = \frac{5\tilde{t} - \tilde{x}}{3\tilde{t} + 2\tilde{x}}$$

Поделим числитель и знаменатель правой части уравнения на \tilde{t} и положим $y = \frac{\tilde{x}}{\tilde{t}}$. Получаем уравнение с разделяющимися переменными:

$$\tilde{t} \cdot \frac{dy}{d\tilde{t}} = \frac{5 - 4y - 2y^2}{3 + 2y}$$

Однородные уравнения: $x = y^m$

Пускай мы имеем уравнение

$$M(t, x)dt + N(t, x)dx = 0$$

где функции M и N — НЕ одинаково однородные. Однако, мы были бы рады привести его к таковому. В этом нам поможет замена $x = y^m$, где $m \in \mathbb{Q}$.

Идея в том, что у однородного уравнения степени каждого из слагаемых уравнения должны совпадать — тогда при домножении на константу мы сможем её спокойно вынести за функции. Поэтому сначала мы найдём степень m , после чего будем решать обычное однородное уравнение при помощи известных методов. Разберём на примерах.

Пример №6

$$2t^4 \cdot x\dot{x} + x^4 = 4t^6$$

— перепишем с дифференциалами:

$$2t^4 \cdot xdx + x^4dt = 4t^6dt$$

Делаем замену:

$$x = y^m \implies dx = m \cdot y^{m-1}dy$$

— получаем уравнение:

$$2t^4 \cdot y^m \cdot m \cdot y^{m-1}dy + y^{4m}dt = 4t^6dt$$

Приравняем степени:

$$3 + 2m = 4m = 6 \implies m = \frac{3}{2}$$

— теперь подставляем и решаем однородный диффур.

Пример №7

$$\dot{x} = x^2 - \frac{2}{t^2}$$

Перепишем с дифференциалами и сделаем замену $x = y^m$:

$$t^2dx = x^2t^2dt - 2dt$$

$$x = y^m, dx = m \cdot y^{m-1}dy$$

$$m \cdot t^2 \cdot y^{m-1}dy = y^{2m} \cdot t^2dt - 2dt$$

Ищем степень:

$$2 + m - 1 = 2m + 2 = 0 \implies m = -1$$

Тогда:

$$-t^2 \cdot y^{-2}dy = y^{-2} \cdot t^2dt - 2dt$$

$$-t^2dy = t^2dt - 2y^2dt$$

Получили однородное уравнение, которое решается классически: $z = \frac{y}{t}$:

$$z = \frac{y}{t}, y = zt, dy = t dz + z dt$$

$$-t^2(t dz + z dt) = t^2dt - 2z^2t^2dt$$

$$-t dz - z dt = dt - 2z^2dt$$

$$t dz = (2z^2 - z - 1)dt$$

Получили уравнение с разделяющимися переменными:

$$\frac{dt}{t} = \frac{dz}{2z^2 - z - 1} \Rightarrow \int = \int$$

— находим решение $z = z(t)$, после чего производим череду обратных замен, находя $x = x(t)$.

Домашнее задание №2

Задача №1. Решить диффур:

$$\dot{x} = 2 \cdot \left(\frac{x+2}{x+t-1} \right)^2$$

Решение.

□

Задача №2. Решить диффур:

$$\dot{x} = \frac{x+2}{t+1} + \tan\left(\frac{x-2t}{t+1}\right)$$

Решение.

□

Задача №3. Решить диффур:

$$2x + (xt^2 + 1) \cdot t\dot{x} = 0$$

Решение.

□

Задача №4. Найти все такие $\alpha, \beta, a, b \in \mathbb{R}$, такие, что дифференциальное уравнение


$$\dot{x} = at^\alpha + bx^\beta$$

сводится к однородному.

Решение.

□

Задача №5. Найдите все кривые $x(t)$, такие, что расстояние от начала координат до касательной к $x(t)$ в любой точке $(t_0, x(t_0))$ совпадает с абсциссой данной точки (равно t_0):



Решение.

□

Семинар 3, 24 января

Линейные уравнения. Базовый случай

Линейные диффуры первого порядка имеют следующий общий вид:

$$\dot{x} + a(t)x = b(t)$$

Опишем 2 метода решения таких уравнений в общем виде.

Метод замены

Имеем диффур: $\dot{x} + a(t)x = b(t)$. Делаем следующую замену: $x = uv$, где $u = u(t)$, $v = v(t)$ – функции от t . Естественным образом изменяется и дифференциал:

$$\begin{cases} x = uv \\ \dot{x} = \dot{u}v + u\dot{v} \end{cases}$$

Тогда уравнение примет вид:

$$\dot{u}v + u\dot{v} + a(t)uv = b(t)$$

Сгруппируем слагаемые в левой части по u :

$$\dot{u}v + u(\dot{v} + a(t)v) = b(t)$$

Теперь приравниваем выражение в скобках к нулю, получая систему:

$$\begin{cases} \dot{v} + a(t)v = 0 \\ \dot{u}v = b(t) \end{cases}$$

Решим первое уравнение системы – это уравнение с разделяющимися переменными:

$$\begin{aligned} \frac{dv}{v} + a(t)v &= 0 \\ \frac{dv}{v} &= -a(t)dt \implies \int = \int \\ \ln |v| &= - \int a(t)dt \implies v = \exp\left(- \int a(t)dt\right) \end{aligned}$$

Прошу заметить, что в данном случае константа $C = 0$ – это важно. Теперь подставляем данное выражение во второе уравнение.

$$\begin{aligned} \dot{u} \exp\left(- \int a(t)dt\right) &= b(t) \\ \dot{u} &= b(t) \cdot \exp\left(\int a(t)dt\right) \implies \int = \int \\ u &= \int b(t) \cdot \exp\left(\int a(t)dt\right)dt + C \end{aligned}$$

Осталось подставить полученные u и v , получив $x = x(t) = u \cdot v$:

$$x = u \cdot v = \left[\int b(t) \cdot \exp\left(\int a(t)dt\right)dt + C \right] \cdot \exp\left(- \int a(t)dt\right)$$

Пример №1

$$\dot{x} + 2tx = t \cdot \exp(-t^2)$$

Будем действовать по алгоритму.

$$\begin{aligned} & \begin{cases} x = uv \\ \dot{x} = \dot{u}v + u\dot{v} \end{cases} \\ \dot{u}v + u\dot{v} + 2tuv = t \cdot \exp(-t^2) & \iff \dot{u}v + u(\dot{v} + 2tv) = t \cdot \exp(-t^2) \\ \begin{cases} \dot{v} + 2tv = 0 \\ \dot{u}v = t \cdot \exp(-t^2) \end{cases} & \implies \begin{cases} v = \exp(-t^2) \\ \dot{u} \exp(-t^2) = t \cdot \exp(-t^2) \end{cases} \\ \dot{u} = t \implies u = \frac{t^2}{2} + C & \implies x = uv = \left(\frac{t^2}{2} + C\right) \cdot \exp(-t^2) \end{aligned}$$

Метод вариации произвольной постоянной

Имеем диффур: $\dot{x} + a(t)x = b(t)$. Если $b(t) := 0$, то у нас имеется однородный диффур $\dot{x} + a(t)x = 0$. Ясно, что каждое решение линейного диффура является решением однородного диффура с нулевой правой частью, смещённого на $b(t)$ – по аналогии с СЛУ из Линала, мы сначала решаем однородную СЛУ, получая общее решение, а затем смещаем на вектор значений (столбец правых частей из расширенной СЛУ). Таким образом, получаем метод:

$$\begin{aligned} \dot{x} + a(t)x &= 0 \\ dx + a(t)xdt &= 0 \\ \frac{dx}{x} &= -a(t)dt \implies \int = \int \\ \ln|x| &= - \int a(t)dt + C \implies x = u \cdot \exp\left(- \int a(t)dt\right), u \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Теперь сделаем вариацию постоянной (тем самым получая все возможные «сдвиги» решения однородного уравнения). Полагаем теперь, что u – не константа, а тоже некоторая функция от t : $u = u(t)$. Тогда можно сделать замену $x = x(t, u)$ и подставить в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} & \left[u \cdot \exp\left(- \int a(t)dt\right) \right] + a(t) \cdot u \cdot \exp\left(- \int a(t)dt\right) = b(t) \\ \dot{u} \exp\left(- \int a(t)dt\right) - u \cdot a(t) \cdot \exp\left(- \int a(t)dt\right) + a(t) \cdot u \cdot \exp\left(- \int a(t)dt\right) &= b(t) \end{aligned}$$

Заметим, что последние два слагаемых в левой части равны по модулю и противоположны по знаку, следовательно, их можно попросту сократить, получая диффур:

$$\begin{aligned} \dot{u} \exp\left(- \int a(t)dt\right) &= b(t) \\ du &= b(t) \cdot \exp\left(\int a(t)dt\right)dt \implies \int = \int \\ u &= \int b(t) \cdot \exp\left(\int a(t)dt\right)dt + C \end{aligned}$$

Осталось подставить полученное решение u в выражение для x , чтобы получить общее решение диффура:

$$x = u \cdot \exp\left(-\int a(t)dt\right) = \left[\int b(t) \cdot \exp\left(\int a(t)dt\right)dt + C\right] \cdot \exp\left(-\int a(t)dt\right)$$

Внимательный читатель может заметить, что оба метода являются по факту одним и тем же. Однако, в зависимости от ситуации, пользоваться можно любым подходом.

Пример №2

$$t\dot{x} - 2x = 2t^4$$

Сначала решим однородное.

$$\begin{aligned} t\dot{x} &= 2x \\ tdx &= 2xdt \implies \frac{dx}{x} = 2\frac{dt}{t} \implies \int = \int \\ \ln|x| &= 2\ln|t| \implies x = u \cdot t^2, u \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Теперь сделаем вариацию постоянной $u = u(t)$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = ut^2 \\ dx = \dot{u}t^2 + 2ut \end{cases} \\ t(\dot{u}t^2 + 2ut) - 2ut^2 &= 2t^4 \\ \dot{u}t^3 + 2ut^2 - 2ut^2 &= 2t^4 \\ \dot{u}t^3 &= 2t^4 \implies \dot{u} = 2t \implies u = t^2 + C \\ x = ut^2 &= (t^2 + C)t^2 = t^4 + Ct^2 \end{aligned}$$

Получили общее решение.

Пример №3

$$x = t(\dot{x} - t \cdot \cos t)$$

Приведём к «классическому» виду:

$$\dot{x}t - x = t^2 \cdot \cos t$$

Однородное:

$$\begin{aligned} \dot{x}t &= x \\ dxt \cdot t &= xdt \\ \frac{dx}{x} &= \frac{dt}{t} \implies \int = \int \\ \ln|x| &= \ln|t| + C \implies x = ut, u \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Сделаем вариацию постоянной $u = u(t)$:

$$\begin{aligned} \begin{cases} x = ut \\ dx = \dot{u}t + u \end{cases} \\ (\dot{u}t + u)t - ut &= t^2 \cos t \implies \dot{u}t^2 = t^2 \cos t \\ \dot{u} &= \cos t \implies u = \sin t + C \end{aligned}$$

Подставляем в выражение для x , чтобы получить итоговый ответ:

$$x = ut = (\sin t + C)t = t \sin t + Ct$$

Функция от x , сведение к линейному

Пусть у нас есть уравнение вида:

$$a'(x)\dot{x} + b(t) \cdot a(x) = c(t)$$

где $a = a(x)$ – функция от x . Его можно свести к линейному ввиду свойств дифференциала:

$$a'(x)\dot{x} = \frac{da}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{da}{dt}$$

Подставляем в исходное уравнение, получая диффур, линейный по a :

$$\frac{da}{dt} + b(t) \cdot a = c(t)$$

Его уже можно решить приведёнными выше методами, получив решение $a = f(t)$, после чего выразить x через $a(x) = f(t)$.

«Обратное» решение: $t = t(x)$

Ранее мы рассматривали уравнения, линейные относительно переменной x и её производной. То есть мы считали, что t является независимой переменной, а x является зависимой переменной. Однако, всегда стоит иметь в виду, что возможен противоположный подход. То есть можно считать переменную x независимой переменной, а t – зависимой переменной. На практике часто встречаются задачи, в которых уравнение линейно относительно переменной t и её производной, а не x . В общем виде такое уравнение можно записать так:

$$(a(x)t + b(x))\dot{x} = c(x)$$

Преобразуем его:

$$(a(x)t + b(x))\frac{dx}{dt} = c(x)$$

$$a(x)t + b(x) = c(x)\frac{dt}{dx}$$

$$c(x)\frac{dt}{dx} - a(x)t = b(x)$$

$$\dot{t} - \frac{a(x)}{c(x)} \cdot t = \frac{b(x)}{c(x)}$$

Теперь решаем его любым из рассмотренных выше методов, но для функции $t = t(x)$.

Пример №4

$$(2t + x^3)\dot{x} = x$$

Преобразуем его к диффуру от t , подставив нужные выражения в формулу выше.

$$\dot{t} - \frac{2}{x} \cdot t = x^2$$

Теперь решим методом вариации постоянной:

$$\dot{t} = \frac{2}{x} \cdot t$$

$$\frac{dt}{t} = 2\frac{dx}{x} \implies \int = \int$$

$$\ln |t| = 2 \ln |x| \implies t = ux^2, u \in \mathbb{R}$$

Теперь положим $u = u(x)$:

$$\begin{cases} t = ux^2 \\ dt = \dot{u}x^2 + 2ux \end{cases}$$

$$\dot{u}x^2 + 2ux - 2ux = x^2 \implies \dot{u}x^2 = x^2$$

$$\dot{u} = 1 \implies u = x + C$$

Получаем общее решение $t = t(x)$:

$$t = ux^2 = (x + C)x^2 = x^3 + Cx$$

Уравнение Бернулли

Это дифференциальное уравнение имеет следующий вид:

$$\dot{x} + a(t)x = b(t) \cdot x^m$$

Характерный признак – степень m в правой части. Стоит отметить, что при $m = 0, 1$ это обычное линейное уравнение, которое мы умеем решать. Более того, степень m может быть какой угодно – положительной ли, отрицательной или вообще дробью.

Как и линейное неоднородное уравнение первого порядка, уравнение Бернулли может приходить на новогодний утренник в разных костюмах:

- Волком:

$$a(t)\dot{x} + b(t)x = c(t) \cdot x^m$$

- Зайчиком:

$$\dot{x} + x = c(t) \cdot x^m$$

- Или белочкой:

$$\dot{x} + a(t)x = x^m$$

Важно, чтобы всегда присутствовала Ёлочка – x^m , которая иногда может маскироваться под корень. Вокруг неё и будем водить хороводы.

Стоит также обратить внимание, что у данных уравнений при $m > 0$ всегда есть очевидное частное решение $x = 0$. Понятно, что когда просят найти частное решение диффура, на этот факт можно забыть, но при нахождении общего решения терять данный случай нельзя.

Теперь обговорим метод решения. Пусть мы имеем диффур в «классическом» виде:

$$\dot{x} + a(t)x = b(t) \cdot x^m$$

Избавимся от x в правой части уравнения, поделив всё на его степень:

$$\frac{\dot{x}}{x^m} + \frac{a(t)}{x^{m-1}} = b(t)$$

Теперь делаем хитрую (нет) замену:

$$\begin{cases} w = \frac{1}{x^{m-1}} \\ \dot{w} = \frac{(1-m)\dot{x}}{x^m} \implies \frac{\dot{x}}{x^m} = \frac{\dot{w}}{1-m} \end{cases}$$

Тогда диффур примет вид:

$$\frac{\dot{w}}{1-m} + a(t)w = b(t) \implies \dot{w} + (1-m) \cdot a(t)w = (1-m) \cdot b(t)$$

— получили обычный линейный диффур, который только что научились решать.

Уравнение Рикатти

Домашнее задание №3

Задача №1. Решить диффур:

$$(tx + e^t)dt - tdx = 0$$

Задача №2. Решить диффур:

$$t\dot{x} = x - t \cdot \exp\left(\frac{x}{t}\right)$$

Задача №3. Решить диффур:

$$t\dot{x} - 2t^2 \cdot \sqrt{x} = 4x$$

Задача №4. Решить диффур:

$$t^2\dot{x} + tx + t^2x^2 = 4$$

Задача №5. Пусть x_1, x_2 – независимые частные решения линейного диффура 1 порядка:

$$\dot{x} + a(t)x = b(t)$$

Найти общее решение (выразить через x_1 и x_2).

Common Tasks

1. Найти все гладкие функции $x(t)$ такие, что для любой точки $t_0 \in \mathbb{R}$ касательная к $x(t)$ в точке $(t_0, x(t_0))$ пересекает ось абсцисс в точке $\frac{t_0}{2}$.

2. Найти дифференциальное уравнение первого порядка, задающее на плоскости семейство парабол $x = at^2 + bt + c$, проходящих через точку $(0,1)$ и касающихся прямой $x = t$.

3. Решить диффур:

$$\frac{t}{x}\dot{x} = \ln x - \ln t + 1$$

4. Решить задачу Коши:

$$\dot{x} = \frac{1}{2x} \cdot \exp\left(\frac{x^2}{t}\right) + \frac{x}{2t}, \quad \text{начальное условие: } x(1) = 1$$

5. Решить диффур:

$$(t+1)(x\dot{x} - 1) = x^2$$

6. Решить задачу Коши:

$$\dot{x} - 2tx + x^2 = 5 - t^2, \quad \text{начальное условие: } x(0) = 0$$