

CH5. 확률과정

■ 확률과정(stochastic process)이란

- 확률법칙에 의해 생성되는 일련의 통계적인 현상
- 확률공간에서 정의되는 확률변수들의 모임

$$\{Z_t, t \in T\}$$

- 연속형 확률과정 / 이산형 확률과정
- 시계열은 T 가 시간의 부분집합인 확률과정
- 실현값(realization) 또는 표본통로(sample path) : 관측된 확률과정

정상 확률 과정

■ 정상성(stationarity)

정상 (stationary) = 시간 불변 (time-invariant)

- 시계열의 확률적인 성질들이 시간의 흐름에 따라 불변
- 평균, 분산, 자기공분산 등에 체계적인 변화가 없음
- 주기적인 변화가 없음

※ 대부분의 시계열의 이론들이 정상성을 가정하고 전개되어 있기 때문에
정상적이 아닌 시계열은 정상시계열로 변환해야함

정상 확률 과정

■ 강정상성(strict stationarity)

- Strong stationarity
- 결합확률분포가 시간에 따라 변하지 않음
- [정의] $\{Z_t, t = 1, 2, \dots\}$ 가 강정상성을 갖는다 $\stackrel{\text{def}}{=}$

임의의 자연수 t_1, \dots, t_k, h 와 실수 z_1, \dots, z_k 에 대하여 다음 등식이 성립

$$\Pr(Z_{t_1} \leq z_1, \dots, Z_{t_k} \leq z_k) = \Pr(Z_{t_1+h} \leq z_1, \dots, Z_{t_k+h} \leq z_k)$$

정상 확률 과정

■ 약정상성(weakly stationarity)

- Weak stationarity, second-order stationarity, covariance stationarity
- 평균, 분산, 자기공분산이 시간에 따라 변하지 않음
- [정의] $\{Z_t, t = 1, 2, \dots\}$ 가 정상성을 갖는다 $\stackrel{\text{def}}{=}$

모든 t 에 대하여 $E|Z_t|^2 < \infty$ 이고,

(1) 평균 일정 : $E(Z_t) = \mu, \forall t$

(2) 분산 일정 : $Var(Z_t) = \sigma^2, \forall t$

(3) 자기공분산이 시차 h 에만 의존 : $Cov(Z_t, Z_{t+h}) = \gamma_h, \forall t$


정상 확률 과정

■ 강정상과 약정상성의 관계

- 일반적으로 두 정상성은 포함관계가 없음
- 분산이 존재하는 강정상 시계열 => 약정상 시계열
- Gaussian process인 경우(결합확률분포가 다변량 정규분포인 경우)에는 두 정상성의 개념은 일치


정상 확률 과정

- 정상 시계열 : $N(0,1)$ iid



정상 확률 과정


- 정상 시계열 : $Z_t = 0.5Z_{t-1} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim N(0,1)$ i.i.d
 - 추세 없음(시계열의 평균이 시간 축에 평행)
 - 시계열의 진폭(변동)이 시간의 흐름에 따라 일정



정상 확률 과정

■ 정상 시계열 : $Z_t = 17 - 0.7Z_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim N(0,1)$ i.i.d

- 추세 없음(시계열의 평균이 시간 축에 평행)
- 시계열의 진폭(변동)이 시간의 흐름에 따라 일정



백색잡음 (White Noise)

- IID 확률 변수


- $Z_t \sim iid(\mu, \sigma^2) \Rightarrow \{Z_t\}$: 정상 시계열

- 백색잡음과정 (white noise process)

- 표기 : $\{Z_t\} \sim WN(0, \sigma^2)$
- 정의 : 다음의 3가지 조건을 만족하는 확률 과정
 - (1) $E(Z_t) = 0, \forall t$
 - (2) $Var(Z_t) = \sigma^2, \forall t$
 - (3) $Cov(Z_t, Z_{t+h}) = 0, \forall t, h \neq 0$
- $X_t \sim iid(0, \sigma^2) \Rightarrow \{X_t\} \sim WN(0, \sigma^2)$
- 백색잡음 $\{Z_t\}$ 는 stationary process

백색잡음 (White Noise)

- 백색잡음 $N(0,1)$ iid



절편이 없는 확률 보행 과정

■ 확률보행과정 (random walk process)

- $\{Z_t\} \sim$ random walk

$$Z_t = Z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2), Z_0 = 0$$

- $Z_t = Z_{t-1} + \varepsilon_t = Z_{t-2} + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t = Z_{t-3} + \varepsilon_{t-2} + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t = \dots = \sum_{i=1}^t \varepsilon_i$

(1) 평균 : $E(Z_t) = 0, \forall t$





(2) 분산 : $Var(Z_t) = t\sigma^2,$

(3) 자기공분산 : $Cov(Z_t, Z_{t+h}) = t\sigma^2$

- 확률보행과정 $\{Z_t\}$ 는 정상확률 과정이다 (O / X)

절편이 없는 확률 보행 과정

- 확률보행과정 (random walk process)



절편이 있는 확률 보행 과정

■ 절편이 있는 확률보행과정 (random walk process with drift)

- $\{Z_t\} \sim$ random walk with drift $\delta (\neq 0)$

$$Z_t = \delta + Z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2), Z_0 = 0$$

- $Z_t = \delta + Z_{t-1} + \varepsilon_t = \delta + \delta + Z_{t-2} + \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t = \dots = t\delta + \sum_{i=1}^t \varepsilon_i$

(1) 평균 : $E(Z_t) = t\delta$


(2) 분산 : $Var(Z_t) = t\sigma^2$

(3) 자기공분산 : $Cov(Z_t, Z_{t+h}) = t\sigma^2$

- 절편이 있는 확률보행과정 $\{Z_t\}$ 는 대표적인 비정상 (non-stationary) 확률 과정

절편이 있는 확률 보행 과정

- 절편이 있는 확률보행과정 (random walk process with drift)



이동평균 과정(moving average process)

■ 1차 - 이동평균 과정 (MA(1))

$$Z_t = \mu + \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1}, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$$

- 평균 : $E(Z_t) = \mu$
- 분산 : $Var(Z_t) = (1 + \theta^2)\sigma^2$
- 자기공분산 : $Cov(Z_t, Z_{t+h}) = \begin{cases} -\theta\sigma^2, & h = 1 \\ 0, & h > 1 \end{cases}$
- $\{Z_t\}$: stationary process


■ q차 - 이동평균 과정 (MA(q))

$$Z_t = \mu + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}, \quad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2)$$

- $\{Z_t\}$: stationary process
- 평균, 분산, 자기공분산 = ?


이동평균 과정(moving average process)

- **MA(1)** : $Z_t = \mu + \varepsilon_t - 0.5\varepsilon_{t-1}, \varepsilon_t \sim WN(0,1)$



이동평균 과정(moving average process)

- **MA(2)** : $Z_t = \mu + \varepsilon_t - 0.5\varepsilon_{t-1} - 0.3\varepsilon_{t-2}, \varepsilon_t \sim iid N(0,1)$



선형 과정(linear process)

■ 선형과정

$$Z_t = \mu + \varepsilon_t \varphi_1 \varepsilon_{t-1} + \varphi_2 \varepsilon_{t-2} + \cdots = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_j \varepsilon_{t-j}, \quad \varepsilon_t \sim \text{WN}(0, \sigma^2), \varphi_0 = 1$$

- 평균 : $E(Z_t) = \mu$
- 분산 : $\text{Var}(Z_t) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_j^2$
- 자기공분산 : $\text{Cov}(Z_t, Z_{t+h}) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_j \varphi_{j+|h|}$
- 정상성 조건 :

$$\sum_{j=0}^{\infty} \varphi_j^2 < \infty \Rightarrow \{Z_t\} : \text{stationary process}$$

- MA(∞) process, 무한이동평균과정(infinite moving average process)

후진 연산자

■ 후진연산자 (Backshift Operator)

- $BZ_t = Z_{t-1}, B^j Z_t = Z_{t-j}$

- 선형 과정

$$Z_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_j \varepsilon_{t-j} = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \varphi_j B^j \varepsilon_t = \mu + \Psi(B) \varepsilon_t$$

- MA(1)

$$Z_t = \mu + \varepsilon_t - \theta \varepsilon_{t-1} = \mu + \varepsilon_t - \theta B \varepsilon_t = \mu + (1 - \theta B) \varepsilon_t$$

- MA(q) : $\theta_0 = 1$

$$Z_t = \mu + \varepsilon_t - \theta_1 \varepsilon_{t-1} - \cdots - \theta_q \varepsilon_{t-q}$$

$$= \mu + (1 - \theta_1 B - \cdots - \theta_q B^q) \varepsilon_t = \mu + \sum_{j=0}^q \theta_j B^j \varepsilon_t$$

자기회귀 과정(autoregressive process)


■ 1차 – 자기회귀 과정 (AR(1) process)

$$Z_t - \mu = \varphi (Z_{t-1} - \mu) + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim iid(0, \sigma^2)$$

- $|\varphi| < 1$ 인 경우
 - $Z_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \varphi^j \varepsilon_{t-j}$: stationary linear process
 - 평균 : $E(Z_t) = \mu$
 - 분산 : $Var(Z_t) = \sigma^2 \sum_{j=0}^{\infty} \varphi^{2j} = \frac{\sigma^2}{1-\varphi^2}$
 - 자기공분산 : $Cov(Z_t, Z_{t+h}) = \varphi^h \frac{\sigma^2}{1-\varphi^2}$
- $|\varphi| = 1$ 인 경우 : random walk \Rightarrow non-stationary
- 정상성 조건 : $|\varphi| < 1 \Rightarrow \{Z_t\}$: stationary process

자기회귀 과정(autoregressive process)

- **AR(1)** : $Z_t = 0.5 Z_{t-1} + \varepsilon_t$, $\varepsilon_t \sim iid N(0, 1)$



자기공분산 함수

- 자기공분산함수 (autocovariance function, ACF)

$$\text{Cov}(Z_t, Z_{t+h}) = E\{(Z_t - E(Z_t))(Z_{t+h} - E(Z_{t+h}))\}$$

- 정상시계열의 ACF

- $\gamma_h = \text{Cov}(Z_t, Z_{t+h}) : t$ 와 무관하고, h 에만 의존
- 성질
 - $\gamma_0 = \text{Var}(Z_t), \forall t$
 - $|\gamma_h| \leq \gamma_0, \forall h$
 - $\gamma_{-h} = \gamma_h, \forall h = 1, 2, \dots$

- 표본 자기공분산 (sample autocovariance)

$$\hat{\gamma}_h = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^{n-h} (Z_t - \bar{Z})(Z_{t+h} - \bar{Z}), h = 0, 1, 2, \dots$$

자기상관함수

- 자기상관함수 (autocorrelation function, ACF)

$$\rho_h = \text{Corr}(Z_t, Z_{t+h})$$

- 정상시계열의 ACF

- $\rho_h = \text{Corr}(Z_t, Z_{t+h}) = \frac{\text{Cov}(Z_t, Z_{t+h})}{\text{sd}(Z_t)\text{sd}(Z_{t+h})} = \frac{\gamma_h}{\gamma_0}, \quad \forall t$

- 성질

- $\rho_0 = 1$
- $|\rho_h| \leq 1, \quad \forall h$
- $\rho_{-h} = \rho_h, \quad \forall h = 1, 2, \dots$

- 표본 자기상관함수 (sample autocorrelation function : SACF)

$$\hat{\rho}_h = \hat{\gamma}_h / \hat{\gamma}_0$$

자기상관함수

■ 표본 자기상관함수 (sample autocorrelation function : SACF)

$$\hat{\rho}_h = \frac{\hat{\gamma}_h}{\hat{\gamma}_0} = \frac{\sum_{t=1}^{n-h} (Z_t - \bar{Z})(Z_{t+h} - \bar{Z})}{\sum_{t=1}^n (Z_t - \bar{Z})^2}, \quad h = 1, 2, \dots$$

- 성질

- $E(\hat{\rho}_h) \cong \rho_h$
- MA(q) process (Bartlett, 1946) : $\hat{\rho}_h \approx N\left(\rho, \frac{1}{n}(1 + 2 \sum_{i=1}^q \rho_i^2)\right)$
- White noise : $\hat{\rho}_h \approx N\left(0, \frac{1}{n}\right)$



: $\Rightarrow H_0: \rho_h = 0$ vs. $H_1: \rho_h \neq 0$ 에 대한 검정에서 $|\hat{\rho}_h| > \frac{2}{\sqrt{n}}$ 이면 H_0 기각되고, 시차 h 에서 자기상관관계가 존재한다고 할 수 있음

자기상관함수

■ 표본 상관 도표 :

- 표본자기상관계수를 그린 그림
- 시계열 모형 식별에 사용

■ 예) $Z_t = 0.5 Z_{t-1} + \varepsilon_t, \varepsilon_t \sim iid N(0, 1)$



부분자기상관함수

■ 부분자기상관함수 (partial autocorrelation function : PACF)

- $\varphi_{kk} = \text{Corr}(Z_t^*, Z_{t+k}^*), k = 1, 2, 3, \dots$
 - $Z_t^* = Z_t - E(Z_t | Z_{t+1}, \dots, Z_{t+k-1})$
: Z_t 를 $Z_{t+1}, \dots, Z_{t+k-1}$ 에 회귀분석을 시행한 후의 잔차
 - $Z_{t+k}^* = Z_{t+k} - E(Z_{t+k} | Z_{t+1}, \dots, Z_{t+k-1})$
: Z_{t+k} 를 $Z_{t+1}, \dots, Z_{t+k-1}$ 에 회귀분석을 시행한 후의 잔차
- 의미 : Z_t 와 Z_{t+k} 에서 $Z_{t+1}, \dots, Z_{t+k-1}$ 의 효과를 제거한 후의 상관계수

■ 표본 부분자기상관함수 (SPACF)

- ARMA(p,q) 모형 적합시 모형의 차수 결정하는 데 이용

부분자기상관함수

■ 부분자기상관함수 구하는 방법 (1/2)

- 종속변수 Z_{t+k} 를 $Z_{t+k-1}, Z_{t+k-2}, \dots, Z_t$ 로 회귀분석

$$Z_{t+k} = \phi_{k1}Z_{t+k-1} + \phi_{k2}Z_{t+k-2} + \dots + \phi_{kk}Z_t$$

- 양변에 $Z_{t+k-j} (j \geq 1)$ 을 곱한 후 기대값을 취하면

$$\gamma_j = \phi_{k1}\gamma_{j-1} + \phi_{k2}\gamma_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\gamma_{j-k}$$

- 양변을 γ_0 로 나누면

$$\rho_j = \phi_{k1}\rho_{j-1} + \phi_{k2}\rho_{j-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_{j-k}$$

부분자기상관함수

■ 부분자기상관함수 구하는 방법 (2/2)

- $j = 1, \dots, k$ 에 대해 다음의 연립 방정식 생성

$$\rho_1 = \phi_{k1}\rho_0 + \phi_{k2}\rho_1 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-1}$$

$$\rho_2 = \phi_{k1}\rho_1 + \phi_{k2}\rho_0 + \dots + \phi_{kk}\rho_{k-2}$$

\vdots

$$\rho_k = \phi_{k1}\rho_{k-1} + \phi_{k2}\rho_{k-2} + \dots + \phi_{kk}\rho_0$$

- 연립방정식의 해를 구함

- $\phi_{11} = \rho_1$


- $\phi_{22} = \frac{\rho_2 - \rho_1^2}{1 - \rho_1^2}$

- \vdots


백색잡음의 SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : WN process


Time Series plot of White Noise



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : Population data


Time Series plot of Population data



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : Population data


Time Series plot of Population data



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : 백화점 매출


Time Series plot of Depart data



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : 중간재 출하지수


Time Series plot of Mindex data



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : 중간재 출하지수의 지수평활 후 잔차


Residual plot



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : 주식가격 데이터


Time Series plot of Stock data



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : 주가가격의 이중지수평활 후 잔차


Residual plot



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : 비행기 승객수


Time Series plot of KoreaPass data



SACF




SPACF




SACF와 SPACF

- 표본 상관 도표 : 비행기 승객수 - 로그변환 후 차분 (이분산성, 추세 제거)


Time Series plot of KoreaPass data



SACF



SPACF



End of Document