

# Regression Analysis

## Assignment #1

---

설명변수가 1개인 아래의 단순선형회귀(simple linear regression)를 고려하자.

$$y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + e_i \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

이를 다중선형회귀모형(multiple linear regression)에서 다른 벡터-행렬표현법으로 바꾸면 아래의 모형으로 생각할 수 있다.

$$\mathbf{y} = \mathbf{X}\boldsymbol{\beta} + \mathbf{e}$$

여기서

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \\ \vdots & \vdots \\ 1 & x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{e} = \begin{pmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{pmatrix}$$

이다. 오차에 대한 분포는  $e_i \sim N(0, \sigma^2)$ 이며 서로 독립임을 가정한다.

1.  $\mathbf{X}^T \mathbf{X}$ 를 계산하라. 그리고  $(\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$ 을 계산하라.
2.  $\mathbf{X}^T \mathbf{y}$ 를 계산하라.
3. 다중선형회귀모형에 의하면 회귀계수의 추정량  $\mathbf{b} = (b_0, b_1)^T$ 는  $\mathbf{b} = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y}$ 로 주어진다. 이를 계산하여

$$b_1 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad b_0 = \bar{y} - b_1 \bar{x}$$

임을 보여라. 여기서  $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 이고  $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ 이다.

4. 다중선형회귀모형에 의하면 회귀계수의 추정량  $\mathbf{b} = (b_0, b_1)^T$ 의 분산 및 공분산을 나타내는 행렬은

$$\text{Var}(\mathbf{b}) = \begin{pmatrix} \text{Var}(b_0) & \text{Cov}(b_0, b_1) \\ \text{Cov}(b_1, b_0) & \text{Var}(b_1) \end{pmatrix} = \sigma^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$$

으로 주어짐이 알려져 있다.  $\sigma^2 (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1}$ 을 계산하여

$$\text{Var}(b_1) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}, \quad \text{Var}(b_0) = \sigma^2 \left( \frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \right)$$

이 됨을 증명하라. 또한  $\text{Cov}(b_0, b_1)$ 은 어떻게 주어지는지 명시하라.