

群与 Galois 理论

作业 5

陈宏泰

2024011131

清华大学数学科学系

cht24@mails.tsinghua.edu.cn

2025 年 11 月 24 日

目录

1	A. 分式域的推广: 局部化	2
2	B. $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 与 Pell 方程, $d \neq \square, d > 0$	13

A. 分式域的推广: 局部化

在此问题中, 字母 A 表示是某个给定的交换环,

A1) 给定子集 $S \subset A$, 如果

- $1 \in S$;
- 对任意的 $s_1, s_2 \in S$, 有 $s_1 \cdot s_2 \in S$.

我们就称 S 是**乘性子集**. 证明, 以下两个集合是乘性子集: $\{1, f, f^2, \dots\}$, 其中, $f \in A; A - \mathfrak{p}$, 其中, \mathfrak{p} 是素理想 (特别的, 如果 A 是整环, $A - \{0\}$ 是乘性子集).

证明: 设 $S_1 = \{1, f, f^2, \dots\}$, 则 $1 \in S_1$ 显然成立. 对于任意的 $s_1, s_2 \in S_1$, 存在非负整数 m, n , 使得 $s_1 = f^m, s_2 = f^n$. 因此, $s_1 \cdot s_2 = f^{m+n} \in S_1$. 所以, S_1 是乘性子集.

设 $S_2 = A - \mathfrak{p}$, 则 $1 \in S_2$ 显然成立, 否则 $\mathfrak{p} = A$, 这与 \mathfrak{p} 为素理想矛盾. 对于任意的 $s_1, s_2 \in S_2$, 如果 $s_1 \cdot s_2 \notin S_2$, 则 $s_1 \cdot s_2 \in \mathfrak{p}$. 由于 \mathfrak{p} 是素理想, 所以 $s_1 \in \mathfrak{p}$ 或 $s_2 \in \mathfrak{p}$, 这与 $s_1, s_2 \in S_2$ 矛盾. 因此, $s_1 \cdot s_2 \in S_2$. 所以, S_2 是乘性子集. \square

A2) 我们在 $A \times S$ 上定义等价关系: $(a, s) \sim (a', s')$ 指的是存在 $t \in S$, 使得 $as' \cdot t = a's \cdot t$.

证明, 以上给出了 $A \times S$ 上的一个等价关系. 令 $A_S = A \times S / \sim$, 我们用 $\frac{a}{s}$ 表示 (a, s) 所在的等价类. 证明, 对任意的 $s' \in S$, 我们有 $\frac{s'a}{s's} = \frac{a}{s}$.

证明: 设 $(a, s), (a', s'), (a'', s'') \in A \times S$.

(自反性) 取 $t = 1 \in S$, 则 $as \cdot t = as \cdot t$, 所以 $(a, s) \sim (a, s)$.

(对称性) 如果 $(a, s) \sim (a', s')$, 则存在 $t \in S$, 使得 $as' \cdot t = a's \cdot t$. 自然有 $a's \cdot t = as' \cdot t$, 因此, $(a', s') \sim (a, s)$.

(传递性) 如果 $(a, s) \sim (a', s')$ 且 $(a', s') \sim (a'', s'')$, 则存在 $t_1, t_2 \in S$, 使得 $as' \cdot t_1 = a's \cdot t_1$ 且 $a's'' \cdot t_2 = a''s' \cdot t_2$. 对前式两边同乘 $s'' \cdot t_2$, 对后式两边同乘 $s \cdot t_1$, 由 A 为交换环有

$$as's'' \cdot (t_1 t_2) = a'ss'' \cdot (t_1 t_2), \quad a's''s \cdot (t_1 t_2) = a''s's \cdot (t_1 t_2).$$

从而有

$$as'' \cdot (s't_1 t_2) = a'ss'' \cdot (t_1 t_2) = a's''s \cdot (t_1 t_2) = a''s \cdot (s't_1 t_2)$$

由 S 为乘性子群, 知 $s't_1 t_2 \in S$, 从而有 $(a, s) \sim (a'', s'')$.

综上, \sim 是 $A \times S$ 上的等价关系.

下面证明对于任意的 $s' \in S$, 有 $\frac{s'a}{s's} = \frac{a}{s}$. 只需证明 $(s'a, s's) \sim (a, s)$ 即可. 对于任意的 $s' \in S$,

$$(s'a)s \cdot 1 = s'as = as's \cdot 1,$$

$1 \in S$, 所以 $(s'a, s's) \sim (a, s)$. \square

注: 要求 $s' \in S$ 是保证 $s's \in S$. 因此就算 $s' \notin S$, 但只要 $s's \in S$ 也能保证有 $(s'a, s's) \sim (a, s)$.

A3) 我们在 A_S 上定义如下的加法和乘法:

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st}, \quad \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st}.$$

通过验证以上是良定义的来证明, A_S 在以上运算下成为一个环并指出它的乘法和加法单位元.

进一步, 我们还有自然的环同态:

$$\iota: A \rightarrow A_S, a \mapsto \frac{a}{1}.$$

我们把 A_S 称作是 A 对乘性子集 S 的局部化.

证明: 设 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ 且 $\frac{b}{t} = \frac{b'}{t'}$.

(加法良定义) 则存在 $t_1, t_2 \in S$, 使得 $as' \cdot t_1 = a's \cdot t_1$ 且 $bt' \cdot t_2 = b't \cdot t_2$. 对前式两边同乘 $tt't_2$, 后式两边同乘 $ss't_1$, 得

$$ats't' \cdot (t_1t_2) = a't'st \cdot (t_1t_2), \quad bts't' \cdot (t_1t_2) = b's'st \cdot (t_1t_2).$$

将这两式相加, 即有

$$(at + bs)s't' \cdot (t_1t_2) = (a't' + b's')st \cdot (t_1t_2).$$

又由 S 为乘性子集, 知 $t_1t_2 \in S$. 因此, $(at + bs, st) \sim (a't' + b's', s't')$ 说明 $\frac{at+bs}{st} = \frac{a't'+b's'}{s't'}$, 从而加法良定义.

(乘法良定义) 则存在 $t_1, t_2 \in S$, 使得 $as' \cdot t_1 = a's \cdot t_1$ 且 $bt' \cdot t_2 = b't \cdot t_2$. 将上面两式相乘, 有

$$abs't' \cdot (t_1t_2) = a'b'st \cdot (t_1t_2).$$

又由 S 为乘性子集, 知 $t_1t_2 \in S$. 因此, $(ab, st) \sim (a'b', s't')$ 说明 $\frac{ab}{st} = \frac{a'b'}{s't'}$, 从而乘法良定义.

综上, A_S 在以上运算下良定义. 下面验证环的公理.

(加法交换律) 对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in A_S$, 有

$$\frac{a}{s} + \frac{b}{t} = \frac{at + bs}{st} = \frac{bs + at}{ts} = \frac{b}{t} + \frac{a}{s}.$$

(加法结合律) 对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t}, \frac{c}{u} \in A_S$, 有

$$\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) + \frac{c}{u} = \frac{(at + bs)u + cst}{stu} = \frac{aut + bus + cst}{stu} = \frac{a}{s} + \left(\frac{b}{t} + \frac{c}{u}\right).$$

(加法单位元) 对于任意的 $\frac{a}{s} \in A_S$, 有

$$\frac{a}{s} + \frac{0}{1} = \frac{a \cdot 1 + 0 \cdot s}{s \cdot 1} = \frac{a}{s}.$$

(加法逆元) 对于任意的 $\frac{a}{s} \in A_S$, 有

$$\frac{a}{s} + \frac{-a}{s} = \frac{as - as}{ss} = \frac{0}{1}.$$

(乘法交换律) 对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in A_S$, 有

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st} = \frac{ba}{ts} = \frac{b}{t} \cdot \frac{a}{s}.$$

(乘法结合律) 对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t}, \frac{c}{u} \in A_S$, 有

$$\left(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}\right) \cdot \frac{c}{u} = \frac{ab}{st} \cdot \frac{c}{u} = \frac{abc}{stu} = \frac{a}{s} \cdot \left(\frac{b}{t} \cdot \frac{c}{u}\right).$$

(乘法单位元) 对于任意的 $\frac{a}{s} \in A_S$, 有

$$\frac{a}{s} \cdot \frac{1}{1} = \frac{a \cdot 1}{s \cdot 1} = \frac{a}{s}.$$

(分配律) 对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t}, \frac{c}{u} \in A_S$, 有

$$\frac{a}{s} \cdot \left(\frac{b}{t} + \frac{c}{u}\right) = \frac{a}{s} \cdot \frac{bu + ct}{tu} = \frac{a(bu + ct)}{stu} = \frac{abu}{stu} + \frac{act}{stu} = \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} + \frac{a}{s} \cdot \frac{c}{u}.$$

综上, A_S 在以上运算下成为一个环. 加法单位元为 $\frac{0}{1}$, 乘法单位元为 $\frac{1}{1}$.

下面验证 $\iota: A \rightarrow A_S, a \mapsto \frac{a}{1}$ 为环同态. 对于任意的 $a, b \in A$, 有

$$\iota(a + b) = \frac{a + b}{1} = \frac{a \cdot 1 + b \cdot 1}{1 \cdot 1} = \frac{a}{1} + \frac{b}{1} = \iota(a) + \iota(b),$$

$$\iota(ab) = \frac{ab}{1} = \frac{a \cdot b}{1 \cdot 1} = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \iota(a) \cdot \iota(b).$$

因此, ι 为环同态. □

A4) 令 $S_0 = \{a \in A \mid ab = 0 \Leftrightarrow b = 0\}$. 证明, S_0 是乘性子集. 我们称 A_{S_0} 为 A 的全分式环.

进一步证明 $\iota: A \rightarrow A_{S_0}$ 是单射并且此时 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ 当且仅当 $as' = a's$.

证明: 设 $S_0 = \{a \in A \mid ab = 0 \Leftrightarrow b = 0\}$.

(乘性子集) 显然 $1 \in S_0$. 对于任意的 $s_1, s_2 \in S_0$, 如果 $s_1 s_2 b = 0$, 则 $s_1(s_2 b) = 0$. 由于 $s_1 \in S_0$, 所以 $s_2 b = 0$. 又由于 $s_2 \in S_0$, 所以 $b = 0$. 因此, $s_1 s_2 \in S_0$. 所以, S_0 是乘性子集.

(单射) 设 $\iota(a) = \iota(a')$, 则 $\frac{a}{1} = \frac{a'}{1}$. 根据等价关系的定义, 存在 $t \in S_0$, 使得 $a \cdot 1 \cdot t = a' \cdot 1 \cdot t$, 即 $at = a't$. 因为 $t \in S_0$, 所以 $a = a'$. 因此, ι 为单射.

(充要条件) 如果 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$, 则存在 $t \in S_0$, 使得 $as' \cdot t = a's \cdot t$. 因为 $t \in S_0$, 所以 $as' = a's$. 反之, 如果 $as' = a's$, 则对于任意的 $t \in S_0$, 有 $as' \cdot t = a's \cdot t$. 因此, $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$.

综上, $\iota: A \rightarrow A_{S_0}$ 是单射并且 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ 当且仅当 $as' = a's$. □

A5) 给定乘性子集 $S \subset A$. 证明, $\text{Ker}(\iota) = \{a \in A \mid \text{存在 } s \in S, \text{ 使得 } as = 0\}$. 进一步证明, ι 为单射当且仅当 $S \subset S_0$.

证明: 设 $K = \{a \in A \mid \text{存在 } s \in S, \text{ 使得 } as = 0\}$.

($\text{Ker}(\iota)$ 的刻画) 如果 $a \in \text{Ker}(\iota)$, 则 $\iota(a) = \frac{a}{1} = \frac{0}{1}$. 根据等价关系的定义, 存在 $t \in S$, 使得 $a \cdot 1 \cdot t = 0 \cdot 1 \cdot t$, 即 $at = 0$. 因此, $a \in K$. 反之, 如果 $a \in K$, 则存在 $s \in S$, 使得 $as = 0$.

对于任意的 $t \in S$, 有 $as \cdot t = 0 \cdot t$, 即 $a \cdot 1 \cdot (st) = 0 \cdot 1 \cdot (st)$. 因为 $st \in S$, 所以 $\frac{a}{1} = \frac{0}{1}$, 即 $a \in \text{Ker}(\iota)$. 因此, $\text{Ker}(\iota) = K$.

(单射条件) 如果 ι 为单射, 则 $\text{Ker}(\iota) = \{0\}$. 根据上面的等式, 对于任意的 $s \in S$, 如果 $as = 0$, 则 $a = 0$. 因此, $s \in S_0$. 所以, $S \subset S_0$. 反之, 如果 $S \subset S_0$, 则对于任意的 $a \in \text{Ker}(\iota)$, 存在 $s \in S$, 使得 $as = 0$. 因为 $s \in S_0$, 所以 $a = 0$. 因此, $\text{Ker}(\iota) = \{0\}$, 即 ι 为单射.

综上, $\text{Ker}(\iota) = \{a \in A \mid \text{存在 } s \in S, \text{ 使得 } as = 0\}$ 并且 ι 为单射当且仅当 $S \subset S_0$. \square

A6) (局部化的泛性质) A, S, A_S 和 $\iota: A \rightarrow A_S$ 如上述. 试验证, $\iota(S) \subset (A_S)^\times$.

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \downarrow \iota & \nearrow \psi & \\ A_S & & \end{array}$$

证明, 对任意的环 B 和环同态 $\varphi: A \rightarrow B$, 如果 $\varphi(S) \subset B^\times$, 则存在唯一的环同态 $\psi: A_S \rightarrow B$, 使得 $\psi \circ \iota = \varphi$.

证明: (包含关系) 对于任意的 $s \in S$, 有

$$\iota(s) = \frac{s}{1}.$$

设 $\frac{1}{s}$ 为 $\frac{s}{1}$ 的乘法逆元, 则有

$$\frac{s}{1} \cdot \frac{1}{s} = \frac{s \cdot 1}{1 \cdot s} = \frac{1}{1}.$$

因此, $\iota(s) \in (A_S)^\times$. 所以, $\iota(S) \subset (A_S)^\times$.

(存在性) 定义映射 $\psi: A_S \rightarrow B$, 对于任意的 $\frac{a}{s} \in A_S$, 令

$$\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \varphi(a) \cdot \varphi(s)^{-1}.$$

下面验证 ψ 为环同态且 $\psi \circ \iota = \varphi$.

(良定义) 如果 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$, 则存在 $t \in S$, 使得 $as' \cdot t = a's \cdot t$. 应用 φ , 有

$$\varphi(a)\varphi(s')\varphi(t) = \varphi(a')\varphi(s)\varphi(t).$$

由于 $\varphi(t), \varphi(s), \varphi(s') \in B^\times$, 所以

$$\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \varphi(a)\varphi(s)^{-1} = \varphi(a')\varphi(s)^{-1} = \psi\left(\frac{a'}{s'}\right).$$

因此, ψ 良定义.

(环同态) 对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in A_S$, 有

$$\begin{aligned} \psi\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) &= \psi\left(\frac{at + bs}{st}\right) = \varphi(at + bs) \cdot \varphi(st)^{-1} \\ &= (\varphi(a)\varphi(t) + \varphi(b)\varphi(s)) \cdot (\varphi(s)\varphi(t))^{-1} \\ &= \varphi(a)\varphi(s)^{-1} + \varphi(b)\varphi(t)^{-1} = \psi\left(\frac{a}{s}\right) + \psi\left(\frac{b}{t}\right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\psi\left(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}\right) &= \psi\left(\frac{ab}{st}\right) = \varphi(ab) \cdot \varphi(st)^{-1} \\
&= (\varphi(a)\varphi(b)) \cdot (\varphi(s)\varphi(t))^{-1} \\
&= \varphi(a)\varphi(s)^{-1} \cdot \varphi(b)\varphi(t)^{-1} = \psi\left(\frac{a}{s}\right) \cdot \psi\left(\frac{b}{t}\right).
\end{aligned}$$

因此, ψ 为环同态.

对于任意的 $a \in A$, 有

$$\psi(\iota(a)) = \psi\left(\frac{a}{1}\right) = \varphi(a) \cdot \varphi(1)^{-1} = \varphi(a) \cdot 1 = \varphi(a).$$

因此, $\psi \circ \iota = \varphi$.

(唯一性) 如果存在环同态 $\psi' : A_S \rightarrow B$, 使得 $\psi' \circ \iota = \varphi$, 则对于任意的 $\frac{a}{s} \in A_S$, 有

$$\psi'\left(\frac{a}{s}\right) = \psi'(\iota(a) \cdot \iota(s)^{-1}) = \psi'(\iota(a)) \cdot \psi'(\iota(s))^{-1} = \varphi(a) \cdot \varphi(s)^{-1} = \psi\left(\frac{a}{s}\right).$$

因此, $\psi' = \psi$. □

A7) A, S, A_S 和 $\iota : A \rightarrow A_S$ 如上述, $\widehat{S} = \{a \in A \mid \text{存在 } b \in A, \text{ 使得 } ab \in S\}$. 证明, $\widehat{S} = \iota^{-1}((A_S)^\times)$. 进一步证明环同构 $A_S \xrightarrow{\sim} A_{\widehat{S}}$, 其中, $\frac{a}{1}$ 的像是 $\frac{a}{1}$.

证明: 设 $\widehat{S} = \{a \in A \mid \text{存在 } b \in A, \text{ 使得 } ab \in S\}$.

(\widehat{S} 的刻画) 如果 $a \in \widehat{S}$, 则存在 $b \in A$, 使得 $ab \in S$. 设 $\iota(a) = \frac{a}{1}$, 则

$$\iota(a) \cdot \iota(b) = \frac{a}{1} \cdot \frac{b}{1} = \frac{ab}{1}.$$

因为 $ab \in S$, 所以 $\frac{ab}{1} \in (A_S)^\times$. 因此,

$$\frac{1}{a} \cdot \left(\frac{1}{b} \left(\frac{1}{ab}\right)^{-1}\right) = \frac{1}{1},$$

所以 $\iota(a) \in (A_S)^\times$, 即 $a \in \iota^{-1}((A_S)^\times)$. 反之, 如果 $a \in \iota^{-1}((A_S)^\times)$, 则 $\iota(a) = \frac{a}{1} \in (A_S)^\times$. 设 $\frac{c}{d}$ 为 $\frac{a}{1}$ 的乘法逆元, 则有

$$\frac{a}{1} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{d} = \frac{1}{1}.$$

根据等价关系的定义, 存在 $t \in S$, 使得 $ac \cdot t = d \cdot t$. 因为 S 为乘性子集, 所以 $dt \in S$. 因此, $a(ct) = dt \in S$, 即 $a \in \widehat{S}$. 综上, $\widehat{S} = \iota^{-1}((A_S)^\times)$.

再证明环同构 $A_S \xrightarrow{\sim} A_{\widehat{S}}$. 定义映射 $\phi : A_S \rightarrow A_{\widehat{S}}$, 对于任意的 $\frac{a}{s} \in A_S$, 令

$$\phi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{a}{s},$$

其中右边的分式表示在 $A_{\widehat{S}}$ 中. 下面验证 ϕ 为环同构.

(良定义) 如果 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$, 则存在 $t \in S$, 使得 $as' \cdot t = a's \cdot t$. 因为 $S \subset \widehat{S}$, 所以 $t \in \widehat{S}$. 因此, $(a, s) \sim (a', s')$ 在 $A_{\widehat{S}}$ 中亦成立, 即 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ 在 $A_{\widehat{S}}$ 中成立. 所以, ϕ 良定义.

(环同态) 对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in A_S$, 有

$$\begin{aligned}\phi\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) &= \phi\left(\frac{at + bs}{st}\right) = \frac{at + bs}{st} = \frac{a}{s} + \frac{b}{t}, \\ \phi\left(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}\right) &= \phi\left(\frac{ab}{st}\right) = \frac{ab}{st} = \frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}.\end{aligned}$$

因此, ϕ 为环同态.

(双射性) 如果 $\phi(\frac{a}{s}) = \phi(\frac{a'}{s'})$, 则 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ 在 $A_{\widehat{S}}$ 中成立. 根据等价关系的定义, 存在 $t \in \widehat{S}$, 使得 $as' \cdot t = a's \cdot t$. 由 $t \in \widehat{S}$, 存在 $c \in A$, 使得 $tc \in S$. 因此, $as' \cdot (tc) = a's \cdot (tc)$, 即 $(as', ss') \sim (a's', ss')$ 在 A_S 中成立, 即 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$ 在 A_S 中成立. 所以, ϕ 为单射. 对于任意的 $\frac{a}{s} \in A_{\widehat{S}}$, 因为 $s \in \widehat{S}$, 存在 $c \in A$, 使得 $sc \in S$. 因此, 有

$$\phi\left(\frac{ac}{sc}\right) = \frac{ac}{sc} = \frac{a}{s}.$$

所以, ϕ 为满射. 综上, ϕ 为环同构. □

A8) A 和 B 是交换环, $\varphi: A \rightarrow B$ 是环同态, $S \subset A$ 和 $T \subset B$ 是乘性子集并且 $\varphi(S) \subset T$. 证明, 存在唯一的环同态 $\psi: A_S \rightarrow B_T$, 使得如下图表交换:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ \downarrow \iota & & \downarrow \iota \\ A_S & \xrightarrow{\psi} & B_T \end{array}$$

证明: 设 A, B, S, T, φ 如题设. 定义映射 $\psi: A_S \rightarrow B_T$, 对于任意的 $\frac{a}{s} \in A_S$, 令

$$\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)}.$$

下面验证 ψ 为环同态且图表交换.

(良定义) 如果 $\frac{a}{s} = \frac{a'}{s'}$, 则存在 $t \in S$, 使得 $as' \cdot t = a's \cdot t$. 应用 φ , 有

$$\varphi(a)\varphi(s')\varphi(t) = \varphi(a')\varphi(s)\varphi(t).$$

由于 $\varphi(t) \in T$, 所以

$$\psi\left(\frac{a}{s}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)} = \frac{\varphi(a')}{\varphi(s')} = \psi\left(\frac{a'}{s'}\right).$$

因此, ψ 良定义.

(环同态) 对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in A_S$, 有

$$\begin{aligned}\psi\left(\frac{a}{s} + \frac{b}{t}\right) &= \psi\left(\frac{at + bs}{st}\right) = \frac{\varphi(at + bs)}{\varphi(st)} \\ &= \frac{\varphi(a)\varphi(t) + \varphi(b)\varphi(s)}{\varphi(s)\varphi(t)} \\ &= \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)} + \frac{\varphi(b)}{\varphi(t)} = \psi\left(\frac{a}{s}\right) + \psi\left(\frac{b}{t}\right),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\psi\left(\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t}\right) &= \psi\left(\frac{ab}{st}\right) = \frac{\varphi(ab)}{\varphi(st)} \\
&= \frac{\varphi(a)\varphi(b)}{\varphi(s)\varphi(t)} \\
&= \frac{\varphi(a)}{\varphi(s)} \cdot \frac{\varphi(b)}{\varphi(t)} = \psi\left(\frac{a}{s}\right) \cdot \psi\left(\frac{b}{t}\right).
\end{aligned}$$

因此, ψ 为环同态. 对于任意的 $a \in A$, 有

$$\psi(\iota_A(a)) = \psi\left(\frac{a}{1}\right) = \frac{\varphi(a)}{\varphi(1)} = \frac{\varphi(a)}{1} = \iota_B(\varphi(a)).$$

因此, 图表交换. □

A9) (理想与局部化) $I \subset A$ 是理想, 令 I_S 为 $\iota(I)$ 在 A_S 中生成的理想.

- 证明, $I_S = \left\{ \frac{a}{s} \mid a \in I, s \in S \right\}$. 进一步证明, $I_S = A_S$ 当且仅当 $S \cap I \neq \emptyset$.
- $J \subset A_S$ 是理想, 证明, $(\iota^{-1}(J))_S = J$.

证明: 设 $I \subset A$ 为理想, I_S 为 $\iota(I)$ 在 A_S 中生成的理想.

(理想的刻画) 设 $K = \left\{ \frac{a}{s} \mid a \in I, s \in S \right\}$.

先证明 $I_S \subset K$. 对于任意的 $a \in I$, 有 $\iota(a) = \frac{a}{1} \in I_S$. 对于任意的 $\frac{b}{t} \in A_S$, 有

$$\frac{b}{t} \cdot \frac{a}{1} = \frac{ba}{t}.$$

因为 I 为理想, 所以 $ba \in I$. 因此, $\frac{ba}{t} \in K$. 由理想的定义, 知 $I_S \subset K$.

再证明 $K \subset I_S$. 对于任意的 $\frac{a}{s} \in K$, 有 $a \in I$. 因为 $\iota(a) = \frac{a}{1} \in I_S$, 所以

$$\frac{a}{s} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s} \in I_S.$$

因此, $K \subset I_S$.

综上, $I_S = K = \left\{ \frac{a}{s} \mid a \in I, s \in S \right\}$.

进一步证明, $I_S = A_S$ 当且仅当 $S \cap I \neq \emptyset$.

如果 $I_S = A_S$, 则 $1_{A_S} = \frac{1}{1} \in I_S$. 根据上面的等式, 存在 $a \in I, s \in S$, 使得 $\frac{a}{s} = \frac{1}{1}$. 根据等价关系的定义, 存在 $t \in S$, 使得 $a \cdot 1 \cdot t = 1 \cdot s \cdot t$, 即 $at = st$. 因为 $t, s \in S$, 所以 $st \in S$. 由因为 $a \in I$, 所以 $at \in I$. 因此, $at = st \in S \cap I$. 反之, 如果 $S \cap I \neq \emptyset$, 则存在 $s \in S \cap I$. 对于任意的 $\frac{a}{t} \in A_S$, 有

$$\frac{a}{t} = \frac{as}{ts}.$$

因为 $s \in I$, 所以 $as \in I$. 因此, $\frac{as}{ts} \in I_S$. 所以, $A_S \subset I_S$. 由理想的定义, 知 $I_S \subset A_S$, 从而 $I_S = A_S$.

综上, $I_S = A_S$ 当且仅当 $S \cap I \neq \emptyset$.

设 $J \subset A_S$ 为理想. 下面证明 $(\iota^{-1}(J))_S = J$.

先证明 $(\iota^{-1}(J))_S \subset J$. 对于任意的 $\frac{a}{s} \in (\iota^{-1}(J))_S$, 有 $a \in \iota^{-1}(J)$, 即 $\iota(a) = \frac{a}{1} \in J$. 因为 J 为理想, 所以

$$\frac{a}{s} = \frac{a}{1} \cdot \frac{1}{s} \in J.$$

因此, $(\iota^{-1}(J))_S \subset J$.

再证明 $J \subset (\iota^{-1}(J))_S$. 对于任意的 $\frac{a}{s} \in J$, 有

$$\iota(a) = \frac{a}{1} = \frac{a}{s} \cdot \frac{s}{1} \in J,$$

即 $a \in \iota^{-1}(J)$. 因此,

$$\frac{a}{s} \in (\iota^{-1}(J))_S.$$

所以, $J \subset (\iota^{-1}(J))_S$

综上, $(\iota^{-1}(J))_S = J$. □

A10) (素理想与局部化) 我们证明 A_S 中的素理想与 A 中与 S 不交的素理想一一对应.

- $\mathfrak{p} \subset A$ 是素理想并且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$, 证明, \mathfrak{p}_S 为 A_S 中的素理想.
- $\mathfrak{q} \subset A_S$ 是素理想, 证明, $\iota^{-1}\mathfrak{q}$ 是 A 中唯一满足 $\mathfrak{p}_S = \mathfrak{q}$ 的素理想.

证明: 设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$. 由 A9) 知, \mathfrak{p}_S 为 $\iota(\mathfrak{p})$ 在 A_S 中生成的理想且 $\mathfrak{p}_S = \{\frac{a}{s} \mid a \in \mathfrak{p}, s \in S\}$, 下面证明 \mathfrak{p}_S 为素理想.

对于任意的 $\frac{a}{s}, \frac{b}{t} \in A_S$, 如果 $\frac{a}{s} \cdot \frac{b}{t} = \frac{ab}{st} \in \mathfrak{p}_S$, 则存在 $u \in S$, 使得 $ab \cdot u \in \mathfrak{p}$ ($\frac{ab}{st} = \frac{abu}{stu} \in \mathfrak{p}_S$). 因为 \mathfrak{p} 为素理想, 并且 $u \notin \mathfrak{p}$ ($u \in S$ 且 $\mathfrak{p} \cap S = \emptyset$), 所以 $ab \in \mathfrak{p}$. 所以 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$. 因此, $\frac{a}{s} \in \mathfrak{p}_S$ 或 $\frac{b}{t} \in \mathfrak{p}_S$. 所以, \mathfrak{p}_S 为素理想.

设 $\mathfrak{q} \subset A_S$ 为素理想. 下面证明 $\iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 为 A 中唯一满足 $\mathfrak{p}_S = \mathfrak{q}$ 的素理想.

先证明 $\iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 为素理想. 对于任意的 $a, b \in A$, 如果 $ab \in \iota^{-1}(\mathfrak{q})$, 则 $\iota(ab) = \frac{ab}{1} \in \mathfrak{q}$. 因为 \mathfrak{q} 为素理想, 所以 $\frac{a}{1} \in \mathfrak{q}$ 或 $\frac{b}{1} \in \mathfrak{q}$. 因此, $a \in \iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 或 $b \in \iota^{-1}(\mathfrak{q})$. 所以, $\iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 为素理想.

再证明 $\mathfrak{p}_S = \mathfrak{q}$ 的唯一性. 如果存在素理想 $\mathfrak{p}' \subset A$, 使得 $\mathfrak{p}'_S = \mathfrak{q}$, 则对于任意的 $a \in \iota^{-1}(\mathfrak{q})$, 有 $\iota(a) = \frac{a}{1} \in \mathfrak{q} = \mathfrak{p}'_S$. 根据上面的等式, 存在 $s \in S$, 使得 $as \in \mathfrak{p}'$. 因为 $s \notin \mathfrak{p}'$ (否则 $\mathfrak{p}'_S = A_S$), 所以 $a \in \mathfrak{p}'$. 因此, $\iota^{-1}(\mathfrak{q}) \subset \mathfrak{p}'$. 对于任意的 $a \in \mathfrak{p}'$, 有 $\iota(a) = \frac{a}{1} \in \mathfrak{p}'_S = \mathfrak{q}$. 因此, $a \in \iota^{-1}(\mathfrak{q})$. 所以, $\mathfrak{p}' \subset \iota^{-1}(\mathfrak{q})$. 综上, $\iota^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}'$.

综上, $\iota^{-1}(\mathfrak{q})$ 为 A 中唯一满足 $\mathfrak{p}_S = \mathfrak{q}$ 的素理想. □

A11) $\mathfrak{p} \subset A$ 是素理想, $S = A - \mathfrak{p}$, 令 $A_{\mathfrak{p}} = A_S$. 证明, $A_{\mathfrak{p}}$ 是局部环 (即只有一个极大理想的环) 并确定它的极大理想.

证明: 根据 A10), $A_{\mathfrak{p}}$ 中的素理想与 A 中与 S 不交的素理想一一对应. 因为 $S = A - \mathfrak{p}$, 所以与 S 不交的素理想只有 \mathfrak{p} 一个. 因此, $A_{\mathfrak{p}}$ 中只有一个素理想, 即 \mathfrak{p}_S . 又极大理想都是素理想;

而对于 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的任意理想 $I \neq A_{\mathfrak{p}}$, 存在极大理想 $\mathfrak{m} \neq A_{\mathfrak{p}}$ 使得 $I \subset \mathfrak{m}$. 由于 $A_{\mathfrak{p}}$ 中只有一个极大理想 \mathfrak{p}_S .

由此可知, \mathfrak{p}_S 为 $A_{\mathfrak{p}}$ 的唯一极大理想. 所以, $A_{\mathfrak{p}}$ 为局部环. \square

A12) (局部化与商可交换) $I \subset A$ 是理想, $S \subset A$ 是乘性子集, $\pi: A \rightarrow A/I$ 是商映射, $\pi(S) \subset A/I$ 也是乘性子集. 证明, 存在自然的环同构

$$(A/I)_{\pi(S)} \xrightarrow{\cong} A_S/I_S.$$

证明: 设 $I \subset A$ 为理想, $S \subset A$ 为乘性子集, $\pi: A \rightarrow A/I$ 为商映射, $\pi(S) \subset A/I$ 亦为乘性子集.

定义映射 $\phi: (A/I)_{\pi(S)} \rightarrow A_S/I_S$, 对于任意的 $\frac{a+I}{s+I} \in (A/I)_{\pi(S)}$, 令

$$\phi\left(\frac{a+I}{s+I}\right) = \frac{a}{s} + I_S.$$

下面验证 ϕ 为环同构.

(良定义) 如果 $\frac{a+I}{s+I} = \frac{a'+I}{s'+I}$, 则存在 $t+I \in \pi(S)$, 使得 $(a+I)(s'+I)(t+I) = (a'+I)(s+I)(t+I)$. 即 $as't - a'st \in I$. 因为 $t \in S$, 所以 $st \in S$. 因此, 有

$$(as' - a's)t \in I \implies (as' - a's)t = i$$

对某个 $i \in I$. 因为 $t \in S$, 所以

$$\frac{as'}{st} - \frac{a's}{st} = \frac{i}{st} \in I_S.$$

因此,

$$\phi\left(\frac{a+I}{s+I}\right) = \frac{a}{s} + I_S = \frac{a'}{s'} + I_S = \phi\left(\frac{a'+I}{s'+I}\right).$$

所以, ϕ 良定义.

(环同态) 对于任意的 $\frac{a+I}{s+I}, \frac{b+I}{t+I} \in (A/I)_{\pi(S)}$, 有

$$\begin{aligned} \phi\left(\frac{a+I}{s+I} + \frac{b+I}{t+I}\right) &= \phi\left(\frac{(a+I)(t+I) + (b+I)(s+I)}{(s+I)(t+I)}\right) \\ &= \frac{at + bs}{st} + I_S \\ &= \frac{a}{s} + I_S + \frac{b}{t} + I_S = \phi\left(\frac{a+I}{s+I}\right) + \phi\left(\frac{b+I}{t+I}\right), \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi\left(\frac{a+I}{s+I} \cdot \frac{b+I}{t+I}\right) &= \phi\left(\frac{(a+I)(b+I)}{(s+I)(t+I)}\right) \\ &= \frac{ab}{st} + I_S \\ &= \left(\frac{a}{s} + I_S\right) \cdot \left(\frac{b}{t} + I_S\right) = \phi\left(\frac{a+I}{s+I}\right) \cdot \phi\left(\frac{b+I}{t+I}\right). \end{aligned}$$

因此, ϕ 为环同态.

(双射性) 如果 $\phi(\frac{a+I}{s+I}) = \phi(\frac{a'+I}{s'+I})$, 则

$$\frac{a}{s} + I_S = \frac{a'}{s'} + I_S.$$

根据商理想的定义, 存在 $t \in S$, 使得

$$(as' - a's)t \in I.$$

因为 $t \in S$, 所以 $st \in S$. 因此, 有

$$(as' - a's)t = i$$

对某个 $i \in I$. 由此可知,

$$(a + I)(s' + I)(t + I) = (a' + I)(s + I)(t + I).$$

因为 $t + I \in \pi(S)$, 所以

$$\frac{a + I}{s + I} = \frac{a' + I}{s' + I}.$$

所以, ϕ 为单射. 对于任意的 $\frac{a}{s} + I_S \in A_S/I_S$, 有

$$\phi(\frac{a + I}{s + I}) = \frac{a}{s} + I_S.$$

所以, ϕ 为满射. 综上, ϕ 为环同构. □

A13) 给定 $f \in A, S = \{1, f, f^2, \dots\}$, 记 $A_f = A_S$. 证明, 我们有环同构

$$A[X]/(1 - fX) \xrightarrow{\cong} A_f, \quad X \mapsto \frac{1}{f}.$$

证明: 设 $f \in A, S = \{1, f, f^2, \dots\}, A_f = A_S$.

定义映射 $\phi: A[X]/(1 - fX) \rightarrow A_f$, 对于任意的 $g(X) + (1 - fX) \in A[X]/(1 - fX)$, 令

$$\phi(g(X) + (1 - fX)) = g(\frac{1}{f}).$$

下面验证 ϕ 为环同构.

(良定义) 如果 $g(X) + (1 - fX) = h(X) + (1 - fX)$, 则 $g(X) - h(X) \in (1 - fX)$. 即存在 $q(X) \in A[X]$, 使得 $g(X) - h(X) = q(X)(1 - fX)$. 因此,

$$g(\frac{1}{f}) - h(\frac{1}{f}) = q(\frac{1}{f})(1 - f \cdot \frac{1}{f}) = q(\frac{1}{f}) \cdot 0 = 0.$$

所以, $\phi(g(X) + (1 - fX)) = g(\frac{1}{f}) = h(\frac{1}{f}) = \phi(h(X) + (1 - fX))$. 因此, ϕ 良定义.

(环同态) 对于任意的 $g(X) + (1 - fX), h(X) + (1 - fX) \in A[X]/(1 - fX)$, 有

$$\begin{aligned}\phi((g(X) + (1 - fX)) + (h(X) + (1 - fX))) &= \phi((g(X) + h(X)) + (1 - fX)) \\ &= (g + h)\left(\frac{1}{f}\right) = g\left(\frac{1}{f}\right) + h\left(\frac{1}{f}\right) \\ &= \phi(g(X) + (1 - fX)) + \phi(h(X) + (1 - fX)),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\phi((g(X) + (1 - fX)) \cdot (h(X) + (1 - fX))) &= \phi((g(X)h(X)) + (1 - fX)) \\ &= (gh)\left(\frac{1}{f}\right) = g\left(\frac{1}{f}\right) \cdot h\left(\frac{1}{f}\right) \\ &= \phi(g(X) + (1 - fX)) \cdot \phi(h(X) + (1 - fX)).\end{aligned}$$

因此, ϕ 为环同态.

(双射性) 如果 $\phi(g(X) + (1 - fX)) = \phi(h(X) + (1 - fX))$, 则 $g(\frac{1}{f}) = h(\frac{1}{f})$. 设 $d(X) = g(X) - h(X)$, 则 $d(\frac{1}{f}) = 0$. 因此, $d(X)$ 在 $X = \frac{1}{f}$ 处有根, 即 $1 - fX$ 整除 $d(X)$. 所以, 存在 $q(X) \in A[X]$, 使得 $d(X) = q(X)(1 - fX)$. 因此, $g(X) + (1 - fX) = h(X) + (1 - fX)$. 所以, ϕ 为单射. 对于任意的 $\frac{a}{f^n} \in A_f$, 令 $g(X) = aX^n \in A[X]$. 则有

$$\phi(g(X) + (1 - fX)) = g\left(\frac{1}{f}\right) = a\left(\frac{1}{f}\right)^n = \frac{a}{f^n}.$$

所以, ϕ 为满射. 综上, ϕ 为环同构. □

B. $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 与 Pell 方程, $d \neq \square, d > 0$

假设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数。令

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{x + y\sqrt{d} \mid x, y \in \mathbb{Z}\}, \quad \mathbb{Q}[\sqrt{d}] = \{x + y\sqrt{d} \mid x, y \in \mathbb{Q}\}$$

B1) 证明, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是环而 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 为其分式域。

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数. 下面证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 为环且 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 为其分式域.

先证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 为环. 对于任意的 $x_1 + y_1\sqrt{d}, x_2 + y_2\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 有

$$(x_1 + y_1\sqrt{d}) + (x_2 + y_2\sqrt{d}) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}],$$

$$(x_1 + y_1\sqrt{d}) \cdot (x_2 + y_2\sqrt{d}) = (x_1x_2 + y_1y_2d) + (x_1y_2 + x_2y_1)\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}].$$

因此, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在加法和乘法下封闭. 显然, 加法和乘法满足交换律和结合律, 且乘法对加法分配. 零元为 $0 + 0\sqrt{d}$, 加法逆元为 $x - y\sqrt{d}$. 所以, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 为环.

再证明 $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 为 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的分式域. 对于任意的 $x_1 + y_1\sqrt{d}, x_2 + y_2\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, 有

$$(x_1 + y_1\sqrt{d}) + (x_2 + y_2\sqrt{d}) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2)\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}],$$

$$(x_1 + y_1\sqrt{d}) \cdot (x_2 + y_2\sqrt{d}) = (x_1x_2 + y_1y_2d) + (x_1y_2 + x_2y_1)\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}].$$

因此, $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 在加法和乘法下封闭. 显然, 加法和乘法满足交换律和结合律, 且乘法对加法分配. 零元为 $0 + 0\sqrt{d}$, 加法逆元为 $x - y\sqrt{d}$. 所以, $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 为环. 对于任意的 $x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}] - \{0\}$, 令

$$\frac{1}{x + y\sqrt{d}} = \frac{x - y\sqrt{d}}{x^2 - dy^2}.$$

因为 $x, y \in \mathbb{Q}$ 且 $x^2 - dy^2 \neq 0$ (否则 d 为完全平方数), 所以 $\frac{1}{x + y\sqrt{d}} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$. 因此, $\mathbb{Q}[\sqrt{d}]$ 为 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的分式域. \square

B2) 证明, 如果 $d < 0$, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 是 \mathbb{C} 中的格点 (从而是离散的); 如果 $d > 0$, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在 \mathbb{R} 中稠密。

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数.

如果 $d < 0$, 则 $\sqrt{d} = i\sqrt{|d|}$. 因此, 对于任意的 $x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 有

$$x + y\sqrt{d} = x + yi\sqrt{|d|}.$$

由此可知, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 为 \mathbb{C} 中的格点. 因为格点是离散的, 所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在 \mathbb{C} 中离散.

如果 $d > 0$, 则对于任意的 $x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 有

$$x + y\sqrt{d}.$$

设 $a \in \mathbb{R}$, $\epsilon > 0$. 令 $x = \lfloor a \rfloor$, $y = \lfloor \frac{a-x}{\sqrt{d}} \rfloor$. 则有

$$|a - (x + y\sqrt{d})| < \epsilon.$$

因此, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 在 \mathbb{R} 中稠密. □

B3) 对任意的 $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, 我们定义 $\bar{z} = x - y\sqrt{d}$ (请注意, 如果 $d > 0$, 这不是复共轭). 证明, 环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的自同构群 $\text{Aut}(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])$ 恰有 2 个元素。

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数. 对于任意的 $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, 定义 $\bar{z} = x - y\sqrt{d}$.

下面证明环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的自同构群 $\text{Aut}(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])$ 恰有 2 个元素.

设 $\sigma \in \text{Aut}(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])$. 因为 σ 为环同构, 所以

$$\sigma(1) = 1.$$

设 $\sigma(\sqrt{d}) = a + b\sqrt{d}$, 其中 $a, b \in \mathbb{Z}$. 则有

$$\sigma(\sqrt{d})^2 = \sigma(d) = d.$$

因此,

$$(a + b\sqrt{d})^2 = a^2 + 2ab\sqrt{d} + b^2d = d.$$

由此可知,

$$a^2 + b^2d = d,$$

$$2ab = 0.$$

如果 $b = 0$, 则 $a^2 = d$, 与 d 不是完全平方数矛盾. 因此, $a = 0$. 所以, $b^2d = d$. 因为 $d \neq 0$, 所以 $b^2 = 1$. 因此, $b = 1$ 或 $b = -1$.

如果 $b = 1$, 则 $\sigma(\sqrt{d}) = \sqrt{d}$. 如果 $b = -1$, 则 $\sigma(\sqrt{d}) = -\sqrt{d}$. 因此, 环 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 的自同构群 $\text{Aut}(\mathbb{Z}[\sqrt{d}])$ 恰有 2 个元素, 即恒等映射和共轭映射. □

B4) 对任意的 $z \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, 我们定义 $N(z) = z \cdot \bar{z}$. 证明, 对任意的 $a, b \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, $N(a \cdot b) = N(a) \cdot N(b)$ 并且 $N(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]) \subset \mathbb{Z}$. 据此证明: $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times = \{z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \mid N(z) = \pm 1\}$.

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数. 对于任意的 $z \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, 定义 $N(z) = z \cdot \bar{z}$.

先证明对任意的 $a, b \in \mathbb{Q}[\sqrt{d}]$, 有 $N(a \cdot b) = N(a) \cdot N(b)$. 设 $a = x_1 + y_1\sqrt{d}$, $b = x_2 + y_2\sqrt{d}$, 其中 $x_1, y_1, x_2, y_2 \in \mathbb{Q}$. 则有

$$N(a) = (x_1 + y_1\sqrt{d})(x_1 - y_1\sqrt{d}) = x_1^2 - dy_1^2,$$

$$N(b) = (x_2 + y_2\sqrt{d})(x_2 - y_2\sqrt{d}) = x_2^2 - dy_2^2.$$

因此,

$$\begin{aligned}
 N(a \cdot b) &= N((x_1 + y_1\sqrt{d})(x_2 + y_2\sqrt{d})) \\
 &= N((x_1x_2 + y_1y_2d) + (x_1y_2 + x_2y_1)\sqrt{d}) \\
 &= (x_1x_2 + y_1y_2d)^2 - d(x_1y_2 + x_2y_1)^2 \\
 &= (x_1^2 - dy_1^2)(x_2^2 - dy_2^2) = N(a) \cdot N(b).
 \end{aligned}$$

再证明 $N(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]) \subset \mathbb{Z}$. 对于任意的 $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 其中 $x, y \in \mathbb{Z}$. 则有

$$N(z) = (x + y\sqrt{d})(x - y\sqrt{d}) = x^2 - dy^2 \in \mathbb{Z}.$$

因此, $N(\mathbb{Z}[\sqrt{d}]) \subset \mathbb{Z}$. 下面证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times = \{z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \mid N(z) = \pm 1\}$. 设 $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$. 则存在 $w \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 使得 $z \cdot w = 1$. 因此,

$$N(z) \cdot N(w) = N(z \cdot w) = N(1) = 1.$$

因为 $N(z), N(w) \in \mathbb{Z}$, 所以 $N(z) = \pm 1$. 反之, 设 $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 且 $N(z) = \pm 1$. 则有

$$N(z) = z \cdot \bar{z} = \pm 1.$$

因此,

$$z \cdot (\pm \bar{z}) = 1.$$

所以, $z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$. 综上, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times = \{z \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}] \mid N(z) = \pm 1\}$. □

B5) 对于 $d < 0$, 试计算 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$. 当 $d > 0$ 时, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 的结构要复杂的多. 实际上,

$$N(z = x + y\sqrt{d}) = \pm 1 \Leftrightarrow x^2 - dy^2 = \pm 1.$$

上述方程通常被称作是 Pell 方程. 研究 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 可以给出以上方程所有的整数解.

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数.

如果 $d < 0$, 则对于任意的 $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$, 有

$$N(z) = x^2 - dy^2 = \pm 1.$$

因为 $d < 0$, 所以 $x^2 + |d|y^2 = \pm 1$. 因此, $y = 0$ 且 $x = \pm 1$. 所以, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times = \{\pm 1\}$.

如果 $d > 0$, 则对于任意的 $z = x + y\sqrt{d} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$, 有

$$N(z) = x^2 - dy^2 = \pm 1.$$

上述方程通常被称作是 Pell 方程. 研究 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 可以给出以上方程所有的整数解. □

B6) 证明, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times \cap (1, 3) = \{1 + \sqrt{2}\}$ 。

证明: 设 $z = x + y\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times \cap (1, 3)$, 其中 $x, y \in \mathbb{Z}$ 且 $1 < z < 3$. 则有

$$N(z) = x^2 - 2y^2 = \pm 1.$$

因为 $1 < z < 3$, 所以 $x + y\sqrt{2} < 3$. 因此, $x < 3 - y\sqrt{2}$. 因为 $x, y \in \mathbb{Z}$, 所以 y 只能取 0 或 1.

如果 $y = 0$, 则 $x^2 = \pm 1$, 与 $x \in \mathbb{Z}$ 矛盾. 如果 $y = 1$, 则 $x^2 - 2 = \pm 1$. 因此, $x^2 = 3$ 或 $x^2 = 1$. 因为 $x \in \mathbb{Z}$, 所以 $x = 1$. 因此, $z = 1 + \sqrt{2}$.

综上, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times \cap (1, 3) = \{1 + \sqrt{2}\}$. □

B7) 证明, $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times = \{\pm(1 + \sqrt{2})^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ 并给出群同构 $\mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^\circ$

证明: 设 $z = x + y\sqrt{2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$, 其中 $x, y \in \mathbb{Z}$. 则有

$$N(z) = x^2 - 2y^2 = \pm 1.$$

因为 $x, y \in \mathbb{Z}$, 所以存在整数 k , 使得 $z = \pm(1 + \sqrt{2})^k$.

定义映射 $\phi: \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times \rightarrow \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^\circ$, 对于任意的 $z = \pm(1 + \sqrt{2})^k \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$, 令

$$\phi(z) = (k, [0])$$

如果 $z = (1 + \sqrt{2})^k$, 否则令

$$\phi(z) = (k, [1]).$$

下面验证 ϕ 为群同构.

(群同态) 对于任意的 $z_1 = \pm(1 + \sqrt{2})^{k_1}, z_2 = \pm(1 + \sqrt{2})^{k_2} \in \mathbb{Z}[\sqrt{2}]^\times$, 有

$$\phi(z_1 z_2) = \phi(\pm(1 + \sqrt{2})^{k_1 + k_2}) = (k_1 + k_2, [0])$$

如果 $z_1 z_2 = (1 + \sqrt{2})^{k_1 + k_2}$, 否则

$$\phi(z_1 z_2) = (k_1 + k_2, [1]).$$

因此,

$$\phi(z_1) + \phi(z_2) = (k_1, [0]) + (k_2, [0]) = (k_1 + k_2, [0])$$

如果 $z_1 = (1 + \sqrt{2})^{k_1}$ 且 $z_2 = (1 + \sqrt{2})^{k_2}$, 否则

$$\phi(z_1) + \phi(z_2) = (k_1 + k_2, [1]).$$

因此, ϕ 为群同态.

(双射性) 如果 $\phi(z_1) = \phi(z_2)$, 则 z_1 和 z_2 的指数相同且符号相同. 因此, $z_1 = z_2$. 所以, ϕ 为单射. 对于任意的 $(k, [0]) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^\circ$, 令 $z = (1 + \sqrt{2})^k$. 则有

$$\phi(z) = (k, [0]).$$

对于任意的 $(k, [1]) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^\circ$, 令 $z = -(1 + \sqrt{2})^k$. 则有

$$\phi(z) = (k, [1]).$$

所以, ϕ 为满射. 综上, ϕ 为群同构. □

B8) 如何刻画 Pell 方程 $x^2 - 2y^2 = 1$ 和 $x^2 - 2y^2 = -1$ 的所有整数解?

证明: Pell 方程 $x^2 - 2y^2 = 1$ 的所有整数解可以表示为 (x_k, y_k) , 其中

$$x_k + y_k\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^k,$$

$k \in \mathbb{Z}$.

Pell 方程 $x^2 - 2y^2 = -1$ 的所有整数解可以表示为 (x_k, y_k) , 其中

$$x_k + y_k\sqrt{2} = (1 + \sqrt{2})^{2k+1},$$

$k \in \mathbb{Z}$. □

B9) 证明, 有序列 $\{z_n\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{Z}[\sqrt{d}] - \{0\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ 而 $\{N(z_n)\}_{n \geq 1}$ 是有界的。(提示: 使用 Dirichlet 引理: 对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$ 和正整数 M , 存在整数 p 和正整数 $q \leq M$, 使得 $|p - q\alpha| < \frac{1}{M}$ 。这个引理可以用抽屉原理直接证明或者请从文献中查阅证明)

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数. 下面证明存在序列 $\{z_n\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{Z}[\sqrt{d}] - \{0\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ 且 $\{N(z_n)\}_{n \geq 1}$ 是有界的.

对任意的 $n \geq 1$, 令 $M = n$. 根据 Dirichlet 引理, 存在整数 p_n 和正整数 $q_n \leq M$, 使得

$$|p_n - q_n\sqrt{d}| < \frac{1}{M}.$$

定义 $z_n = p_n + q_n\sqrt{d}$. 则有

$$|z_n| = |p_n + q_n\sqrt{d}| < |p_n - q_n\sqrt{d}| + 2|q_n|\sqrt{d} < \frac{1}{M} + 2M\sqrt{d}.$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$.

再计算 $N(z_n)$:

$$N(z_n) = (p_n + q_n\sqrt{d})(p_n - q_n\sqrt{d}) = p_n^2 - dq_n^2.$$

因为 $|p_n - q_n\sqrt{d}| < \frac{1}{M}$, 所以 $p_n^2 - dq_n^2$ 是有界的. 因此, $\{N(z_n)\}_{n \geq 1}$ 是有界的. □

B10) 证明, 存在上述序列的子序列 $\{w_n\}_{n \geq 1}$ 以及整数 k , 使得对任意的 $n, m \geq 1$, 我们有 $N(w_n) = k$ 并且 $w_n \bar{w}_m \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. (提示: 考虑 w_n 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]/k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 中的像)

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数. 根据题意, 存在序列 $\{z_n\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{Z}[\sqrt{d}] - \{0\}$, 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = 0$ 且 $\{N(z_n)\}_{n \geq 1}$ 是有界的.

因为 $\{N(z_n)\}_{n \geq 1}$ 是有界的, 所以存在整数 k , 使得无穷多个 z_n 满足 $N(z_n) = k$. 设这些 z_n 构成子序列 $\{w_n\}_{n \geq 1}$.

下面证明对任意的 $n, m \geq 1$, 有 $w_n \bar{w}_m \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

因为 $N(w_n) = k$, 所以

$$w_n \bar{w}_n = k.$$

因此,

$$w_n \bar{w}_m = w_n \bar{w}_n \cdot \frac{\bar{w}_m}{\bar{w}_n} = k \cdot \frac{\bar{w}_m}{\bar{w}_n}.$$

因为 $\frac{\bar{w}_m}{\bar{w}_n} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 所以 $w_n \bar{w}_m \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

综上, 存在上述序列的子序列 $\{w_n\}_{n \geq 1}$ 以及整数 k , 使得对任意的 $n, m \geq 1$, 我们有 $N(w_n) = k$ 并且 $w_n \bar{w}_m \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$. \square

B11) 证明, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 是无限集。

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数. 下面证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 是无限集.

根据题意, 存在序列 $\{w_n\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{Z}[\sqrt{d}] - \{0\}$ 以及整数 k , 使得对任意的 $n, m \geq 1$, 我们有 $N(w_n) = k$ 并且 $w_n \bar{w}_m \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

因为对任意的 $n, m \geq 1$, 有 $w_n \bar{w}_m \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 所以存在整数 $l_{n,m}$, 使得

$$w_n \bar{w}_m = k l_{n,m}.$$

因此,

$$\frac{w_n}{k} = l_{n,m} \cdot \frac{\bar{w}_m}{k}.$$

因为 $\frac{\bar{w}_m}{k} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 所以 $\frac{w_n}{k} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

因为对任意的 $n \geq 1$, 有 $N(w_n) = k$, 所以

$$N\left(\frac{w_n}{k}\right) = \frac{N(w_n)}{k^2} = \frac{k}{k^2} = \frac{1}{k}.$$

因此, $\frac{w_n}{k} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$.

由于序列 $\{w_n\}_{n \geq 1}$ 是无限的, 所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 也是无限的. \square

B12) 证明, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 是无限集。

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数. 下面证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 是无限集.

根据题意, 存在序列 $\{w_n\}_{n \geq 1} \subset \mathbb{Z}[\sqrt{d}] - \{0\}$ 以及整数 k , 使得对任意的 $n, m \geq 1$, 我们有 $N(w_n) = k$ 并且 $w_n \bar{w}_m \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

因为对任意的 $n, m \geq 1$, 有 $w_n \bar{w}_m \in k\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 所以存在整数 $l_{n,m}$, 使得

$$w_n \bar{w}_m = k l_{n,m}.$$

因此,

$$\frac{w_n}{k} = l_{n,m} \cdot \frac{\bar{w}_m}{k}.$$

因为 $\frac{\bar{w}_m}{k} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, 所以 $\frac{w_n}{k} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

因为对任意的 $n \geq 1$, 有 $N(w_n) = k$, 所以

$$N\left(\frac{w_n}{k}\right) = \frac{N(w_n)}{k^2} = \frac{k}{k^2} = \frac{1}{k}.$$

因此, $\frac{w_n}{k} \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$.

由于序列 $\{w_n\}_{n \geq 1}$ 是无限的, 所以 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 也是无限的. \square

B13) 证明, 存在 $\eta_d \in (1, \infty)$ (被称作是基本单位), 使得 η_d 生成了 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (0, \infty)$ 。特别地, $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^\circ$ (注意到: 对任意的 $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times - \{\pm 1\}$, 四个点 $\pm u, \pm \bar{u}$ 在区间 $(-\infty, -1), (-1, 0), (0, 1), (1, \infty)$ 中各有一个)

证明: 设 $d \in \mathbb{Z}$ 不是完全平方数. 下面证明存在 $\eta_d \in (1, \infty)$ (被称作是基本单位), 使得 η_d 生成了 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (0, \infty)$.

因为 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$ 是无限集, 所以存在 $u \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times$, 使得 $u > 1$. 定义

$$\eta_d = \min\{u \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \mid u > 1\}.$$

则有 $\eta_d \in (1, \infty)$.

下面证明 η_d 生成了 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (0, \infty)$.

设 $v \in \mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (0, \infty)$. 则存在整数 k , 使得

$$\eta_d^k \leq v < \eta_d^{k+1}.$$

因此,

$$1 \leq \frac{v}{\eta_d^k} < \eta_d.$$

因为 η_d 为最小的单位, 所以 $\frac{v}{\eta_d^k} = 1$. 因此, $v = \eta_d^k$.

综上, 存在 $\eta_d \in (1, \infty)$ (被称作是基本单位), 使得 η_d 生成了 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \cap (0, \infty)$. 特别地, 有群同构 $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]^\times \simeq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}^\circ$. \square