

## 清华大学 2025-2026 秋季学期，群与 Galois 理论，作业 2

请用 A4 大小的纸张正反面用钢笔，签字笔或者圆珠笔书写，并注明自己的姓名、年级（书院或系）和作业的总页数。除定理公式所涉及的人名之外，请使用中文。本次作业请扫描并上传至网络学堂，具体截止日期请查阅网络学堂，逾期视作零分。

### A. 对称群 $\mathfrak{S}_n$ 中的计算

假设  $n \geq 2$ 。

- A1) 假设  $S = \{(i, j)\}$  是一些对换 (2-循环) 的集合并且  $S$  生成  $\mathfrak{S}_n$ ，那么， $|S|$  的最小值是多少？
- A2) 假设  $|i_0 - j_0|$  与  $n$  互素。证明， $S_4 = \{(i_0, j_0), (1, 2, \dots, n)\}$  生成  $\mathfrak{S}_n$ 。
- A3) 假设  $n \geq 5$ 。证明， $\mathfrak{A}_n$  中的所有 3-循环是（在  $\mathfrak{A}_n$  中）相互共轭的。
- A4) 证明， $\mathfrak{A}_5$  可以被双对换  $\{(i, j)(k, l) | 1 \leq i, j, k, l \leq 5 \text{ 且两两不同}\}$  生成。
- A5) ( $\mathfrak{A}_5$  的自同构群) 令  $G = \mathfrak{A}_5$ 。
- a) 假设  $x = (12)(34) \in G$ ， $y \in G$  的是一个 3 阶元。证明， $xy$  的阶为 5 当且仅当  $y$  的两个不动点一个在  $\{1, 2\}$  中并且另一个在  $\{3, 4\}$  中。
- b) 令  $X = \{(u, v) \in G \times G | u, v, uv \text{ 的阶分别为 } 2, 3, 5\}$ ，证明， $|X| = 120$ 。
- c)  $\text{Aut}(G)$  作用在  $X$  上，证明，这个作用是自由的。据此， $|\text{Aut}(G)| \leq 120$ 。由于  $\text{Aut}(G)$  包含  $\mathfrak{S}_5$ ，从而  $\text{Aut}(G) = \mathfrak{S}_5$ 。
- A6) ( $\mathfrak{A}_4$  的自同构群) 用  $(2, 3, 3)$  (元素的阶) 替换  $(2, 3, 5)$ ，试用类似的方法证明  $\text{Aut}(\mathfrak{A}_4) = \mathfrak{S}_4$ 。
- A7) ( $\mathfrak{S}_4$  的自同构群) 用  $(2, 3, 4)$  (元素的阶) 替换  $(2, 3, 5)$ ，试用类似的方法证明  $\text{Aut}(\mathfrak{S}_4) = \mathfrak{S}_4$ 。
- A8) 试用 A6) 的结论证明 A7)。

### B. 交错群 $\mathfrak{A}_n$ ( $n \geq 5$ ) 是单群

如果群  $G$  除了 1 和本身之外没有其它的正规子群，我们就称  $G$  是**单群**。很明显，循环群只有在其阶为素数时为单群。

- B0) 给出  $\mathfrak{A}_3$  和  $\mathfrak{A}_4$  的正规子群。
- B1) 我们按照以下步骤证明  $\mathfrak{A}_5$  是单群：
- B1-1) 假设  $N \triangleleft \mathfrak{A}_5$  是正规子群并且  $N \neq 1$ 。假设  $N$  包含一个双置换 (两个不交的置换之积)，不妨设为  $\sigma = (1, 2)(3, 4)$ ，证明， $\tau = (1, 5)(3, 4)$  在  $\mathfrak{A}_5$  中与  $\sigma$  共轭。特别地，证明  $\sigma\tau$  是 3-循环。
- B1-2) 假设  $N \triangleleft \mathfrak{A}_5$  是正规子群并且  $N \neq 1$ 。假设  $N$  包含一个 5-循环，不妨设为  $\sigma = (1, 2, 3, 4, 5)$ ，证明， $\tau = (2, 3, 1, 4, 5)$  在  $\mathfrak{A}_5$  中与  $\sigma$  共轭。特别地，证明  $\tau\sigma^2$  是 3-循环。
- B1-3) 假设  $N \triangleleft \mathfrak{A}_5$  是正规子群并且  $N \neq 1$ 。证明， $N$  包含所有的 3-循环，从而， $\mathfrak{A}_5$  是单群。
- B2) 我们还可以按照以下步骤证明  $\mathfrak{A}_5$  是单群

B2-1) 证明,  $\mathfrak{A}_5$  有五个共轭类并且每个共轭类中的元素个数分别为 1, 12, 12, 15 和 20。

B2-2) 子群  $N \subset \mathfrak{A}_5$  在  $\mathfrak{A}_5$  的共轭下不变。证明,  $|N|$  只能等于 1, 13, 16, 21, 25, 28, 33, 36, 40, 45, 48 和 60。

B2-3) 证明,  $\mathfrak{A}_5$  是单群。

B3) 以下假设  $n \geq 6$  并且  $\mathfrak{A}_{n-1}$  是单群。假设  $N \triangleleft \mathfrak{A}_n$  是正规子群并且  $N \neq 1$ ,  $N \neq \mathfrak{A}_n$ 。

B3-1) 如果存在  $\sigma \in N - \{1\}$  使得  $\sigma(n) = n$ , 证明,  $N = \mathfrak{A}_n$ 。

B3-2) 证明, 对任意的  $\sigma \in N - \{1\}$ , 只要  $\{i, j\} \cap \{\sigma(n), n\} = \emptyset$ , 那么,  $\tau\sigma\tau^{-1}\sigma = 1$ , 其中,  $\tau = (i, j)(n, \sigma(n))$ 。

B3-3) 同上, 证明,  $\sigma^2 = 1$  并且  $\sigma : \{i, j\} \rightarrow \{i, j\}$ 。(提示: 考虑  $\sigma^{-1}\tau\sigma\tau^{-1}$ )

B3-4) 证明,  $\sigma = (n, \sigma(n))$  从而得到矛盾。据此,  $\mathfrak{A}_n$  是单群。

B4) 假设  $n \geq 5$ ,  $G \triangleleft \mathfrak{S}_n$  为正规子群, 证明, 如果  $G \neq 1$ ,  $G \neq \mathfrak{S}_n$ , 那么,  $G = \mathfrak{A}_n$ 。

B5) 证明,  $N = \{1, (1, 2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)\}$  是  $\mathfrak{S}_4$  的正规子群并且  $N \triangleleft \mathfrak{A}_4$ 。 $\mathfrak{S}_4/N$  是哪一个群?

B6) 假设  $n \geq 5$ ,  $H < \mathfrak{S}_n$  为子群,  $d = [\mathfrak{S}_n : H]$ 。证明, 存在群同态  $\varphi : \mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{S}_d$ , 使得  $\text{Ker}(\varphi) < H$ 。据此证明, 如果  $H \neq \mathfrak{A}_n, \mathfrak{S}_n$ , 那么,  $d \geq n$ 。

B7) 证明, 对于  $n \geq 2$ , 存在单的群同态  $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{A}_{n+2}$  (从而  $\mathfrak{S}_n$  可被视作是  $\mathfrak{A}_{n+2}$  的子群) 但是不存在单的群同态  $\mathfrak{S}_n \rightarrow \mathfrak{A}_{n+1}$ 。