

## ODE-第八次作业

习题 1 定义矩阵值函数

$$A(t) := \begin{bmatrix} t^2 & -1 \\ 2t & 0 \end{bmatrix}.$$

考虑线性方程  $\dot{x} = A(t)x$ 。

1) 验证  $\phi(t) := (1, t^2)^t$  是方程的解。

2) 做如下变量替换：

$$x = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ t^2 & 1 \end{bmatrix} y$$

写出  $y$  满足的微分方程。

3) 求解 2) 中得到的微分方程。并得到原方程的一个解。

4) 求原方程的一组基。

习题 2 求系统  $\dot{x} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x$  的流  $\Pi(t, s)$ 。

习题 3 验证讲义第四部分性质 13 证明过程中的等式

$$e^{\mu I_m + B} = J_\lambda(m).$$

习题 4 本题的目的是证明性质 14.

1) 设  $A, B \in M_d(\mathbb{R})$  且  $A = e^B$ 。设  $\lambda < 0$  是  $A$  的特征值。证明  $B$  有形如

$$\log(-\lambda) \pm (2k+1)\pi i, k \in \mathbb{Z}$$

的一对特征根。由此证明：若  $J_\lambda(m)$  出现在  $A$  的 *Jordan* 标准型中，则其必出现偶数次。

2) 设  $a, b \in \mathbb{R}$  且  $b \neq 0$ ，则存在  $D \in M_2(\mathbb{R})$  使得

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} = e^D.$$

特别的，存在  $D \in M_2(\mathbb{R})$  使得  $e^D = -I_2$ 。

3) 证明如下两个矩阵相似：

$$\begin{bmatrix} J_\lambda(m) & \\ & J_\lambda(m) \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} \lambda I_2 & I_2 & & & \\ & \lambda I_2 & I_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda I_2 & I_2 \\ & & & & \lambda I_2 \end{bmatrix}$$

4) 设  $C, D \in M_2(\mathbb{R})$  使得  $C = e^D$ ，则存在  $B \in M_{2m}(\mathbb{R})$  使得

$$\begin{bmatrix} C & I_2 & & & \\ & C & I_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & C & I_2 \\ & & & & C \end{bmatrix} = e^B.$$

5) 证明性质 14。

**习题 5** 1) 设  $A, B \in M_d(\mathbb{C})$  且  $A = e^B$ 。证明  $A$  可对角化当且仅当  $B$  可对角化。

2) 设  $A \in M_d(\mathbb{C})$  可逆。证明  $A$  可对角化当且仅当  $A^2$  可对角化。

(注：此二性质用在了定理 7 的证明过程中)