

# 濾泡性淋巴瘤 (Follicular Lymphoma) 是慢性病嗎？

*Is follicular lymphoma a chronic disease?*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/11 · 最後更新：2026/05/11 · 審稿：林協霆 (2026/05/11) · 主題：濾泡性淋巴瘤 (Follicular lymphoma)

DOI: 10.5281/zenodo.20131216 · 此版本 10.5281/zenodo.20131217 ·

<https://lin.hsiehting.com/posts/2026/follicular-lymphoma-indolent-treatment/>

## 摘要 · ABSTRACT

Follicular lymphoma 是「慢病化」的低度淋巴瘤：中位存活 > 15 年，但目前無治癒方案。本文整理 watch-and-wait 何時適用、第一線 rituximab-bendamustine vs. R-CHOP、復發治療路徑 (lenalidomide、tazemetostat、CD19/CD20 雙特異性抗體、CAR-T)，與「轉型」 (transformation to DLBCL) 的警訊。

**Follicular lymphoma (FL) 是「indolent」 (低度) B 細胞淋巴瘤，中位存活 > 15 年，但目前無治癒方案。** 治療目標是「控制症狀、延長無進展時間、減少累積毒性」。本文整理 watch-and-wait 何時適用 (GELF criteria)、第一線 R-bendamustine vs. R-CHOP vs. Obinutuzumab-CHOP、復發治療路徑 (lenalidomide + rituximab、tazemetostat、CD3×CD20 雙特異性抗體、CAR-T)，以及「轉型」成 DLBCL 的警訊與處理。

## 閱讀對象

本文設定讀者為剛診斷 FL、面對「先不治療」建議感到困惑的病友與家屬，以及住院醫師、第一線醫療同仁。實際治療由血液腫瘤科醫師依個案決定；本文不取代個別判斷。



## 為什麼 FL 是「慢性病」

| 特徵    | 解釋                                 |
|-------|------------------------------------|
| 腫瘤生物學 | t(14;18) BCL-2 過度表現，阻斷凋亡但不快速增生     |
| 臨床表現  | 多以無痛性淋巴結腫大、有時自發消退                  |
| 進程    | 反覆復發與緩解的模式                         |
| 預後    | 中位 OS > 15 年；多數死因不是 FL 本身          |
| 目前極限  | 無治癒方案（除少數 limited stage I 放療可長期無病） |

## 分期與評估

### Ann Arbor / Lugano 分期

同 Hodgkin。FL 多診斷時即 Stage III–IV。

### 病理分級

| 分級        | 中央區大細胞比例 / HPF                    | 處理                |
|-----------|-----------------------------------|-------------------|
| Grade 1–2 | 0–15 個 centroblast                | 視為 indolent       |
| Grade 3A  | > 15 個 centroblast，仍有 centrocytes | indolent / 看臨床    |
| Grade 3B  | 完全是 centroblast 構成的 sheet         | 視為 DLBCL，用 R-CHOP |

### 風險分數

**FLIPI (Follicular Lymphoma International Prognostic Index)**：年齡 > 60、Stage III–IV、Hb < 12、LDH 升高、淋巴結區 > 4 個。0–1 低風險、2 中風險、≥ 3 高風險。

**FLIPI-2** 加入腫瘤直徑、骨髓侵犯、β2-microglobulin。

**m7-FLIPI**：加入 7 個基因突變（EZH2、ARID1A、MEF2B、EP300、FOXO1、CREBBP、CARD11），預測效能更佳。

## 治療決策

### Watch-and-wait (觀察等待)

Ardeshtna 2003 Lancet 與 Solal-Céligny 系列研究確立：無症狀、低腫瘤負擔的 FL，立刻治療與觀察等待 OS 沒差別。GELF criteria 為「需要治療」門檻：

| 條件 (GELF / BNLI)                   | 任一即建議治療 |
|------------------------------------|---------|
| 單一病灶 > 7 cm                        | ✓       |
| ≥ 3 個病灶 > 3 cm                     | ✓       |
| B symptoms                         | ✓       |
| 脾腫大過肋下 7 cm                        | ✓       |
| 壓迫症狀 (腎、胃腸、上腔靜脈)                   | ✓       |
| 漿膜液 (腹水、胸水)                        | ✓       |
| 細胞減少 (Hb < 10、PLT < 100、ANC < 1.5) | ✓       |
| LDH 或 $\beta$ 2-microglobulin 升高   | ✓       |

## 第一線方案

| 分期                 | 方案                                                                                   |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Stage I–II (局限)    | 放療 24 Gy (可治癒約 50%)                                                                  |
| Stage III–IV 高腫瘤負擔 | <b>R-bendamustine</b> ×6 → <b>rituximab</b> 維持 或 obinutuzumab-bendamustine (GALLIUM) |
| Stage III–IV 低腫瘤負擔 | Watch-and-wait 或 rituximab 單藥                                                        |

## 試驗比較

| 試驗               | 設計                                     | 結果                                              |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>StiL NHL1</b> | R-bendamustine vs. R-CHOP              | mPFS 69.5 vs. 31.2 個月，R-bendamustine 勝          |
| <b>BRIGHT</b>    | R-bendamustine vs. R-CHOP/R-CVP        | CR 31% vs. 25%，毒性較低                             |
| <b>GALLIUM</b>   | O-chemo vs. R-chemo (含 G-bendamustine) | mPFS 86.6 vs. 73.3 個月，OBI 勝；G-bendamustine 感染較多 |
| <b>PRIMA</b>     | Rituximab 維持 vs. 觀察 (誘導後)              | mPFS 顯著延長                                       |

## 復發治療：2020 年代爆發的選項

### Lenalidomide + Rituximab (R<sup>2</sup>)

**AUGMENT 試驗**：R<sup>2</sup> vs. rituximab 單藥，mPFS 39.4 vs. 14.1 個月。R<sup>2</sup> 已是復發 FL 的標準二線之一。

## Tazemetostat (EZH2 抑制劑)

口服 EZH2 抑制劑，FDA 2020 核准復發 FL ( $\geq 2$  線後)：

- EZH2 突變 ORR 69% (CR 13%)
- EZH2 野生型 ORR 35% (CR 4%)
- 毒性溫和，口服方便

## CD3×CD20 雙特異性抗體

| 藥             | 給藥           | ORR / CR                      |
|---------------|--------------|-------------------------------|
| Mosunetuzumab | 皮下 / 靜脈，分期遞增 | ORR 80%、CR 60% ( $\geq 3$ 線後) |
| Epcoritamab   | 皮下           | ORR 82%、CR 63% ( $\geq 2$ 線後) |
| Glofitamab    | 靜脈           | ORR 81%、CR 70%                |

## CAR-T 細胞療法

| 產品                       | 試驗           | ORR / CR                       |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|
| Axicabtagene ciloleucel  | ZUMA-5       | ORR 94%、CR 79% (24 個月 PFS 57%) |
| Tisagenlecleucel         | ELARA        | ORR 86%、CR 69%                 |
| Lisocabtagene maraleucel | TRANSCEND FL | ORR 97%、CR 94%                 |

台灣 2025–2026 起：CAR-T 已陸續可在符合條件的醫學中心執行；健保條件持續更新。

## 轉型成 DLBCL：年累積風險 2–3%

| 警訊                             | 處理                                 |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 某顆淋巴結快速長大 (不對稱進展)              | 切片那顆                               |
| 新出現 B symptoms                 | 影像 + LDH                           |
| LDH 突然升高                       | PET-CT 找 SUV <sub>max</sub> 高的病灶切片 |
| PET 顯示 SUV <sub>max</sub> > 13 | 切片                                 |

**確診轉型後：**以 DLBCL 方案治療 (R-CHOP / Pola-R-CHP)，考慮自體幹細胞移植或 CAR-T。轉型後預後較差但仍有治癒可能。

## 適用對象 / 不適用對象

---

### 本文適用

- 剛診斷 FL、考慮 watch-and-wait 的病友
- 復發 FL 想了解新選項的病友與家屬
- 第一線住院醫師、家醫科參考

### 本文不適用

- Grade 3B FL（應視為 DLBCL）
- 取代血液腫瘤科醫師對個案的判斷
- 兒童 / 少見變異型

## 副作用 / 風險揭露

---

### 化療免疫療法常見不良反應

- R-bendamustine：感染風險、骨髓抑制、藥物熱、長期免疫低下
- R-CHOP：周邊神經病變（vincristine）、心毒性（doxorubicin）、嗜中性低下發燒
- Obinutuzumab：輸注反應（首劑常見、需減速分次給）、感染、B 肝再活化

### 新藥常見不良反應

- Lenalidomide：嗜中性低下、皮疹、靜脈血栓、催畸（女性禁孕）
- Tazemetostat：噁心、疲憊、骨髓抑制（少數 MDS / AML 風險）
- 雙特異性抗體：CRS（細胞激素釋放症候群）、ICANS（神經毒性）
- CAR-T：CRS、ICANS、長期 B 細胞低下、感染風險

### 主要禁忌

- B 肝帶原未抗病毒治療（rituximab 可能誘發 HBV 再活化）
- 活動性感染未控制
- 嚴重共病、ECOG 3–4
- 懷孕 / 哺乳（rituximab、lenalidomide、bendamustine 均不可用）

## 帶去診間的問題清單

---

**我符合 GELF criteria 嗎？需要立刻治療嗎？**

無症狀低負擔者可考慮 watch-and-wait。

**我的 grade 是 1、2、3A 還是 3B？**

Grade 3B 應視為 DLBCL，治療策略不同。

**我的 FLIPI 分數？有沒有做 m7-FLIPI 基因突變？**

高風險者治療更積極。

**第一線會用 R-bendamustine 還是 R-CHOP？**

多以 R-bendamustine 為首選；R-CHOP 在懷疑轉型或高腫瘤負擔時。

**復發後我有哪些選項？**

R<sup>2</sup>、tazemetostat、雙特異性抗體、CAR-T 都在台灣可用。

**B 肝、C 肝、結核篩檢都做了嗎？**

rituximab 前必須。



## 參考文獻

---

1. Rummel MJ, et al. **Bendamustine plus rituximab versus CHOP plus rituximab as first-line treatment for patients with indolent and mantle-cell lymphomas (StiL NHL1).** *Lancet*. 2013;381(9873):1203–1210. doi:10.1016/S0140-6736(12)61763-2
2. Marcus R, et al. **Obinutuzumab for the First-Line Treatment of Follicular Lymphoma (GALLIUM).** *N Engl J Med*. 2017;377(14):1331–1344. doi:10.1056/NEJMoa1614598
3. Leonard JP, et al. **AUGMENT: A Phase III Study of Lenalidomide Plus Rituximab Versus Placebo Plus Rituximab in Relapsed or Refractory Indolent Lymphoma.** *J Clin Oncol*. 2019;37(14):1188–1199. doi:10.1200/JCO.19.00010
4. Morschhauser F, et al. **Tazemetostat for patients with relapsed or refractory follicular lymphoma: an open-label, single-arm, multicentre, phase 2 trial.** *Lancet Oncol*. 2020;21(11):1433–1442. doi:10.1016/S1470-2045(20)30441-1
5. Budde LE, et al. **Single-agent mosunetuzumab shows durable complete responses in patients with relapsed or refractory B-cell lymphomas.** *Lancet Oncol*. 2022;23(8):1055–1065. doi:10.1016/S1470-2045(22)00335-7
6. Jacobson CA, et al. **Axicabtagene ciloleucel in relapsed or refractory indolent non-Hodgkin lymphoma (ZUMA-5).** *Lancet Oncol*. 2022;23(1):91–103. doi:10.1016/S1470-2045(21)00591-X
7. Ardeschna KM, et al. **Long-term effect of a watch and wait policy versus immediate systemic treatment for asymptomatic advanced-stage non-Hodgkin lymphoma.** *Lancet*. 2003;362(9383):516–522. doi:10.1016/S0140-6736(03)14110-4

引用整理協力：NCCN 2026 FL、StiL NHL1、BRIGHT、GALLIUM、AUGMENT、tazemetostat、mosunetuzumab、ZUMA-5、ELARA、Ardeschna 2003 (2026/05/11)。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/follicular-lymphoma-indolent-treatment/>

CITATION 林協霆. 濾泡性淋巴瘤 (Follicular Lymphoma) 是慢性病嗎?. 林協霆 · 臨床筆記. 2026/05/11.  
doi:10.5281/zenodo.20131216

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](#) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN / ASCO / ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。