

# 癌症與酒精：少量紅酒真的對心臟好嗎？

*Alcohol and cancer: is any amount safe?*

林協霆, MD, 內科專科醫師, 腫瘤內科專科醫師

醫療財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院 腫瘤內科部 · ORCID: [0009-0002-3974-4528](https://orcid.org/0009-0002-3974-4528)

發表日期：2026/05/12 · 最後更新：2026/05/12 · 審稿：林協霆 (2026/05/12) · 主題：酒精與癌症風險 (Alcohol and cancer risk)

DOI: 10.5281/zenodo.20131188 · 此版本 10.5281/zenodo.20131189 · <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/alcohol-cancer-risk-safe-amount>

## 摘要 · ABSTRACT

「少量紅酒養心」是 20 年前的觀察研究結論，新一代孟德爾隨機化研究與大型統合分析顯示「不喝是最低風險」。IARC 將酒精列為 Group 1 致癌物，與口腔、咽、食道、肝、大腸、乳癌有因果關聯。本文整理風險倍數、與癌治療期間的飲酒安全、戒酒資源。

「少量紅酒養心」是 20 年前觀察研究的結論，新一代孟德爾隨機化研究與大型統合分析已推翻。IARC 將酒精列為 Group 1 (明確致癌)，與口腔、咽、食道、肝、大腸、乳癌有因果關聯。**乳癌從第一杯起風險就上升**。本文整理現行證據、各癌別風險倍數、癌治療期間飲酒禁忌、戒酒資源、與「家人應酬」的實際應對策略。

## 閱讀對象

本文設定讀者為對「酒精與健康」有疑問的一般民眾與癌友。實際飲酒建議請依個別狀況與醫師討論。



## 「少量紅酒養心」為什麼錯了？

### 過去 (1990–2010 觀察研究)

J 形曲線：少量飲酒心血管死亡較低

紅酒中 resveratrol 抗氧化

「適量」對健康無害

「適量」可預防心血管

### 新證據 (2018–2025)

J 形曲線是「選擇偏差」造成 (不喝組含戒酒者、健康問題者)

人體攝取量遠低於實驗劑量，無臨床效益

WHO 2023：「沒有安全劑量」

Mendelian randomization、UK Biobank：少量也增加心血管風險 (中風、心房顫動)

**Mendelian randomization** 用基因變異作為「終身飲酒量」的工具變數，避免選擇偏差——結果顯示任何劑量酒精都增加心血管與癌症風險。

## IARC : Group 1 致癌物

酒精（含其代謝物 acetaldehyde）已列入 Group 1 致癌物，與下列癌有因果關聯：

| 癌別        | 每天 10 g 酒精（~1 杯）的相對風險 |
|-----------|-----------------------|
| 口腔癌、咽癌、喉癌 | ~1.4–2 倍              |
| 食道（鱗狀細胞）  | ~1.4 倍                |
| 肝細胞癌      | ~1.3 倍                |
| 大腸癌（男性）   | ~1.1 倍                |
| 乳癌（女性）    | ~1.07–1.1 倍（從第一杯起）    |

**重度飲酒**（ $\geq 50$  g/day）：上述癌風險倍增。**與吸菸合併**：口腔咽食道癌風險倍增甚至 10 倍以上。

## 機轉

| 機轉               | 影響           |
|------------------|--------------|
| 乙醛（acetaldehyde） | 直接致癌物；損傷 DNA |
| 氧化壓力（ROS）        | DNA、蛋白質、脂質損傷 |
| 改變雌激素代謝          | 乳癌風險上升       |
| 影響葉酸代謝           | 影響 DNA 甲基化   |
| 改變腸道菌叢           | 大腸癌風險        |
| 酒精性肝炎 → 肝硬化      | HCC 風險       |
| ALDH2 缺乏（亞洲常見）   | 乙醛代謝慢，致癌風險更高 |

## ALDH2 缺乏：亞洲特殊風險

**ALDH2\*2 變異**在台灣、日本、韓國人口約 30–50% 帶有，造成乙醛代謝慢。**特徵**：喝酒後臉紅、心悸、頭暈。**癌風險**：(1) ALDH2 缺乏 + 喝酒 → **食道癌風險上升 5–80 倍**（依劑量）；(2) **頭頸癌**：也大幅上升。**結論**：喝酒會臉紅的人，特別不該喝酒——是基因警告，不是「適應後就好」。

## 治療期間的飲酒禁忌

| 階段            | 建議                                          |
|---------------|---------------------------------------------|
| 化療期間          | 完全戒酒                                        |
| 放療期間（特別頭頸、食道） | 完全戒酒（加劇黏膜炎）                                 |
| 標靶治療期間        | 多數需戒（依藥物個別評估，特別 sorafenib、regorafenib 等肝代謝） |
| 免疫治療期間        | 戒酒（減少肝毒性與 irAE 加劇）                          |
| 移植或 CAR-T 期間  | 完全戒酒                                        |
| 緩和醫療階段        | 視舒適度個別決定                                    |
| 治療結束追蹤期       | 個別與主治醫師討論                                   |

## 與化療藥的特定交互作用

| 藥                     | 與酒精                          |
|-----------------------|------------------------------|
| Methotrexate          | 加劇肝毒性                        |
| Procarbazine          | Disulfiram-like 反應（潮紅、心悸、嘔吐） |
| Metronidazole（常用抗生素）  | 同上                           |
| 5-FU、capecitabine     | 增加心毒性風險、肝負擔                  |
| Sorafenib、regorafenib | 增加肝毒性                        |
| Tamoxifen             | 影響代謝、增加肝毒性                   |

## 戒酒資源（台灣）

| 資源               | 內容                                           |
|------------------|----------------------------------------------|
| 醫院精神科戒酒門診        | 動機晤談、藥物輔助（disulfiram、naltrexone、acamprosate） |
| 戒酒匿名會（AA Taiwan） | 同伴支持，台北、台中、高雄等有定期聚會                          |
| 行為治療 / 心理諮商      | 個別或團體                                        |
| 家醫科              | 短期介入諮商有效                                     |
| 1995 安心專線        | 24 小時心理諮詢，含戒酒議題                              |

## 戒酒後的好處時間軸

| 時間       | 變化                   |
|----------|----------------------|
| 24–72 小時 | 血壓、心率穩定，睡眠改善         |
| 1 週      | 肝功能開始恢復              |
| 1 個月     | 體重、皮膚、消化改善           |
| 3 個月     | 肝功能進一步恢復、認知改善        |
| 1 年      | 心血管風險下降              |
| 10–20 年  | 口腔、咽、喉、食道癌風險回到接近不喝酒者 |

## 如何應對「應酬」「家人壓力」

### 1. 預先告知

家人、朋友、同事知道你戒酒。

### 2. 選擇替代飲品

無酒精啤酒、氣泡水、檸檬水、茶。

### 3. 不需詳細解釋

「我在治療中」「醫師交代」「我戒酒了」就夠。

### 4. 預演拒絕台詞

「不用，謝謝，我喝水就好」「我這陣子戒酒」。

### 5. 必要時提早離開

把「戒酒成功」放在「應酬合群」之上。

## 適用對象 / 不適用對象

### 本文適用

- 對「酒與健康」有疑問的一般民眾
- 癌友與家屬的衛教
- 第一線家醫科、預防醫學

### 本文不適用

- 取代戒酒專業治療

- 重度酒精依賴者的急性戒斷（需醫療監督）

## 副作用 / 風險揭露

---

### 急性酒精戒斷症候群（重度依賴者）

- 焦慮、震顫、出汗
- 嚴重者：抽搐、譫妄、致命性 delirium tremens
- 重度依賴者戒酒需醫療監督

### 主要禁忌

- 重度酒精依賴自行突然停酒（需醫療監督）
- 已知酒精過敏（少見）



## 參考文獻

---

1. International Agency for Research on Cancer. **Alcohol Consumption and Ethyl Carbamate**. IARC Monographs Volume 96. IARC. [monographs.iarc.who.int](https://monographs.iarc.who.int)
2. Anderson BO, et al. **Health and cancer risks associated with low levels of alcohol consumption**. *Lancet Public Health*. 2023;8(1):e6–e7. doi:10.1016/S2468-2667(22)00317-6
3. World Health Organization. **No level of alcohol consumption is safe for our health**. WHO Europe, 2023. [who.int/europe](https://who.int/europe)
4. GBD 2016 Alcohol Collaborators. **Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016**. *Lancet*. 2018;392(10152):1015–1035. doi:10.1016/S0140-6736(18)31310-2
5. Bagnardi V, et al. **Alcohol consumption and site-specific cancer risk: a comprehensive dose-response meta-analysis**. *Br J Cancer*. 2015;112(3):580–593. doi:10.1038/bjc.2014.579
6. Yokoyama A, et al. **Alcohol-related cancers and aldehyde dehydrogenase-2 in Japanese alcoholics**. *Carcinogenesis*. 1998;19(8):1383–1387. doi:10.1093/carcin/19.8.1383
7. LoConte NK, et al. **Alcohol and Cancer: A Statement of the American Society of Clinical Oncology**. *J Clin Oncol*. 2018;36(1):83–93. doi:10.1200/JCO.2017.76.1155

引用整理協力：IARC Monograph、WHO 2023、Lancet Public Health 2023、ASCO 2018 Alcohol Statement、GBD 2016 Alcohol、Bagnardi 2015 meta-analysis、Yokoyama 1998 ALDH2 (2026/05/12)。

---

SOURCE <https://lin.hsiehting.com/posts/2026/alcohol-cancer-risk-safe-amount>

CITATION 林協霆. 癌症與酒精：少量紅酒真的對心臟好嗎？. 林協霆·臨床筆記. 2026/05/12. doi:10.5281/zenodo.20131188

LICENSE CC BY-NC-ND 4.0 — 文章內容依 [Creative Commons 姓名標示-非商業性-禁止改作 4.0 國際](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) 授權公開使用。

DISCLAIMER 本文整理公開發表之臨床試驗結果與 NCCN/ASCO/ESMO 治療指引，僅供醫學新知與病人衛生教育參考，不構成個別醫療建議，亦不取代主治醫師之診療判斷。實際治療決策請與您的主治團隊面對面討論。