

## LỚP LÝ THẦY NGỌC

GV: TRẦN VĂN THIỆN NGỌC

SDT: 0935216256

## BẢN CHỮA BÀI TRỰC TUYỂN

Môn: VẬT LÝ 10 – THPT BÙI THỊ  
XUÂN

KIỂM TRA GIỮA KỲ I – 2025 – 2026 – Mã  
đề: 207

Lớp chữa đề Online: ..... Mã đề: 207

### PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.)

**Câu 1. [ID: VL10-BTX207-C01]** Trong hệ đơn vị SI, đơn vị của gia tốc là

- A.  $m \cdot s^2$ .
- B.  $m \cdot s$ .
- C.  $m \cdot s^{-1}$ .
- D.  $m \cdot s^{-2}$ .

**Câu 2. [ID: VL10-BTX207-C02]** Đồng hồ đo thời gian hiện số MC964 khi đặt ở chế độ MODE A + B dùng để

- A. đo thời gian vật chẵn cổng quang điện nối với ổ B.
- B. đo tổng hai khoảng thời gian vật chẵn cổng quang điện nối với ổ A và cổng quang điện nối với ổ B.
- C. đo thời gian vật chuyển động từ cổng quang điện nối với ổ A tới cổng quang điện nối với ổ B.
- D. đo thời gian vật chẵn cổng quang điện nối với ổ A.

**Câu 3. [ID: VL10-BTX207-C03]** Chọn phát biểu đúng về vận tốc.

- A. Vận tốc là đại lượng vô hướng, luôn có giá trị không âm.
- B. Vận tốc là đại lượng vectơ, có hướng ngược với hướng của độ dịch chuyển.
- C. Vận tốc là đại lượng vô hướng, có thể nhận giá trị âm hoặc dương.
- D. Vận tốc là đại lượng vectơ, có hướng trùng với hướng của độ dịch chuyển.

**Câu 4. [ID: VL10-BTX207-C04]** Đối tượng nghiên cứu của Vật lí là

- A. các dạng vận động của vật chất và năng lượng.
- B. sự phát triển sinh học của vật chất hữu cơ.
- C. sự hình thành và phát triển của các lí thuyết vật lí.
- D. cuộc đời và sự nghiệp của các nhà vật lí.

**Câu 5. [ID: VL10-BTX207-C05]** Chuyển động nào sau đây được coi là rơi tự do?

- A. Vận động viên đang nhảy dù từ máy bay xuống.
- B. Viên sỏi nhỏ được thả rơi từ trên cao trong không khí.
- C. Chiếc lá khô đang rơi từ trên cành xuống.
- D. Sợi chỉ mảnh được thả rơi trong không khí.

**Câu 6. [ID: VL10-BTX207-C06]** Phát biểu nào sau đây về chuyển động thẳng biến đổi đều là **sai**?

- A. Trong chuyển động nhanh dần đều, vectơ gia tốc cùng chiều với chiều chuyển động.
- B. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc không đổi theo thời gian.
- C. Trong chuyển động chậm dần đều, gia tốc luôn có giá trị âm.
- D. Trong chuyển động chậm dần đều, vectơ gia tốc ngược chiều với chiều chuyển động.

**Câu 7. [ID: VL10-BTX207-C07]** Gọi  $\bar{A}$  là giá trị trung bình,  $\Delta A'$  là sai số dụng cụ,  $\overline{\Delta A}$  là sai số ngẫu nhiên và  $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A'$  là sai số tuyệt đối của phép đo đại lượng  $A$ . Sai số tỉ đối của phép đo là

- A.  $\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$ .
- B.  $\delta A = \frac{\bar{A}}{\Delta A} \cdot 100\%$ .
- C.  $\delta A = \frac{\Delta A'}{\bar{A}} \cdot 100\%$ .
- D.  $\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$ .

**Câu 8. [ID: VL10-BTX207-C08]** Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( $d - t$ ) của chuyển động thẳng đều có dạng là

- A. đường thẳng.

- B. đường tròn.
- C. đường hypebol.
- D. đường parabol.

**Câu 9. [ID: VL10-BTX207-C09]** Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu  $v_0$ , sau thời gian  $t$  vật có vận tốc  $v$ . Gia tốc của vật là

- A.  $a = \frac{v_0 - v}{t}$ .
- B.  $a = \frac{v_0 + v}{t}$ .
- C.  $a = \frac{v^2 - v_0^2}{t}$ .
- D.  $a = \frac{v - v_0}{t}$ .

**Câu 10. [ID: VL10-BTX207-C10]** Một chất điểm đi được quãng đường  $s$  trong khoảng thời gian  $\Delta t$ . Tốc độ trung bình của chất điểm là

- A.  $v_{tb} = s \cdot \Delta t$ .
- B.  $v_{tb} = s - \Delta t$ .
- C.  $v_{tb} = \frac{s}{\Delta t}$ .
- D.  $v_{tb} = \frac{\Delta t}{s}$ .

**Câu 11. [ID: VL10-BTX207-C11]** Độ dịch chuyển của một vật cho biết

- A. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.
- B. vị trí và thời điểm chuyển động của vật.
- C. mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.
- D. tổng độ dài quãng đường mà vật đã đi được.


**Câu 12. [ID: VL10-BTX207-C12]** Khi phòng thực hành xảy ra sự cố cháy, hành động nào sau đây là **sai**?

- A. Ngắt ngay toàn bộ nguồn điện của phòng thực hành.
- B. Di chuyển nhanh các chai lọ hóa chất, vật liệu dễ cháy ra khu vực an toàn.
- C. Không dùng bình khí  $\text{CO}_2$  để dập đám cháy trên quần áo người hoặc đám cháy kim loại kiềm.
- D. Dùng nước dội trực tiếp để dập đám cháy ở nơi có thiết bị điện đang cắm nguồn.

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

**Câu 1.** [ID: VL10-BTX207-C13] Một bạn học sinh đạp xe từ cổng trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đi thẳng theo đường Lê Lợi 1 km, sau đó rẽ phải vào đường Hùng Vương đi thẳng 500 m để đến quán chè Hẻm như sơ đồ hình bên. Coi hai đoạn đường vuông góc với nhau.



| Phát biểu                                                                      | Đúng | Sai |
|--------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển của bạn học sinh là khác nhau. |      |     |
| b) Độ dịch chuyển của bạn học sinh là một đại lượng vô hướng.                  |      |     |
| c) Quãng đường bạn học sinh đã đi được là 1,5 km.                              |      |     |
| d) Độ lớn độ dịch chuyển của bạn học sinh bằng 1180 m.                         |      |     |

**Câu 2.** [ID: VL10-BTX207-C14] Một vật chuyển động thẳng dọc theo trục  $Ox$  có phương trình độ dịch chuyển  $d = 4t - t^2$  ( $d$  tính bằng m,  $t$  tính bằng s,  $t \geq 0$ ).

| Phát biểu                                                                        | Đúng | Sai |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trong suốt quá trình chuyển động.         |      |     |
| b) Ngay sau thời điểm $t = 0$ , vật chuyển động theo chiều dương của trục $Ox$ . |      |     |

| Phát biểu                                                                 | Đúng | Sai |
|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| c) Gia tốc của vật bằng $1 \text{ m/s}^2$ .                               |      |     |
| d) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1 \text{ s}$ bằng $2 \text{ m/s}$ . |      |     |

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm) (Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)


**Câu 1.** [ID: VL10-BTX207-C15] Tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin (Đức), vận động viên Usain Bolt lập kỉ lục thế giới chạy 100 m với thời gian 9,58 s. Tốc độ trung bình của Usain Bolt trên đường chạy đó là bao nhiêu m/s? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

.....  
.....  
.....  
.....

**Câu 2.** [ID: VL10-BTX207-C16] Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( $d - t$ ) của một ô tô chuyển động thẳng. Vận tốc của ô tô bằng bao nhiêu m/s?



KQ: 

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

.....  
.....  
.....  
.....

**Câu 3.** [ID: VL10-BTX207-C17] Một người đang lái xe máy với tốc độ 28,8 km/h thì nhìn thấy một cái hố trước mặt nên hãm phanh, xe chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 5 s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của xe là bao nhiêu m/s<sup>2</sup>?

KQ:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

.....

.....

.....

.....

**Câu 4.** [ID: VL10-BTX207-C18] Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 80 m so với mặt đất. Lấy  $g = 10\text{ m/s}^2$ . Thời gian rơi của vật là bao nhiêu giây?

KQ:

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

.....

.....

.....

.....

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

**Câu 1.** [ID: VL10-BTX207-C19] Lúc 7 giờ, một ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ 40 km/h đi từ A qua B đến C. Biết  $AB = 30\text{ km}$ ,  $BC = 70\text{ km}$  (A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó). Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 7 giờ. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( $d - t$ ) của ô tô.

.....


.....

.....

.....

**Câu 2.** [ID: VL10-BTX207-C20] Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều dọc theo trục Ox có đồ thị vận tốc – thời gian ( $v - t$ ) như hình bên. Tính:  
a) Gia tốc của vật.

b) Quãng đường vật đi được trong 10 s đầu tiên.



.....

.....

.....

.....

**Câu 3.** [ID: VL10-BTX207-C21] Thả rơi tự do một vật từ độ cao 100 m so với mặt đất. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Tính:

- a) Quãng đường vật rơi được sau 3 s kể từ lúc thả.
- b) Độ cao của vật so với mặt đất tại thời điểm đó.

.....

.....

.....

.....

———— **HẾT** ————