

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Phép đo các đại lượng vật lí – Hệ đơn vị SI

a) Định nghĩa phép đo một đại lượng vật lí

Phép đo một đại lượng vật lí là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.

b) Đơn vị đo

- Hệ đơn vị đo thông dụng hiện nay là hệ đơn vị quốc tế SI.
- Hệ SI quy định 7 đơn vị cơ bản:

Đại lượng	Đơn vị (Kí hiệu)	Đại lượng	Đơn vị (Kí hiệu)
Độ dài	mét (m)	Cường độ dòng điện	ampe (A)
Thời gian	giây (s)	Cường độ sáng	candela (cd)
Khối lượng	kilôgam (kg)	Lượng chất	mol (mol)
Nhiệt độ	kelvin (K)		

Ngoài 7 đơn vị cơ bản, các đơn vị còn lại được gọi là **đơn vị dẫn xuất** (ví dụ: vận tốc có đơn vị m/s, gia tốc có đơn vị m/s^2 , lực có đơn vị N, điện áp có đơn vị V,...).

c) Kí hiệu bội số và ước số của đơn vị đo

Khi số đo của một đại lượng là một bội số hoặc ước số thập phân của 10, ta có thể sử dụng kí hiệu (tiếp đầu ngữ) ngay trước đơn vị để phần số đo được trình bày ngắn gọn.

Kí hiệu	Tên đọc	Hệ số	Kí hiệu	Tên đọc	Hệ số
T	tera	10^{12}	d	deci	10^{-1}
G	giga	10^9	c	centi	10^{-2}
M	mega	10^6	m	mili	10^{-3}
k	kilo	10^3	μ	micro	10^{-6}
h	hecto	10^2	n	nano	10^{-9}
da	deka	10^1	p	pico	10^{-12}

d) Các phương pháp đo một đại lượng vật lí

- Phép đo trực tiếp:** Đo trực tiếp một đại lượng bằng dụng cụ đo, kết quả được đọc trực tiếp trên dụng cụ đo (ví dụ: dùng thước đo chiều dài, dùng cân đo khối lượng, dùng đồng hồ đo thời gian,...).
- Phép đo gián tiếp:** Đo một đại lượng không trực tiếp mà thông qua công thức liên hệ với các đại lượng có thể đo trực tiếp (ví dụ: đo khối lượng riêng $D = \frac{m}{V}$, đo tốc độ $v = \frac{s}{t}$, đo gia tốc rơi tự do $g = \frac{2h}{t^2}, \dots$).

e) Số chữ số có nghĩa trong kết quả đo

Số chữ số có nghĩa là tất cả những chữ số tính từ trái sang phải kể từ chữ số khác 0 đầu tiên.

- $13,1 \rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.
- $13,10 \rightarrow$ có 4 chữ số có nghĩa.
- $1,30 \cdot 10^3 \rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.
- $0,3109 \rightarrow$ có 4 chữ số có nghĩa.
- $0,0314 \rightarrow$ có 3 chữ số có nghĩa.

2. Sai số phép đo

a) Phân loại sai số

- **Sai số hệ thống:**
 - Khi sử dụng dụng cụ đo để đo các đại lượng vật lý luôn có sự sai lệch do đặc điểm và cấu tạo của dụng cụ gây ra. Sự sai lệch này gọi là sai số dụng cụ hoặc sai số hệ thống.
 - Sai số hệ thống có nguyên nhân khách quan (do giới hạn cấu tạo của dụng cụ), hoặc nguyên nhân chủ quan do người đo hiệu chỉnh vạch số 0 ban đầu chưa chuẩn (cần phải loại bỏ trước khi đo).
- **Sai số ngẫu nhiên:**
 - Khi lặp lại các phép đo nhiều lần, ta thu được các giá trị khác nhau mà sự sai lệch không có nguyên nhân rõ ràng và ổn định. Đó là sai số ngẫu nhiên (do thao tác không đều, điều kiện thí nghiệm biến thiên, hạn chế phản xạ giác quan,...).
 - Để giảm thiểu sai số ngẫu nhiên, ta thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình cộng.

CHÚ Ý VỀ SAI SỐ DỤNG CỤ (ΔA_{dc}):

Sai số gây bởi dụng cụ thường được quy ước lấy bằng một độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) hoặc nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo (ví dụ: thước có ĐCNN là 1 mm thì sai số dụng cụ lấy là 0,5 mm hoặc 1 mm), hoặc lấy theo thông số cấp chính xác ghi sẵn trên dụng cụ do nhà sản xuất quy định.

b) Cách xác định sai số phép đo trực tiếp

Giả sử tiến hành đo n lần cùng một đại lượng A , thu được các giá trị $A_1, A_2, \dots, A_n$:

- **Giá trị trung bình:**

$$\bar{A} = \frac{A_1 + A_2 + \dots + A_n}{n}$$

- **Sai số tuyệt đối của từng lần đo:**

$$\Delta A_1 = |\bar{A} - A_1|; \quad \Delta A_2 = |\bar{A} - A_2|; \quad \dots; \quad \Delta A_n = |\bar{A} - A_n|$$

- **Sai số tuyệt đối trung bình (sai số ngẫu nhiên):**

$$\overline{\Delta A} = \frac{\Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n}{n}$$

- **Sai số tuyệt đối của phép đo:** là tổng của sai số ngẫu nhiên và sai số dụng cụ:

$$\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A_{dc}$$

- **Sai số tỉ đối:** là tỉ số phần trăm giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình, đặc trưng cho mức độ chính xác của phép đo:

$$\delta A = \frac{\Delta A}{\bar{A}} \cdot 100\%$$

c) Cách xác định sai số phép đo gián tiếp

Cho các đại lượng đo trực tiếp: $X = \bar{X} \pm \Delta X$; $Y = \bar{Y} \pm \Delta Y$; $Z = \bar{Z} \pm \Delta Z$.

- **Quy tắc tổng và hiệu:** Sai số tuyệt đối của một tổng hay hiệu bằng tổng các sai số tuyệt đối của các số hạng.

$$A = 2X + 3Y - 4Z \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = 2\bar{X} + 3\bar{Y} - 4\bar{Z} \\ \Delta A = 2\Delta X + 3\Delta Y + 4\Delta Z \end{cases}$$

- **Quy tắc tích và thương:** Sai số tỉ đối của một tích hay thương bằng tổng các sai số tỉ đối của các thừa số (số mũ lũy thừa nhân ra trước sai số tỉ đối tương ứng).

$$A = 3 \cdot \frac{X \cdot Y^\alpha}{Z^\beta} \Rightarrow \begin{cases} \bar{A} = 3 \cdot \frac{\bar{X} \cdot \bar{Y}^\alpha}{\bar{Z}^\beta} \\ \delta A = \delta X + \alpha \cdot \delta Y + \beta \cdot \delta Z \end{cases}$$

d) Cách ghi kết quả đo

Kết quả đo đại lượng A được ghi dưới dạng:


$$A = \bar{A} \pm \Delta A \quad \text{hoặc} \quad (\bar{A} - \Delta A) \leq A \leq (\bar{A} + \Delta A)$$

Quy tắc biểu diễn chữ số:

- Sai số tuyệt đối ΔA thường được viết đến tối đa 1 hoặc 2 chữ số có nghĩa.
- Giá trị trung bình $\bar{A}$ được làm tròn đến bậc thập phân tương ứng với sai số tuyệt đối ΔA .
- Nếu viết dạng lũy thừa 10^n thì cả giá trị trung bình $\bar{A}$ và sai số tuyệt đối ΔA đều phải viết chung cơ số lũy thừa 10^n .

CHÚ Ý: PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ BIỂU DIỄN SAI SỐ

Sai số và kết quả của phép đo có thể biểu diễn bằng đồ thị. Mỗi giá trị thực nghiệm đều có sai số: $\pm \Delta x$ và $\pm \Delta y$. Do đó trên mặt phẳng tọa độ, mỗi điểm thực nghiệm được biểu diễn bằng một điểm $M(x_M, y_M)$ nằm tại tâm của một hình chữ nhật có kích thước $2\Delta x \times 2\Delta y$, gọi là **ô bao sai số**.



B. CÁC VÍ DỤ MẪU MINH HỌA

Ví dụ 1. Dùng một thước có ĐCNN là 1 mm và một đồng hồ đo thời gian có ĐCNN 0,01 s để đo 5 lần quãng đường đi và thời gian chuyển động của một chiếc xe đồ chơi chạy bằng pin từ điểm A đến điểm B.



A

B

- Nguyên nhân nào gây ra sự sai khác giữa các lần đo?
- Tính sai số tuyệt đối của phép đo s, t và điền vào bảng. Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất của dụng cụ.
- Viết kết quả đo s và t ?
- Tính sai số tỉ đối của s và t ?

Lần đo	s (mm)	Δs (mm)	t (s)	Δt (s)
1	649		3,49	
2	651		3,51	
3	654		3,54	
4	653		3,53	
5	650		3,50	
Trung bình				

Ví dụ 2. Đường kính của một viên bi trong 5 lần đo bằng 2,620 cm; 2,625 cm; 2,630 cm; 2,628 cm và 2,626 cm. Đường kính trung bình của viên bi là

- A. 2,6258 cm. B. 2,6271 cm. C. 2,6251 cm. D. 2,6249 cm.

Ví dụ 3. Kết quả ba lần đo quãng đường chuyển động của viên bi từ A đến B lần lượt là 0,048 m; 0,050 m; 0,050 m, quãng đường trung bình là 0,049 m. Khi đó sai số tuyệt đối của quãng đường chuyển động của viên bi qua ba lần đo có giá trị lần lượt là

- A. 0,001 m; 0,001 m; 0,001 m. B. -0,001 m; 0,001 m; 0,001 m.
C. 0,001 m; -0,001 m; -0,001 m. D. 0,001 m; 0,000 m; 0,002 m.

Ví dụ 4. Để xác định thời gian đi của bạn A trên quãng đường s , người ta sử dụng đồng hồ bấm giây, thu được bảng số liệu dưới đây:

Lần đo	1	2	3
Thời gian (s)	35,20	36,15	35,75

Coi tốc độ đi không đổi trong suốt quá trình chuyển động, sai số ngẫu nhiên trong phép đo này là bao nhiêu?

- A. 0,30 s. B. 0,31 s. C. 0,32 s. D. 0,33 s.

Ví dụ 5. Dùng thước thẳng có giới hạn đo 20 cm và độ chia nhỏ nhất 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Lấy sai số dụng cụ bằng một nửa độ chia nhỏ nhất. Bỏ qua sai số ngẫu nhiên. Nếu chiếc bút có độ dài trung bình 15 cm thì phép đo này có sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối là

- A. 0,5 cm và 2,5%. B. 0,5 cm và 1,7%. C. 0,25 cm và 2,5%. D. 0,25 cm và 1,7%.

Ví dụ 6. Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1 mm để đo 5 lần đường kính d của một trụ thép. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Cho kết quả như trong bảng dưới. Hãy cho biết kết quả phép đo d .

Lần đo	1	2	3	4	5
d (mm)	30,0	30,1	30,0	30,1	30,1

- A. $d = (30,06 \pm 0,15)$ mm. B. $d = (30,1 \pm 0,15)$ mm.
C. $d = (30 \pm 0,1)$ mm. D. $d = (30,00 \pm 0,15)$ mm.

Ví dụ 7. Một học sinh dùng đồng hồ bấm giây để đo chu kì chuyển động tròn của một vật bằng cách đo thời gian vật quay hết một vòng. Năm lần đo cho kết quả thời gian vật quay hết một vòng lần lượt là 2,00 s; 2,05 s; 2,00 s; 2,05 s; 2,05 s. Thang chia nhỏ nhất của đồng hồ là 0,01 s. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép đo chu kì được biểu diễn bằng

- A. $T = 2,030 \pm 0,02$ s. B. $T = 2,030 \pm 0,024$ s. C. $T = 2,030 \pm 0,034$ s. D. $T = 2,03 \pm 0,03$ s.

Ví dụ 8. Nhiệt độ đầu và nhiệt độ cuối của một lượng nước được ghi bởi một người quan sát trên nhiệt kế là $(42,4 \pm 0,2)^{\circ}\text{C}$ và $(80,6 \pm 0,3)^{\circ}\text{C}$. Bỏ qua sai số dụng cụ, nhiệt độ của nước đã tăng

- A. $(39,2 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$. B. $(38,2 \pm 0,1)^{\circ}\text{C}$. C. $(38,2 \pm 0,5)^{\circ}\text{C}$. D. $(39,2 \pm 0,1)^{\circ}\text{C}$.

Ví dụ 9. Điện trở của một dây dẫn bằng kim loại được xác định theo định luật Ohm $R = \frac{U}{I}$. Trong một mạch điện, hiệu điện thế U giữa hai đầu điện trở đo được là $U = (8 \pm 0,4)$ V và cường độ dòng điện qua điện trở là $I = (4 \pm 0,2)$ A. Giá trị của điện trở cùng sai số tỉ đối bằng

- A. $(2 \pm 5\%) \Omega$. B. $(2 \pm 7\%) \Omega$. C. $(2 \pm 10\%) \Omega$. D. $(2 \pm 28\%) \Omega$.

C. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 1

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phép đo của một đại lượng vật lý

- A. là phép so sánh nó với một đại lượng cùng loại được quy ước làm đơn vị.
- B. là những sai sót gặp phải khi đo một đại lượng vật lý.
- C. là sai số gặp phải khi dụng cụ đo một đại lượng vật lý.
- D. là những công cụ đo các đại lượng vật lý như thước, cân...vv.

Câu 2. Trong đơn vị SI, đơn vị nào là đơn vị dẫn xuất?

- A. mét (m).
- B. giây (s).
- C. mol (mol).
- D. mét trên giây (m/s).

Câu 3. Có mấy cách để đo các đại lượng vật lý?

- A. 1.
- B. 2.
- C. 3.
- D. 4.

Câu 4. Trong các phép đo dưới đây, đâu là phép đo trực tiếp? (1) Dùng thước đo chiều cao. (2) Dùng cân đo cân nặng. (3) Dùng cân và ca đong đo khối lượng riêng của nước. (4) Dùng đồng hồ và cột cây số đo tốc độ của người lái xe.

- A. (1), (2).
- B. (2), (4).
- C. (1), (2), (4).
- D. (2), (3), (4).

Câu 5. Một học sinh dùng thước đo chiều dài có độ chia nhỏ nhất là 1 milimet, đồng hồ bấm giây để đo quãng đường, thời gian và tốc độ chuyển động của chiếc xe đồ chơi. Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Đo tốc độ là phép đo trực tiếp.
- B. Đo thời gian là phép đo trực tiếp.
- C. Sai số dụng cụ của thước đo chiều dài là 0,5 mm.
- D. Đo quãng đường là phép đo trực tiếp.

Câu 6. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,0809. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4.
- B. 2.
- C. 1.
- D. 3.

Câu 7. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 0,4009. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4.
- B. 1.
- C. 2.
- D. 3.

Câu 8. Sai số hệ thống là

- A. sai số có tính quy luật và được lặp lại ở tất cả các lần đo.
- B. sai số từ những yếu tố ngẫu nhiên bên ngoài.
- C. sai số xuất phát từ sai sót, phản xạ của người làm thí nghiệm.
- D. sai số tuyệt đối.

Câu 9. $\Delta A_i = A - \Delta A_i$ là công thức tính

- A. sai số tuyệt đối ứng với mỗi lần đo.
- B. sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo.
- C. giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần.
- D. sai số tuyệt đối của phép đo.

Câu 10. Điều nào sau đây không đúng khi nói về nguyên nhân gây ra sai số ngẫu nhiên trong quá trình đo một đại lượng vật lý?

- A. Thao tác đo không chuẩn.
- B. Dụng cụ đo không chuẩn.
- C. Điều kiện làm thí nghiệm không ổn định.
- D. Mắt người đọc không chuẩn.

Câu 11. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.
- B. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.
- C. $\delta x = \Delta x_{dc} \times 100\%$.
- D. $\delta x = \Delta x \times 100\%$.

Câu 12. Một phép đo đại lượng vật lí A thu được giá trị trung bình là A, sai số của phép đo là ΔA . Cách ghi đúng kết quả đo A là

- A. $A = A + \Delta A$. B. $A = A - \Delta A$. C. $A = A \pm \Delta A$. D. $A = A \pm \Delta A$.

Câu 13. Sai số của một tích $A = B.C$ trong phép đo gián tiếp được xác định bởi công thức?

- A. $\delta A = \delta B + \delta C$. B. $\Delta A = \Delta B + \Delta C$. C. $\delta A = \Delta B + \Delta C$. D. $\Delta A = \delta B + \delta C$.

Câu 14. Khi đo chiều dài L của chiếc bàn học, một học sinh viết được kết quả là $L = 118 \pm 2$ cm. Giá trị trung bình của L là

- A. 2 cm. B. 120 cm. C. 118 cm. D. 116 cm.

Câu 15. Bạn Bình tiến hành cân một viên bi nhỏ nhiều lần và tính được kết quả khối lượng của viên bi như sau: $m = 6,03 \pm 0,04$ g. Sai số tuyệt đối của phép đo khối lượng viên bi là

- A. 0,04 g. B. 6,03 g. C. 0,7%. D. 0,6%.

Câu 16. Một người dùng thước đo có độ chia nhỏ nhất 1 cm để đo chiều cao một người khác trong ba lần được là 160 cm; 161 cm; 162 cm. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. 0,23%. B. 7,2%. C. 0,41%. D. 1,04%.

Câu 17. Dùng một cái cân có độ chia nhỏ nhất là 0,1 kg để cân 5 lần khối lượng của một bao gạo đều bằng 20 kg. Lấy sai số dụng cụ bằng một độ chia nhỏ nhất. Kết quả của phép cân này là

- A. $20 \pm 0,1$ kg. B. $20,0 \pm 0,2$ kg. C. $20,00 \pm 0,1$ kg. D. $20,0 \pm 0,1$ kg.

Câu 18.

Để đo dòng điện một chiều có cường độ 25 mA bằng đồng hồ vạn năng, người ta tiến hành các bước:

- (1) Kết nối que đo màu đỏ của đồng hồ về phía cực (+) và que đo màu đen về phía cực (-) theo chiều dòng điện trong mạch thí nghiệm. Mắc đồng hồ nối tiếp với mạch thí nghiệm.
- (2) Đọc kết quả đo hiện trên đồng hồ.
- (3) Tắt nguồn điện của các mạch thí nghiệm.
- (4) Cắm que đo màu đen vào đầu COM và que đỏ vào dấu (+).
- (5) Đặt chuyển mạch của đồng hồ ở thang DCmA.
- (6) Bật điện cho mạch thí nghiệm.



Thứ tự các bước tiến hành đúng là

- A. (4); (5); (3); (1); (6); (2). B. (6); (5); (4); (3); (1); (2).
C. (1); (2); (3); (4); (5); (6). D. (3); (1); (6); (5); (4); (2).

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 19. Nếu một đại lượng được đo trực tiếp.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của đại lượng cần đo khi tiến hành phép đo nhiều lần được xác định bằng công thức $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$.		
b) Sai số dụng cụ thường được lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ.		
c) Sai số tỉ đối của phép đo càng lớn thì phép đo càng chính xác.		

Phát biểu	Đúng	Sai
d) Sai số của phép đo chiều dài một đại lượng có kết quả là 0,03 cm. Số chữ số có nghĩa trong kết quả của phép đo này là 3.		

Câu 20.

Hình vẽ thể hiện nhiệt kế đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ và $t_2(^{\circ}\text{C})$ của một dung dịch trước và sau khi đun:



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị đo nhiệt độ $t_1(^{\circ}\text{C})$ của dung dịch trước khi đun là $t_1 = 24,0 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$.		
b) Giá trị đo nhiệt độ $t_2(^{\circ}\text{C})$ của dung dịch sau khi đun là $t_2 = 68,0 \pm 0,05^{\circ}\text{C}$.		
c) Sai số tuyệt đối của phép đo nhiệt độ này là $1,5^{\circ}\text{C}$.		
d) Kết quả độ tăng nhiệt độ của dung dịch là: $\Delta t = 44,0 \pm 1,0^{\circ}\text{C}$.		

Câu 21.

Hai người cùng đo chiều dài của cánh cửa sổ, kết quả thu được như sau:

Người thứ nhất: $d = 120 \pm 1 \text{ cm}$

Người thứ hai: $d = 120 \pm 2 \text{ cm}$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tỉ đối được xác định bằng tỉ số giữa hai số tuyệt đối và giá trị trung bình của chiều dài cánh cửa sổ: $\delta d = \Delta d \cdot 100\%$.		
b) Sai số tỉ đối của phép đo của người thứ nhất là 8,3%.		
c) Sai số tỉ đối của phép đo của người thứ hai là 1,67%.		
d) Người thứ hai đo chính xác hơn người thứ nhất vì sai số tỉ đối của người thứ nhất lớn hơn.		

Câu 22.

Một học sinh đo tốc độ trung bình của viên bi được giá trị $= (2,50 \pm 0,04) \text{ m/s}$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của tốc độ của viên bi là 2,54 m/s.		
b) Sai số tuyệt đối của phép đo tốc độ viên bi là 0,04.		
c) Sai số tỉ đối của phép đo là 1,6%.		
d) Nếu sai số tỉ đối của thời gian là 1% thì sai số tỉ đối của quãng đường là 1,6%.		

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 23.

Lấy sai số dụng cụ bằng nửa độ chia nhỏ nhất. Sai số dụng cụ của cây bút chì trong trường hợp dưới đây là bao nhiêu cm?



KQ:

Câu 24.

Đường kính của một quả bóng bằng $(5,0 \pm 0,2) \text{ cm}$. Sai số tỉ đối của phép đo thể tích quả bóng có giá trị là $x\%$. Tìm x .

KQ:

Câu 25.

Để tính gia tốc rơi tự do g , người ta có thể dùng công thức tính chu kì của một con lắc đơn gồm một vật nặng có kích thước nhỏ treo vào một dây nhẹ, không co giãn: $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$, trong đó, T là thời gian để vật nặng thực hiện một dao động và ℓ là chiều dài sợi dây. Trong thí nghiệm với con lắc đơn, người ta đo

được: $\ell = 0,350 \pm 0,005$ (m) và $T = 1,18 \pm 0,02$ (s). Sai số tuyệt đối của phép đo này là bao nhiêu m/s² (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Câu 26. Dùng thước thẳng có giới hạn đo là 20 cm và độ chia nhỏ nhất là 0,5 cm để đo chiều dài chiếc bút máy. Nếu chiếc bút có độ dài cỡ 15 cm thì phép đo này sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?

KQ:

Câu 27. Kết quả đo đường kính của một đường tròn là $d = (40,1 \pm 0,2)$ cm. Sai số tuyệt đối của phép đo diện tích này bằng $x \cdot 10^3$ cm². Tìm x (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm).

KQ:

Câu 28. Kết quả của phép đo chiều dài và chiều rộng của một hình chữ nhật lần lượt là $a = 85,0 \pm 0,2$ (cm) và $b = 29,5 \pm 0,2$ (cm). Sai số tỉ đối của phép đo diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

D. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 2

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 29. Đại lượng nào là đại lượng cơ bản của hệ SI?

- A. Cường độ dòng điện. B. Hiệu điện thế. C. Công suất. D. Điện trở.

Câu 30. Đơn vị đo thời gian trong hệ thống đo lường chính thức ở nước ta hiện nay là

- A. tuần. B. ngày. C. giờ. D. giây.

Câu 31. Phép đo trực tiếp của một đại lượng vật lý là phép

- A. so sánh trực tiếp qua dụng cụ đo.
B. so sánh gián tiếp qua dụng cụ đo.
C. so sánh không thông qua dụng cụ đo.
D. đo đại lượng thứ nhất rồi suy ra đại lượng cần đo thông qua công thức.

Câu 32. Phép đo nào sau đây không thể thực hiện đo trực tiếp?

- A. Đo thời gian. B. Đo khối lượng. C. Đo khối lượng riêng. D. Đo chiều dài.

Câu 33. Thiết bị nào sau đây dùng để đo điện năng tiêu thụ trong các hộ gia đình?

- A. Vôn kế. B. Ampe kế. C. Công tơ điện. D. Nhiệt kế.

Câu 34. Kết quả sai số tuyệt đối của một phép đo là 6,07. Số chữ số có nghĩa là

- A. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 35. Sai số phép đo bao gồm

- A. sai số ngẫu nhiên và sai số đơn vị. B. sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
C. sai số hệ thống và sai số đơn vị. D. sai số đơn vị và sai số dụng cụ.

Câu 36. Sai số hệ thống có thể được hạn chế bằng cách thường xuyên

- A. hiệu chỉnh dụng cụ đo, vệ sinh dụng cụ đo.
B. đeo kính lúp khi đo, vệ sinh dụng cụ đo.
C. hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.

D. sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao, đeo kính lúp khi đo.

Câu 37. Khi đo n lần cùng một đại lượng A , ta nhận được các giá trị khác nhau: $A_1, A_2, \dots, A_n$. Giá trị trung bình của A là $\bar{A}$. Sai số tuyệt đối ứng với lần đo thứ 4 được tính bằng công thức nào sau đây?

- A. $\Delta A_4 = A - A_4$. B. $\Delta A_4 = A - A_4 \cdot 2$. C. $\Delta A_4 = A + A_4 \cdot 2$. D. $\Delta A_4 = A + A_4$.

Câu 38. Sai số ngẫu nhiên có thể được hạn chế bằng cách

- A. thực hiện phép đo nhiều lần và lấy giá trị trung bình để hạn chế sự phân tán của số liệu đo.
B. hiệu chỉnh dụng cụ đo, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.
C. hiệu chỉnh dụng cụ đo, thực hiện phép đo nhiều lần.
D. thực hiện phép đo nhiều lần, sử dụng thiết bị đo có độ chính xác cao.

Câu 39. Sai số tỉ đối của phép đo là

- A. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và sai số ngẫu nhiên.
B. tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và sai số hệ thống.
C. tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình của đại lượng cần đo.
D. tỉ số giữa sai số ngẫu nhiên và sai số tuyệt đối.

Câu 40. Khi đo nhiều lần thời gian chuyển động của một viên bi trên mặt phẳng nghiêng mà thu được nhiều giá trị khác nhau, thì giá trị nào sau đây được lấy làm kết quả của phép đo?

- A. Giá trị trung bình của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
B. Giá trị trung bình của tất cả các giá trị đo được.
C. Giá trị của lần đo cuối cùng.
D. Giá trị được lặp lại nhiều lần nhất.

Câu 41. Trong bài thực hành đo tốc độ của vật chuyển động. Để đo tốc độ trung bình của vật ta sử dụng biểu thức $v = s/t$. Khi đó

- A. $\Delta v = \Delta s - \Delta t$. B. $\Delta v = \Delta s + \Delta t$. C. $\delta v = \delta s + \delta t$. D. $\delta v = \delta s - \delta t$.

Câu 42. Đo chiều dày của một cuốn sách, được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Giá trị trung bình của các lần đo là

- A. 2,3 cm. B. 2,4 cm. C. 2,5 cm. D. 2,2 cm.

Câu 43. Một người đo chiều dài một cuốn sách $\ell = 22 \pm 1$ cm. Sai số tỉ đối của phép đo chiều dài quyển sách là

- A. 4%. B. 5%. C. 4,5%. D. 1,5%.

Câu 44. Khi đo gia tốc rơi tự do, một học sinh tính được $g = 9,786345 \text{ m/s}^2$, $\Delta g = 0,025479 \text{ m/s}^2$ thì kết quả được ghi như thế nào?

- A. $9,78 \pm 0,0254$. B. $9,78 \pm 0,025$. C. $9,786 \pm 0,025$. D. $9,786 \pm 0,03$.

Câu 45. Đo bề dày ℓ của một mặt bàn 4 lần, ta được kết quả: 2,3 cm; 2,4 cm; 2,5 cm; 2,4 cm. Lấy sai số dụng cụ là 0,05 cm. Kết quả của phép đo là

- A. $\ell = 2,40 \pm 0,05 \text{ cm}$. B. $\ell = 2,50 \pm 0,05 \text{ cm}$. C. $\ell = 2,3 \pm 0,1 \text{ cm}$. D. $\ell = 2,4 \pm 0,1 \text{ cm}$.

Câu 46. Có hai điện trở: $(3,0 \pm 0,1) \Omega$ và $(6,0 \pm 0,3) \Omega$. Phép đo điện trở tương đương của hai điện trở mắc nối tiếp sẽ có sai số tỉ đối bằng

- A. 1,1%. B. 2,2%. C. 3,3%. D. 4,4%.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 47. Về sai số trong phép đo vật lí.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tuyệt đối của lần đo thứ được xác định bởi công thức $\Delta A_i = A - A_i$.		
b) Thực hiện phép đo nhiều lần rồi lấy trung bình là cách giảm sai số ngẫu nhiên.		
c) Sai số hệ thống có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách thực hiện nhiều phép đo.		
d) Sai số tỉ đối có đơn vị là phần trăm hoặc không có đơn vị tùy theo trường hợp.		

Câu 48. Liên hệ giữa sai số và độ chính xác của phép đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tỉ đối càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.		
b) Để giảm sai số hệ thống, có thể hiệu chỉnh và sử dụng thiết bị chính xác hơn.		
c) Sai số ngẫu nhiên có thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách thay đổi thiết bị đo.		
d) Khi sai số tuyệt đối bằng 0 thì phép đo được coi là hoàn hảo và không có sai số nào khác.		

Câu 49. Về cách xác định số chữ số có nghĩa và sai số trong phép đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Số 6,07 có 3 chữ số có nghĩa vì các chữ số 6, 0, 7 đều được ghi rõ.		
b) Nếu sai số tuyệt đối là 0,03 cm thì kết quả đo phải được viết chính xác đến hàng phần trăm.		
c) Số chữ số có nghĩa luôn bằng số chữ số sau dấu phẩy.		
d) Một kết quả đo có sai số là 0,04 cm thì số đo 12,0 cm là không phù hợp.		

Câu 50. Về cách xác định và giảm sai số trong thực hành đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Trong phép đo $v = s/t$, sai số tỉ đối được xác định bởi $\delta v = \delta s + \delta t$.		
b) Sai số dụng cụ được xác định bằng một nửa độ chia nhỏ nhất của thước hoặc đồng hồ.		
c) Sai số của phép đo chiều dài không phụ thuộc vào cách đặt mắt khi đọc kết quả.		
d) Đo khối lượng riêng là phép đo trực tiếp vì dùng cân và bình chia độ.		

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 51. Một học sinh đo chiều dài 5 lần và thu được các giá trị: 19,8 cm, 20,0 cm, 19,9 cm, 20,1 cm, 19,8 cm. Giá trị trung bình của chiều dài là bao nhiêu cm (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Câu 52. Giá trị trung bình của các phép đo: 10,2 s, 10,0 s, 10,3 s, 10,1 s là bao nhiêu giây (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Câu 53. Đo chiều dài bằng thước có độ chia nhỏ nhất 1 mm. Sai số tuyệt đối của phép đo là bao nhiêu mm nếu lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất?

KQ:

Câu 54. Đo điện áp bằng vôn kế có độ chia nhỏ nhất 0,2 V. Sai số tuyệt đối là bao nhiêu vôn nếu lấy bằng một nửa độ chia nhỏ nhất?

KQ:

Câu 55. Một học sinh đo chiều dài $\ell = 25,4 \pm 0,1$ cm. Sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Câu 56. Một học sinh đo thời gian rơi tự do được $t = 0,48 \pm 0,02$ s. Sai số tỉ đối bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

E. ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ 3

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 57. Hai đơn vị nào sau đây gồm có một đơn vị cơ bản và một đơn vị dẫn xuất trong hệ SI?

- A. Kelvin, mol. B. Mét, kilogam. C. Mol, jun. D. Giây, ampe.

Câu 58. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường SI là

- A. tấn. B. gam. C. kilôgam. D. miligam.

Câu 59. Phép đo đại lượng nào sau đây là phép đo trực tiếp?

- A. Đo thời gian chuyển động của một vật. B. Tốc độ trung bình.
C. Đo diện tích. D. Đo gia tốc.

Câu 60. Phép đo đại lượng nào sau đây là phép đo gián tiếp?

- A. Quãng đường. B. Diện tích. C. Khối lượng. D. Thời gian.

Câu 61. Để xác định thành tích chạy của vận động viên điền kinh người ta sử dụng loại đồng hồ nào sau đây?

- A. Đồng hồ đeo tay. B. Đồng hồ bấm giây. C. Đồng hồ quả lắc. D. Đồng hồ hẹn giờ.

Câu 62. Theo quy ước, số 42,50 có bao nhiêu chữ số có nghĩa?

- A. 1. B. 2. C. 4. D. 3.

Câu 63. Xét theo nguyên nhân thì sai số của phép đo được chia thành mấy loại?

- A. 1. B. 3. C. 2. D. 4.

Câu 64. Sai số dụng cụ thường lấy bằng

- A. nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
B. nửa hoặc một phần tư độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
C. nửa hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.
D. một hoặc hai độ chia nhỏ nhất trên dụng cụ đo.

Câu 65. Sai số tuyệt đối trung bình của n lần đo được tính theo công thức:

- A. $A = A \pm \Delta A$. B. $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$.
C. $A = A_1 + A_2 + \dots + A_n$. D. $\Delta A = \Delta A_1 + \Delta A_2 + \dots + \Delta A_n$.

Câu 66. Sai số phép đo gồm

- A. sai số hệ thống và sai số dụng cụ. B. sai số chủ quan và sai số khách quan.
C. sai số hệ thống và sai số ngẫu nhiên. D. sai số điều kiện thí nghiệm và sai số ngẫu nhiên.

Câu 67. Phát biểu nào sau đây không đúng về sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối)?

- A. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) càng nhỏ thì phép đo càng chính xác.
B. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) càng lớn thì phép đo càng chính xác.
C. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) là tỉ số giữa sai số tuyệt đối và giá trị trung bình.

D. Sai số tỉ đối (còn được gọi là sai số tương đối) được tính bằng công thức $\delta x = \Delta x \cdot 100\%$.

Câu 68. Kết quả đo đại lượng A được viết dưới dạng $A = A \pm \Delta A$. Giá trị thực của đại lượng cần đo A nằm trong khoảng

- A. từ $-\Delta A$ đến $+\Delta A$. B. từ $A - \Delta A$ đến $A + \Delta A$.
C. từ $A - \Delta A$ đến $A + \Delta A$. D. từ $A - 2\Delta A$ đến $A + 2\Delta A$.

Câu 69. Cho các bước khi thực hiện đo nhiệt độ của một vật gồm: Thực hiện phép đo nhiệt độ. (1) Đọc và ghi kết quả đo. (2) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp. (3) Ước lượng nhiệt độ của vật. (4) Hiệu chỉnh nhiệt kế. (5) Thử tự đúng khi thực hiện phép đo nhiệt độ là

- A. (1), (2), (3), (4), (5). B. (4), (3), (5), (1), (2). C. (2), (4), (3), (1), (5). D. (3), (4), (1), (2), (5).

Câu 70. Dùng một đồng hồ đo thời gian có độ chia nhỏ nhất 0,001 s để đo thời gian rơi tự do của một vật. Xác định sai số dụng cụ của phép đo có thể là

- A. 0,0005 s. B. 0,002 s. C. 0,003 s. D. 0,004 s.

Câu 71. Kết quả đo gia tốc rơi tự do được viết dưới dạng: $g = 9,78 \pm 0,44 \text{ m/s}^2$. Sai số tỉ đối của phép đo xấp xỉ là

- A. 4,0%. B. 5,0%. C. 4,5%. D. 3,5%.

Câu 72. Thể tích của hai vật đo được bằng $V_1 = (10,20 \pm 0,02) \text{ cm}^3$ và $V_2 = (6,40 \pm 0,01) \text{ cm}^3$. Tổng thể tích của hai vật trên sẽ có giá trị bằng

- A. $(17,00 \pm 0,01) \text{ cm}^3$. B. $(16,60 \pm 0,02) \text{ cm}^3$. C. $(16,60 \pm 0,01) \text{ cm}^3$. D. $(16,60 \pm 0,03) \text{ cm}^3$.

Câu 73. Dùng thước kẹp có độ chia nhỏ nhất 0,1 mm để đo 5 lần chiều cao h của một trụ thép. Cho kết quả như trong bảng dưới. Lấy sai số dụng cụ là một độ chia nhỏ nhất. Kết quả phép đo h của trụ thép là

- A. $h = (19,9 \pm 0,18) \text{ mm}$.
B. $h = (19,9 \pm 0,2) \text{ mm}$.
C. $h = (19,8 \pm 0,2) \text{ mm}$.
D. $h = (19,9 \pm 0,1) \text{ mm}$. Lần đo h (mm) 1 19,9 2 19,8 3 20,0 4 19,7 5 19,9.

Câu 74. Biết rằng đại lượng vật lí (A) được đo gián tiếp thông qua hai đại lượng vật lí (B) và (C) bằng công thức toán học $A = B \cdot C^2$. Kết quả đo đại lượng (B) và (C) lần lượt là $B = 55,35 \pm 0,44$; $C = 2,86 \pm 0,12$. Kết quả của đại lượng (A) được ghi là

- A. $A = 18,30 \pm 0,62$. B. $A = 6,77 \pm 0,34$. C. $A = 18,30 \pm 0,34$. D. $A = 6,77 \pm 0,62$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 75. Trong quá trình đo đạc vật lí, người ta thường lặp lại nhiều lần để giảm sai số.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Giá trị trung bình của nhiều phép đo lặp lại giúp giảm ảnh hưởng của sai số ngẫu nhiên.		
b) Càng đo nhiều lần thì sai số hệ thống sẽ tự triệt tiêu.		
c) Dụng cụ đo có độ chia càng nhỏ thì sai số dụng cụ càng nhỏ.		
d) Kết quả đo phải luôn trùng khớp với giá trị thực của đại lượng.		

Câu 76. Phân biệt giữa sai số tuyệt đối và sai số tỉ đối trong đo lường vật lí.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Sai số tuyệt đối có cùng đơn vị với đại lượng cần đo.		
b) Sai số tỉ đối được tính bằng hiệu giữa các lần đo chia cho giá trị nhỏ nhất.		
c) Sai số tỉ đối không có đơn vị.		

Phát biểu	Đúng	Sai
d) Sai số tuyệt đối càng nhỏ thì sai số tỉ đối luôn nhỏ.		

Câu 77. Ảnh hưởng của yếu tố con người và điều kiện môi trường đến sai số đo.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Mắt người đọc không cùng hướng vuông góc với thước sẽ gây ra sai số hệ thống.		
b) Gió thổi mạnh làm sai lệch khi đo thời gian rơi tự do là ví dụ về sai số ngẫu nhiên.		
c) Người đọc sai đơn vị trên thước là sai số ngẫu nhiên.		
d) Sai số do độ trễ của đồng hồ bấm giây là sai số hệ thống.		

Câu 78. Quy tắc ghi kết quả đo và số chữ số có nghĩa.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Kết quả đo chỉ nên ghi dưới dạng $A = A \pm \Delta A$.		
b) Nếu sai số tuyệt đối là 0,05 thì kết quả có thể ghi là $12,347 \pm 0,05$.		
c) Khi nhân chia hai đại lượng đo, sai số tỉ đối phải cộng vào nhau.		
d) Số chữ số có nghĩa của kết quả đo phải phù hợp với độ chính xác của phép đo.		

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn.

Câu 79. Thực hiện 3 lần đo khối lượng: 120,0 g, 119,8 g, 120,2 g. Giá trị trung bình là bao nhiêu gam (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Câu 80. Kết quả đo: $x = 8,43 \pm 0,02$ m. Giá trị lớn nhất của phép đo có thể là bao nhiêu mét?

KQ:

Câu 81. Kết quả đo: $x = 5,70 \pm 0,03$ m. Giá trị nhỏ nhất có thể là bao nhiêu mét?

KQ:

Câu 82. Một vật có khối lượng $m = 50,0$ g và sai số tuyệt đối 0,2 g. Sai số tỉ đối là bao nhiêu %?

KQ:

Câu 83. Dùng thước có độ chia nhỏ nhất 2 mm để đo chiều dài. Sai số dụng cụ là bao nhiêu mm nếu nó được lấy là một nửa độ chia nhỏ nhất?

KQ:

Câu 84. Một học sinh đo chiều cao $h = 170,0 \text{ cm} \pm 0,5 \text{ cm}$. Sai số tỉ đối là bao nhiêu % (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Chuyển động cơ – Chất điểm

a) Chuyển động cơ

Chuyển động cơ của một vật là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.


b) Chất điểm

Chất điểm là những vật có kích thước rất nhỏ so với độ dài đường đi hoặc so với khoảng cách đang xét.

c) Quỹ đạo

Quỹ đạo của chất điểm là tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định trong không gian.

- Quỹ đạo có thể là đường thẳng (chuyển động thẳng) hoặc đường cong (chuyển động cong, chuyển động tròn).



2. Cách xác định vị trí của vật trong không gian


a) Vật làm mốc

Vật làm mốc là vật được coi là đứng yên để so sánh vị trí của vật chuyển động.

b) Hệ tọa độ

Hệ tọa độ gồm có gốc tọa độ O (gắn với vật làm mốc) và các trục tọa độ:


- Khi vật chuyển động trên một đường thẳng: dùng hệ tọa độ một trục Ox . Vị trí của chất điểm được xác định bởi tọa độ x .
- Khi vật chuyển động trên một mặt phẳng: dùng hệ trục tọa độ vuông góc Oxy gồm hai trục Ox và Oy vuông góc với nhau tại gốc O . Vị trí của chất điểm được xác định bởi cặp tọa độ $(x; y)$.



c) Hệ tọa độ địa lí

Trong thực tế cuộc sống và hàng hải, người ta thường chọn hệ tọa độ trùng với hệ tọa độ địa lí:

- Gốc tọa độ O là vị trí của vật mốc.
- Trục hoành là đường nối hai hướng địa lí Tây – Đông.
- Trục tung là đường nối hai hướng địa lí Bắc – Nam.
- Vị trí của một điểm được xác định bởi khoảng cách d từ gốc tới điểm đó kèm theo góc lệch phương vị so với các hướng chính (Đông, Tây, Nam, Bắc).



Ví dụ: Điểm A cách gốc O một khoảng 20 m theo hướng lệch 45° Đông – Bắc:
 $A(d = 20 \text{ m}; 45^\circ \text{ Đông – Bắc})$.

3. Cách xác định thời gian trong chuyển động

- **Mốc thời gian (gốc thời gian):** Là thời điểm mà ta bắt đầu bấm giờ đo thời gian ($t = 0$).
- **Thời điểm:** Là giá trị mà đồng hồ hiện đang chỉ đến theo một mốc thời gian đã chọn (ví dụ: 8 h, 10 h 30 phút).
- **Thời gian (khoảng thời gian):** Là khoảng thời gian trôi đi trong thực tế giữa hai thời điểm: $\Delta t = t_2 - t_1$.

4. Hệ quy chiếu

Hệ quy chiếu bao gồm:

1. Một vật làm mốc và một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.
2. Một mốc thời gian và một đồng hồ dùng để đo thời gian.

5. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được

- **Độ dịch chuyển:** Là một đại lượng vectơ biểu diễn sự thay đổi vị trí của vật, kí hiệu là $\vec{d}$. Vectơ độ dịch chuyển có:
 - Gốc đặt tại vị trí đầu của chuyển động.
 - Mút (ngọn) đặt tại vị trí cuối của chuyển động.
 - Độ lớn tỉ lệ với khoảng cách giữa vị trí đầu và vị trí cuối.
- **Quãng đường đi được (s):** Là độ dài toàn bộ quỹ đạo mà vật đã vạch ra trong suốt quá trình chuyển động. Quãng đường là đại lượng vô hướng luôn không âm ($s \geq 0$).
- **So sánh giữa độ lớn độ dịch chuyển (d) và quãng đường (s):**
 - Khi vật chuyển động thẳng và **không đổi chiều**: độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được ($d = s$).
 - Khi vật chuyển động thẳng nhưng **có đổi chiều**: quãng đường đi được luôn lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển ($s > d$).
 - Khi vật chuyển động cong: quãng đường đi được luôn lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển ($s > d$).
 - Nói chung: Trong mọi trường hợp chuyển động, ta luôn có $s \geq d$.
- **Tổng hợp độ dịch chuyển:** Nếu một vật thực hiện liên tiếp các độ dịch chuyển $\vec{d}_1, \vec{d}_2, \dots$ thì độ dịch chuyển tổng hợp là:


$$\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2 + \dots$$

- Cùng chiều: $d = d_1 + d_2$.
- Ngược chiều: $d = |d_1 - d_2|$.
- Vuông góc: $d = \sqrt{d_1^2 + d_2^2}$.

B. CÁC DẠNG BÀI TẬP VÀ VÍ DỤ MINH HỌA

Dạng 1: Quãng đường đi được và độ dịch chuyển

Ví dụ 1. Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường. Chọn hệ tọa độ có gốc là vị trí nhà bạn A, trục Ox trùng với đường đi từ nhà bạn A tới trường như hình vẽ.



- a) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A đi từ trạm xăng tới siêu thị.
b) Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của bạn A trong cả chuyến đi trên.

Ví dụ 2. Bạn Phong bơi trong bể bơi dài 40 m. Phong bắt đầu xuất phát từ đầu bể bơi đến cuối bể bơi thì quay lại bơi tiếp về đầu bể rồi nghỉ. Quãng đường mà bạn Phong bơi được là

- A. 0 m. B. 80 m. C. 40 m. D. -80 m.

Ví dụ 3.

Xác định vị trí của vật A trên trục Ox ở hình bên tại thời điểm 12 h. Biết vật xuất phát từ O tại thời điểm 8 h, đi theo chiều dương của trục Ox , mỗi giờ đi được 40 km.



Ví dụ 4. Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc. Quãng đường đi được trong cả chuyến đi là


- A. 23 km. B. 24 km. C. 25 km. D. 26 km.

Ví dụ 5. Một người lái mô tô đi thẳng 3 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 2 km rồi quay sang hướng Đông 3 km. Quãng đường đi được của người đó là

- A. 6 km. B. 2 km. C. 8 km. D. 3 km.

Ví dụ 6.

Một thang máy mang một người từ tầng trệt đi xuống tầng hầm sâu 5 m, rồi lên đến tầng 3. Biết rằng mỗi tầng cách nhau 4 m. Trục tọa độ có gốc và chiều dương như hình vẽ. Độ dịch chuyển từ hầm lên đến tầng 3 của thang máy là



- A. 7 m. B. 5 m. C. 17 m. D. 10 m.

Ví dụ 7. Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 10 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 6 m về phía Tây. Độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ khi $\vec{d} = \vec{d}_1 + \vec{d}_2$ là

- A. 4 m (Tây). B. 16 m (Đông). C. 4 m (Đông). D. 16 m (Tây).

Ví dụ 8. Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 10 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 6 m về phía Tây. Độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ khi $\vec{d} = \vec{d}_1 + 3\vec{d}_2$ là

- A. 16 m (Tây). B. 16 m (Đông). C. 8 m (Đông). D. 8 m (Tây).

Ví dụ 9. Xét quãng đường AB dài 1500 m với A là vị trí nhà của em và B là vị trí của bưu điện. Tiệm tạp hóa nằm tại vị trí C là trung điểm của AB . Nếu chọn nhà em làm gốc tọa độ và chiều dương hướng từ nhà em đến bưu điện. Độ dịch chuyển của em trong trường hợp đi từ tiệm tạp hóa đến bưu điện rồi quay về nhà là

- A. 1500 m. B. 0 m. C. -1500 m. D. -750 m.

Ví dụ 10. Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc. Độ dịch chuyển tổng hợp của người đó là

- A. 20,88 km. B. 26,00 km. C. 14,00 km. D. 30,90 km.

Ví dụ 11. Một người bơi ngang từ bờ bên này sang bờ bên kia của một dòng sông rộng 50 m có dòng chảy theo hướng từ Bắc xuống Nam. Do nước sông chảy mạnh nên khi sang đến bờ bên kia thì người đó đã trôi xuôi theo dòng nước 50 m. Xác định độ dịch chuyển của người đó.

Ví dụ 12. An chạy bộ qua cầu đi thẳng 120 m theo hướng Đông, sau đó rẽ trái chạy thẳng theo hướng Bắc 60 m rồi quay sang hướng Tây đi 40 m. Độ dịch chuyển của An là

- A. 0 m. B. 220 m. C. 100 m. D. 72 m.

Ví dụ 13. Một con kiến bò trên miệng của một cái chén đi được $\frac{1}{2}$ vòng. Bán kính của miệng chén là 6 cm. Lấy $\pi = 3,14$. Độ dịch chuyển của kiến là

A. 12 cm.

B. 18,84 cm.

C. 0 m.

D. 6 cm.

Ví dụ 14. Biết $\vec{d}_1$ là độ dịch chuyển 3 m về phía Đông, còn $\vec{d}_2$ là độ dịch chuyển 4 m về phía Bắc. Độ lớn, phương và chiều của độ dịch chuyển tổng hợp $\vec{d}$ là

A. 5 m (hướng Đông – Nam 43°).B. 5 m (hướng Đông – Bắc 53°).C. 7 m (hướng Đông – Bắc 43°).D. 7 m (hướng Đông – Nam 53°).

Ví dụ 15. Một người chuyển động 30 m theo hướng Bắc, sau đó đi 20 m theo hướng Đông và cuối cùng là $20\sqrt{2}$ m theo hướng Tây Nam một góc 45° so với hướng Tây. Sự dịch chuyển của người từ vị trí đầu sẽ là

A. 10 m dọc theo phía Bắc.

B. 10 m về phía Nam.

C. 10 m dọc theo phía Tây.

D. 10 m về phía Đông.

Ví dụ 16. Một xe ô tô xuất phát từ tỉnh A đi đến tỉnh B cách A 10 km sau đó đi theo chiều ngược lại tới vị trí cách tỉnh A 2 km (chưa đi qua tỉnh A) thì dừng lại. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 12 km. Độ dịch chuyển là 8 km.


B. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 20 km. Độ dịch chuyển là 0 km.

C. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 18 km. Độ dịch chuyển là 2 km.

D. Quãng đường mà ô tô đó đi được là 12 km. Độ dịch chuyển là 2 km.


Ví dụ 17.

Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C. Cả hai đều về đích cùng một lúc. Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của người thứ nhất và người thứ hai.



Ví dụ 18.

Một xe bắt đầu chuyển động theo chiều kim đồng hồ từ điểm P đến điểm Q theo đường tròn bán kính $r = 8$ m như hình vẽ bên. Biết OP vuông góc với OQ . Tính quãng đường đi được và độ dịch chuyển của xe.



C. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 1

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Trường hợp nào sau đây quỹ đạo của vật là đường thẳng?

A. Một học sinh đi xe từ nhà đến trường.

B. Một viên bi sắt được thả rơi.

C. Một ô tô chuyển động trên đường.

D. Một viên đá được ném theo phương ngang.

Câu 2. Độ lớn độ dịch chuyển phụ thuộc vào

A. khoảng cách vị trí đầu và vị trí cuối.

B. thời điểm xuất phát.

C. khối lượng của vật.

D. kích thước của vật.

Câu 3. Một chất điểm chuyển động trên trục Ox từ tọa độ x_1 đến tọa độ x_2 . Độ dịch chuyển của chất điểm này là

A. $d = x_1 - x_2$.B. $d = x_2 - x_1$.C. $d = x_1 + x_2$.D. $d = x_1 \cdot x_2$.

Câu 4. Đối với vật chuyển động, quãng đường đi được

A. là đại lượng vectơ.

B. có đơn vị đo là m (mét).

C. có đơn vị là m/s (mét trên giây).

D. có đơn vị là s (giây).

Câu 5. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau

- A. khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều. B. khi vật chuyển động thẳng, đổi chiều.
C. khi vật chuyển động thẳng. D. xảy ra ở mọi trường hợp.

Câu 6. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

- A. Quyển sách rơi từ trên bàn xuống sàn nhà. B. Chiếc ô tô trong bến xe.
C. Mặt Trăng trong chuyển động quanh Trái Đất. D. Con cá trong chậu nước.

Câu 7. Trong trường hợp nào sau đây không thể coi vật chuyển động như một chất điểm?

- A. Trái Đất trong chuyển động quanh Mặt Trời.
B. Ô tô đi từ Hà Nội đến Quảng Ninh.
C. Viên đạn chuyển động trong không khí.
D. Người ngư dân di chuyển trên chiếc thuyền đánh cá.


Câu 8. Số liệu về độ dịch chuyển và thời gian của chuyển động thẳng của một xe ô tô đồ chơi chạy bằng pin được ghi trong bảng bên. Dựa vào bảng này để xác định từ giây thứ 3 đến 5 xe chuyển động như thế nào?

Thời gian (s)	0	1	2	3	4	5
Độ dịch chuyển (m)	1	3	5	7	7	7

- A. Chuyển động nhanh dần. B. Chuyển động chậm dần.
C. Chuyển động đều. D. Không chuyển động.

Câu 9.

Một vận động viên chạy từ một siêu thị (A) đến cổng Sân Vận Động (D) theo hai quỹ đạo khác nhau. Hãy so sánh độ dịch chuyển và quãng đường chạy được của người vận động viên trong trường hợp đi từ $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D$.



- A. $d > s$. B. $d = s$. C. $d < s$. D. $d = s = 0$.

Câu 10. Trường hợp nào dưới đây có thể coi vật là chất điểm?

- A. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh mình nó.
B. Hai hòn bi lúc va chạm với nhau.
C. Người nhảy cầu lúc đang rơi xuống nước.
D. Giọt nước mưa lúc đang rơi.

Câu 11. Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào có thể xem vật như một chất điểm?

- A. Trái Đất đang chuyển động tự quay quanh mình nó.
B. Viên đạn đang chuyển động trong nòng súng.
C. Tàu hoả đứng trong sân ga.
D. Trái Đất chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời.


Câu 12. Để xác định vị trí một ô tô du lịch thám hiểm giữa sa mạc người ta sử dụng

- A. khoảng cách theo đường chim bay thẳng đến một thành phố ven sa mạc.
B. kinh độ và vĩ độ địa lí của xe.
C. quãng đường đi của xe từ lúc xuất phát ở một thành phố ven sa mạc.
D. khoảng thời gian đã đi của xe từ lúc xuất phát đó.

Câu 13. Một người lái xe ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km. Quãng đường đi được của ô tô là

- A. 16 km. B. 13 km. C. 10 km. D. 14 km.

Câu 14. Bạn Việt đi xe đạp đến trường theo đường thẳng như hình vẽ. Khi đến quây báo, bạn chợt nhớ đã quên một cuốn sách ở nhà nên quay về nhà lấy sách rồi lại đạp xe đến trường. Độ dịch chuyển khi bạn quay từ quây báo về nhà và độ dịch chuyển khi bạn từ quây báo đến trường lần lượt là



- A. 400 m và 600 m. B. 400 m và 1000 m. C. -400 m và 1000 m. D. -400 m và 600 m.

Câu 15. Một ô tô đi 12 km theo hướng Tây và sau đó đi 16 km về hướng Nam. Quãng đường đi được và độ dịch chuyển của ô tô là

- A. 28 km và 28 km. B. 28 km và 20 km. C. 20 km và 28 km. D. 20 km và 20 km.

Câu 16. Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 8 km. Quãng đường s đi được và độ dịch chuyển d của ô tô lần lượt là

- A. 14 km; 10 km. B. 10 km; 14 km. C. 10 km; 10 km. D. 14 km; 14 km.

Câu 17. Một vật chuyển động thẳng trên một đoạn đường. Nếu chọn 10 giờ làm mốc tính thời gian và thời điểm 11 giờ lúc xuất phát thì thời điểm bắt đầu đo thời gian là

- A. 30 phút. B. 1 giờ. C. 2 giờ. D. 4 giờ.

Câu 18. Một người điều khiển thuyền đi được 5,6 km theo hướng Bắc trên mặt hồ phẳng lặng trong thời gian 1,0 h. Sau đó, anh ta quay thuyền đi về phía Tây 3,4 km trong 30 phút. Độ dịch chuyển tổng hợp của thuyền có độ lớn

- A. 6,6 km và hướng lệch về phía Tây 31° so với hướng Bắc.
 B. 13,2 km và hướng lệch về phía Tây 31° so với hướng Bắc.
 C. 13,2 km và hướng lệch về phía Đông 42° so với hướng Bắc.
 D. 6,6 km và hướng lệch về phía Đông 42° so với hướng Bắc.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 5 m, rồi lên tới tầng cao nhất của tòa nhà cách tầng G 50 m.

- a) Khi đi từ tầng G xuống tầng hầm thì quãng đường đi được là -5 m.
 b) Khi đi từ tầng G xuống tầng hầm độ lớn độ dịch chuyển là 5 m.
 c) Khi đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất quãng đường đi được là 55 m.
 d) Khi đi từ tầng hầm lên tầng cao nhất độ dịch chuyển có độ lớn là 55 m.

Câu 2.


Trong hình bên, người đi xe máy (1), người đi bộ (2), người đi ô tô (3) đều khởi hành từ siêu thị A để đi đến bưu điện B.



- a) Độ lớn độ dịch chuyển của ba người là bằng nhau.
 b) Quãng đường đi được của người đi bộ là lớn nhất trong ba người.
 c) Độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được bằng nhau nếu người đó đi theo đường thẳng từ A đến B.
 d) Quãng đường đi được luôn nhỏ hơn độ dịch chuyển.

Câu 3.

Độ lớn độ dịch chuyển mô tả ở hình vẽ trong hệ tọa độ địa lí. Biết chuyển động là chuyển động thẳng. Tỷ xích 1 cm ứng với 100 m.




- a) Độ lớn độ dịch chuyển $d_4 = 100$ m.
 b) Quãng đường đi được s_4 bằng độ lớn độ dịch chuyển d_4 .

- c) Độ dịch chuyển $\vec{d}_1 = 100$ m theo hướng Bắc.
d) Độ dịch chuyển $\vec{d}_2 = 200$ m hướng theo góc 45° từ Đông sang Bắc.

Câu 4.

Một người đi bộ 5,0 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam theo sơ đồ như hình.



- a) Vectơ độ dịch chuyển đổi chiều trong quá trình chuyển động.
b) Tổng quãng đường đã đi là 12 km.
c) Quãng đường đi được và độ lớn của độ dịch chuyển trong trường hợp trên là khác nhau.
d) Độ lớn độ dịch chuyển là 7 km theo hướng Nam.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Thông tin dùng chung cho các câu hỏi sau : Một người đi xe máy từ nhà đến bến xe bus cách nhà 6 km về phía Đông. Đến bến xe, người đó lên xe bus đi tiếp 20 km về phía Bắc.


Câu 1. Quãng đường đi được trong cả chuyến đi là bao nhiêu kilômét?

KQ:

Câu 2. Độ dịch chuyển tổng hợp của người đó có độ lớn là bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Thông tin dùng chung cho các câu hỏi sau : Bạn A đi xe đạp từ nhà qua trạm xăng, tới siêu thị mua đồ rồi quay về nhà cất đồ, sau đó đi xe đến trường.



Câu 3. Quãng đường đi được từ trạm xăng đến siêu thị là bao nhiêu mét?

KQ:

Câu 4. Độ dịch chuyển của cả chuyến đi có độ lớn là bao nhiêu mét?

KQ:

Thông tin dùng chung cho các câu hỏi sau : Một thang máy mang một người từ tầng trệt đi xuống tầng hầm sâu 5 m rồi đi lên tầng 3. Biết chiều cao tầng trệt và các tầng lầu là 4 m. Chọn gốc tọa độ tại mặt đất (tầng trệt).

Câu 5. Quãng đường chuyển động khi người này lên tới lầu 3 là bao nhiêu mét?

KQ:

Câu 6. Độ dịch chuyển từ khi thang máy đi từ tầng hầm đến khi dừng tại lầu 3 là bao nhiêu mét?

KQ:

D. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆN – ĐỀ SỐ 2

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về quỹ đạo của vật?

- A. Quỹ đạo là một đường thẳng mà trên đó chất điểm chuyển động.
- B. Một đường vạch sẵn trong không gian trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.
- C. Quỹ đạo là một đường nối những vị trí liên tiếp của vật theo thời gian trong quá trình chuyển động.
- D. Một đường cong mà trên đó chất điểm chuyển động gọi là quỹ đạo.

Câu 2. Độ dịch chuyển là đại lượng

- A. vectơ.
- B. vô hướng.
- C. luôn âm.
- D. luôn dương.

Câu 3. Độ dịch chuyển của một vật là

- A. quãng đường vật đi được trong khoảng thời gian đó.
- B. khoảng thời gian vật đi từ điểm đầu đến điểm cuối.
- C. tốc độ chuyển động nhanh hay chậm của vật.
- D. một vectơ nối vị trí điểm đầu đến cuối là điểm cuối của chuyển động và độ dài tỉ lệ với độ lớn của độ dịch chuyển.

Câu 4. Quãng đường đi được là một đại lượng luôn có giá trị

- A. âm.
- B. dương, âm hoặc bằng không.
- C. dương hoặc âm.
- D. không âm.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về độ dịch chuyển và quãng đường đi được của một vật?

- A. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vectơ.
- B. Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ còn quãng đường đi được là đại lượng vô hướng.
- C. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng vô hướng.
- D. Độ dịch chuyển và quãng đường đi được đều là đại lượng không âm.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây là đúng khi so sánh quãng đường và độ dịch chuyển?

- A. Quãng đường luôn luôn lớn hơn hoặc bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
- B. Quãng đường luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
- C. Quãng đường luôn luôn bằng độ lớn của độ dịch chuyển.
- D. Quãng đường luôn luôn nhỏ hơn độ lớn của độ dịch chuyển.

Câu 7. Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta sử dụng

- A. độ sâu của nước biển tại vị trí của tàu.
- B. kinh độ và vĩ độ địa lí của tàu.
- C. khoảng cách từ tàu đến bến cảng gần nhất.
- D. khoảng cách từ tàu đến một bến cảng nhất định.

Câu 8. Một người đi bộ 5 km trên một con đường thẳng theo hướng Bắc rồi quay đầu lại và đi 12 km theo hướng Nam. Độ dịch chuyển của người đó là


- A. 17 km, hướng Nam.
- B. 5 km, hướng Bắc.
- C. 7 km, hướng Nam.
- D. 7 km, hướng Bắc.

Câu 9. Một con nhện bò dọc theo các cạnh của một chiếc bàn hình chữ nhật. Biết hai cạnh bàn có chiều dài lần lượt là 0,8 m và 1,2 m. Độ dịch chuyển của con nhện khi nó xuất phát từ một đỉnh hình chữ nhật và đi được quãng đường 2,0 m là

- A. 1,4 m.
- B. 1,5 m.
- C. 1,6 m.
- D. 1,7 m.

Câu 10.

Một vật bắt đầu chuyển động từ điểm O về điểm B , sau đó chuyển động đến điểm A như hình vẽ. Quãng đường và độ dịch chuyển của vật tương ứng bằng



- A. 7 m; 3 m. B. 7 m; -3 m. C. 8 m; 3 m. D. 8 m; -2 m.


Câu 11. Một người chỉ cho một người khách du lịch như sau: “Ông hãy đi dọc theo phố này đến một bờ hồ lớn. Đứng tại đó, nhìn sang bên kia hồ theo hướng Tây Bắc, ông sẽ thấy tòa nhà của khách sạn S”. Người chỉ đường đã xác định vị trí của khách sạn S theo cách nào?

- A. Cách dùng đường đi và vật làm mốc. B. Cách dùng hệ tọa độ địa lí.
C. Dùng cả hai cách A và B. D. Không dùng cả hai cách A và B.

Câu 12. Một người đi thang máy từ tầng G xuống tầng hầm cách tầng G 5 m. Quãng đường và độ dịch chuyển của người đó khi đi từ tầng G xuống tầng hầm là

- A. Quãng đường $s = 50$ m; $d = 5$ m (xuống dưới). B. Quãng đường $s = 5$ m; $d = 5$ m (lên trên).
C. Quãng đường $s = 45$ m; $d = -5$ m (xuống dưới). D. Quãng đường $s = 5$ m; $d = 5$ m (xuống dưới).

Thông tin dùng chung cho các câu hỏi sau : Một người di chuyển ở bốn địa điểm: xe buýt đậu bên đường, cây xanh, trường học, công viên.



Câu 13. Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Câu 14. Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Câu 15. Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên và cuối cùng đến chỗ cây xanh là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 260 m.

Câu 16. Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên và cuối cùng đến chỗ cây xanh là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 180 m. D. 128 m.

Câu 17. Quãng đường đi được của người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên rồi đến chỗ cây xanh và cuối cùng đến chỗ xe buýt là

- A. 80 m. B. 360 m. C. 180 m. D. 128 m.

Câu 18. Độ lớn độ dịch chuyển khi người đó di chuyển từ chỗ xe buýt đến trường rồi đến công viên rồi đến chỗ cây xanh và cuối cùng đến chỗ xe buýt là

- A. 80 m. B. 100 m. C. 0 m. D. 128 m.

PHẦN II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng / Sai


Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Xét một vật chuyển động.

- a) Quãng đường là đại lượng vô hướng, không âm, chỉ được đặc trưng bởi độ lớn.
b) Quãng đường đi được không thể hiện được chiều chuyển động của vật.
c) Độ dịch chuyển có thể nhận giá trị âm, dương hoặc bằng không.
d) Khi vật chuyển động thẳng, không đổi chiều thì độ lớn của độ dịch chuyển và quãng đường đi được khác nhau.

Câu 2.

Hai người đạp xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C, người thứ hai đi thẳng từ A đến C như hình vẽ.




- Người thứ nhất đi được quãng đường 7 km, còn độ dịch chuyển là 5 km.
- Người thứ hai có quãng đường và độ dịch chuyển đều bằng 5 km.
- Độ dịch chuyển của người thứ nhất là 7 km theo hướng Đông – Bắc.
- Góc giữa độ dịch chuyển của người thứ nhất và hướng Đông là 53° .

Câu 3. Em của An chơi trò chơi tìm kho báu ở ngoài vườn với các bạn của mình. Em của An giấu kho báu của mình là một chiếc vòng nhựa vào trong một chiếc giày rồi viết mật thư tìm kho báu như sau: Bắt đầu từ gốc cây ổi, đi 10 bước về phía Bắc, sau đó đi 4 bước về phía Tây, 15 bước về phía Nam, 5 bước về phía Đông và 5 bước về phía Bắc là tới chỗ giấu kho báu.

- Không thể tìm ra kho báu theo cách mô tả này.
- Quãng đường phải đi (theo bước) để tìm ra kho báu là 34 bước.
- Kho báu được giấu ở vị trí cách cây ổi 5 bước theo hướng Nam.
- Độ dịch chuyển (theo bước) để tìm ra kho báu là 1 bước theo hướng Đông.

Câu 4. Xét hai xe chuyển động như hình. Chọn gốc tọa độ tại vị trí O trên hình vẽ, chiều dương hướng từ trái sang phải. Tại một thời điểm nào đó, xe màu xanh và xe màu cam đang lần lượt ở vị trí có tọa độ $x_A = 10$ km và $x_B = 20$ km. Sau khoảng thời gian Δt_1 , xe màu xanh đến được vị trí x_B và xe màu cam đến được vị trí x_A .




- Hai xe chuyển động ngược chiều nhau.
- Quãng đường đi được của hai xe là 10 km.
- Độ lớn độ dịch chuyển bằng quãng đường đi được của hai xe.
- Độ dịch chuyển của xe B có giá trị là 10 km.

PHẦN III. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Thông tin dùng chung cho các câu hỏi sau : Một người đi bộ với tốc độ không đổi dọc theo nửa đường tròn có bán kính 5,0 m, từ A đến B như hình vẽ với thời gian đi là 6,0 s.




Câu 1. Độ lớn độ dịch chuyển là bao nhiêu mét?

KQ:

Câu 2. Quãng đường đã đi là bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Thông tin dùng chung cho các câu hỏi sau : Hai người đi xe đạp từ A đến C, người thứ nhất đi theo đường từ A đến B, rồi từ B đến C; người thứ hai đi thẳng từ A đến C như hình vẽ. Cả hai đều về đích cùng một lúc.



Câu 3. Quãng đường đi được của người thứ nhất là bao nhiêu kilômét?

KQ:

Câu 4. Độ lớn độ dịch chuyển của người thứ hai là bao nhiêu kilômét (làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)?

KQ:

Thông tin dùng chung cho các câu hỏi sau : Một người lái ô tô đi thẳng 6 km theo hướng Tây, sau đó rẽ trái đi thẳng theo hướng Nam 4 km rồi quay sang hướng Đông đi 3 km.

Câu 5. Quãng đường đi được của ô tô là bao nhiêu kilômét?

KQ:

Câu 6. Độ lớn độ dịch chuyển của ô tô là bao nhiêu kilômét?

KQ: