

|                                                                                                  |  |                                                                                                                                        |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <div>LỚP TOÁN CÔ THÚY</div> <div>SĐT: 0935.322.328</div> <div>Địa chỉ: 50/2C Phạm Thị Liên</div> |  | <div>HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT GIỮA KỲ I</div> <div>Môn: VẬT LÍ 10 – THPT BÙI THỊ XUÂN</div> <div>Năm học 2025 – 2026 – Mã đề: 207</div> |               |
| Giáo viên: HỒ THỊ THÚY                                                                           |  | Môn học: VẬT LÍ 10                                                                                                                     | Mã đề thi 207 |

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)**

- B. Viên sỏi nhỏ được thả rơi từ trên cao trong không khí.
- C. Chiếc lá khô đang rơi từ trên cành xuống.
- D. Sợi chỉ mảnh được thả rơi trong không khí.

**Lời giải.**

Vật được coi là rơi tự do khi lực cản của không khí rất nhỏ so với trọng lượng. Viên sỏi nhỏ, nặng thỏa mãn điều kiện này; dù, lá khô, sợi chỉ chịu lực cản lớn.

Chọn đáp án **(B)** ..... □

**Câu 6.** Phát biểu nào sau đây về chuyển động thẳng biến đổi đều là **sai**?

- A. Trong chuyển động nhanh dần đều, vectơ gia tốc cùng chiều với chiều chuyển động.
- B. Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, gia tốc không đổi theo thời gian.
- C. Trong chuyển động chậm dần đều, gia tốc luôn có giá trị âm.
- D. Trong chuyển động chậm dần đều, vectơ gia tốc ngược chiều với chiều chuyển động.

**Lời giải.**

Trong chuyển động chậm dần đều,  $\vec{a}$  ngược chiều  $\vec{v}$  (tức  $a \cdot v < 0$ ). Nếu vật chuyển động theo chiều âm ( $v < 0$ ) thì  $a > 0$ . Vậy khẳng định gia tốc “luôn có giá trị âm” là sai.

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**Câu 7.** Gọi  $\bar{A}$  là giá trị trung bình,  $\Delta A'$  là sai số dụng cụ,  $\overline{\Delta A}$  là sai số ngẫu nhiên và  $\Delta A = \overline{\Delta A} + \Delta A'$  là sai số tuyệt đối của phép đo đại lượng  $A$ . Sai số tỉ đối của phép đo là

- A.  $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$ .
- B.  $\delta A = \frac{\bar{A}}{\Delta A} \cdot 100\%$ .
- C.  $\delta A = \frac{\Delta A'}{A} \cdot 100\%$ .
- D.  $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$ .

**Lời giải.**

Sai số tỉ đối bằng tỉ số giữa sai số tuyệt đối (toàn phần) và giá trị trung bình:  $\delta A = \frac{\Delta A}{A} \cdot 100\%$ .

Chọn đáp án **(D)** ..... □

**Câu 8.** Đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( $d - t$ ) của chuyển động thẳng đều có dạng là

- A. đường thẳng.
- B. đường tròn.
- C. đường hypebol.
- D. đường parabol.

**Lời giải.**

Chuyển động thẳng đều có  $d = vt$  là hàm bậc nhất của  $t$  nên đồ thị ( $d - t$ ) là một đường thẳng.

Chọn đáp án **(A)** ..... □

**Câu 9.** Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều với vận tốc ban đầu  $v_0$ , sau thời gian  $t$  vật có vận tốc  $v$ . Gia tốc của vật là

- A.  $a = \frac{v_0 - v}{t}$ .
- B.  $a = \frac{v_0 + v}{t}$ .
- C.  $a = \frac{v^2 - v_0^2}{t}$ .
- D.  $a = \frac{v - v_0}{t}$ .

**Lời giải.**

Theo định nghĩa:  $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{v - v_0}{t}$ .

Chọn đáp án **(D)** ..... □

**Câu 10.** Một chất điểm đi được quãng đường  $s$  trong khoảng thời gian  $\Delta t$ . Tốc độ trung bình của chất điểm là

- A.  $v_{tb} = s \cdot \Delta t$ .
- B.  $v_{tb} = s - \Delta t$ .
- C.  $v_{tb} = \frac{s}{\Delta t}$ .
- D.  $v_{tb} = \frac{\Delta t}{s}$ .

**Lời giải.**

Tốc độ trung bình bằng quãng đường chia thời gian:  $v_{tb} = \frac{s}{\Delta t}$ .

Chọn đáp án **C** ..... ☐

**Câu 11.** Độ dịch chuyển của một vật cho biết

- A. độ dài và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.    B. vị trí và thời điểm chuyển động của vật.  
C. mức độ nhanh hay chậm của chuyển động.    D. tổng độ dài quãng đường mà vật đã đi được.

**Lời giải.**

Độ dịch chuyển  $\vec{d}$  là vectơ nối vị trí đầu với vị trí cuối, cho biết độ dài (khoảng cách thẳng) và hướng của sự thay đổi vị trí của vật.

Chọn đáp án **A** ..... ☐

**Câu 12.** Khi phòng thực hành xảy ra sự cố cháy, hành động nào sau đây là **sai**?

- A. Ngắt ngay toàn bộ nguồn điện của phòng thực hành.  
B. Di chuyển nhanh các chai lọ hóa chất, vật liệu dễ cháy ra khu vực an toàn.  
C. Không dùng bình khí CO<sub>2</sub> để dập đám cháy trên quần áo người hoặc đám cháy kim loại kiềm.  
D. Dùng nước dội trực tiếp để dập đám cháy ở nơi có thiết bị điện đang cắm nguồn.

**Lời giải.**


Nước dẫn điện, dội nước vào đám cháy có thiết bị điện đang cắm nguồn có thể gây chập điện, điện giật cho người chữa cháy. Đây là hành động sai.

Chọn đáp án **D** ..... ☐

## PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

**Câu 1.** Một bạn học sinh đạp xe từ cổng trường THPT Chuyên Quốc Học Huế đi thẳng theo đường Lê Lợi 1 km, sau đó rẽ phải vào đường Hùng Vương đi thẳng 500 m để đến quán chè Hẻm như sơ đồ hình bên. Coi hai đoạn đường vuông góc với nhau.



| Phát biểu                                                                       | Đúng | Sai |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Quãng đường đi được và độ lớn độ dịch chuyển của bạn học sinh là khác nhau.. | X    |     |
| b) Độ dịch chuyển của bạn học sinh là một đại lượng vô hướng..                  |      | X   |
| c) Quãng đường bạn học sinh đã đi được là 1,5 km..                              | X    |     |
| d) Độ lớn độ dịch chuyển của bạn học sinh bằng 1180 m..                         |      | X   |

**Lời giải.**

**a) Đúng.** Đường đi gấp khúc (có rẽ) nên quãng đường lớn hơn độ lớn độ dịch chuyển.

**b) Sai.** Độ dịch chuyển là đại lượng vectơ, có cả độ lớn và hướng.

**c) Đúng.**  $s = 1000 + 500 = 1500 \text{ m} = 1,5 \text{ km}$ .

**d) Sai.** Hai đoạn vuông góc:  $d = \sqrt{1000^2 + 500^2} \approx 1118 \text{ m} \neq 1180 \text{ m}$ .

Chọn đáp án **a đúng b sai c đúng d sai** ..... ☐

**Câu 2.** Một vật chuyển động thẳng dọc theo trục  $Ox$  có phương trình độ dịch chuyển  $d = 4t - t^2$  ( $d$  tính bằng m,  $t$  tính bằng s,  $t \geq 0$ ).

| Phát biểu                                                                         | Đúng | Sai |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| a) Vật chuyển động thẳng nhanh dần đều trong suốt quá trình chuyển động..         |      | X   |
| b) Ngay sau thời điểm $t = 0$ , vật chuyển động theo chiều dương của trục $Ox$ .. | X    |     |
| c) Gia tốc của vật bằng $1\text{ m/s}^2$ ..                                       |      | X   |
| d) Vận tốc của vật tại thời điểm $t = 1\text{ s}$ bằng $2\text{ m/s}$ ..          | X    |     |

- Lời giải.**
- a) **Sai.** So sánh với  $d = v_0t + \frac{1}{2}at^2$ :  $v_0 = 4\text{ m/s}$ ,  $a = -2\text{ m/s}^2$ . Ban đầu  $a \cdot v_0 < 0$  nên vật chuyển động chậm dần đều (đến  $t = 2\text{ s}$  thì đổi chiều).
- b) **Đúng.**  $v_0 = 4\text{ m/s} > 0$  nên ban đầu vật chuyển động theo chiều dương.
- c) **Sai.**  $a = -2\text{ m/s}^2 \neq 1\text{ m/s}^2$ .
- d) **Đúng.**  $v = v_0 + at = 4 - 2t \Rightarrow v(1) = 4 - 2 \cdot 1 = 2\text{ m/s}$ .

Chọn đáp án 

|       |        |       |        |
|-------|--------|-------|--------|
| a sai | b đúng | c sai | d đúng |
|-------|--------|-------|--------|

 ..... ☐

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)**
*(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4.)*

**Câu 1.** Tại giải vô địch điền kinh thế giới ở Berlin (Đức), vận động viên Usain Bolt lập kỉ lục thế giới chạy 100 m với thời gian 9,58 s. Tốc độ trung bình của Usain Bolt trên đường chạy đó là bao nhiêu m/s? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười).

Đáp án: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | , | 4 |
|---|---|---|---|

**Lời giải.**


$$v_{tb} = \frac{s}{\Delta t} = \frac{100}{9,58} \approx 10,44 \approx 10,4\text{ m/s}.$$

Đáp án: 

|      |
|------|
| 10,4 |
|------|

 ..... ☐

**Câu 2.** Hình bên là đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( $d - t$ ) của một ô tô chuyển động thẳng. Vận tốc của ô tô bằng bao nhiêu m/s?



Đáp án: 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5 |  |  |  |
|---|--|--|--|

- Lời giải.**
- Đồ thị là đường thẳng qua gốc tọa độ nên ô tô chuyển động thẳng đều. Tại  $t = 5\text{ h}$  thì  $d = 90\text{ km}$ :

$$v = \frac{d}{t} = \frac{90}{5} = 18\text{ km/h} = \frac{18}{3,6} = 5\text{ m/s}.$$

Đáp án: 

|   |
|---|
| 5 |
|---|

 ..... ☐

**Câu 3.** Một người đang lái xe máy với tốc độ 28,8 km/h thì nhìn thấy một cái hố trước mặt nên hãm phanh, xe chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 5 s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Gia tốc của xe là bao nhiêu  $\text{m/s}^2$ ?

Đáp án: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| − | 1 | , | 6 |
|---|---|---|---|

**Lời giải.**

$$v_0 = 28,8 \text{ km/h} = 8 \text{ m/s}; v = 0.$$

$$a = \frac{v - v_0}{\Delta t} = \frac{0 - 8}{5} = -1,6 \text{ m/s}^2.$$

Đáp án: **-1,6** ..... □

**Câu 4.** Một vật được thả rơi tự do từ độ cao 80 m so với mặt đất. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Thời gian rơi của vật là bao nhiêu giây?

Đáp án: **4** □ □ □ □

**Lời giải.**

$$h = \frac{1}{2}gt^2 \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2h}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 80}{10}} = 4 \text{ s}.$$

Đáp án: **4** ..... □

**PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)**

(Thí sinh trình bày lời giải từ câu 1 đến câu 3.)

**Câu 1.** Lúc 7 giờ, một ô tô chuyển động thẳng đều với tốc độ 40 km/h đi từ A qua B đến C. Biết  $AB = 30 \text{ km}$ ,  $BC = 70 \text{ km}$  (A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó). Chọn gốc tọa độ tại A, chiều dương từ A đến B, gốc thời gian lúc 7 giờ. Vẽ đồ thị độ dịch chuyển – thời gian ( $d - t$ ) của ô tô.

**Lời giải.**


Phương trình độ dịch chuyển:  $d = vt = 40t$  ( $d$ : km,  $t$ : h).

– Tại A:  $t = 0$ ,  $d = 0$ .

– Tại B:  $d_B = 30 \text{ km} \Rightarrow t_B = \frac{30}{40} = 0,75 \text{ h}$  (lúc 7 giờ 45 phút).

– Tại C:  $d_C = 30 + 70 = 100 \text{ km} \Rightarrow t_C = \frac{100}{40} = 2,5 \text{ h}$  (lúc 9 giờ 30 phút).


Đồ thị là đoạn thẳng đi qua  $O(0;0)$ ,  $B(0,75;30)$  và kết thúc tại  $C(2,5;100)$ :



**Câu 2.** Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều dọc theo trục  $Ox$  có đồ thị vận tốc – thời gian ( $v - t$ ) như hình bên. Tính:

a) Gia tốc của vật.

b) Quãng đường vật đi được trong 10 s đầu tiên.



**Lời giải.**

a) Từ đồ thị:  $v_0 = 2 \text{ m/s}$ , tại  $t = 10 \text{ s}$  thì  $v = 12 \text{ m/s}$ .

$$a = \frac{v - v_0}{t} = \frac{12 - 2}{10} = 1 \text{ m/s}^2.$$

b) Vật chuyển động theo một chiều ( $v > 0$ ) nên quãng đường bằng độ dịch chuyển:

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 = 2 \cdot 10 + \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 10^2 = 70 \text{ m.}$$

(Hoặc tính diện tích hình thang dưới đồ thị:  $s = \frac{(2 + 12) \cdot 10}{2} = 70 \text{ m.}$ )

**Câu 3.** Thả rơi tự do một vật từ độ cao 100 m so với mặt đất. Lấy  $g = 10 \text{ m/s}^2$ . Tính:

a) Quãng đường vật rơi được sau 3 s kể từ lúc thả.

b) Độ cao của vật so với mặt đất tại thời điểm đó.

**Lời giải.**

a)

$$s = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 3^2 = 45 \text{ m.}$$

b) Độ cao của vật so với mặt đất:  $h' = h - s = 100 - 45 = 55 \text{ m.}$

## BẢNG ĐÁP ÁN – MÃ ĐỀ 207

### Phần I.

| Câu    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| Đáp án | D | B | D | A | B | C | D | A | D | C  | A  | D  |

### Phần II.

| Câu | a) | b) | c) | d) |
|-----|----|----|----|----|
| 1   | Đ  | S  | Đ  | S  |
| 2   | S  | Đ  | S  | Đ  |

### Phần III.

| Câu    | 1    | 2 | 3    | 4 |
|--------|------|---|------|---|
| Đáp án | 10,4 | 5 | -1,6 | 4 |

———— **HẾT** ————