

**LỚP TOÁN CÔ THÚY****GV: HỒ THỊ THÚY****SĐT: 0935.322.328****HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ KHẢO  
SÁT CHẤT LƯỢNG TOÁN 12****Môn: TOÁN 12 – THPT Số 3 Bảo Thắng****Năm học 2026 – 2027 – Mã đề thi: 0104****PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn**

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi

thí sinh chỉ chọn một phương án.)

**Câu 1. [ID: TOAN12-BT3-0104-C01]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = 3(x - 1)(x - 3)$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Khoảng nghịch biến của hàm số là

**A.**  $(-\infty; 1)$ .**B.**  $(3; +\infty)$ .**C.**  $(-\infty; 3)$ .**D.**  $(1; 3)$ .**Lời giải.**Ta có  $f'(x) < 0 \iff 3(x - 1)(x - 3) < 0 \iff 1 < x < 3$ .Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng  $(1; 3)$ .Chọn đáp án **(D)** ..... □

**Câu 2. [ID: TOAN12-BT3-0104-C02]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như dưới đây:

|         |           |              |               |                    |   |
|---------|-----------|--------------|---------------|--------------------|---|
| $x$     | $-\infty$ | 0            | 4             | $+\infty$          |   |
| $f'(x)$ | +         | 0            | -             | 0                  | + |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow 7$ | $\searrow -1$ | $\nearrow +\infty$ |   |

Giá trị cực đại của hàm số là

**A.** 0.**B.** 7.**C.** 4.**D.** -1.**Lời giải.**Từ bảng biến thiên, khi qua  $x = 0$ , đạo hàm  $f'(x)$  đổi dấu từ dương sang âm nên hàm số đạt cực đại tại  $x = 0$  và giá trị cực đại là  $y_{CD} = 7$ .Chọn đáp án **(B)** ..... □

**Câu 3. [ID: TOAN12-BT3-0104-C03]** Cho hàm số  $y = \frac{3x - 2}{x + 4}$ . Phương trình tiệm cận đứng là

**A.**  $x = -4$ .**B.**  $x = 4$ .**C.**  $y = 3$ .**D.**  $y = -4$ .**Lời giải.**Ta có  $\lim_{x \rightarrow (-4)^+} \frac{3x - 2}{x + 4} = -\infty$  và  $\lim_{x \rightarrow (-4)^-} \frac{3x - 2}{x + 4} = +\infty$ . Vậy đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số là  $x = -4$ .Chọn đáp án **(A)** ..... □

**Câu 4. [ID: TOAN12-BT3-0104-C04]** Cho hàm số  $y = \frac{-2x+5}{x-1}$ . Phương trình tiệm cận ngang là

- A.  $y = 2$ . B.  $x = 1$ . C.  $y = -2$ . D.  $y = 5$ .

**Lời giải.**

Ta có  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-2x+5}{x-1} = -2$ . Do đó đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số có phương trình là  $y = -2$ .

Chọn đáp án **C** ..... □

**Câu 5. [ID: TOAN12-BT3-0104-C05]** Cho hàm số  $y = x - 1 + \frac{2}{x-2}$ . Phương trình đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là

- A.  $y = x + 1$ . B.  $y = x - 1$ . C.  $y = -x + 1$ . D.  $x = 2$ .

**Lời giải.**

Ta có  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-2} = 0$ . Vậy đường thẳng  $y = x - 1$  là đường tiệm cận xiên của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án **B** ..... □

**Câu 6. [ID: TOAN12-BT3-0104-C06]** Đồ thị hàm số  $y = -3 + \frac{5}{x+2}$  có tâm đối xứng là

- A.  $I(2; -3)$ . B.  $I(-3; 2)$ . C.  $I(-2; 3)$ . D.  $I(-2; -3)$ .

**Lời giải.**

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng  $x = -2$  và tiệm cận ngang  $y = -3$ . Giao điểm hai đường tiệm cận là tâm đối xứng của đồ thị:  $I(-2; -3)$ .

Chọn đáp án **D** ..... □

**Câu 7. [ID: TOAN12-BT3-0104-C07]** Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x+1)^2(x-2)(x-5)$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Số điểm cực trị của hàm số là

- A. 1. B. 3. C. 4. D. 2.

**Lời giải.**

Phương trình  $f'(x) = 0 \iff x = -1$  (nghiệm bội 2) hoặc  $x = 2$  (nghiệm đơn) hoặc  $x = 5$  (nghiệm đơn). Đạo hàm chỉ đổi dấu khi qua hai nghiệm đơn  $x = 2$  và  $x = 5$ . Vậy hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **D** ..... □

**Câu 8. [ID: TOAN12-BT3-0104-C08]** Cho hàm số  $y = x + 1 + \frac{3}{x-1}$ . Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- A.  $I(1; 1)$ . B.  $I(1; 2)$ . C.  $I(-1; 0)$ . D.  $I(2; 1)$ .


**Lời giải.**

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng  $x = 1$  và đường tiệm cận xiên  $y = x + 1$ . Tọa độ giao điểm hai đường tiệm cận là  $I(1; 2)$  vì  $y(1) = 1 + 1 = 2$ .

Chọn đáp án **B** ..... □

**Câu 9.**

[ID: TOAN12-BT3-0104-C09] Cho hàm số phân thức  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $ac \neq 0, ad-bc \neq 0$ ) có đồ thị như hình bên. Hàm số nào dưới đây có đồ thị như hình đã cho?



A.  $y = 1 + \frac{2}{x+1}$ .

B.  $y = 1 - \frac{2}{x+1}$ .

C.  $y = 1 + \frac{2}{x-1}$ .

D.  $y = -1 + \frac{2}{x+1}$ .

**Lời giải.**

Từ đồ thị ta thấy:

- Tiệm cận đứng  $x = -1$  (loại phương án C).
- Tiệm cận ngang  $y = 1$  (loại phương án D).
- Tại  $x = 0$ , đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ  $y > 1$ . Với hàm số  $y = 1 + \frac{2}{x+1}$ , khi  $x = 0 \Rightarrow y = 3 > 1$  (thỏa mãn).

Vậy hàm số có đồ thị như hình vẽ là  $y = 1 + \frac{2}{x+1}$ .

Chọn đáp án **(A)** ..... □

**Câu 10.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C10] Cho hàm số  $y = f(x)$  xác định trên  $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  và có đạo hàm  $f'(x) = \frac{x^2-1}{x^2}$ . Số điểm cực trị của hàm số là

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

**Lời giải.**

Tập xác định  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Ta có  $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ . Vì qua  $x = -1$  và  $x = 1$ ,  $f'(x)$  đều đổi dấu và các điểm này đều thuộc tập xác định nên hàm số có đúng 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**Câu 11.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C11] Cho hàm số  $y = f(x) = x^3 - 12x + 1$ . Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đạt cực trị tại  $x = -2$  và  $x = 2$ .

B. Hàm số không có cực trị.

C. Hàm số có một điểm cực trị.

D. Tâm đối xứng của đồ thị là  $I(1; 0)$ .

**Lời giải.**

Ta có  $f'(x) = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$ . Đạo hàm đổi dấu qua cả hai điểm này nên hàm số đạt cực trị tại  $x = -2$  và  $x = 2$ . Tâm đối xứng của đồ thị là điểm uốn  $I(0; 1)$ .

Chọn đáp án **(A)** ..... □

**Câu 12.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C12] Cho hàm số bậc ba  $y = f(x)$  có bảng biến thiên như dưới đây:

|         |           |            |     |            |      |            |           |
|---------|-----------|------------|-----|------------|------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$       | $1$ | $+\infty$  |      |            |           |
| $f'(x)$ |           | $+$        | $0$ | $-$        | $0$  | $+$        |           |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow$ | $2$ | $\searrow$ | $-2$ | $\nearrow$ | $+\infty$ |

Hàm số nào dưới đây có bảng biến thiên đã cho?

A.  $y = -x^3 + 3x$ .

B.  $y = x^3 + 3x$ .

C.  $y = x^3 - 3x$ .

D.  $y = x^3 - 3x + 1$ .

**Lời giải.**

Từ bảng biến thiên, khi  $x \rightarrow +\infty$  thì  $y \rightarrow +\infty$  nên hệ số bậc ba  $a > 0$  (loại A). Hàm số có cực đại  $y_{CD} = 2$  tại  $x = -1$  và cực tiểu  $y_{CT} = -2$  tại  $x = 1$ . Thử hàm số  $y = x^3 - 3x$  ta có  $y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$ ;  $y(-1) = 2$ ,  $y(1) = -2$ , hoàn toàn khớp với bảng biến thiên.

Chọn đáp án **(C)** ..... □

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai**

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.)

**Câu 1. [ID: TOAN12-BT3-0104-C13]** Cho hàm số  $y = \frac{(x+1)^2}{x+2}$ . Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Đạo hàm là  $y' = \frac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$   
 b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng  $(-3; -2)$  và  $(-2; -1)$   
 c) Giá trị cực đại của hàm số bằng 0  
 d) Bảng biến thiên dưới đây là bảng biến thiên của hàm số đã cho.

|         |           |            |      |            |           |
|---------|-----------|------------|------|------------|-----------|
| $x$     | $-\infty$ | $-3$       | $-2$ | $-1$       | $+\infty$ |
| $f'(x)$ |           | $+$        | $0$  | $-$        | $+$       |
| $f(x)$  | $-\infty$ | $\nearrow$ | $-4$ | $\searrow$ | $+\infty$ |

**Lời giải.**

Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$ .

- a) Ta có  $y = x + \frac{1}{x+2} \Rightarrow y' = \frac{2(x+1)(x+2) - (x+1)^2}{(x+2)^2} = \frac{(x+3)(x+1)}{(x+2)^2}$ . Do đó a) đúng.
- b)  $y' = 0 \Leftrightarrow x = -3$  hoặc  $x = -1$ . Với  $x \in (-3; -2)$  và  $x \in (-2; -1)$  thì  $y' < 0$ , nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng  $(-3; -2)$  và  $(-2; -1)$ . Do đó b) đúng.
- c) Tại  $x = -3$ , hàm số đạt cực đại với giá trị cực đại  $y_{CD} = y(-3) = \frac{(-3+1)^2}{-3+2} = -4 \neq 0$ . Do đó c) sai.
- d) Bảng biến thiên đã cho thể hiện đúng các giới hạn, sự đổi dấu của đạo hàm và các giá trị cực trị. Do đó d) đúng.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c sai ☐ d đúng ..... ☐

**Câu 2. [ID: TOAN12-BT3-0104-C14]** Cho hàm số  $y = f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x - 2$ . Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:

- a) Tập xác định là  $\mathbb{R}$ .  
 b) Hàm số đồng biến trên khoảng  $(1; 3)$ .  
 c) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng  $-2$ .  
 d) Điểm  $I(2; 1)$  là tâm đối xứng của đồ thị.

**Lời giải.**


- a) Hàm đa thức bậc ba có tập xác định  $D = \mathbb{R}$ . Do đó a) đúng.
- b) Ta có  $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x-1)(x-3)$ . Trên khoảng  $(1; 3)$ ,  $f'(x) < 0$  nên hàm số nghịch biến trên khoảng  $(1; 3)$ . Do đó b) sai.
- c) Qua  $x = 3$ ,  $f'(x)$  đổi dấu từ âm sang dương nên hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 3$ ; giá trị cực tiểu  $y_{CT} = f(3) = 3^3 - 6 \cdot 3^2 + 9 \cdot 3 - 2 = -2$ . Do đó c) đúng.
- d) Điểm uốn của đồ thị hàm bậc ba là tâm đối xứng:  $f''(x) = 6x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = 0$ . Tâm đối xứng là  $I(2; 0)$ , không phải  $I(2; 1)$ . Do đó d) sai.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c đúng ☐ d sai ..... ☐

**Câu 3.**

[ID: TOAN12-BT3-0104-C15] Cho hàm số phân thức  $y = \frac{ax+b}{cx+d}$  ( $ac \neq 0, ad-bc \neq 0$ )

0) có đồ thị như hình bên. Xét tính đúng, sai của các phát biểu sau:



- a) Đồ thị có tiệm cận đứng  $x = -2$ .
- b) Đồ thị có tiệm cận ngang  $y = 1$ .
- c) Tâm đối xứng của đồ thị là  $I(-2; -1)$ .
- d) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định.

**Lời giải.**

Dựa vào đồ thị hàm số:

- a) Đường tiệm cận đứng là  $x = -2$ . Do đó a) đúng.
- b) Đường tiệm cận ngang là  $y = -1$ , không phải  $y = 1$ . Do đó b) sai.
- c) Giao điểm của hai đường tiệm cận là  $I(-2; -1)$ , đây chính là tâm đối xứng của đồ thị. Do đó c) đúng.
- d) Trên mỗi khoảng xác định  $(-\infty; -2)$  và  $(-2; +\infty)$ , các nhánh đồ thị đi xuống từ trái sang phải nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. Do đó d) sai.

Chọn đáp án 


|        |       |        |       |
|--------|-------|--------|-------|
| a đúng | b sai | c đúng | d sai |
|--------|-------|--------|-------|

 ..... □

**Câu 4.**

[ID: TOAN12-BT3-0104-C16] Cho hàm số  $y = \frac{-2x+1}{x+1}$ . Xét tính đúng, sai của

các phát biểu sau:



- a) Đạo hàm là  $y' = -\frac{3}{(x+1)^2}$ .
- b) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.
- c) Đồ thị có tiệm cận ngang  $y = 2$ .
- d) Hình bên là đồ thị của hàm số đã cho.

**Lời giải.**

Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$ .

- a) Ta có  $y' = \frac{-2(1) - 1(1)}{(x+1)^2} = -\frac{3}{(x+1)^2}$ . Do đó a) đúng.
- b) Vì  $y' < 0, \forall x \neq -1$  nên hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định  $(-\infty; -1)$  và  $(-1; +\infty)$ . Do đó b) đúng.
- c) Ta có  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -2$ , do đó tiệm cận ngang của đồ thị là  $y = -2$ , không phải  $y = 2$ . Do đó c) sai.
- d) Đồ thị có tiệm cận đứng  $x = -1$ , tiệm cận ngang  $y = -2$  và đồ thị nghịch biến trên từng khoảng xác định, hoàn toàn trùng khớp với hình vẽ. Do đó d) đúng.

Chọn đáp án 

|        |        |       |        |
|--------|--------|-------|--------|
| a đúng | b đúng | c sai | d đúng |
|--------|--------|-------|--------|

 ..... □

**PHẦN III. Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn***(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.)*

**Câu 1.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C17] Cho hàm số  $y = f(x) = -x^3 + 3x + 1$ . Tính tổng hai giá trị cực trị của hàm số.

Đáp án: 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 2 |  |  |  |
|---|--|--|--|

**Lời giải.**

Ta có  $f'(x) = -3x^2 + 3 = -3(x^2 - 1) = 0 \iff x = \pm 1$ .

Giá trị cực đại:  $y_{\text{CD}} = f(1) = -(1)^3 + 3(1) + 1 = 3$ .

Giá trị cực tiểu:  $y_{\text{CT}} = f(-1) = -(-1)^3 + 3(-1) + 1 = -1$ .

Tổng hai giá trị cực trị là:  $y_{\text{CD}} + y_{\text{CT}} = 3 + (-1) = 2$ .

Đáp án: 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 2 |  |  |  |
|---|--|--|--|

 □

**Câu 2.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C18] Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2}$ . Gọi  $I(a; b)$  là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị. Tính  $a + b$ .

Đáp án: 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5 |  |  |  |
|---|--|--|--|

**Lời giải.**

Ta thực hiện phép chia:  $y = \frac{x^2 - x + 2}{x - 2} = x + 1 + \frac{4}{x - 2}$ .

Đường tiệm cận đứng là  $x = 2$ .

Đường tiệm cận xiên là  $y = x + 1$ .

Tọa độ giao điểm  $I(a; b)$  là nghiệm của hệ  $\begin{cases} x = 2 \\ y = x + 1 \end{cases} \implies \begin{cases} a = 2 \\ b = 3 \end{cases} \implies I(2; 3)$ .

Vậy  $a + b = 2 + 3 = 5$ .

Đáp án: 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 5 |  |  |  |
|---|--|--|--|

 □

**Câu 3.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C19] Cho hàm số  $y = f(x)$  có đạo hàm  $f'(x) = (x + 2)^2(x - 1)(x - 3)$  với mọi  $x \in \mathbb{R}$ . Tính tổng các giá trị của  $x$  tại đó hàm số đạt cực trị.

Đáp án: 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 4 |  |  |  |
|---|--|--|--|

**Lời giải.**

Phương trình  $f'(x) = 0 \iff x = -2$  (nghiệm kép) hoặc  $x = 1$  (nghiệm đơn) hoặc  $x = 3$  (nghiệm đơn).

Vì  $f'(x)$  chỉ đổi dấu khi qua  $x = 1$  và  $x = 3$  nên hàm số chỉ đạt cực trị tại hai điểm  $x = 1$  và  $x = 3$ .

Tổng các giá trị của  $x$  tại đó hàm số đạt cực trị là:  $1 + 3 = 4$ .

Đáp án: 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 4 |  |  |  |
|---|--|--|--|

 □

**Câu 4.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C20] Cho hàm số  $y = \frac{x^2 - 2x + 5}{x - 1}$ . Gọi  $A, B$  là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. Tính độ dài đoạn thẳng  $AB$  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Đáp án: 

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 8 | , | 9 | 4 |
|---|---|---|---|

**Lời giải.**

Ta có  $y = x - 1 + \frac{4}{x - 1} \Rightarrow y' = 1 - \frac{4}{(x - 1)^2} = \frac{(x - 1)^2 - 4}{(x - 1)^2} = \frac{(x + 1)(x - 3)}{(x - 1)^2}$ .

$y' = 0 \Leftrightarrow x = -1$  hoặc  $x = 3$ .

Với  $x = -1 \Rightarrow y = -4 \Rightarrow A(-1; -4)$ .

Với  $x = 3 \Rightarrow y = 4 \Rightarrow B(3; 4)$ .

Độ dài đoạn thẳng  $AB$  là:

$$AB = \sqrt{(3 - (-1))^2 + (4 - (-4))^2} = \sqrt{4^2 + 8^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \approx 8,94.$$

Đáp án: 

|      |
|------|
| 8,94 |
|------|

 ..... □

**Câu 5.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C21] Cho hàm số  $y = f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x}$ . Tính hiệu giữa giá trị cực tiểu và giá trị cực đại của hàm số.

Đáp án: 

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 8 |  |  |  |
|---|--|--|--|

**Lời giải.**

Tập xác định:  $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$ . Ta có  $f(x) = x - 1 + \frac{4}{x} \Rightarrow f'(x) = 1 - \frac{4}{x^2} = \frac{x^2 - 4}{x^2}$ .

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 2$ .

Hàm số đạt cực đại tại  $x = -2$  với  $y_{CD} = f(-2) = -2 - 1 + \frac{4}{-2} = -5$ .

Hàm số đạt cực tiểu tại  $x = 2$  với  $y_{CT} = f(2) = 2 - 1 + \frac{4}{2} = 3$ .

Hiệu giữa giá trị cực tiểu và giá trị cực đại là:  $y_{CT} - y_{CD} = 3 - (-5) = 8$ .

Đáp án: 

|   |
|---|
| 8 |
|---|

 ..... □

**Câu 6.** [ID: TOAN12-BT3-0104-C22] Cho hàm số  $y = \frac{ax + b}{cx + d}$  ( $ac \neq 0, ad - bc \neq 0$ ) có bảng biến thiên như dưới đây:

|         |                          |      |                          |
|---------|--------------------------|------|--------------------------|
| $x$     | $-\infty$                | $-2$ | $+\infty$                |
| $f'(x)$ | $-$                      |      | $-$                      |
| $f(x)$  | $-1 \rightarrow -\infty$ |      | $+\infty \rightarrow -1$ |

Gọi  $I(u; v)$  là tâm đối xứng của đồ thị hàm số. Tính  $u + v$ .

Đáp án: 

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| - | 3 |  |  |
|---|---|--|--|

**Lời giải.**

Từ bảng biến thiên của hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất:

- Tiệm cận đứng là  $x = -2$ .
- Tiệm cận ngang là  $y = -1$ .

Tâm đối xứng của đồ thị là giao điểm hai tiệm cận:  $I(-2; -1)$ .

Suy ra  $u = -2, v = -1 \Rightarrow u + v = -2 + (-1) = -3$ .

Đáp án: 

|    |
|----|
| -3 |
|----|

 ..... □

———— HẾT ————