
A
14,845 myeloid cells, gated annotation
Neutrophil
cDC2
Classical monocyte
Macrophage
pDC
Low quality
UMAP 2
UMAP 1
B
State markers (red: at ambient level)
CD14 1.44 1.83 0.70 0.04 0.28 0.14
FCGR3A 1.29 1.81 0.58 0.06 0.00 0.13
C1QA 2.30 1.93 0.93 0.18 0.22 0.22
CD1C 0.05 0.01 0.79 0.17 0.00 0.01
CLEC10A 0.27 0.15 1.02 0.00 0.00 0.03
FCER1A 0.16 0.02 1.10 0.13 0.00 0.00
LILRA4 0.01 0.01 0.01 0.21 0.00 0.00
CLEC9A 0.05 0.01 0.09 0.00 0.00 0.00
XCR1 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.02
TPSAB1 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.04
Macrophage
Classical monocyte
cDC2
pDC
Neutrophil
Low quality
Mean log-normalised
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
C
cDC2 abundance (d = 0.12, p = 0.84)
cDC2 per 1,000 tissue cells
Failed
Matured
D
Dilution within myeloid (d = -1.06, p = 0.12)
cDC2, % of myeloid cells
Failed
Matured
E
Myeloid expansion (d = 1.37, p = 0.04)
Myeloid cells per 1,000
Failed
Matured