

便秘综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

《中国消化健康白皮书 2024》：我国成人慢性便秘患病率为 4%-10%，60 岁以上人群高达 22%。按 14 亿人口推算，慢性患者约 5600 万至 1.4 亿。约 5% 的慢性便秘患者伴随肠道器质性病变，其中渐进性便秘与肠癌风险直接相关。

全国每年因便秘导致的医疗支出超 200 亿元，而误工损失更是高达 430 亿元。

便秘不是小事，别让便秘毁了健康。长期便秘严重危害人体健康。

腹压增高，心脏负担加重：当用力排便时，会不自觉地屏气用力，导致腹压急剧升高。升高的压力也会传导至心脏，增加心肌耗氧量。这对于心血管疾病患者而言，无疑是“雪上加霜”，极有可能诱发心绞痛、心律失常，甚至心肌梗死。

血压波动，血管承受压力：排便困难时，血管压力增大，血流速度加快，血压随之升高。对于高血压患者来说，这种血压波动尤为危险，可能引发脑出血等严重疾病。

毒素积累，炎症反应加剧：长期便秘会导致肠道内有害物质堆积，这些毒素被肠道吸收后进入血液，可能引发全身性炎症反应，损伤血管内皮，促进动脉粥样硬化的形成，最终增加心血管疾病的风险。

一、普筛

1.1 发病原因

膳食纤维摄入严重不足：精加工食品消费量增 30%，人均膳食纤维摄入不足推荐量 50%，导致食物消化后几乎没有残渣，结肠内不能形成足够体积的粪便，就难以每天产生便意。

运动不足：久坐、缺少活动，会导致结肠蠕动减少，影响排便。另外，如果水分补充不足，肠道会更多吸收粪便中的水分，出现大便干燥问题。

疾病影响：肠道疾病（结直肠手术后，肛裂，肛瘘等）、内分泌和代谢性疾病（糖尿病、甲状腺功能减退、甲状腺功能亢进、慢性肾病等），肠道菌群紊乱，影响肠道蠕动和分泌功能，导致便秘。

药物因素：抗生素，导致肠道菌群失调，破坏肠道屏障，影响肠道的蠕动能力；抗过敏药物，抑制胃肠道以及泌尿道平滑肌的收缩，从而导致便秘的情况出现；泻药虽然能治疗便秘，帮助排便，但如果长期使用，肠道会形成对泻药的依赖，自主运动减弱，肠神经系统受到损害，结果发生便秘。

精神压力：抑郁、压力大、焦虑、精神衰弱等，直肠敏感性降低，便意降低，久而久之，就会造成便秘。

老龄化加剧：60 岁以上人群便秘率每 10 年增长 5%-8%（肠道动力下降）。

1.2 高危人群

妊娠期妇女

吸烟者

爱吃肉及辛辣厚味者

大病、久病、长期卧床、老年人手术后及低血钾症患者

紧张或情绪抑郁者

贫血、大失血、妇女产后

中青年女性，伴内分泌失调

服用抗精神病药物的患者

运动和体力活动过少者

1.3 临床表现

排便频率减少：每周排便次数少于 3 次，或连续数天无便意。

粪便性状改变：大便干结、硬结，呈羊粪状或小颗粒状，表面可能附着黏液或鲜血。

排便困难：排便时需用力或过度用力，排便时间延长（超过 15 分钟），甚至需用手辅助排便。

排便不尽感：便后仍有肛门坠胀或未排净的感觉。

腹胀腹痛：肠道内积聚气体，导致腹部胀满、疼痛，下午可能加重。

伴随症状：可能出现食欲不振、口臭、皮肤问题（如痤疮、色斑）、疲劳感，严重时可能诱发肛裂、痔疮等肛肠疾病。

二、试用

畅立清：1-2 袋/次，当天会有排便反应。

三、诊断

表 1-1 罗马III标准中功能性便秘的诊断标准

疾病名称	诊断标准
功能性便秘	1. 必须包括下列 2 项或 2 项以上：①至少 25%的排便感到费力；②至少 25%的排便为干球粪或硬粪；③至少 25%的排便有不尽感；④至少 25%的排便有肛门直肠梗阻感和（或）堵塞感；⑤至少 25%的排便需手法辅助（如用手指协助排便、盆底支持）；⑥每周排便少于 3 次 2. 不用泻药时很少出现稀便

*诊断前症状出现至少 6 个月，且近 3 个月症状符合以上诊断标准



四、干預治療

名称	作用机理
清畅/畅快	调节肠道菌群，修复肠屏障，增加肠动力，促进肠道蠕动。
英宝畅（儿童）	
畅立清	吸水膨胀，刺激肠道蠕动。
	高浓度糖浆造成肠道内外渗透压差，促进肠道蠕动排便。

分类	干预方案
成人	畅立清：1-2 袋/次/天，连续使用 7 天，直接使用（不要兑水）。 清畅/畅快：1-2 袋/次，2 次/天，均餐前使用，温水冲饮。
儿童	英宝畅：根据年龄使用。 3 岁以下：0.5 袋-1 袋/次，1-2 次/天，温水冲饮。 3-6 岁：1-2 袋/次，1-2 次/天，温水冲饮。 6 岁以上：2-4 袋/次，1-2 次/天，温水冲饮。
备注：对于初次使用，如肠道反应(腹胀、腹痛等)较为猛烈，可遵循少量多次的原则，逐渐加量，该过程一般持续 3-5 天。 部分人群在干预过程中会出现刚开始效果较好，然后效果较差甚至便秘更严重的现象，这属于正常现象（赫氏消亡反应），该过程一般持续 7 天左右。	

其他干预方式

饮食干预：增加膳食纤维摄入和充足水量摄入（约 1500~2000 毫升）。

适量运动：促进肠道蠕动。

建立良好的排便习惯：规律的排便习惯有助于培养身体的生物钟，促进肠道健康。建议每天在固定的时间上厕所。

调整精神状态：保持乐观情绪可通过脑肠轴作用影响肠道功能，促进排便。

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气	氢气具有抗炎和抗氧化的作用，有利于肠道黏膜的修复，维持肠屏障功能，促进排便。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

营养干预前一便秘症状评估表

*姓名：_____ *性别：男 ☐ 女 ☐ *出生日期：_____年____月____日

*联系电话：_____ 地址：_____

*发病日期：_____年____月____日 *评估日期：_____年____月____日 评估人：_____（印章）

序号	*排便困难、过度用力排便	*粪便性状	*排便时间 min/次	*下坠、不尽、胀感	*频率 d/次	*腹痛
1	无 ☐	坚果状 ☐	<10 ☐	无 ☐	1~2 ☐	无 ☐
2	偶尔 ☐	干硬状 ☐	10~15 ☐	偶尔 ☐	3 ☐	偶尔 ☐
3	时有 ☐	有褶皱 ☐	15~25 ☐	时有 ☐	4~5 ☐	时有 ☐
4	经常 ☐	香蕉状 ☐	>25 ☐	经常 ☐	>5 ☐	经常 ☐

（此表标*为必填选项，☐如有对应情况请打√）

注：坚果状——硬邦邦的小块；干硬状——比较硬的多个小块连在一起；有褶皱——表面布满裂痕；香蕉状——比较软，表面光滑

*服用方法：益生元名称_____；早 ☐，_____克；中 ☐，_____克；晚 ☐，_____克

*服用周期：1 周 ☐ 2~4 周 ☐ >1 个月 ☐

营养干预后一便秘症状评估表

*评估日期：_____年____月____日 评估人：_____（印章）

序号	*排便困难、过度用力排便	*粪便性状	*排便时间 min/次	*下坠、不尽、胀感	*频率 d/次	*腹痛
1	无 ☐	坚果状 ☐	<10 ☐	无 ☐	1~2 ☐	无 ☐
2	偶尔 ☐	干硬状 ☐	10~15 ☐	偶尔 ☐	3 ☐	偶尔 ☐
3	时有 ☐	有褶皱 ☐	15~25 ☐	时有 ☐	4~5 ☐	时有 ☐
4	经常 ☐	香蕉状 ☐	>25 ☐	经常 ☐	>5 ☐	经常 ☐