

心脑血管疾病综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

心脑血管疾病是我国居民死亡的首要原因，每年有大量患者因该病失去生命。急性发作如急性心肌梗死、急性脑血栓等，往往危及生命，发病突然，来势凶猛，若抢救不及时，后果严重。

《中国心血管健康与疾病报告2023》公布。在我国城乡居民疾病死亡构成比中，心血管病占首位，2021年分别占农村、城市死因的48.98%和47.35%；每5例死亡中就有2例死于心血管病。

心脑血管疾病对身体机能有多方面的危害性。

心脏功能受损：心肌缺血、心肌梗死或心律失常等会使心脏射血功能障碍，无法为身体各脏器组织提供足够血液，导致缺血缺氧和功能下降，严重时可致猝死。

脑血管功能异常：脑出血、脑梗死等脑血管疾病会严重影响脑功能，导致死亡率高。即使患者保命，也可能出现偏瘫、感觉异常、视觉异常等症状，严重影响生命质量。

一、引流普筛

1.1 发病原因

肠道菌群失调导致“肠漏”，炎症因子进入血液循环，激活免疫系统，引发全身性炎症反应。炎症反应会损伤血管内皮细胞，使血管壁的完整性遭到破坏，诱发心脑血管疾病。

1.2 高危人群

五高人群（高血糖、高血压、高血脂、高体重、高尿酸）；

既往患有心脑血管疾病人群；

40岁及以上人群，尤其是高龄老人；

长期吸烟、饮酒、失眠的人群；

长期饮食结构不合理，并缺乏运动；

长时间久坐或久站人群等。

1.3临床表现

眩晕，一般可以出现突然严重的头晕或者眩晕，有时还会伴有恶心、耳鸣等等。

短时间出现语言障碍或肢体的无力。

突然发生的剧烈头痛。

半身的麻木症状。

突然出现记忆力障碍。

眼前一过性黑蒙。

白天患者出现睡眠增多或者嗜睡的症状。

喝水或者进食的过程中出现莫名的呛咳。

不分时间、地点情不自禁的哈气连天。

舌根发硬、流口水、说话不清楚，甚至会出现吞咽困难等等。

1.4引流技术

氢气：氢气有利于清除体内的氧自由基，抗氧化应激作用，抑制炎症反应，对心脑血管有保护性作用。

二、试用

早餐前 2 袋清畅/畅快，通过三天的试用，改善肠道菌群，有利肠屏障修复，抑制炎症反应。肠道反应：腹胀、腹痛、排气增多。由于益生元在体内被肠道菌群发酵过程产生气体，气体外排就形成排气

增多的现象；如果肠道不通，气体容易停留在腹部，就会有腹胀、腹痛的感觉。

症状	程度	危害性
试用产品后，一般排气现象增多，其他体感变化较为轻微，三天的试用期后，粪便接近五星黄金便（肠道健康的标准）。	轻度失调	影响营养物质吸收 增加细菌病毒感染风险
试用产品后，可能会有轻微腹痛、腹胀现象。三天的试用期后，排便可能较为轻松一些。	中度失调	导致消化功能障碍 提高慢性患病概率。
试用产品后，腹痛、腹胀现象较多较严重，肠漏、肠道炎症较为严重，益生元被发酵发挥作用时体观感受反应较为剧烈。三天的试用期后，体感可能还是很难受，排便可能比较顺畅。（三天试用时间较短，难以根本改变。停用后，可能会迅速恢复原状。）	重度失调	导致免疫障碍 引发全身炎症，尤其是肝肾损伤。

三、诊断

心脑血管疾病一般不是单独存在的，由其他慢性病的长期影响对血管造成损伤导致病变。

3.1 高体重

高体重是心脑血管疾病的独立危险因素，长期的肥胖导致体内炎症因子增多，损伤血管内壁。

分类	标准
轻度	BMI: 24~27.9kg/m ²
重度	BMI>28kg/m ²

3.2 高血压

高血压是心血管疾病的独立危险因素，长期的血压过高会引起血管损伤，从而引发心血管病变。

分类	标准
轻度	收缩压（140-159mmHg）和/或舒张压（90-99mmHg）
中度	收缩压（160-179mmHg）和/或舒张压（100-109mmHg）
重度	收缩压（ ≥ 180 mmHg）和/或舒张压（ ≥ 110 mmHg）

3.3 高血脂

血脂异常是心血管疾病的重要危险因素。

分类	标准（和/或）	
	总胆固醇（TC）	甘油三酯（TG）
轻度	5.2~6.2mmol/L	1.70~2.3mmol/L
重度	≥ 6.2 mmol/L	≥ 2.3 mmol/L

3.4 高血糖

糖尿病是心血管疾病的独立危险因素，长期的血糖过高会引起身体器官渐进性损伤，从而引发心血管病变。

分类	标准（和/或）	
	空腹血糖	餐后 2h 血糖
轻度	6.1~7.0mmol/L	7.8~11.1mmol/L
重度	≥ 7.0 mmol/L	≥ 11.1 mmol/L

四、干预和治疗

总体目标：

医学营养治疗（MNT）是心血管疾病综合防治的重要措施之一。

营养治疗的目标是控制血脂、血压、血糖和体重，降低心血管疾病危险因素的同时，增加保护因素。

通过提供医学营养治疗对患者的预后有着积极的影响，对减少再入院和住院天数、提高对限制钠及液体摄入的依从性、提高生活质量等心衰患者的治疗目标具有重要作用。

名称	干预机制
精华素/纽畅	调节肠道菌群，精准增殖丁酸菌，修复肠黏膜损伤，促进肠促胰素分泌，修复胰腺功能，降低餐后血糖，调控血糖血脂。
纽畅 B	发挥抗氧化应激作用，提高细胞活性干预 DNA 甲基化，调控表观遗传修饰作用，影响体内激素平衡及糖脂代谢能力。
纽畅伴侣 (高蛋白)	高蛋白干预有利于控制体重，同时可改善糖尿病患者糖脂代谢障碍的程度，从而改善血糖水平。
纽畅伴侣 (高纤维)	高膳食纤维控制能量摄入，有利于体重管理。
安欣畅	良好的睡眠，有利于身体的放松，稳定血压、减轻心脏负担、改善心脏功能、促进血管健康等。
槲皮丹-二 氢槲皮素复 合制剂	清除体内自由基，提高机体的抗氧化能力，抑制氧化应激反应，保护血管内皮细胞。
心脑血管干	能降低血液黏稠度，顺畅进入微血管，溶解微血管内的

预产品	微栓，软化血管恢复血管弹性，解除微血管堵塞，有助于预防心脑血管疾病并发症。
鱼油	富含不饱和脂肪酸，有利于调节血脂，清理血栓，防止血液凝固，预防脑血栓、脑溢血及中风。

分类		干预方案
BMI	轻度	精华素/纽畅：早晚餐前 1 袋 纽畅伴侣：高纤维晚餐前 1 袋 心脑血管干预产品：午餐前 1 袋 鱼油：2 次/天，每次 2 粒，随餐使用
	重度	精华素/纽畅：早午晚餐前各 1 袋 纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋，高纤维晚餐前 1 袋 心脑血管干预产品：午餐前 1 袋 鱼油：2 次/天，每次 3 粒，随餐使用
合并高血压	轻度	心脑血管干预产品：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：晚餐前 1 袋 葛洋子袋泡茶：茶饮 鱼油：2 次/天，每次 2 粒，随餐使用
	中度	心脑血管干预产品：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午晚餐前 1 袋 安欣畅：睡觉前 1 小时 1 袋 鱼油：3 次/天，每次 2 粒，随餐使用 葛洋子袋泡茶：茶饮
	重度	心脑血管干预产品：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午晚餐前 1 袋 槲皮丹：早餐后 1 袋 安欣畅：睡觉前 1 小时 1 袋

		鱼油：3 次/天，每次 3 粒，随餐使用 葛洋子袋泡茶：茶饮
合并血脂异常	轻度	心脑血管干预产品：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋 鱼油：2 次/天，每次 2 粒，随餐使用
	重度	心脑血管干预产品：早餐前 1 袋 槲皮丹：早餐后 1 袋 精华素/纽畅：午晚餐前各 1 袋 纽畅 B：晚餐后 1 袋 鱼油：3 次/天，每次 3 粒，随餐使用
合并高血糖	轻度	心脑血管干预产品：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午晚餐前各 1 袋 槲皮丹：早餐后 1 袋 鱼油：2 次/天，每次 2 粒，随餐使用
	重度	心脑血管干预产品：早餐前 1 袋 精华素/纽畅：午餐前 1 袋 纽畅 B：晚餐前 1 袋 槲皮丹：早餐后 1 袋 安欣畅：睡觉前 1 小时 1 袋 纽畅伴侣：高蛋白早餐前 1 袋，高纤维晚餐前 1 袋 鱼油：3 次/天，每次 3 粒，随餐使用
注：可多吃抗氧化性营养素，如维生素 C、辅酶 Q10、维生素 E、多酚类化合物等。		

饮食干预

食物多样化，粗细搭配，平衡膳食

能量摄入平衡

低脂肪、低饱和脂肪膳食

足量摄入膳食纤维补充

足量摄入新鲜蔬菜和水果等

增加身体活动等。

五、康复管理

名称	干预机制
吸氢气	氢气有利于清除体内的氧自由基，抗氧化应激作用，抑制炎症反应，有利于减缓血管内皮细胞损伤。
石墨烯	可使血管扩张，促进血液循环，强化各组织之间的新陈代谢，增加组织的再生能力，提高机体的免疫能力，对心脑血管疾病的预防和康复有积极意义。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

心脑血管非药物干预案例记录表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	出生日期	年 月
	身高	cm	体重	kg	BMI	kg/m ²
	电话		地址			
诊疗方案	干预方案	1、_____ 2、_____				开始时间：
		3、_____ 4、_____				调理时长：
	其他建议					

		干预前	__月__日	__月__日
胃肠道情况	好 10 分 偶尔不适 8 分 经常不适 6 分			
四肢麻木	好 10 分 偶尔麻木 8 分 经常麻木 6 分			
胸闷胸痛	没有 10 分 偶尔不适 8 分 经常不适 6 分			
睡眠情况	好 10 分 偶尔失眠 8 分 经常失眠 6 分			
视力问题	好 10 分 轻微模糊 8 分 非常模糊 6 分			
疲劳乏力	好 10 分 轻微乏力 8 分 严重乏力 6 分			
语言障碍	好 10 分 轻微口齿不清 8 分 严重口齿不清 6 分			
意识障碍	好 10 分 轻微糊涂 8 分 严重糊涂 6 分			
记忆力	好 10 分 偶尔忘记 8 分 经常忘记 6 分			
呼吸困难	没有 10 分 偶尔不适 8 分 经常不适 6 分			

检测项目	干预前	月 日	月 日	检测项目	干预前	月 日	月 日
糖化血红蛋白				总胆固醇			
空腹血糖				甘油三酯			
餐后 2h 血糖				BMI			
血压值				尿酸			