


眼部护理综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

视力损伤不仅影响日常活动，还会增加跌倒、痴呆等多种疾病风险，严重者给社会和家庭照护带来沉重负担。国际防盲协会报告全球有 11 亿人存在视力问题，其中 2.95 亿为中重度视力障碍、超过 4300 万人失明。眼部亚健康问题同时也对老年群体造成了极大的困扰，调查显示，与年龄性相关性黄斑变性(AMD)是全球 50 岁以上成年人首要致盲疾病之一，这类病在我国患病人数超过 3000 万，并且以每年 30 万人次的速度增加。



一、引流普筛

1.1 发病原因

眼部疾病的发病原因复杂多样，主要包括以下几类：

先天性因素：家族遗传、自身基因突变等

外界刺激：

物理性刺激：风沙、烟尘、紫外线等长期刺激，可能损伤眼表组织，引发炎症或病变。

化学性损伤：有毒气体、酸碱物质或药物接触眼部，可能灼伤眼表，导致化学性眼外伤。

隐形眼镜佩戴不当：长期佩戴不合适的隐形眼镜或护理不当，可能引发角膜感染、干眼症等。

病原体感染：

原发性感染：细菌（如肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌）、病毒（如腺病毒、单纯疱疹病毒）、衣原体等感染，可引起结膜炎、角膜炎、睑腺炎等。

继发性感染：临近部位的病原体蔓延，或体内感染源经血流传播至眼部，引发眼内炎等严重感染。

慢性损伤或细胞老化：年龄增长、慢性疾病影响、自身免疫病等

不良生活习惯：过度用眼、不良用眼姿势、熬夜与缺乏运动、饮食不均衡。

环境因素：空气污染、紫外线辐射、干燥环境等。

1.2 高危人群

有家族病史者：青光眼、视网膜病变等疾病具有遗传倾向，若家族中有相关病史，患病风险显著增加。

高度近视或远视人群：眼球结构改变可能导致眼压升高或视网膜变薄，增加青光眼、视网膜脱离等疾病的风险。

慢性病患者：糖尿病、高血压、心血管疾病等会影响眼部血管健康，易引发糖尿病视网膜病变、高血压性视网膜病变等。

长期用眼过度者：长时间使用电子设备、熬夜、长期戴隐形眼镜等不良习惯，可能导致眼压升高、干眼症或角膜损伤。

老年人：随着年龄增长，晶状体混浊（白内障）、黄斑变性、青光眼等疾病的发病风险增加。

长期使用特定药物者：长期使用糖皮质激素、抗肿瘤药物等可能诱发眼压升高或眼底病变。

不良生活习惯者：吸烟、酗酒、长期便秘等可能影响眼部血液循环，增加眼部疾病风险。

1.3 临床表现

视力模糊

畏光

眼红、眼痛

多泪、分泌物增多

眼涩、灼烧

辨色能力下降

1.4 引流技术

石墨烯眼罩：基于石墨烯的红外作用原理，眼部细胞和石墨烯释放的远红外线发生“共振”，视网膜中央血管系统与睫状肌肉管系统温度升高，血液循环加速，充足眼部细胞供氧，增强视神经、巩膜、睫状体、脉络膜及角膜的活性，增强眼睛的自我调节能力。

二、试服

护眼产品连续使用 7 天，清除自由基，减少氧化损伤，增强眼部

微循环，促进血液供应，缓解长时间用眼导致的干涩、酸胀等不适。

三、诊断

鹰瞳眼底照相技术（黄斑视力损伤、视网膜年龄风险指数）结合病史采集进行初步诊断。

眼科检测确诊。

四、综合干预

名称	作用机理
清畅/畅快	调节肠道菌群，修复肠屏障，一方面促进护眼营养物质吸收；另一方面减少有毒物质进入血液循环系统。
纽畅 B	降低氧化应激反应，减少细胞损伤，提高机体自我修复能力。
护眼产品	清除自由基，减少氧化损伤，增强眼部微循环，促进血液供应，缓解长时间用眼导致的干涩、酸胀等不适。

名称	干预方案
清畅/畅快	早餐前 1 袋
护眼产品	午餐前 1 袋
纽畅 B	晚餐前 1 袋

五、康复管理

名称	作用机理
氢气	氢气可通过降低氧化应激反应，稳定泪膜，增加泪液分泌量和泪膜破裂时间，改善干眼症状。临床研究显示，饮用

	富氢水或使用富氢生理盐水点眼，能显著缓解干眼患者的不适，提高泪膜稳定性。
石墨烯	促进血液循环加速，充足眼部细胞供氧，增强视神经、巩膜、睫状体、脉络膜及角膜的活性，增强眼睛的自我调节能力。

六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

护眼干预案例记录表

基本信息	姓名		性别	男 ☐ 女 ☐	出生日期	年 月
	身高	cm	体重	kg	BMI	kg/m ²
	电话		地址			
诊疗方案	干预方案	1、_____ 2、_____				开始时间：
		3、_____ 4、_____				调理时长：
	其他建议					
记录人						

体感变化评分表		干预前	__月__日	__月__日	__月__日
胃肠道情况	好 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
视力模糊	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
畏光	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
眼红	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
多泪	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
眼涩	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
辨色下降	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
眼痛	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
分泌物增多	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				
灼烧	没有 10 分 偶尔 8 分 经常 6 分				