

# 腹泻综合干预技术方案

武汉英纽林生物科技有限公司

清华海峡研究院医学营养研究中心

根据世界卫生组织的调查显示，腹泻致死率仅次于肿瘤、心脑血管病、糖尿病，高居各种疾病死亡率的第四位。腹泻的危害性如下：

**脱水和电解质紊乱：**腹泻时，大量水分和电解质（如钠、钾、氯等）随着粪便排出体外，若得不到及时补充，就会导致脱水。轻度脱水可能会出现口渴、皮肤干燥、尿量减少等症状；而重度脱水则可引起血压下降、休克，甚至危及生命。同时，电解质紊乱也会对身体产生严重影响，如血钾异常。像新闻中的李先生，本身有慢性肾功能不全，腹泻呕吐后，钾离子排出减少，再加上机体脱水，肾功能进一步受损，排钾能力降低，导致血钾升高，出现高血钾症。

**营养不良：**腹泻期间，胃肠道的消化和吸收功能受到抑制，食物在肠道内停留时间缩短，营养成分不能充分被吸收，长期或严重的腹泻可导致营养不良，尤其对儿童、老年人及患有慢性疾病的人群影响更大。

## **一、引流普筛**

### **1.1 发病原因**

正常肠道菌群可维持肠道黏膜完整性，形成屏障，防止有害物质进入人体。菌群失调时，屏障功能受损，肠道对水分和电解质吸收能力下降，通透性增加，大量水分和未消化食物残渣进入肠道，引发腹泻。

### **1.2 高危人群**

婴幼儿及儿童

老年人

工作压力大、抵抗力弱的人群

有免疫抑制或慢性疾病者

旅游者

### 1.3 临床表现

症状：除排便次数增多和大便稀薄外，还可能伴有腹痛、发热、恶心、呕吐、脱水等症状。

体征：可能包括腹部压痛、肠鸣音亢进等。严重腹泻时可能出现脱水体征，如皮肤弹性差、眼窝凹陷等。

## 二、试用

清畅/畅快：干吃，试用三天。调节肠道菌群，修复肠粘膜；吸水膨胀，粪便成型。

## 三、诊断

腹泻是指每日排便 3 次及以上，或明显超过平日习惯的频率，粪质稀薄或水样便，常伴有排便急迫感或失禁等症状，通常以每日大便重量超 200 g 作为腹泻的客观指标。多以感染性腹泻为主。



#### 四、干預和治療

| 產品名稱     | 作用機理                   |
|----------|------------------------|
| 清暢/暢快    | 調節腸道菌群，降低炎症反應，修復腸屏障功能。 |
| 英寶暢（嬰幼兒） |                        |
| 益生複合肽    | 增強機體免疫力。               |
| 電解質產品    | 補充電解質，維持體內平衡。          |

| 分类                                                                                                                                          | 干预方案                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成人                                                                                                                                          | <p>清畅/畅快：早餐前 1 袋，干吃。</p> <p>益生复合肽：1/次，2 次/天。</p> <p>电解质产品：根据排便次数使用，1/次，2 次/天。</p>                               |
| 儿童                                                                                                                                          | <p>英宝畅：根据年龄使用。</p> <p>3 岁以下：0.5 袋/次，1 次/天，加入奶粉冲饮。</p> <p>3-6 岁：1 袋/次，1 次/天，干吃。</p> <p>6 岁以上：2 袋/次，1 次/天，干吃。</p> |
| <p>备注：对于初次使用，如肠道反应(腹胀、腹痛等)较为猛烈，可遵循少量多次的原则，逐渐加量，该过程一般持续 3-5 天。</p> <p>部分人群在干预过程中会出现刚开始效果较好，然后效果较差甚至更严重的现象，这属于正常现象（赫氏消亡反应），该过程一般持续 7 天左右。</p> |                                                                                                                 |

生活干预：

腹泻期间需保证充足休息，减少体力消耗；

注意腹部保暖，避免受凉刺激肠道蠕动；

养成良好卫生习惯，饭前便后洗手，餐具定期消毒，预防交叉感染。

慢性腹泻患者需保持规律作息，避免精神紧张和过度劳累，适当进行轻度运动（如散步）增强肠道功能。

## 五、康复管理

| 名称 | 干预机制 |
|----|------|
|----|------|

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 吸氢气 | 氢气具有抗炎和抗氧化的作用，有利于肠道黏膜的修复，维持肠屏障功能，促进排便。 |
|-----|----------------------------------------|

## 六、统计分析

填写《真实世界研究案例记录表》，做好数据记录分析。

## 腹泻营养干预效果调查表

\*姓名：\_\_\_\_\_ \*性别：男☐ 女☐ \*出生日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\*联系电话：\_\_\_\_\_ 地址：\_\_\_\_\_

1、发病日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

2、干预前腹泻症状：（随访日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日， 评估人：\_\_\_\_\_（印章））

① 排便次数：\_\_\_\_\_（24小时内最多排便次数， $\geq 3$ 次）

② 发热：是☐，最高体温：\_\_\_\_\_°C 否☐

③ 腹痛：是☐ 否☐ 腹胀：是☐ 否☐

呕吐：是☐ 否☐ 脱水：是☐ 否☐

④ 腹泻情况：（可附上服用前后便常规和血常规化验单结果）

☐较轻、稀便、无血 ☐较轻、稀便、有血

☐严重、水样便、无血 ☐严重、水样便、有血 ☐其他：

3、营养干预方案：

早☐，名称\_\_\_\_\_剂量\_\_\_\_\_克

中☐，名称\_\_\_\_\_剂量\_\_\_\_\_克

晚☐，名称\_\_\_\_\_剂量\_\_\_\_\_克

其他，\_\_\_\_\_

4、干预后腹泻症状：（随访日期\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日， 评估人：\_\_\_\_\_（印章））

① 排便次数：\_\_\_\_\_（24小时内最多排便次数）

② 发热：是☐，最高体温：\_\_\_\_\_°C 否☐

③ 腹痛：是☐ 否☐ 腹胀：是☐ 否☐

呕吐：是☐ 否☐ 脱水：是☐ 否☐

④ 腹泻情况：（可附上服用前后便常规和血常规化验单结果）

☐较轻、稀便、无血 ☐较轻、稀便、有血

☐严重、水样便、无血 ☐严重、水样便、有血 ☐其他：