

(一) 主要根据五点血糖中的空腹血糖 FPG、餐后 2 小时血糖 PG120min 来出具
基本方案:

6.1<FPG<7 和/或 7.8<PG120min<11.1: 早餐前畅快 1 袋+晚餐前纽畅 1 袋

7≤FPG<8 和/或 11.1≤PG120min<13: 早餐前畅快 1 袋+午餐前纽畅 1 袋+晚餐前
纽畅 B 1 袋

8≤FPG<10 和/或 13≤PG120min<16.7: 早餐前畅快 1 袋+午餐前纽畅 1 袋+晚餐
前纽畅 1 袋+睡前 (20 点-21 点) 纽畅 B 1 袋

FPG≥10 和/或 PG120min≥16.7: 早畅快 1 袋、纽畅 1 袋+午纽畅 1 袋+晚餐前纽畅
1 袋+睡前 (20 点-21 点) 纽畅 B 1 袋

(二) 根据患者其他表征在在以上方案基础上**增加其他产品搭配:**

1、如患者伴随肥胖, 根据 BMI 增加纽畅伴侣:

24<BMI≤28: 早餐增加纽畅伴侣高蛋白半袋+晚餐增加纽畅伴侣高纤维半袋

BMI>28: 早餐增加纽畅伴侣高蛋白 1 袋+晚餐增加纽畅伴侣高纤维 1 袋

2、如患者有肠炎胃炎、幽门感染、胃食管反流、10 年以上药物史, 午餐前增加
卫平畅 1 袋;

3、如患者尿酸>420, 午餐后、晚餐后 1 小时增加嘌呤立清各 1 片, 配合氢氧理疗;

4、如患者体感中睡眠评分 4-6 分, 睡前半小时增加安欣畅 1 袋, 配合氢氧理疗;

5、如患者体感中视力模糊、四肢麻木、皮肤瘙痒 4-6 分, 增加维生素 B1、B12。