时空深度学习模型在玉米—大豆分类中的空间泛化能力分析

黄游缘[1]，林 娜[1]，范 莉[2]

（1. 重庆交通大学智慧城市学院，重庆 400074；2. 中国气象局气候资源经济转化重点开放实验室重庆市气象服务中心，重庆 401147）

摘要：[目的] 待补。[方法] 待补。[结果] 待补。[结论] 待补。

关键词：多时相遥感影像；时空深度学习；空间泛化；农作物识别

【中图分类号】P237　　【文献标志码】A　　【文章编号】1009-2307（20 ）0 -

Spatiotemporal Deep Learning for Remote Sensing Identification of Corn and Soybean with Spatial Generalization

HUANG Youyuan[1], LIN Na[1], FAN Li[2]

(1. School of Smart City, Chongqing Jiaotong University, Chongqing 400074, China;
2. China Meteorological Administration Key Open Laboratory of Transforming Climate Resources to Economy, Chongqing Meteorological Service Center, Chongqing 401147, China)

Abstract: [Purposes] **TBD**. [Methods] **TBD**. [Findings] **TBD**.

Key words: multi-temporal remote sensing imagery; spatiotemporal deep learning; spatial generalization; crop identification

0 引言

1 研究区域与数据

1.1 研究区概况

4 个站点均位于美国中西部玉米带内，该区域以玉米和大豆种植为主，分别记为 A、B、C 和 D，自西向东排列顺序为 A、B、D、C。四站彼此相互独立，站点中心间距平均约 452 km，最大约 793 km；各站均为 76.8 km × 76.8 km 的正方形区域，边界沿等积投影的坐标轴方向延伸，与经纬线方向存在一定偏差。四站中心坐标依次为 A（西经 95.9085°、北纬 42.8746°）、B（西经 91.6892°、北纬 42.2382°）、C（西经 86.7671°、北纬 40.7431°）和 D（西经 89.2372°、北纬 40.1071°）。四站 2023 年地物分类图见图 1，子图采用相同的范围和显示比例，排列仅反映版面顺序，不表示站点间的实际方位。

图 1 中的数据来自美国农业部国家农业统计局（USDA NASS）发布的耕地数据层（Cropland Data Layer，CDL）。基于 2023 年 CDL 数据统计结果，4 个站点均以玉米和大豆为主要作物类型，两者面积之和均超过农作物总面积的 90%。本文将 CDL 原始类别重分类为玉米、大豆和其它地类 3 类，其中除玉米和大豆以外的农作物和非农作物地类均归并为其它地类。四站均以玉米和大豆为主要作物，但地物组成与景观格局存在差异。

玉米和大豆的物候信息来自美国农业部国家农业统计局发布的作物进度报告（Crop Progress Report，CPR）。结合该报告，本文以年积日（DOY）116–266 作为主要观测窗口，该窗口覆盖玉米和大豆的主要生育阶段。




图 1 四个研究站点 2023 年地物分类图

1.2 数据获取与预处理

本文采用的多时相遥感数据源自美国国家航空航天局（NASA）地球数据科学系统提供的协同陆地卫星和哨兵 2 号数据（Harmonized Landsat and Sentinel-2，HLS）第 2 版。该产品通过对 Landsat-8/9 OLI 与 Sentinel-2 MSI 的观测影像进行辐射定标、大气校正、几何精校正以及网格重采样，实现了两类卫星数据的深度融合。本研究选取其空间分辨率为 30 m 的多时相地表反射率数据，包含蓝光、绿光、红光、近红外、短波红外 1 和短波红外 2 共 6 个核心波段作为深度学习模型的输入特征。

标签数据采用 USDA NASS CropScape 门户网站提供的 2023 年 CDL 产品。CDL 数据提供了美国本土逐像素的年度作物类型分类信息，在本研究中用于模型训练的真值标记与精度检验。研究对原始的 CDL 分类体系进行重分类，统一划分为玉米（Corn）、大豆（Soybean）和其它地类（Others）3 个目标类别。重分类后的标签数据在空间投影和分辨率上与对应的多时相 HLS 影像进行严格对齐。

在预处理阶段，首先对影像进行镶嵌、云掩膜和裁剪处理。随后，对时间序列采用时序线性插值方法补齐无效观测，并统一 4 个站点的时间跨度与时间间隔。最终，构建得到空间大小为 2560×2560 像素，时间分辨率为 5 天、包含 31 个时间步、空间分辨率为 30 m、光谱波段数为 6 的数据集。样本构建时，将多时相影像及其对应标签裁剪为 128 × 128 像素图块，相邻图块无重叠；在此基础上，最终每个站点每年获得 400 个样本用于后续模型训练与验证。

1.3 研究区空间特征

本文基于 2023 年 CDL 参考标签，从地物组成和景观格局两个方面比较 4 个站点的空间特征，为后续站内分类与跨站比较提供研究区背景。

1.3.1 地物组成

如图 2 所示，4 个站点均以玉米和大豆为主要地物，两者面积之和占各站总面积的 65.57%～82.16%。各站玉米面积占比为 39.97%～45.39%，大豆占比为 23.49%～36.77%，站点间大豆占比的变化幅度更大。A 站两种作物合计占比最高，其它地类仅占 17.84%；B 站大豆占比最低，其它地类占比达到 34.43%。因此，4 个站点具有相同的主要作物组成，但两种作物与其它地类的面积配置存在差别。




图 2 四个研究站点 2023 年地物面积占比

1.3.2 景观格局

景观指数用于定量描述地物组成、斑块大小与形状，以及聚集、邻近等空间配置特征，为比较研究区空间格局提供依据 [1]。地类面积占比已反映景观组成，本文进一步选用斑块面积（AREA）、形状指数（SHAPE）和斑块数，刻画斑块尺度、轮廓及数量；以边缘密度（ED）、聚集度指数（AI）和同类最近邻距离（ENN）补充描述类别交界密集程度、同类聚合程度和斑块间邻近状况。

参考斑块为 2023 年 30 m 标签中 8 邻域相连的同类像元，不等同于实际农业田块，统计保留单像元斑块及研究区外缘斑块。单像元斑块占各站相应作物斑块总数的 44.31%～54.64%，却仅占该作物总面积的 0.23%～0.71%，因此从面积占比观察主要斑块形态。图 3 对四站两种作物采用相同的六档 AREA 和四档 SHAPE，统计各联合组合占本站该作物总面积的比例，保留大小与形状的对应关系。ENN 则按完整参考斑块等权统计，每个斑块计一次。

四站具有相同的主要作物背景，同类聚合程度也较接近，两种作物的 AI 为 91.22%～93.92%（表 1）。八个站点—作物组的 ENN 中位数均为 67.08 m；四站玉米的 AREA 面积加权中位数为 116.91～130.95 ha，即按面积升序累积，首次达到该作物总面积一半时的斑块面积。后者仅概括面积分布的位置，与联合分档面积占比口径不同。上述数值接近并不表示完整空间分布一致，表 1 中的斑块数、ENN 的第 90 百分位数（P90）及整站 ED 进一步补充数量、邻近和边缘背景。

图 3 显示，A 站两种作物的面积较集中于少数联合组合，SHAPE 小于 2 的斑块均承载相应作物面积的近八成，形状相对规则；面积占比最大的组合均为 100≤AREA<200 ha、1.5≤SHAPE<2。B 站两种作物的分布差异突出，玉米面积占比最大的组合为 200≤AREA<500 ha、2≤SHAPE<3，大豆则为 10≤AREA<50 ha、1≤SHAPE<1.5。B 站大豆 ENN 的 P90 为 240.00 m，高于其余三站，表明其中位数以上的距离分布仍有差异。

C 站的联合分布较分散，形状也较复杂。该站两种作物斑块数和整站 ED 均为四站最高，小于 10 ha 的斑块约占数量的九成，但所占作物面积均不足 6%；AREA≥200 ha 且 SHAPE≥3 的斑块仍分别占玉米、大豆总面积的 16.78% 和 10.09%，体现出较多小斑块与大型复杂斑块并存的格局。D 站两种作物面积占比前三位的联合组合相同，主要面积—形状分布较接近，整站 ED 为四站最低的 51.76 m/ha。

表 1 四个研究站点 2023 年作物斑块数量、聚集与邻近特征及整站边缘密度

站点	作物	斑块数	AI（%）	ENN 的 P90（m）	整站 ED（m/ha）
A	玉米	15146	93.92	161.55	55.21
	大豆	14695	93.46	180.00	
B	玉米	14460	93.25	180.00	54.47
	大豆	16039	91.60	240.00	
C	玉米	29837	91.88	152.97	65.53
	大豆	27894	91.22	180.00	
D	玉米	16756	93.58	180.00	51.76
	大豆	14407	93.43	189.74	

注：P90 为第 90 百分位数，按完整参考斑块等权、相邻顺序值线性插值计算。ENN 表示研究区内最近同类斑块的边界像元中心距离，不是田块间净空距离。ED 覆盖玉米、大豆及其它地类三类景观，每站列一次。




图 3 四个研究站点 2023 年玉米和大豆的面积—形状联合分布

注：气泡圆面积与该组合占本站该作物总面积的比例成正比，不表示斑块数量；八个站点—作物组各自合计 100%，全图大小尺度一致。每格 A 左上、B 右上、C 左下、D 右下，错位仅用于区分站点，不表示档内数值差异。气泡为联合档内斑块汇总，不代表单个真实斑块；分档用于展示，不定义形态类型。

2 研究方法

2.1 时空深度学习模型

2.1.1 U-TAE 模型

2.1.2 3D U-Net 模型

2.1.3 ConvGRU 模型

2.2 实验设计

本研究围绕玉米、大豆与其它地类三类目标，设计站内分类实验与跨站点空间泛化实验，以评估三

种时空深度学习模型的分类能力与空间泛化性能。

2.2.1 站内分类实验

站内实验中，每个站点用2023年多时相HLS影像和CDL标签构建400个互不重叠的图块样本，采用5折交叉验证训练和评估。400个样本分为5个互不重叠的子集（折），每轮取其中3个子集训练、1个子集验证（用于早停）、1个子集测试。5轮之后，每个样本恰好被测试一次，得到覆盖全站的交叉验证预测。

站内精度由5折测试的混淆矩阵汇总计算：将5个混淆矩阵逐元素相加，再由汇总混淆矩阵计算玉米F1、大豆F1和OA，得到基于全站预测的站内汇总精度，用作与跨站结果比较的基准。另计算每种模型在每个站点的5折测试F1均值与标准差，用于说明折间差异；该统计量不参与跨站比较。后文如无特别说明，站内精度均指汇总精度。

三种模型均用PyTorch实现，训练策略和超参数统一：优化器为AdamW，损失函数为交叉熵，初始学习率0.0001，批次大小4，余弦退火学习率调度（$T_{\max}=50$，$\eta_{\min}=0.00005$），权重衰减0.00005，梯度裁剪阈值5.0，并采用早停（容忍15轮，最小改善量0.0001）防止过拟合。训练时对每个图块做0°、90°、180°、270°四种旋转增强，每折有效训练样本由240扩展到960。所有模型在同一硬件环境下训练。

2.2.2 跨站点空间泛化实验

在跨站点泛化实验中，依次选取四个站点之一作为源站点，利用其站内实验训练所得的5个模型（每折一个），分别对其余三个目标站点的全部400个图块逐块推理。每条迁移路径得到5次完整预测，每次将400个图块的混淆矩阵汇总后计算指标，再对5次结果取均值与标准差。迁移过程中不微调、不集成，以比较三种模型结构的分类性能与空间泛化性能。4个站点轮换作为源站点，共12条有向迁移路径，3种模型合计36个模型—路径组合、180次完整预测。

为衡量跨站应用的精度与目标站当地训练精度之间的差距，本文以同一模型在目标站点的站内汇总F1为基准，计算F1差值。以玉米为例：

$$\Delta F1_{\text{玉米}} = F1_{\text{目标站站内玉米}} - \overline{F1}_{\text{跨站玉米}} \tag{1}$$

式中，$F1_{\text{目标站站内玉米}}$为该模型在目标站点的站内汇总玉米F1，$\overline{F1}_{\text{跨站玉米}}$为源站点模型在目标站点的跨站玉米F1五次均值，计算时二者取值均为0～1。$\Delta F1_{\text{玉米}}$为二者直接相减的差值，正值表示跨站精度低于目标站点的站内精度，负值表示跨站精度高于站内精度。大豆的F1差值$\Delta F1_{\text{大豆}}$同理计算。F1及其标准差以百分数表示，F1差值以百分点表示，均将原尺度数值乘以100后保留两位小数；计算和比较使用未舍入值，差值不除以站内基准。

2.3 精度评价指标

模型精度由预测结果与像元级真实标签构成的混淆矩阵计算。对玉米、大豆、其它地类三类，混淆矩阵元素C_{ij}表示真实类别为i、预测为j的像元数。类别i的精确率P_i为

$$P_i = \frac{C_{ii}}{\sum_j C_{ji}} \tag{2}$$

召回率R_i为

$$R_i = \frac{C_{ii}}{\sum_j C_{ij}} \tag{3}$$

F1为二者的调和平均：

$$F1_i = \frac{2P_iR_i}{P_i + R_i} \tag{4}$$

总体精度（OA）为

$$\text{OA} = \frac{\sum_i C_{ii}}{\sum_{i,j} C_{ij}} \tag{5}$$

本研究关注玉米和大豆的识别与泛化能力，因此分别报告玉米F1（$F1_{\text{玉米}}$）和大豆F1（$F1_{\text{大豆}}$）作为主要指标，OA作为总体参考。


2.4 硬件和软件配置

模型在Linux工作站（Ubuntu 22.04）上训练，配置为Intel Xeon Gold 6430处理器（2.1 GHz，32核）、120 GB内存和1块NVIDIA GeForce RTX 4090显卡（24 GB显存），深度学习框架为PyTorch。


3 实验结果与分析

3.1 模型站内分类性能

如图4所示，三种模型在四个站点的站内玉米F1为90.98%～96.23%，大豆F1为89.55%～95.89%。三种模型的分类表现呈现出两点共性：在四个站点上，玉米F1均高于大豆F1，差值均小于2.00个百分点；跨站点比较，各模型的玉米和大豆F1均在A站点取得各自最高值。五折交叉验证中，同一数据集不同划分下的每折独立训练，12组实验（3种模型×4个站点）的玉米和大豆F1折间标准差均小于1.00%。



（a）四站点玉米分类精度



（b）四站点大豆分类精度




图 4 三种模型在四个站点的站内玉米和大豆分类精度

三种模型之间的差异主要体现在 ConvGRU 与另两种模型之间。U-TAE 和 3D U-Net 在各站点的玉米和大豆 F1 均高于 ConvGRU，而二者之间差值均小于 1.00 个百分点，互有高低：U-TAE 在 A、B 两个站点略优，3D U-Net 在 D 站点略优，C 站点 U-TAE 的玉米和大豆 F1 分别高出 0.04 和 0.08 个百分点。ConvGRU 与前两者的差距因站点而异：两种作物在 C 站点为 1.43～1.61 个百分点，在 D 站点为 3.34～3.98 个百分点。图 5 以差距较大的 D 站点为例对比了三种模型的站内交叉验证分类结果：在选中局部区域中，ConvGRU 的玉米和大豆像元错误率为 12.1%，高于 3D U-Net（5.8%）和 U-TAE（4.8%）。




图 5 D 站点三种模型站内交叉验证分类结果（上：全站，红框为局部窗口；下：局部窗口放大）

3.2 模型跨站分类性能与泛化退化

如表 2 所示，源站模型不经微调直接用于目标站后，36 个模型—路径组合的玉米和大豆跨站 F1 均低于同一模型在目标站的站内汇总 F1。跨站玉米 F1 为 85.68%～92.92%，大豆 F1 为 83.08%～92.15%，每项为五次完整目标站预测的均值。按目标站对 3 条路径取平均，三种模型的玉米和大豆跨站 F1 均在以 A 站点为目标站时最高，与站内结果中 A 站点精度最高相对应；玉米跨站 F1 则均在以 C 站点为目标站时最低，大豆跨站 F1 的最低目标站则不一致。


按 12 条路径取算术平均，ConvGRU 的跨站 F1 均值最低，但平均 F1 差值最小：其跨站玉米和大豆 F1 分别为 88.73% 和 87.64%，比 3D U-Net 和 U-TAE 低 1.45～2.13 个百分点（后两者两种作物的均值为 89.69%～90.39%）；而玉米和大豆平均 F1 差值分别为 2.79 和 3.00 个百分点，小于 3D U-Net 和 U-TAE（3.74～3.97 个百分点）。跨站 F1 比较的是模型在目标站的实际分类精度，F1 差值衡量的则是跨站 F1 与同一模型在目标站站内汇总 F1 之间的差距。因此，F1 差值较小不代表跨站绝对精度更高，评价模型的跨站表现需要同时考察这两个指标。

如图 6 所示，F1 差值随源—目标组合而变化，且三种模型的变化并不一致。即使目标站相同，F1 差值也会随源站不同而改变：以 D 站点为目标站时，ConvGRU 的大豆 F1 差值在源站为 C 时为 0.90 个百分点，源站为 B 时为 7.39 个百分点；这两种源站下五次预测对应的 F1 差值分别为 0.77～0.99 和 3.29～10.81 个百分点，源站为 B 时的每一次结果均高于源站为 C 时，但五次之间的波动也更大。在 B、D 两个站点之间，两个方向上的 F1 差值大小关系也因模型而异：ConvGRU 的玉米和大豆 F1 差值均为 B→D 方向较大，3D U-Net 则均为 D→B 方向较大；以大豆为例，ConvGRU 在 B→D 和 D→B 路径上分别为 7.39 和 3.36 个百分点，3D U-Net 分别为 4.02 和 6.14 个百分点。上述方向差异基于五次预测的均值，仅反映这一站点对上的表现，不代表普遍的迁移规律。这些差异与站点空间特征的对应关系，将在后文结合地物组成与景观结构分析。

表 2 三种模型在 12 条迁移路径上的跨站玉米和大豆 F1

迁移路径	ConvGRU		3D U-Net		U-TAE	
	玉米 F1（%）	大豆 F1（%）	玉米 F1（%）	大豆 F1（%）	玉米 F1（%）	大豆 F1（%）
A→B	89.91	87.52	91.43	89.28	92.09	89.90
A→C	86.97	86.94	87.71	87.96	88.20	88.29
A→D	88.54	88.05	90.64	90.56	91.78	91.48
B→A	92.00	91.59	92.92	92.15	92.70	91.87
B→C	85.68	84.52	88.09	88.20	87.70	87.66
B→D	85.73	83.08	90.87	90.43	89.59	88.50
C→A	90.31	90.15	92.09	91.64	91.52	91.09
C→B	87.47	85.06	90.23	88.98	90.33	88.18
C→D	89.77	89.57	90.77	90.91	90.98	90.70
D→A	91.05	90.85	91.36	91.32	91.45	92.04
D→B	89.44	86.19	88.13	86.19	90.45	89.17
D→C	87.85	88.19	87.88	88.60	87.83	88.41
平均	88.73	87.64	90.18	89.69	90.39	89.77

注：箭头左侧为源站，右侧为目标站。每格为源站 5 个折模型分别预测目标站全部 400 个图块所得 5 次 F1 的算术平均，以百分数表示，未进行微调和模型集成；“平均”行为 12 条迁移路径 F1 均值的算术平均。



（a）ConvGRU 玉米 F1 差值　（b）3D U-Net 玉米 F1 差值　（c）U-TAE 玉米 F1 差值

（d）ConvGRU 大豆 F1 差值　（e）3D U-Net 大豆 F1 差值　（f）U-TAE 大豆 F1 差值

图 6 不同源—目标区域组合下三种模型的玉米和大豆 F1 差值（单位：百分点；行为源站，列为目标站，对角线不适用；同模型目标站站内 F1 减跨站五次均值，六幅子图共用色标）

3.3 模型跨站泛化差异的空间解释

4 结论

参考文献：

[1] Kevin McGarigal, Samuel A. Cushman, and Eduard Ene. FRAGSTATS v4: Spatial pattern analysis program for categorical maps. URL `https://www.fragstats.org`.