
數線長短差｜家長解答

實線是已知；虛線是新結果。中階左右兩路都接受。

過渡卷 第 1 題｜甲乙 = 7

甲丙 = 11，乙丁 = 14，甲丁 = 21。




甲丁 21 - 乙丁 14 = 甲乙 7

共用一個端點；短段在長段裡。

過渡卷 第 2 題｜CD = 9

AC = 13，BD = 12，AD = 22。



AD 22 - AC 13 = CD 9


共用一個端點；短段在長段裡。

數線長短差｜家長解答

實線是已知；虛線是新結果。中階左右兩路都接受。

過渡卷 第 3 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 13，乙丁 = 16，甲丁 = 23。



先求左側

甲丁 23 - 乙丁 16 = 甲乙 7

甲丙 13 - 甲乙 7 = 乙丙 6


先求右側

甲丁 23 - 甲丙 13 = 丙丁 10

乙丁 16 - 丙丁 10 = 乙丙 6

過渡卷 第 4 題｜BC = 7

AC = 15，BD = 17，AD = 25。



先求左側

AD 25 - BD 17 = AB 8

AC 15 - AB 8 = BC 7

先求右側

AD 25 - AC 15 = CD 10


BD 17 - CD 10 = BC 7

數線長短差｜家長解答

實線是已知；虛線是新結果。中階左右兩路都接受。

過渡卷 第 5 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 16，乙丁 = 14，甲丁 = 24。



先求左側

甲丁 24 - 乙丁 14 = 甲乙 10

甲丙 16 - 甲乙 10 = 乙丙 6

先求右側

甲丁 24 - 甲丙 16 = 丙丁 8

乙丁 14 - 丙丁 8 = 乙丙 6

核答時先看段名，再看數字。

每次相減：兩段共用一個端點，短段包含於長段。

算出的新段要標回原圖，下一步才有依據。


圖不按比例，不能用尺量或看畫得多長來猜答案。

數線長短差｜家長解答

實線是題目已知；虛線是算出的新段；粗線是要求的段。

過渡卷 第 6 題｜BC = 4

AE = 18，BE = 13，AD = 15，CD = 6。



以下五條都合法；每條最少三次相減。

路線 1：先找 AB、AC

AE 18 - BE 13 = AB 5
AD 15 - CD 6 = AC 9
AC 9 - AB 5 = BC 4

路線 2：先找 AC、AB

AD 15 - CD 6 = AC 9
AE 18 - BE 13 = AB 5
AC 9 - AB 5 = BC 4

路線 3：先找 DE、BD

AE 18 - AD 15 = DE 3
BE 13 - DE 3 = BD 10
BD 10 - CD 6 = BC 4

路線 4：先找 AC、CE

AD 15 - CD 6 = AC 9
AE 18 - AC 9 = CE 9
BE 13 - CE 9 = BC 4

路線 5：先找 AB、BD

AE 18 - BE 13 = AB 5
AD 15 - AB 5 = BD 10
BD 10 - CD 6 = BC 4


核對段名與共端包含關係；數字剛好相同，不代表用了正確線段。

數線長短差｜家長解答

實線是已知；虛線是新結果。中階左右兩路都接受。

獨立卷 第 1 題｜甲乙 = 12

甲丙 = 16，乙丁 = 13，甲丁 = 25。




甲丁 25 - 乙丁 13 = 甲乙 12

共用一個端點；短段在長段裡。

獨立卷 第 2 題｜CD = 9

AC = 17，BD = 14，AD = 26。



AD 26 - AC 17 = CD 9


共用一個端點；短段在長段裡。

數線長短差｜家長解答

實線是已知；虛線是新結果。中階左右兩路都接受。

獨立卷 第 3 題｜乙丙 = 6

甲丙 = 17，乙丁 = 15，甲丁 = 26。



先求左側

甲丁 26 - 乙丁 15 = 甲乙 11

甲丙 17 - 甲乙 11 = 乙丙 6


先求右側

甲丁 26 - 甲丙 17 = 丙丁 9

乙丁 15 - 丙丁 9 = 乙丙 6

獨立卷 第 4 題｜BC = 8

AC = 16，BD = 19，AD = 27。



先求左側

AD 27 - BD 19 = AB 8

AC 16 - AB 8 = BC 8

先求右側

AD 27 - AC 16 = CD 11


BD 19 - CD 11 = BC 8

數線長短差｜家長解答

實線是已知；虛線是新結果。中階左右兩路都接受。

獨立卷 第 5 題｜乙丙 = 7

甲丙 = 18，乙丁 = 17，甲丁 = 28。



先求左側

甲丁 28 - 乙丁 17 = 甲乙 11

甲丙 18 - 甲乙 11 = 乙丙 7

先求右側

甲丁 28 - 甲丙 18 = 丙丁 10

乙丁 17 - 丙丁 10 = 乙丙 7

核答時先看段名，再看數字。

每次相減：兩段共用一個端點，短段包含於長段。

算出的新段要標回原圖，下一步才有依據。


圖不按比例，不能用尺量或看畫得多長來猜答案。

數線長短差｜家長解答

實線是題目已知；虛線是算出的新段；粗線是要求的段。

獨立卷 第 6 題｜BC = 3

AE = 20，BE = 14，AD = 17，CD = 8。



以下五條都合法；每條最少三次相減。

路線 1：先找 AB、AC

AE 20 - BE 14 = AB 6
AD 17 - CD 8 = AC 9
AC 9 - AB 6 = BC 3

路線 2：先找 AC、AB

AD 17 - CD 8 = AC 9
AE 20 - BE 14 = AB 6
AC 9 - AB 6 = BC 3

路線 3：先找 DE、BD

AE 20 - AD 17 = DE 3
BE 14 - DE 3 = BD 11
BD 11 - CD 8 = BC 3

路線 4：先找 AC、CE

AD 17 - CD 8 = AC 9
AE 20 - AC 9 = CE 11
BE 14 - CE 11 = BC 3

路線 5：先找 AB、BD

AE 20 - BE 14 = AB 6
AD 17 - AB 6 = BD 11
BD 11 - CD 8 = BC 3

核對段名與共端包含關係；數字剛好相同，不代表用了正確線段。