

1184 0797-8208 37



门诊病历

119432

姓名 方 性别 男 年龄 64 职业 ✓
籍贯 福建 住址或工作单位 福建

药物过敏史 无

注意：每次就诊请带病历，化验检查单请贴在后页粘线上。

地址： 福建

本院电话总机： 福建

医务科： 福建 急诊科： 福建

No 0176748

10033

①

出院小结

住院号: 119932.

入院日期: 1998.3.13 — 3.16.

入院诊断: ^{病情演变}
1. 结核性脑膜炎?
2. 交通性脑积水
3. 占位性病变?

患儿, 男, 6岁, 因 ~~咳~~ 阵发性
头痛、低热 20 天入院。诉因白天
头痛不甚剧烈, 有时加重, 有时睡眠时减轻。
或有一过性视物模糊。无呕吐。
初拟“上感”治疗, 无好转, 后在 362 医
院行 CT 检查, 考虑有脑积水, 疑有
结核等。用退热药 V. 甘露醇, 头痛
减轻, 遂转我院治疗。

入院时: TPR 正常。一般情况
尚可。视物清, 语言正常。 ^无 瞳孔等大。
四肢活动正常。无抽搐。
无过敏史。既往体健。无引产
指征。

位阻3次检查:

脑脊液: 无色清亮透明, 无细胞

Rt) 潘尼试验 (-)

细胞数: 0.002 G/L

白细胞数: 0.001 G/L

总蛋白: 1.08 mmol/L

GLU: 1.96 mmol/L

PIZ: 104.9 mg/L

网膜试验: (阴性)

尿(8:3) pH 6.0 SG 1.018

子宫颈

血WBC: 2.2 G/L NO. 10. C 0.39

因白细胞增高有炎症反应

▲ 早施行头后CT 203号扫描

前2次因病情未好转, 今又因

病情加重, 故

位阻3次即行腰穿, 送检

有性细胞, 在上肢有不自主运动, 并有癫痫

发作, 常用3次抗癫痫药, SM + INH + RFP

用过甘露醇一次

98-11-1

呼吸停止 5分钟. 体弱青紫
患儿13岁 5分钟 突然出过
颜面青紫. 随即呼吸停止. 瞳孔散大. 青
紫. 四肢厥冷. 患儿为右利手. 折断尚好.
近日发热. 38.2℃. 无咳嗽. 散光. 喉
头炎. 呼吸器.

PC. 呼吸器. 呼吸. 颜面青紫.
呼吸微弱. 呼吸器. 呼吸. 呼吸. 呼吸.

左眼反射(-). 双肺呼吸. 散光.
呼吸 6mm. 呼吸. 呼吸. 呼吸. 呼吸.

20% 呼吸. 呼吸. 呼吸. 呼吸. 呼吸.

呼吸. 呼吸. 呼吸. 呼吸. 呼吸.

呼吸. 呼吸. 呼吸. 呼吸. 呼吸.

松

NO

肺水肿.

12. ① 2.0 子吸: 10 电监护

② 今天打吊、吸痰、必要

③ 5%Gs 10ml / in st
Desamethason 5mg

④ 5%Gs 15ml / in st
7. 硫代硫酸钠 15ml / 接

⑤ 访 传染病科 会诊
传染病科

主任医师: ① 呼吸科 12: in st
传染病科

② 10%Gs 500ml / in st
呼吸科 24 / st (接)
会诊

③ 查问 14. 1% 补液: 电解质

NO

④ 少尿才使用利尿剂
20 甘露醇 80ml + D₅W 500ml
in st

进同核火。患儿小月时在南山医院
文后CT片子十四岁引P附片附：
剖增大，尖利切有变比子胎内切变15
故，阜原条件有限，建议转上121115
区治，若否托比，要本本史君吃，新
登书发。

① 胎前：结核性肺炎肺炎
 ② 太阳穴压痛表证
 ③ (因一焦膜一结核性肺炎) 98.11.22. 王位道西院. 中道
 为 99.1~4.16(第49): 2000.7.4~7.6(第8号) (有教训一语
 混合性西院)

门诊病历手册

姓名 肖 性别 男 年龄 7

婚否 职业 籍贯

住址 电话

药物过敏: 98.11.22 ~ 99.2.28.

病历记录, 复诊必带, 不作证明使用, 仅供参考

医院地址: 电话:

邮 编: 急诊电话:

③

98.11.22. 女代诉: 吞嚥难, 易饱咳,

常腰痛, 甚或失语, 喉中痰多, 神尚佳,
^{反不咳; 声低气怯;}

瘦, 针灸后^扶可^能大便干, 小便少,

不欲饮; 左上下肢^手挛僵(针灸前左指^{内勾握拳状}拘挛^挛甚); 口向左^歪歪; 胎前剖产.

前日晚得温发热(39°C 腋), 伴面微

赤隐红; 恶寒; 无汗, 头方痛项强; 用退

热栓^后于夜交时, 如先解, 热已退; 不

抽搐;

素引串珠, 不^能知^时快; 2~4月子^不软良,

常心烦；大便黄短，有时停，不欲饮。
常呼吸心跳停止两次（因胆囊引流管堵塞）
自觉大便平而难，院如故，色黄，有时

便闭10余日，有时甚；常恶心；一月来

前常呕吐黄涎，有肝胃脘痛；转手

不欲食，倦；左手温如热，右手微热。

脉：虚大略涩，左略弦。

^{左关}右关微，^{左关}中关微，消微，左关微。

左足凉，双目无神，睡左卧，眼球活动度^转迟纯
^{气阴大亏}

脉：虚大略涩，左略弦。

阴里病表，病涉少阳太阴。

处方：西洋参 麦冬 五味子 竹沥

枳实6 桔梗3 茯苓6 陈皮6 炙甘草6

前胡38 厚朴6 晚香玉6 12月28日 连翘^打38
+ 煅石膏^打38
另: 鲜竹沥 20cc/次 2次
(煎制) 如

12.13. 因患候竹沥. 上因始服中药.

服药至第15(前已停药), 诸症明显
减; 大便已畅, 恶心及呃逆已除; 胃痛已除;
欲食而凉

自全则汗在除; 小便已利, 无尿尿; 语

言稍清楚; 已能坐. 左手能抬举. 颈项有强直
感

脉: 不夏按. 略弦数遇; 右关浮;
左关微浮. 脉清凉.

舌：中心已长苔，边苔厚，仍合余证。

处方：厚朴除防己，加厚朴5 x2
减枳实为5g 枝子3g
羌活

12.15. 服药后：喉中仍有痰（痰多）

脉浮滑而迟，微弦，尺沉弱；

浮，右手指微有温。

舌：质红，中心及尖刺苔，右侧苔略

白厚。

处方：银花6 连翘5 桑叶8 薄荷6
西洋参6 麦冬8 珠子3 法半夏4 陈皮6
茯苓8 炙甘草8 枳实5 x4
No

另：竹沥200 + 姜汁5滴/次 冲服

98.12.20. 痰又减, 指温热已降.

脉仍虚迟. 同前.

处方: 红参₅ 竹沥₄ 枳壳₆

车前₄ 茯苓₆ 陈皮₆ 虎骨₆

熟地₆ 当归₄ 黄连₆ 麦冬₆

玉冰烧

x4

竹沥加姜汁

抄

12.27. 眼左偏; 喉中仍有痰. 尚

能语; 语言仍引迟; 大便尚可;

左手能抬平身, 左足能迈步; 无夜尿;

略寐稀; 现已微欲饮

脉略强但不受按，尺沉，脉浮。

舌：前半红而仍无苔，中心及根部有
白苔，舌伸较长，仍向左歪。

处方：西洋参3 麦冬6 五味子4
石菖蒲4 远志6 炙甘草6 熟地黄18
地龙5 红花5 郁金5 赤芍药6

新地5

4包

另：竹沥加姜汁3滴/次

2h

好

99.2.3 上方加大至量10g x4

NO

5

脉略弦但不受按，尺沉，脉浮。

舌：前半红而仍无苔，中心及根部有
白苔，舌伸较长，仍向左歪。

处方：西洋参3 麦冬6 五味子4
石膏4 炙甘草6 炙黄芪6 生地黄18
地龙5 红花5 枳实5 赤芍药6
新地5

4日

另竹沥加姜汁3滴/次

2/次

妙

99.2.3 上方加大剂量10g x4

NO

5

99. 元. 8. 感冒. 微咳. 痰为黄脓易出.

脉略细; 右寸按. 搏. 关尺沉; 左略

弦. 舌中心刺苔. 质红, 苔黄白. 咽量. 达冷

处方: 防风 6 银花 16 桑叶 5 薄荷 6

12 陈皮 5 姜黄 6 厚朴 6 杏仁 6 枳实 5

胆南星 5 石膏屑 5

X 3

竹沥 500/次 (兑姜汁 2 滴) 2/3

99. 元. 13. 感冒. 痰除; 咽喉头子管不通.

喉中, 舌底

脉略成. 已转白软稀. 饱水; 尚能食; 痰时吐

通. 舌平; 偏腹微痛. 痛即除. 大便成形. 日一行.

口不甚渴;

NO

张

便已痛降; 便量(服利福平); 股骨后

功如常; 尿口近;

尿: 数引尿引, 不受按; 左髂后缘;

左足冷, 右足温;

舌: 已正歪斜; 中心系带, 边苔略

白厚干燥, 口微左偏。

处方: 西药 8 白术 8 茯苓 8

补骨脂 8 法夏 5 陈皮 8 赤芍药 10

熟地 10 黄芩 8 归尾 6 大青盐 10

木瓜 6 X 陈子

另: 4917 1500 x 4. 每次加新 5 滴 40°

99.元.17. 喉中仍痰响流涎;腰

痛;流涕涕.嚏.微咳;口开齿;

脉虚.右微浮.舌苔厚.

处方:香薷散合痛世要方.黄芩

党参 x 2

99.元.24. 咳嗽喘.微痰多;运

动更有力;右微浮;喉中痰响如锯.

微前腹微痛.指牙疼(痰)

脉:虚弦.舌苔白厚腻.

处方:黄芩10 陈皮8 茯苓8 白术8

炙甘草 陈皮 法半夏 枳壳 苏梗

NO

7

黄芩10 金银花8 防己6 赤芍药8

若：竹沥200cc 加姜汁3滴/日
如

99. 元. 29. 症又略减.

现：身热，夜睡时露睛，仍微
流涎；喘微响；舌淡红；喉中痰
鸣减；现欲食甜，口渴干。

硬梗
脉略弦紧。尺脉沉；右寸浮。

舌：苔薄腻仅散在。质微红。

处方：上方除姜黄，防己，白芍。

△ 最厉害药方

加：飞滑石4 大皂荚12 木瓜8

3剂
妙

99.2.7. 服药平。

服略虚数回。右持。破手抖；左手凉。

舌苔腐白。散在刺苔底底红。

处方：仿神仙何得丹。

姜黄8 全蝎3 桔梗5 甘草6 麦冬6

西洋参3g 珍珠4 磁石5 远志 胆星6

羌活6 茯苓6 杭菊5

3剂
妙

竹沥定新102

99.2.11. 脉: 弦滑; 左略浮涩.

舌: 苔白减. 微花刺.

喉中痰喘痰多. 微咳, 口苦.

会阴前略减; 咯痰白沫; 手指略
温. 余同前.

处方: 防己 6 黄芩 8 茯苓 6

白术 6 炙甘草 12 枳实 6 紫苏叶 6

杏仁 6 黄芩 8 法半夏 5 广陈皮 6

茯苓 6 胆星 6 前胡 6 射干 6 4

另: 竹沥兑姜汁 3

炒

99.2.23. 痰略减; 咆除; 与指自除;

余症亦减.

脉虚而流利. 舌略白厚.

处方: 生黄芪10 地龙6 枳实5

赤芍6 木通5 防己6 茯苓6

白术6 黄芩 红花5 胆星6

梗6 桂枝5 羌活6 何首乌

另: 竹沥 20cc + 姜汁 7滴

壹千月事，一直在^服大益益寿(每天10g)

99.2.28. 服药平。脉右尺流利。

处方：黄芪 地龙 桑叶 黄芩

白芍 柴胡 胆南星 射干 天麻

檀香 茯苓 陈皮 x 半剂

竹沥加新₂₀₀₀也角 x 7

3.7. 发热。无汗。无恶寒恶风。

面色。颊微红；腹微痛；

脉^略弦紧。右寸。舌苔略厚。

处方：银花 连翘 桑叶 薄荷

黄芩 射干 白芍 茯苓 茵陈 泽

泻 茯苓

x 2 剂

尚
99.3.10. 半服上方时, 当天(3月7日)
身微热出汗
服时即自行退热。

次偏腹痛, 但大便正常, 引吐,
食尚可, 舌左微红; 喉中痰减
喘痰稀白; 已知以愈。

脉虚弱, 左略濡大。

舌: 略润。

处方: 姜菴6 射干6 茵陈5

苏梗6 防风5 木瓜5 竹茹4

枳壳^炒5 丁木^炒5 滑石^炒4 砂仁^炒5
大青^炒10 黄芩^炒4
NO X 6

另：①竹沥10cc + 姜汁4滴。

②刺五加片 按说明服

(股股三片)

如

3.12. 头痛. 呕吐二次. 咳嗽; 才大便.

大便. 不欲食. 不欲寒. 喉中痰声.

痰多加刺. 咽.

脉: 微弱. 两脉微浮.

舌: 白苔.

处方: 荆芥5g 防风6 党参8

炙甘草6 茯苓6 川芎5 羌活12g 独活12g

果明4 法本度5 附皮5 胆南星4

桔梗4

x 2

加

3.15岁

白西党8g 大红枣6g 厚白术6

云茯苓8g 胆南星8g 煅牡蛎8

法半夏8g 白附子5g 干地黄6

白芍药2g 炙甘草5g 石菖蒲4g

生地黄 炙甘草

水煎服 每日三次 每次一服

NO

张明

3.21. 服上药痰多，喉咽痒，手足抖。
汗多。

脉：虚引流系。

胃气微红，舌苔略暗，微汗。

花刺。

处方：地黄饮子合补阳还魂汤

加量用远志。

X 4

妙

竹沥加姜汁4滴

△

3.26. 服上药后，喉中痰鸣，痰略

成，咳嗽反应明显增强，哭声响亮

亮，但仍不会用口吮乳；痰稀白，或

白痰，泡多。

语言略完整；无“热岛”反应；

左手已能抬至150°左右；已能勉强

用单手搀扶行走数步；左手肌^张力

正常，左足肌张力略增高。左足仍

不能上翘；为假睡；排便略增多。大便正常。饮食正常。

舌滑，中心略厚。微发黄；微流涎。

脉度图略数；双指不过。

处方：上方健服

炮附片4 补骨脂3 生熟地各8

肉苁蓉5 石菖蒲 决明子5 山萸肉5

淮山6 赤芍6 炙甘草6 鹿筋6

生黄芪15 当归尾8 茯苓8 枳壳8

X6

如

4.1. 左足似更软; 杨腰痛. 如

余症减.

肺虚思; 微弦数; 尺沉弱, 永微热.

舌: 红花刺. 中心苔略厚偏黄.

处方: 巴戟天6 生熟地各6 黄由5

茯苓 薏苡 麦冬8 茯苓8 高丽5

黄芩 赤芍 炙甘草 枳壳 白芍8

法半夏4 黄连6

NO
方利 如

淮山6 赤芍6 炙甘草6 鹿筋6

生薑15 荆尾8 茯苓8 枳实8

X6

加

4.1. 左足似更软; 杨腰痛.

余症渐减.

脉虚细; 微弦数; 尺沉弱, 水微热.

舌: 嫩花刺. 中心苔略厚偏黄.

处方: 巴戟天6 生熟地各6 黄芩5

茯苓 薏苡 熟地8 茯苓8 高丽5

黄芩 赤芍 炙甘草 枳实 茯苓

法半夏4 黄芩6

NO.

卷三

99. 4.4. 腹痛除, 余症.

脉: 见有力. 舌苔见厚.

处方: 白附子3 胆南星5 已戟天4

熟地5 山萸肉5 麦冬6 茯苓6

石菖蒲4 干柏枝8 红参3 玉附子43

赤白芍各6 鹿筋6 X3

另: 竹沥10cc 姜汁4滴/次 姜

8/4. 喉中痰多, 昨日痰多,

自诉胸痛; 排便了微黄; 大便

自可.

脉：略紧；左流利。

舌：中心苔略厚。

处方：枳实、陈皮、甘草

桑叶、杏仁、胆星、葛根、厚朴

沙参 X 3

12/4. 咳除；胸膈除；肢节活动

范围更大，更有力；喉中痰鸣渐减

咳嗽反应明显；然口仍流涎，食略

减，偏腹痛，有时便前腹痛；有时

喘能饮。硬自润。口涎仍多。

脉弦滑，~~尺~~；左关流利，口尺
偏沉；左关偏沉。

舌：尖刺苔，中心及根部苔白偏厚
腻。

处方：仿理脾降饮与加减泻心汤

红参3 黄连4 赤芍药6 枳实5
熟地5
法半夏6 陈皮5 陈皮6

白术5 茯苓8 炙甘草8 胆南星6
x4

另：竹沥10cc + 姜汁7滴

姜

解:

99.4.21. 有时腰痛、服上药减轻;

有时头昏; 阴雨天右腿脚足跟痛;

食略增; 痰声度之大减; ^{语言发音更清晰;}咳嗽反

应很灵敏, 咳声响亮; 眼球运动

更灵活, 然仍微斜视; 口微渴, 较

前明显好转; 喜伸欠, 伸欠则舒;

左手已能高举伸直; 自主吃饮已有一

个月; 已能牵扶行走 200m; 流涎略

减; 大便质正常, 略色绿, 日一行;

小便增长; 服上药第一剂时左手

阶段诊断：内痰湿、气虚血瘀、肾气阴两虚。

足抖动、头摇，服第一剂时即消失；
尚能饮；
^{左膝}朝以事每周针灸一次。

脉：虚细，关上弦，尺沉弱。

舌：苔白微厚，边尖红，质红。

处方：黄芪12 红花8 枳壳6

地龙5 赤芍药8 当归尾6 木瓜8

旱莲草8 夜明草8 胆南星6 红参4

枳壳16

12剂

另：竹沥100cc+姜汁5滴/次 2/日。

叶梅影

(翻印) T:
4.25. 头痛; 38.6°C (腋);

左足痛而颤抖明显; 发热时汗;

不欲食. 然不吐; 喉中痰多; 项软.

布氏征(+). 巴氏征(+). 克氏

征(+). 小便黄. 大便两时行

脉: 数而濡弱. 按弦尺沉. 舌指热.

舌: 中心苔厚略腻淡黄.

处方: 羌活5 秦艽6 钩藤6

桑叶8 胆星5 黄芩6 厚朴6

扁豆5 黄连5 滑石4 甘草6

NO X2

406

4.29. 252 患儿李顺为即已退热.

先汗出而后热退, 病势因而愈; 今

$T: 38.4^{\circ}\text{C}$

晨又发热, 鼻微塞, 流清涕, 尚有

黄脓涕; 无汗; 自诉不甚寒; 尚能

食; 二便正常. 喉中痰声如锯, 有痰疾

脉: 略细弱, 不显按; 两肺.

舌: 尖边红少苔.

处方: 银翘散加胆皂, 桑叶 $\times 2$

献

叶

99.5.1. 发热已退; 鼻塞流涕除;

喉中痰减; 已便通; 用力时头微

胀; 饮食一般; 咳痰乏力, 有黄浓痰。

脉: 右尺欠弱; 右略数滑; 左略

弦欠流利, 脉微热。

舌: 中舌苔白厚腻, 边刺苔。

处方: 胆星6 姜厚6 石膏8

枳实6 黄芩8 连翘 沙参8

~~茯苓~~ 茯苓6 大贝母6 黄芩5

夏枯草8 射干8 桑叶6 X2

另: 竹沥100C/日 州

NO

99.5.4. 今晨微有白痰涕; 喉
喉咽湿润, 痰白稠; 口渴渴;
仍微流涎; 脘舒腹微痛;
食尚可; 无明显汗出; 二便正常;
手足自温已降; 自诉腰项无力;
头微摇.

脉不^{两腕脉}受数; 左虚; 左微

弦欠流利. 右微热. 右足仍有振颤(能
舌质偏红. 苔少而干; 根苔略^(停束).

厚

附子

门诊处方笺

科别

1999年5月4日

姓名

肖

性别

男

年龄

7

地址

R

太子参 10g

淮山药 8g

夜甘草 8g

夜远志 6g

广陈皮 6g

干地黄 6g

白术 8g

茯苓 8g

胆南星 6g

枳实 6g

法半夏 5g

生白芍 6g

十味地黄丸 陈积亮 6g

12剂

另：大活络丸 式颗 每盒三分之一颗

医师

叶梅

调剂

核发

99-5-5.

发捷. 11/21-12

138.9°C. 自国通捷令

发捷通捷令 3/8°C

去年印防被名眼用板田平
曹村. 去年印防板田.

以合. 直板田.

知部印防板田. 顺/子.

顺/子. 顺/子. 顺/子. 顺/子.

顺/子. 顺/子. 顺/子. 顺/子.

顺/子

No 2

99-5-7

发物咸, 23.8°C (合景)

~~食~~ 饮甜增, 右便叶
色淡绿可食

正庚21咸, 23.8°C (合景)

正庚21咸, 23.8°C (合景)

正庚21咸, 23.8°C (合景)

正庚21咸, 23.8°C (合景)

正庚21咸, 23.8°C (合景)

× 2

2/2

NO

99-5-8.

发热已退 36-8℃ 大便色暗
粘。

肺部听诊 脉管音

胆量 6 肝功 8 呼吸 8

血常规 6 尿 6 尿 5

血常规 8 尿 6 尿 6

血常规 8

X 3

3/2

布衣征左走(+) 余(-).

99.5.11. 无寒流涕心寒; 热已

退; 自诉无头眩头痛, 无恶心呕吐;

喉中痰鸣减, 咳痰尚有力, 痰稀;

舌少; 腹不痛; 大便尚可; 常笑头^{2/}部。

脉: 虚略通大, 寸脉略^{2/}弦, 如微热。

舌: 苔白, 中心略厚, 略红刺。

处方: 太子参 10g 白术 8g 茯苓 8g

陈皮 8g 胆南星 6g 桔梗 5g

陈皮 6g 法半夏 5g 干地黄 6g

生白芍 6g 枳实 8g 枳壳 6g

另: 大活络丸 武振 每包 1/3 包 NO 但制

5.16. 自研腰力. 晨仍交头; 与

心热; 余尿减好转;

脉弱, 左略迟. 舌苔白刺底

微红.

处方: 太子参 淮山药 泽泻

茯苓 陈皮 法半夏

炙甘草 胆星 生白芍 黄芩

姜黄 杜仲

X6

另加大剂量 四上服 妙

5.22. 左尺脉仍沉，候头管，腰
无加减，头微减，喉中痰未减。

脉：略欠流利；左微弦。

舌：白厚，微无刺。

处方：补阳还五汤加桑寄生、杜仲、

牛膝、羌活、木瓜 X 6

右石络丸

如神

5.30. 此痛降，舌仍偏少，余症减。
喜嗽

脉：已流利，右数，左略沉，右指重

羌活降，石络刺。

处方: 红参 麦冬 五味子.

胆星 法夏 茯苓 肉苁蓉

巴戟天 肉桂 补骨脂 熟地

地龙 石膏 厚朴 3g x 6

木香 枳实 炒

6.6. 夜尿甚少, 流涎甚少, 痰头微;

能独站数分钟; 左侧上下肢肌张

力明显减轻; 左足仍可触勾; 会

增, 便子常; 偏头危;

脉: 右软; 左弱; 痰头微; 痰头微; 痰头微.

5.5 续续.

NO

舌：苔中略腻。

处方：上方除熟地，肉桂，石膏

减掉。加苍术茯苓，并芍药，炙甘草

x7

如

6.15. 发热未退，无汗，然自汗亦

减。大便二日一行，腹无所苦；+

便意，尚利。

脉

脉略数；右寸浮；左脉滑。

舌：边刺；中苔略白厚腻。

处方：苍术 厚朴 扁豆

NO

银花 连翘 姜黄 枳壳

竹沥 飞滑石 甘草

另：竹沥100g/次 煎 炒

6.17. 发热退

脉：略滑数，微偏阴弦。

舌：边刺苔灰黄；中5苔

略厚。 微热。

处方：银花 连翘 枳壳 枳实

竹沥 秦艽 姜黄 胆南星

桔梗 甘草 藜芦 党参

要料 扁豆 熟 $\times 3$

6.20. 发热. 与白通. 舌苔厚腻
证

处方: 香薷 要料 扁豆

薤白 连翘 秦艽 木瓜

羌活 独活

6.21. 已能独立站立. 发

热已退 (微汗出).

况: 口微右偏; 偏头振: 摇; 伸

舌体爽. 反映灵敏. 记忆力强; 已

不流涎, 欲甜幅则不饱, 饮

咸湯則每次必咆喚，喉中痰鳴漉

漉，^{已能}自主咳嗽、咯痰。此痰，

痰為白稀。泡多，偶有少量黃痰，

白且易唾；食增；口微渴；大便

常；腰力已強；左足活動較好。但

仍弱于右側，左手指已能伸，微勾。軟弱拍

急。左臂仍不能上翻。

傳柳：腦膜刺激症及雜性事

傳柳：左臂微能舉反，其餘均消失。

左十趾伸陽張力微增強。

脈：微滑，兩尺沉；左英略強。

与指心温发热。

云质偏红，夹边花刺；左侧

舌苔略厚腻，苔黄。

处方：黄芩6 胆南星6 枳实

12g 厚朴5 茯苓5 杏仁4 青石

黄芩5 枳实5 甘草6 橘络5

麦冬6 连翘6 X 4

另：竹沥100ml ② + 姜汁2滴。

6.28. 脉细数，舌苔略白，与指
温发均已基本消失。

处方：上方除桑葚、枳椇、甘草。

加沙参6 玉竹3 $\times 3$ 妙

7.1. 上方沙参改西洋参3g $\times 7$

妙

7.11. 已能独立站立良久，扶墙行走，扶已能下蹲拾起连续3次；

虽左无力，但能端平碗筷；口微涎，

喉痛微有痰，咳嗽反射灵敏；“笑

哭”已降；腰已不软。口已渴。

脉：滑。数。弦。

舌：尖左边刺甚，质偏红；苔白厚

略减。

处方：太子参 15g 淮山 15g 茯苓 8g

决明子 6g 黄芩 12g 莲肉 8g 麦冬 6g

木瓜 8g 黄芩 4g 桔梗 4g 甘草 4g

陈皮 8g 砂仁 12g 薄荷 6g x 7

另：竹沥 100cc + 生姜汁 4滴/次 9h

② 鹿筋 10g/12

99.7.22. 近事痰多; 右腋下痛.

微呛咳; 黄涕减; 痰微黄, 有

时稀白; 咽喉; 3 粒良; 有汗; 十

△ 便黄; 次仍继续; 全身体

脉度略浮, 右肘关况.

云: 苦白杏仁剂

手指微热.

处方: 12 附已 品半仁 连翘

飞滑 赤芍 苦杏仁 桑叶

杏仁 蝉花 桑叶 西洋参

麦冬 黄芩 薄荷 陈皮

NO

x4
好

△ 鸡血藤胶

99.27/6. 喉中痰减. 偏饱咳; 转

神好. 每夜睡八小时; 饮食; 软良
张主欠, 大人与平好志.

动又略好转; 语言如前. 略量含混.

脉软; 左略流利; 右略虚. 才

略浮时.

舌: 边尖刺苔. 质正红; 中及

根苔略厚腻. 浮苔 (服了中).

处方: 熟地黄 6 荆尾 4 续断 4

茯苓 5 陈皮 5 炙甘草 6 党参 8 鸡血藤 8

白术 6 枳梗 5 熟枣 6. X 6

① 煎法: 10g/12. 熬汤.

③ 竹沥 10cc/次 饭前送下 4 角 另抄

1/8. 今晨恶寒. 发热(38.9°C); 鼻

不塞. 痰量浓涕(已两天); 咳. 痰多. 有

色, 有时有黄痰; 无汗; 两腮曾胃

腹不适; 不吐; 大便正常; 小便尚常. 无

黄; 头痛; 四肢疼; 腰膝酸痛.

特标:

检查: 胸脊刺激(+) ; 右下肺有

湿性啰音(+) .

脉: 略滑数. 偏数. 尺欠弱.

拒否. 趾热; 好热;

舌: 舌红 | 苔质红, 中苔略黄厚腻.

处方：麻黄₆ 杏仁₆ 杏仁₆
 炙甘草₆ 石膏₁₀ 天竺黄₅ 芦根₆
 杏仁₁₂ 枳实₃ 杏仁₆ 滑石₆
 石膏₄ 杏仁₅

8.5. 发热退，但仍黄痰，有痰；
 有黄痰，痰黄甚浓；右足冷；有
 汗，切大脉；口渴；舌减；二便尚可。

脉：浮数而软。手指热减
 舌：未微红。剥苔。

外方: 银花 连翘 桔梗
甘草 桑叶 杏仁 薄荷
芦根 金银花 苏叶 枳壳/双配
沙参 前胡 射干 大贝母

苏叶汤 10cc + 射干汤 2/3
2/4 妙

8.8. 低热似退, 然咳(夜甚).
痰多, 痰液, 无痰, 左足痛减;

哭声高亢, 微有汗; 不欲食。
略咳

脉沉取不受按; 右寸旺; 左
略强欠流利。手温热。

舌: 尖边剥苔. 质嫩红; 中5苔
略黄燥.

处方: 清化痰丸合增液散
加沙参. 银花. 苡米. 大通草.
晚露砂. 麦冬. 地骨皮. 桑白皮
竹沥100cc + 姜汁2滴/次 2次

13. 喉中痰大减; 痰略黄.
余痰均降. 流涎

脉: 欠流利. 右漫按; 右寸略浮;

左腕弱。

左寸略强，右寸偏已降。

右：花刺，中心苦偏要时是，已
可赋。

△ 停抗弱已半个月。已能独立
站立十分钟。

处方：金水与君煎加黄芩
滑石。沙参。麦冬。百合 X 6

另：竹沥 + 生姜汁（同上）

8.21. 咳已1天；有黄浓痰；流涕
涕；要心；鼻敏感；微热（37.5℃）；

不要肉；大便二三日一次，先硬后软；

脉：略浮弦细。

舌：质红，苔略白厚。

处方：麻、杏、苁、甘、前胡、
黄芩、射干、沙参、竹茹、地龙、菖蒲 x3

妙

8.28 府大减。

脉：略数；右略滑，寸略旺；

左欠流利，略受按；脉微弦。

舌：尖略红而刺苔；苔白

厚賦.

处方: 桑菊飲加養陰. 荆芥.

身汗. 前胡. 葛根. 黃芩 $\times 3$ 如

8.29. 微咳.

脈: 右寸微浮, 关尺略沉; 左寸微弦滑. 舌同前微黃.

处方: 上方加沙參 $\times 3$ 如

9.5. 右手微熱.

脈: 細弱. 尺沉弱; 右寸浮.

石: 尖刺苣. 苦杏仁

处方: 太子参 10 熟地 6 附子 4

石膏 4 远志 6 茯苓 6 枳实 6

大建菴 8 苣荬 8 黄芩 6 熟地 6

枳实 5 黄芩 8

X 7

叶

9.15. 尿软; 尿微热; 舌苔

外母已发苔, 白苔已退;

唾涎多, 余症又减.

处方: 上方除枳实. 甘草. 加菴 12 4

NO

X 7 叶

9.30. 单步能行路一里以上;

腰膝少; 口渴;

脉略滑. 尺沉弱. 心热.

石: 史也祥, 中及根苔厚腻.

处方: 生山台厚煎加茯苓. 查

智仁. 大豆蔻卷. 鹿筋. 13年陈 X 10
黄参

② 金匱水 (桂枝汤) 式并
按法酌减

③ 竹沥 5cc + 姜汁 3滴/次
2次/日 妙

9.30. 单车能行路一里以上;

尿少; 口渴;

脉略滑. 尺沉弱. 舌红.

石: 史迪祥, 中心及根茎厚层皮.

处方: ① 羌活 6g 苍术 6g 独活 6g 桑寄生 10g

骨节. 大豆黄卷. 鹿筋. 何首乌 X10
黄芩 8g

② 金匱丸 (桂枝汤) 式并
按元明版

③ 竹沥 500 + 姜汁 300g
2次/日 妙

99. 10.23. 唯厚口水.

脉: 欠流利.

舌: 苔厚但微腻. 左边有一小块

微红刺苔.

④依

处方: 理脾解痰加熟地. 黄芩

既 苍智仁. 竹沥 5cc + 姜汁 5 滴. x 7

⑤金鹿丸

妙

11.13. 已能晚食. 十余日, 但欠稳;

仍流涎, 咯痰明显, 色如泡, 量

名; 偏腰痛; 硬子常, 饮色暗的
子常.

脉: 略欠流利; 脉微自通.

舌: 尖边刺点, 质微红; 中心苔
略厚腻.

处方: ① 麦冬 10g 川贝 3g

射干 10g 每包煎药或加入
转内汤煎煮.

② 全鹿丸.

按说明书吞服

③ 九制陈皮

如

1包/3次

NO

2000.元.21. 近因走过路,突然足软

而受伤,现左膝疼痛(行刺痛).

局部不红不肿,左膝内侧微有压痛;

换牙齿迟;

脉:虚弱,尺沉弱;左略细;左

平数右平.

治法:补虚益精.

处方:①熟地黄₁₂ 改皂角

解 鹿角胶₈ 麻黄₄ 炮姜炭₄ 甘草₁₀

白芥子₃ 肉桂₁₉ 田三七₄ 5-21
NO 对

2000.元.28. 足痛降, 行走有力

服: 鹿药. 片院

石: 剥苔处微长苔, 苔略厚腻
微作苔.

处方: ① 莲子心 黄芩 加大
未煮药每口一克

② 全鹿丸 十鹿筋.

2.29. 既有服阳和汤苔长较速, 反换

牙后新苔2年不长, 既明拿: 独立行走较

吃力, 左腿软; 说话稍含糊缓慢,

口流涎涎; 偏于左侧时吮吸, 食不多;

尿潴射力偏差; 喜右侧卧位, 自折

左侧卧位时有时左臂有疼痛。

脉象: 右关略弦, 尺沉弱。

舌: 左侧花剥。

处方: 补骨脂 2 菟丝子 8 茯苓 6

白术 5 炙甘草 6 党参 12.5 炒白芍 6

生姜 4 蔓荆子 6 巴戟天 13 熟地黄 6

鹿角 5 当归 4

X 10

另: 金匱丸 新接皮明眼 NO

3.12. 左膝微凉. 3款; 大便微干.

脉: 右脉虚减. 余同前.

舌: 花剥.

处方: 黄芪10 熟地黄3

茯苓8 白术8 麦冬8

熟地黄8 黄芩8 巴戟天8 当归6

太子参8 鹿筋5 独活5 X 半剂

另: 金匱丸 鹿筋片 附

3.21. ^昨自“感冒”，^鼻鸣，^{流涕}涕，
嚏多；行路则汗；口不渴，仍微
流涎；头不昏，耳不鸣，
不^不发热。余^不常饮良硬子常。

脉不受按，两尺沉弱；右寸浮。

舌：舌体大，根微红。

处方：玉屏散加^{荆芥}， \times 又
附注：近来学训流涎多为上志

合併咽痛、咳嗽，一部份有耳

鸣耳。

3.24. 迷胃症已降。

脉：引流利；右寸略旺。关尺略沉

弱；左微热。

舌：苔厚腻色白，右刺舌根。

处方：异功散加姜、黄芩。

紫苏叶

x 3

叶

4. 6. 已能独立行走良久，微热（左足明

重）；口流涎；右指^微温温发热；

脉：左略欠流利，^略不^略受按；

舌：微花赤

NO

处方：木瓜6 大皂莢8 透骨草8

茯苓8 黄芩8 熟地6 杜仲8

地牛膝8 虎骨5 龟板12 威灵6

羌活5

X10

另：全鹿丸 10粒

抄

2000.7.4.主诉:发热已两天(因夜热
解时吹风扇而起)鼻塞塞,涕黄浓,
咳嗽.

问:汗少,有时无汗,咽西药因热
剂始汗出;有时畏寒.自诉有时咳
不止.自觉喉中痰阻难以咳出(原
抢救时气管插管维持了两个多月,晚
间有痰上缘仍面有凹陷的疤痕),
有时咳声高亢;痰多色白泡沫,常
有黄浓痰;口不甚渴,饮不多;无胸闷;

2000.7.4. 主诉：发热已两天（因夜热
解时吹风扇而起）鼻塞寒，涕黄浓，
咳嗽。

问：汗少，有时无汗，咽西药退热
剂据平素；有时畏寒；自诉有时咳
不止。自觉喉中痰阻难以咳出（原
抢救时气管插管维持了两个月，现
胸骨柄上缘仍留有凹陷的疤痕），
有时咳声高亢；痰多色白泡沫，常
有黄浓痰，口不甚渴，饮多；无胸闷；

头痛，食尚可，不呕；大便正常，

小便量畅利，左降降已两天。

脉：略滑数；右略细弦；左

略软。心热。

舌：苔花剥。

处方：香薷6 银花18 连翘6

厚朴6 白芍5 炙甘草6 桔梗5

甘草 竹叶8 杏仁6 胆南星6

前胡6 黄连4

X2

抄

NO

2000.7.6. 喉中^{喉中}痰涎，痰涎^{痰涎}；

服上药后痰涎^{痰涎}即愈。

自诉喉中痰涎^{痰涎}而喘略^{喘略}；

舌^舌干，痰涎^{痰涎}稀，微黄；

脉：弦滑略大。

舌：花刺。

处方：桑菊饮加^加枇杷^{枇杷}、郁^郁、浙^浙

贝^贝、桔^桔、麦^麦、黄^黄、

x 3
抄

7.19. 左膝酸痛, 阴雨天前甚; 数日佳.

脉: 微软滑; 右寸关略沉.

舌: 暗花刺, 苔白厚(左侧厚).

处方: 四妙汤加熟地, 木瓜

防己. 茯苓

x4

抄

2000.

10.22. 近晚夜明显, 喉中有痰.

173x8.

脉: 略滑. 关偏浮.

舌: 苔中白略厚. 边及根

葛刺

手指微屈，掌心微扣。

处方：新叶，杏仁，桔梗

甘草 厚朴 糖 附石

酸枣 枳 竹茹 枳壳

黄芩 熟

X 3

2000

5/11. 咳，涕痰，已3天。

问：黄痰涕痰；

脉：软滑；手指微屈。

示：边尖葛刺；中心葛偏厚。

NO

处方：桑菊饮加滑. 苁. 前.
木瓜. 参. x4
如

2000.12.13. 舌：边刺苔，中心黄白滑. 略重

脉：右虚濡大，左细弦.

左膝痛（天阴雨）.

处方：忍冬藤8 全蝎6

甘草8 玄参6 防己8 木瓜8

桑枝6 海桐皮8 独活8 x4
如