

PUBLICATION · FICHE DE VULGARISATION

Hépatite B : un tiers des nouveau-nés du Kabadougou ratent leur premier vaccin.

Seuls 68,4 % des nouveau-nés du Kabadougou reçoivent la dose de naissance contre l'hépatite B. HUÉ Bi Tahié Aubain a identifié les freins et les leviers.

Publié le
21 octobre 2026

Lecture
2 min

En ligne
hubscientifiqueafricain.com

TITRE DE L'ÉTUDE

« Factors influencing vaccination coverage for the birth dose of hepatitis B vaccine in Kabadougou, Côte d'Ivoire, 2025: Analytical cross-sectional study », ***Journal of Interventional Epidemiology and Public Health*****, vol. 9 n°1, mars 2026.**

01

Contexte

L'OMS recommande d'administrer la dose de naissance du vaccin contre l'hépatite B dans les 24 heures, avec un objectif de couverture de 90 %. Dans la région du Kabadougou, la couverture administrative variait entre 49 % et 71 % de 2020 à 2023, et de 0 % à 100 % selon les aires de santé.

02

Problème

HUÉ Bi Tahié Aubain a voulu identifier les facteurs qui expliquent que cette dose ne soit pas administrée dans les 72 heures suivant la naissance.

03

Méthode

En août 2025, dans les districts d'Odienné et de Madinani, HUÉ Bi Tahié Aubain et son équipe ont tiré au sort 450 enfants nés entre janvier 2020 et août 2025 (15 grappes de 30), interrogé leurs gardiens ainsi que 15 agents de santé, et vérifié les carnets et registres de vaccination.

04

Résultats

La couverture de la dose de naissance atteint 68,4 %. Aucune rupture de vaccin n'a été relevée sur 12 mois et les 15 structures disposaient d'un réfrigérateur fonctionnel. L'accouchement à domicile (ORa = 5,7) et les croyances locales défavorables (ORa = 4,7) sont fortement associés à la non-vaccination. À l'inverse, posséder le carnet mère-enfant (ORa = 0,1) et avoir été informée de cette dose pendant les consultations prénatales (ORa = 0,3) sont protecteurs.

05

Ce que ça change

HUÉ Bi Tahié Aubain recommande de promouvoir l'accouchement en structure sanitaire, de sensibiliser les communautés pour lever les croyances défavorables, de remettre systématiquement le carnet de vaccination, de renforcer la formation des agents et d'intégrer le dépistage prénatal de l'hépatite B dans l'élimination de la transmission mère-enfant.

06

Qui peut s'en servir

Direction de Coordination du Programme Élargi de Vaccination, Programme National de Lutte contre les Hépatites Virales, Direction régionale de la santé du Kabadougou, INHP, sages-femmes et maternités, Gavi, UNICEF et OMS.

07

Statut

Publié (mars 2026)

08

Contact

HUÉ Bi Tahié Aubain, Direction de Coordination du Programme Élargi de Vaccination (DC-PEV), Abidjan · docteur.hbta@gmail.com

09

Appel à l'action

Vous agissez pour la vaccination ou la santé maternelle ? Contactez HUÉ Bi Tahié Aubain pour cibler les leviers qui feront grimper la couverture.

HSA

Parce qu'une recherche qui reste uniquement dans les publications scientifiques ou qui dort dans les tiroirs ne réalise qu'une partie de son potentiel, **Hub Scientifique Africain (HSA)**, le réseau social n°1 pour vulgariser et valoriser les résultats de recherches en Afrique, accompagne les chercheurs, doctorants et innovateurs africains en communication scientifique, en valorisation de la recherche et en création d'impact.

Rejoindre la communauté

Lire l'article en ligne

Scannez pour lire l'article en ligne

Icônes : Objectifs de développement durable, Nations Unies (usage informatif). © Hub Scientifique Africain — hubscientifiqueafricain.com