

PUBLICATION · FICHE DE VULGARISATION

Vaccins des bébés : la peur du Covid a fait hésiter près d'un parent sur deux.

Pendant la COVID-19, 46,68 % des parents reçus à l'INHP hésitaient à faire vacciner leur bébé. Djedjro Franck Renaud MELESS révèle pourquoi, commune par commune.

Publié le
23 octobre 2026

Lecture
2 min

En ligne
hubscientifiqueafricain.com

TITRE DE L'ÉTUDE

« Connaissances, attitudes et modélisation du refus de vaccination des enfants par les usagers du programme élargi de vaccination en Côte d'Ivoire durant la COVID-19 », *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, **vol. 7 n°2, octobre 2025.**

01

Contexte

La COVID-19 a bousculé les priorités sanitaires et perturbé le Programme Élargi de Vaccination (PEV), qui bénéficiait jusque-là d'une forte adhésion en Côte d'Ivoire. Désinformation, méfiance envers les institutions et rumeurs sur les réseaux sociaux se sont invitées dans les centres de vaccination.

02

Problème

Djedjro Franck Renaud MELESS et ses collègues de l'INHP ont cherché à savoir quels facteurs ont poussé des parents à retarder ou refuser les vaccins de routine de leurs enfants pendant la pandémie.

03

Méthode

Du 26 avril au 14 mai 2021, l'équipe de Djedjro Franck Renaud MELESS a interrogé en face-à-face 422 parents ou tuteurs d'enfants de 0 à 11 mois au centre de vaccination de l'INHP à Abidjan. Les réponses ont été analysées commune par commune (analyse des correspondances multiples) puis par régression logistique.

04

Résultats

46,68 % des parents étaient réticents ou refusaient la vaccination de leur enfant, alors que 99,53 % connaissaient la COVID-19. Premier facteur de refus : la peur que l'enfant reçoive un vaccin anti-COVID à la place des vaccins du PEV (risque multiplié par 6,57). La crainte d'effets secondaires graves des vaccins de routine multiplie aussi le risque par 3,63. Les motifs varient selon les communes : peur de la contamination et rumeurs à Port-Bouët, Yopougon ou Abobo, peur de la substitution vaccinale à Cocody, Treichville ou Koumassi.

05

Ce que ça change

Les auteurs recommandent une communication ciblée contre les rumeurs, différenciée selon les communes, avec l'appui des associations et des chefs religieux, ainsi que la formation continue des soignants à la gestion de l'hésitation vaccinale.

06

Qui peut s'en servir

Direction de Coordination du PEV, INHP, Ministère de la Santé (communication et promotion de la santé), districts sanitaires d'Abidjan, UNICEF, OMS, Gavi, agents de santé communautaire, leaders religieux.

07

Statut

Publié (octobre 2025).

08

Contact

MELESS Djedjro Franck Renaud, Institut National d'Hygiène Publique (INHP) et Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan · MDFRENAUD@yahoo.com · Téléphone : +225 0749597587

09

Appel à l'action

Vous préparez une campagne de vaccination ou de lutte contre les rumeurs ? Écrivez à Djedjro Franck Renaud MELESS pour adapter vos messages commune par commune.

HSA

Parce qu'une recherche qui reste uniquement dans les publications scientifiques ou qui dort dans les tiroirs ne réalise qu'une partie de son potentiel, **Hub Scientifique Africain (HSA)**, le réseau social n°1 pour vulgariser et valoriser les résultats de recherches en Afrique, accompagne les chercheurs, doctorants et innovateurs africains en communication scientifique, en valorisation de la recherche et en création d'impact.

Rejoindre la communauté

Lire l'article en ligne

Scannez pour lire l'article en ligne

Icônes : Objectifs de développement durable, Nations Unies (usage informatif). © Hub Scientifique Africain — hubscientifiqueafricain.com