

L'arithmétique de Peano.

- ▷ DEDEKIND (1888) et PEANO (1889) formalisent l'arithmétique.
- ▷ En 1900, David HILBERT, lors du 2ème ICM à Paris, donne un programme et dont le 2nd problème est la *cohérence de l'arithmétique*.
- ▷ En 1901, RUSSEL donne son paradoxe concernant l'« ensemble » de tous les ensembles.
- ▷ En 1930, (Hilbert) est toujours optimiste : « On doit savoir, on saura ! »

La formalisation de l'arithmétique engendre deux questions :

1. est-ce que tout théorème est prouvable ? (▷ complétude)
2. existe-t-il un algorithme pour décider si un théorème est prouvable ? (▷ décidabilité)

Le second point est appelé « *Entscheidungsproblem* », le problème de décision, en 1928.

- ▷ En 1931, Gödel répond NON à ces deux questions.

On a donné plusieurs formalisations des algorithmes :

- ▷ en 1930, le λ -calcul de Church ;
- ▷ en 1931–34, les fonctions récursives de Herbrand et Gödel ;
- ▷ en 1936, les machines de Turing.

On démontre que les trois modèles sont équivalents.

La thèse de Church–Turing nous convainc qu'il n'existe pas de modèle plus évolué « dans la vraie vie ».

1 Les axiomes.

On définit le langage $\mathcal{L}_0 = \{\textcircled{0}, \textcircled{\mathbf{S}}, \oplus, \otimes\}$ où

- ▷ $\textcircled{0}$ est un symbole de constante ;
- ▷ $\textcircled{\mathbf{S}}$ est un symbole de fonction unaire ;
- ▷ \oplus et \otimes sont deux symboles de fonctions binaires.

On verra plus tard que l'on peut ajouter une relation binaire \leq .

Remarque 1 (Convention). La structure \mathbb{N} représente la \mathcal{L}_0 -structure dans laquelle on interprète les symboles de manière habituelle :

- ▷ pour $\textcircled{0}$, c'est 0 ;
- ▷ pour $\textcircled{\mathbf{S}}$, c'est $\lambda n.n + 1$ (*i.e.* $x \mapsto x + 1$) ;
- ▷ pour \oplus , c'est $\lambda n \lambda m.n + m$;
- ▷ pour \otimes , c'est $\lambda n \lambda m.n \times m$.

Les axiomes de Peano.

On se place dans le cas égalitaire. L'ensemble \mathcal{P} est composé de \mathcal{P}_0 un ensemble fini d'axiomes (A1–A7) et d'un schéma d'induction (SI).

Trois axiomes pour le successeur :

- A1.** $\forall x \neg(\textcircled{\mathbf{S}} x = \textcircled{0})$
- A2.** $\forall x \exists y (\neg(x = \textcircled{0}) \rightarrow x = \textcircled{\mathbf{S}} y)$
- A3.** $\forall x \forall y (\textcircled{\mathbf{S}} x = \textcircled{\mathbf{S}} y \rightarrow x = y)$

Deux axiomes pour l'addition :

- A4.** $\forall x (x \oplus \textcircled{0} = x)$
- A5.** $\forall x \forall y (x \oplus (\textcircled{\mathbf{S}} y) = \textcircled{\mathbf{S}}(x \oplus y))$

Deux axiomes pour la multiplication :

- A6.** $\forall x (x \otimes \textcircled{0} = \textcircled{0})$
- A7.** $\forall x \forall y (x \otimes (\textcircled{\mathbf{S}} y) = (x \otimes y) \oplus x)$

Et le schéma d'induction :

- SI.** Pour toute formule F de variables libres x_0, \dots, x_n ,

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \left(\left(F(\textcircled{0}, \dots, x_1, \dots, x_n) \wedge \forall x (F(x, x_1, \dots, x_n) \rightarrow F(\textcircled{\mathbf{S}}x, x_1, \dots, x_n)) \right) \rightarrow \forall x F(x, x_1, \dots, x_n) \right).$$

Remarque 2. \triangleright Le schéma est le SI avec hypothèse faible, qui permet de montrer le SI avec hypothèse forte. On adopte la notation $\forall y \leq x F(y, x_1, \dots, x_n)$ pour

$$\forall y \left((\exists z z \oplus y = x) \rightarrow F(y, x_1, \dots, x_n) \right).$$

Le SI avec hypothèse forte est :

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \left(\left(F(\textcircled{0}, \dots, x_1, \dots, x_n) \wedge \forall x ((\forall y \leq x F(y, x_1, \dots, x_n)) \rightarrow F(\textcircled{\mathbf{S}}x, x_1, \dots, x_n)) \right) \rightarrow \forall x F(x, x_1, \dots, x_n) \right)$$

- \triangleright L'ensemble \mathcal{P} est non-contradictoire car \mathbb{N} est un modèle, appelé *modèle standard*.
- \triangleright On peut remplacer le SI par une nouvelle règle de démonstration :

$$\frac{\Gamma \vdash F(\textcircled{0}) \quad \Gamma \vdash \forall y (F(y) \rightarrow F(\textcircled{\mathbf{S}}y))}{\Gamma \vdash \forall x F(x)} \text{rec}.$$

Exercice 1. Montrer l'équivalence entre SI et la nouvelle règle **rec**, *i.e.* on peut démontrer les mêmes théorèmes.

Notation. On note \textcircled{n} le terme $\underbrace{\textcircled{\mathbf{S}} \cdots \textcircled{\mathbf{S}}}_{n \text{ fois}} \textcircled{0}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Définition 1. Dans une \mathcal{L}_0 -structure, on dit qu'un élément est *standard* s'il est l'interprétation d'un terme \textcircled{n} avec $n \in \mathbb{N}$.

Remarque 3. Dans \mathbb{N} (le modèle standard), tout élément est standard.

Théorème 1. Il existe des modèles de \mathcal{P} non isomorphes à \mathbb{N} .

- Preuve.** 1. Avec le théorème de Löwenheim-Skolem, il existe un modèle de \mathcal{P} de cardinal κ pour tout $\kappa \geq \aleph_0$, et $\text{card } \mathbb{N} = \aleph_0$.
2. Autre preuve, on considère un symbole de constante c et on pose $\mathcal{L} := \mathcal{L}_0 \cup \{c\}$. On considère la théorie

$$T := \mathcal{P} \cup \{ \neg(c = \overline{n}) \mid n \in \mathbb{N} \}.$$

Montrons que T a un modèle. Par le théorème de compacité de la logique du premier ordre, il suffit de montrer que T est finiment satisfiable. Soit $T' \subseteq_{\text{fini}} T$: par exemple,

$$T' \subseteq \mathcal{P} \cup \{ \neg(c = \overline{n}_1), \neg(c = \overline{n}_2), \dots, (c = \overline{n}_k) \},$$

et $n_k \geq n_1, \dots, n_{k-1}$. On construit un modèle de T' correspondant à \mathbb{N} où c est interprété par $n_k + 1$. Ainsi, T' est satisfiable et donc T aussi avec un modèle \mathcal{M} .

Montrons que \mathbb{N} et \mathcal{M} ne sont pas isomorphes. Par l'absurde, supposons que $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{N}$ soit un isomorphisme. Alors $\gamma := \varphi(c_{\mathcal{M}})$ satisfait les mêmes formules que $c_{\mathcal{M}}$, par exemple, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $\mathcal{M} \models \neg(c = \overline{n})$. Or, on ne peut pas avoir $\mathbb{N} \models \neg((\gamma) = \overline{n})$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. **Absurde.**

□

On a montré que tous les modèles isomorphes à \mathbb{N} n'ont que des éléments standards.

Théorème 2. Dans tout modèle \mathcal{M} de \mathcal{P} ,

1. l'addition est commutative et associative ;
2. la multiplication aussi ;
3. la multiplication est distributive par rapport à l'addition ;
4. tout élément est *régulier* pour l'addition :

$$\mathcal{M} \models \forall x \forall y \forall z (x \oplus y = x \oplus z \rightarrow y = z) ;$$

5. tout élément non nul est régulier pour la multiplication :

$$\mathcal{M} \models \forall x \forall y \forall z ((\neg(x = \textcircled{0}) \wedge x \otimes y = x \otimes z) \rightarrow y = z) ;$$

6. la formule suivante définit un ordre total sur \mathcal{M} compatible avec $+$ et \times :

$$x \leq y \text{ ssi } \exists z (x \oplus x = y).$$

Preuve. On prouve la commutativité de $+$ en trois étapes.

1. On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x (\textcircled{0} \oplus x = x)$. On utilise le SI avec la formule $F(x) := (\textcircled{0} \oplus x = x)$.
 - ▷ On a $\mathcal{P} \vdash \textcircled{0} \oplus \textcircled{0} = \textcircled{0}$ par A4.
 - ▷ On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x F(x) \rightarrow F(\textcircled{\text{S}}x)$, c'est à dire :

$$\forall x ((\textcircled{0} \oplus x = x) \rightarrow (\textcircled{0} \oplus (\textcircled{\text{S}}x) = \textcircled{\text{S}}x)).$$

On peut le montrer par A5.

Questions/Remarques :

- ▷ Pourquoi pas une récurrence normale ? On n'est pas forcément dans \mathbb{N} !
 - ▷ Grâce au théorème de complétude, on peut raisonner sur les modèles, donc en maths naïves.
2. On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x \forall y \textcircled{\text{S}}(x \oplus y) = (\textcircled{\text{S}}x) \oplus y$. On veut utiliser le schéma d'induction avec $F(x, y) := \textcircled{\text{S}}(x \oplus y) = (\textcircled{\text{S}}x) \oplus y$. Mais ça ne marche pas... (Pourquoi ?)

La bonne formule est $F(y, x) := \textcircled{\text{S}}(x \oplus y) = (\textcircled{\text{S}}x) \oplus y$.

- ▷ On montre $\mathcal{P} \vdash F(\textcircled{0}, x)$, c'est à dire

$$\mathcal{P} \vdash \textcircled{\text{S}}(x \oplus \textcircled{0}) = (\textcircled{\text{S}}x) \oplus \textcircled{0}.$$

Ceci est vrai car

$$\textcircled{\text{S}}(x \oplus \textcircled{0}) \underset{\text{A4}}{=} \textcircled{\text{S}}x \underset{\text{A4}}{=} (\textcircled{\text{S}}x) \oplus \textcircled{0}.$$

▷ On a $\mathcal{P} \vdash F(y, x) \rightarrow F(\mathbb{S}y, x)$ car : si $\mathbb{S}(x \oplus y) = (\mathbb{S}x) \oplus y$, alors

$$\mathbb{S}(x \oplus (\mathbb{S}y)) \underset{A5}{=} \mathbb{S}(\mathbb{S}(x \oplus y)) \underset{\text{hyp}}{=} \mathbb{S}((\mathbb{S}x) \oplus y) \underset{A5}{=} (\mathbb{S}x) \oplus (\mathbb{S}y).$$

3. On utilise le SI avec $F(x, y) := (x \oplus y = y \oplus x)$. D'une part, on a $F(\mathbb{O}, y) = (\mathbb{O} \oplus y = y \oplus \mathbb{O})$ par 1 et A4. D'autre part, si l'on a $x \oplus y = y \oplus x$ alors $(\mathbb{S}x) \oplus y = y \oplus (\mathbb{S}x)$ par A5 et 2. Par le SI, on conclut.


□

Exercice 2. Finir la preuve du théorème.

2 Liens entre \mathbb{N} et un modèle \mathcal{M} de \mathcal{P} .

Définition 2. Si $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$ et $\mathcal{N} \models \mathcal{P}_0$ et \mathcal{N} une sous-interprétation de \mathcal{M} , on dit que \mathcal{N} est un segment initial de \mathcal{M} , ou que \mathcal{M} est une extension finale de \mathcal{N} , si pour tous $a, b, c \in |\mathcal{M}|$ avec $a \in |\mathcal{N}|$ on a :

1. si $\mathcal{M} \models c \leq a$ alors $c \in |\mathcal{N}|$;
2. si $b \notin |\mathcal{N}|$ alors $\mathcal{M} \models a \leq b$.



Remarque 4. ▷ Les points peuvent être incomparables et dans \mathcal{M} .

- ▷ L'ensemble \mathcal{P}_0 est très faible, on ne montre même pas que \oplus commute ou que \leq est une relation d'ordre (c.f. TD).

Théorème 3. Soit $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$. Alors, le sous-ensemble de \mathcal{M} sui-

vant est une sous-interprétation de \mathcal{M} qui est un segment initial et qui est isomorphe à \mathbb{N} :

$$\left\{ a \in |\mathcal{M}| \mid \begin{array}{l} \text{il existe } n \in \mathbb{N} \text{ et } a \\ \text{est l'interprétation} \\ \text{de } \overline{n} \text{ dans } \mathcal{M} \end{array} \right\}.$$

Preuve. 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \overline{n+1} = \mathbf{S} \overline{n}$.

2. Pour tout $n, m \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \overline{m} \oplus \overline{n} = \overline{m+n}$.

3. Pour tout $n, m \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \overline{m} \otimes \overline{n} = \overline{m \times n}$.

4. Pour tout $n \in \mathbb{N}_*$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \neg(\overline{n} = \mathbf{0})$.

5. Pour tout $n \neq m$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \neg(\overline{m} = \overline{n})$.

6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ (admis), on a

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall x \left(x \leq \overline{n} \rightarrow (x = \mathbf{0} \vee x = \mathbf{1} \vee \dots \vee x = \overline{n}) \right).$$

7. Pour tout x , on a $\mathcal{P}_0 \vdash \forall x (x \leq \overline{n} \vee \overline{n} \leq x)$.

□

3 Les fonctions représentables.

Cette section détaille un outil technique pour montrer le théorème d'incomplétude de Gödel vu plus tard. On code tout avec des entiers !

Définition 3. Soit $f : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction totale et $F(x_0, \dots, x_p)$ une formule de \mathcal{L}_0 . On dit que F *représente* f si, pour tout p -uplet d'entiers (n_1, \dots, n_p) on a :

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall y \left(F(y, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_p}) \leftrightarrow y = \overline{f(n_1, \dots, n_p)} \right).$$

On dit que f est *représentable* s'il existe une formule qui la représente.

Un ensemble de p -uplets $A \subseteq \mathbb{N}^p$ est *représenté* par $F(x_1, \dots, x_p)$

si pour tout p -uplet d'entiers (n_1, \dots, n_p) , on a

1. si $(n_1, \dots, n_p) \in A$ alors $\mathcal{P}_0 \vdash F(n_1, \dots, n_p)$;
2. si $(n_1, \dots, n_p) \notin A$ alors $\mathcal{P}_0 \vdash \neg F(n_1, \dots, n_p)$.

On dit que A est *représentable* s'il existe une formule qui le représente.

Exercice 3. Montrer qu'un ensemble est représentable ssi sa fonction indicatrice l'est.

Exemple 1 (Les briques de base des fonctions récursives).

- ▷ La fonction nulle $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto 0$ est représentable par $F(x_0, x_1) := x_0 = \textcircled{0}$.
- ▷ Les fonctions constantes $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto n$ sont représentables par $F(x_0, x_1) := x_0 = \textcircled{n}$, où $n \in \mathbb{N}$.
- ▷ Les projections $\pi_p^i : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}, (x_1, \dots, x_p) \mapsto x_i$ sont représentables par $F(x_0, x_1, \dots, x_p) := x_0 = x_i$.
- ▷ La fonction successeur $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x + 1$ est représentable par $F(x_0, x_1) := x_0 = (\textcircled{\text{S}} x_1)$.
- ▷ L'addition $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}, (x, y) \mapsto x + y$ est représentable par $F(x_0, x_1, x_2) := x_0 = x_1 \oplus x_2$.
- ▷ La multiplication $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}, (x, y) \mapsto x \times y$ est représentable par $F(x_0, x_1, x_2) := x_0 = x_1 \otimes x_2$.

Théorème 4. Toute fonction récursive totale est représentable.