

Logique

*Basé sur le cours de Natacha PORTIER
Notes prises par Hugo SALOU*



7 mai 2026

Table des matières

Introduction.	4
1 Le calcul propositionnel.	5
1.1 Syntaxe.	5
1.2 Sémantique.	7
1.3 <i>Annexe</i> : preuve détaillée du lemme de lecture unique.	14
2 La logique du premier ordre.	18
2.1 Les termes.	18
2.2 Les formules.	21
2.3 Les démonstrations en déduction naturelle.	25
2.4 La sémantique.	27
2.5 Théorème de complétude de Gödel.	38
2.5.1 Preuve du théorème de correction.	40
2.5.2 Preuve du théorème de complétude.	42
2.5.3 Compacité.	48
3 L'arithmétique de Peano.	51
3.1 Les axiomes.	52
3.2 Liens entre $\mathbb{N}$ et un modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{P}$	56
3.3 Les fonctions représentables.	58
3.4 Indécidabilité des théories consistantes contenant $\mathcal{P}_0$	65
3.4.1 Codage des suites d'entiers.	67
3.4.2 Les termes.	67
3.4.3 Les formules.	68
3.4.4 Opérations sur les formules.	69
3.4.5 Codage des preuves.	70
3.4.6 Codage des preuves en déduction naturelle.	71
3.4.7 Théories (in)décidables.	73

3.5	Théorèmes d'incomplétude de Gödel	76
4	La théorie des ensembles.	81
4.1	Les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel.	81
4.2	Ordinaux et induction transfinie.	88
4.3	Axiome de choix et variantes équivalentes.	96
4.3.1	AC 1 implique AC 2.	97
4.3.2	AC 2 implique AC 3.	97
4.3.3	AC 3 implique AC 1.	97
4.3.4	AC 2 implique Zermelo.	97
4.3.5	Zermelo implique AC 2.	98
4.3.6	Zorn implique AC 3.	99
4.3.7	AC 2 implique Zorn.	99
4.3.8	Indépendance de ZF et de l'axiome du choix.	100
5	Exemples de théories décidables.	101
5.1	De quoi on parle ?	101
5.1.1	L'élimination des quantificateurs.	101
5.1.2	Les corps réels clos et le théorème de Tarski.	102
5.2	La méthode d'élimination.	105
5.2.1	Rappels et exemples.	105
5.2.2	Énoncé comme lemme clé.	106
5.3	Corps algébriquement clos.	108
5.3.1	Applications aux mathématiques.	111

Introduction.

Dans ce cours, on s'intéressera à quatre thèmes :

- ▷ la théorie des modèles (▷ les « vraies » mathématiques) ;
- ▷ la théorie de la démonstration (▷ les preuves) ;
- ▷ la théorie des ensembles (▷ les objets) ;
- ▷ les théorèmes de Gödel (▷ les limites).

On ne s'intéressera pas à la calculabilité, car déjà vue en cours de FDI. Ce cours peut être utile à ceux préparant l'agrégation d'informatique.

Note 0.1. Merci à Quentin Vermande et Lison Blondeau-Patissier pour leurs corrections de typos, et retours sur ces notes de cours.

1 Le calcul propositionnel.

Dans ce chapitre, on s'intéressera à

1. la construction des formules ($\triangleright$ la syntaxe) ;
2. la sémantique et les théorèmes de compacité ($\triangleright$ la compacité sémantique).

1.1 Syntaxe.

Définition 1.1. Un *langage*, ou *alphabet*, est un ensemble d'éléments (fini ou pas). Ses éléments sont appelés *lettres*, et les suites finies de lettres sont appelées *mots*.

Remarque 1.1. On choisit l'alphabet :

- $\triangleright \mathcal{P} = \{x_0, x_1, \dots\}$ des variables propositionnelles ;
- $\triangleright$ un ensemble de *connecteurs* ou *symboles logiques*, défini par $\{\neg, \vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$, il n'y a pas $\exists$ et $\forall$ pour l'instant.
- $\triangleright$ les parenthèses $\{(,)\}$.

Les formules logiques sont des mots. On les fabrique avec des briques de base (les variables) et des opérations de construction : si F_1 et F_2 sont deux formules, alors $\neg F$, $(F_1 \vee F_2)$, $(F_1 \wedge F_2)$, $(F_1 \rightarrow F_2)$ et $(F_1 \leftrightarrow F_2)$ aussi.

On donne deux définitions des formules et on pourra montrer qu'elles sont équivalentes.

Définition 1.2 (« par le haut », « mathématique »). L'ensemble $\mathcal{F}$ des formules du calcul propositionnel construit sur $\mathcal{P}$ est le

plus petit ensemble contenant $\mathcal{P}$ et stable par les opérations de construction.

Définition 1.3 (« par le bas », « informatique »). L'ensemble $\mathcal{F}$ des formules logiques du calcul propositionnel sur $\mathcal{P}$ est défini par

$$\triangleright \mathcal{F}_0 = \mathcal{P};$$

$$\triangleright \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, \mathcal{F}_{n+1} = \mathcal{F}_n \cup \left\{ \begin{array}{l} \neg F_1 \\ (F_1 \vee F_2) \\ (F_1 \wedge F_2) \\ (F_1 \rightarrow F_2) \\ (F_1 \leftrightarrow F_2) \end{array} \middle| F_1, F_2 \in \mathcal{F}_n \right\}$$

puis on pose $\mathcal{F} = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_n$.

Théorème 1.1 (Lecture unique). Toute formule $G \in \mathcal{F}$ vérifie une et une seule de ces propriétés :

- $\triangleright G \in \mathcal{P}$;
- $\triangleright$ il existe $F \in \mathcal{F}$ telle que $G = \neg F$;
- $\triangleright$ il existe $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ telle que $G = (F_1 \vee F_2)$;
- $\triangleright$ il existe $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ telle que $G = (F_1 \wedge F_2)$;
- $\triangleright$ il existe $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ telle que $G = (F_1 \rightarrow F_2)$;
- $\triangleright$ il existe $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ telle que $G = (F_1 \leftrightarrow F_2)$;

et ces sous-formules sont uniques.


Preuve. En exercice.

Une preuve (très, et même probablement trop) détaillée est donnée en annexe, page 14. $\square$

Corollaire 1.1. Il y a une bijection entre les formules et les arbres dont

- $\triangleright$ les feuilles sont étiquetées par des variables ;
- $\triangleright$ les nœuds internes sont étiquetés par des connecteurs ;
- $\triangleright$ ceux étiquetés par $\neg$ ont un fils, les autres deux.

Exemple 1.1. La formule $((\neg x_0 \vee x_1) \rightarrow ((x_0 \wedge x_2) \leftrightarrow x_3))$ correspond à l'arbre



1.2 Sémantique.

Lemme 1.1. Soit ν une fonction de $\mathcal{P}$ dans $\{0, 1\}$ appelée *valuation*. Alors ν s'étend de manière unique en une fonction $\bar{\nu}$ de $\mathcal{F}$ dans $\{0, 1\}$ telle que

- ▷ sur $\mathcal{P}$, $\nu = \bar{\nu}$;
- ▷ si $F, G \in \mathcal{F}$ sont des formules alors
 - $\bar{\nu}(\neg F) = 1 - \bar{\nu}(F)$;
 - $\bar{\nu}(F \vee G) = \max(\bar{\nu}(F), \bar{\nu}(G))$;
 - $\bar{\nu}(F \wedge G) = \bar{\nu}(F) \times \bar{\nu}(G)$;
 - $\bar{\nu}(F \rightarrow G) = 1$ ssi $\bar{\nu}(F) \leq \bar{\nu}(G)$;
 - $\bar{\nu}(F \leftrightarrow G) = 1$ ssi $\bar{\nu}(F) = \bar{\nu}(G)$.

Par abus de notations, on notera ν pour $\bar{\nu}$ par la suite.

Preuve (Idée de preuve). Existence. On définit en utilisant le lemme de lecture unique, et par induction sur $\mathcal{F}$:

- ▷ $\bar{\nu}$ est définie sur $\mathcal{F}_0 = \mathcal{P}$;
- ▷ si $\bar{\nu}$ est définie sur $\mathcal{F}_n$ alors pour $F \in \mathcal{F}_{n+1}$, on a la disjonction de cas
 - si $F = \neg G$ avec $G \in \mathcal{F}_n$, on définit $\bar{\nu}(F) = 1 - \bar{\nu}(F_1)$;
 - etc pour les autres cas.

Unicité. On peut montrer que si $\bar{\nu}$ et $\bar{\nu}'$ sont deux extensions de ν , alors $\bar{\nu}$ et $\bar{\nu}'$ coïncident sur $\mathcal{F}_n$, pour tout $n \in \mathbb{N}$, ce que l'on prouve par récurrence sur n .

□

Exemple 1.2 (Table de vérité). Pour la formule

$$F = ((x_1 \rightarrow x_2) \rightarrow (x_2 \rightarrow x_1)),$$

on construit la table

x_1	0	0	1	1
x_2	0	1	0	1
$x_1 \rightarrow x_2$	1	1	0	1
$x_2 \rightarrow x_1$	1	0	1	1
F	1	0	1	1

qui liste les différentes assignations possibles de valeurs de vérité aux variables de F et les valeurs de vérité correspondantes pour les sous-formules de F .

Définition 1.4. ▷ Une formule F est dite *satisfaite par une valuation* ν si $\nu(F) = 1$.

- ▷ Une *tautologie* est une formule satisfaite par toutes les valuations.
- ▷ Un ensemble $\mathcal{E}$ de formules est *satisfiable* s'il existe une valuation qui satisfait toutes les formules de $\mathcal{E}$.
- ▷ Un ensemble $\mathcal{E}$ de formules est *finiment satisfiable* si tout sous-ensemble fini de $\mathcal{E}$ est satisfiable.
- ▷ Une formule F est *conséquence sémantique* d'un ensemble de formules $\mathcal{E}$ si toute valuation qui satisfait $\mathcal{E}$ satisfait F .
- ▷ Un ensemble de formules $\mathcal{E}$ est *contradictoire* s'il n'est pas satisfiable.

- ▷ Un ensemble de formules $\mathcal{E}$ est *finiment contradictoire* s'il existe un sous-ensemble fini contradictoire de $\mathcal{E}$.

Théorème 1.2 (compacité du calcul propositionnel). On donne trois énoncés équivalents (équivalence des trois énoncés laissée en exercice) du théorème de compacité du calcul propositionnel.

Version 1. Un ensemble de formules $\mathcal{E}$ est satisfiable si et seulement s'il est finiment satisfiable.

Version 2. Un ensemble de formules $\mathcal{E}$ est contradictoire si et seulement s'il est finiment contradictoire.

Version 3. Pour tout ensemble $\mathcal{E}$ de formules du calcul propositionnel, et toute formule F , F est conséquence sémantique de $\mathcal{E}$ si et seulement si F est conséquence sémantique d'un sous-ensemble fini de $\mathcal{E}$.

Preuve. Supposons que $\mathcal{P}$ soit dénombrable. Le cas non-dénombrable sera traité après.

« $\implies$ ». Si ν satisfait toute formule de $\mathcal{E}$, alors tout sous-ensemble fini de $\mathcal{E}$ est satisfait par ν donc satisfiable.

« $\impliedby$ ». Supposons $\mathcal{E}$ finiment satisfiable. Comme $\mathcal{P}$ est supposé dénombrable, notons $\mathcal{P} = \{x_1, x_2, \dots\}$. On cherche une valuation ν qui satisfait toute formule de $\mathcal{E}$, et on va définir la suite des $\varepsilon_n = \nu(x_n)$ par récurrence.

1. On construit par récurrence une suite $(\varepsilon_n)_{n \geq 1}$ qui satisfait, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

« pour toute partie finie B de $\mathcal{E}$, il existe une valuation λ satisfaisant B et telle que pour tout indice $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $\lambda(x_i) = \varepsilon_i$ ».

On note cette propriété $\mathcal{R}_n$.

- ▷ Pour $n = 0$, la propriété $\mathcal{R}_0$

« pour toute partie finie B de $\mathcal{E}$, il existe une valuation λ satisfaisant B »,

est vraie car $\mathcal{E}$ est supposé finiment satisfiable.

▷ Soit $n \in \mathbb{N}$. Supposons que $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ sont construits et qu'ils satisfont $\mathcal{R}_n$. On a la disjonction de cas suivante :

- Si pour toute partie finie B de $\mathcal{E}$, il existe une valuation λ telle que $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \lambda(x_i) = \varepsilon_i$ et que $\lambda(x_{i+1}) = 0$, alors posons $\varepsilon_{n+1} := 0$ et on a immédiatement $\mathcal{R}_{n+1}$.
- Supposons qu'il existe une partie A de $\mathcal{E}$, telle que $(\star)$ toute valuation λ satisfaisant A et telle que $\lambda(x_i) = \varepsilon_i$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ vérifie $\lambda(x_{n+1}) = 1$. On pose $\varepsilon_{n+1} := 1$.

Montrons la propriété $\mathcal{R}_{n+1}$. Considérons une partie finie B de $\mathcal{E}$. D'après $\mathcal{R}_n$, il existe une valuation η qui satisfait $A \cup B$, sous-ensemble fini de $\mathcal{E}$, et qui vérifie $\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \eta(x_i) = \varepsilon_i$. En particulier η satisfait A , ce qui implique par $(\star)$, que $\eta(x_{n+1}) = 1 = \varepsilon_{n+1}$. Et comme η satisfait B , on obtient bien $\mathcal{R}_{n+1}$.

2. Posons $\nu : x_i \mapsto \varepsilon_i$. Montrons que ν satisfait $\mathcal{E}$. Soit $F \in \mathcal{E}$. On sait que F est un mot (fini), donc qu'il contient un ensemble fini (non vide) de variables. Soit n maximal tel que x_n est une variable de F , de sorte que l'ensemble des variables de F soit inclus dans $\{x_0, \dots, x_n\}$. D'après $\mathcal{R}_n$, il existe une valuation η qui satisfait F et telle que $\eta(x_0) = \varepsilon_0, \dots, \eta(x_n) = \varepsilon_n$. En particulier, ν et η coïncident sur les variables de F . Donc (lemme simple), elles coïncident sur toutes les formules qui n'utilisent que ces variables. Donc, $\eta(F) = 1$, et on en conclut que η satisfait $\mathcal{E}$.

□

Dans le cas non-dénombrable, on utilise le *lemme de Zorn*, un équi-

valent de l'*axiome du choix*.

Définition 1.5. Un ensemble ordonné $(X, \mathcal{R})$ est inductif si tout sous-ensemble Y de X totalement ordonné par $\mathcal{R}$ (*i.e.* une chaîne) admet un majorant dans X .

Remarque 1.2. On considère ici un majorant et non un plus grand élément (un maximum).

Exemple 1.3. 1. $(\mathcal{P}(X), \subseteq)$ est inductif, le majorant d'une chaîne étant l'union de ses éléments.
2. $(\mathbb{R}, \leq)$ n'est pas inductif car $\mathbb{R}$ n'a pas de majorant dans $\mathbb{R}$.

Lemme 1.2 (Lemme de Zorn). Tout ensemble ordonné inductif non-vide admet un élément maximal.

Remarque 1.3. Un élément maximal n'est pas nécessairement le plus grand.

Preuve (Cas non-dénombrable pour le théorème 1.2). Soit $\mathcal{E}$ un ensemble de formules finiment satisfiable, et $\mathcal{P}$ un ensemble de variables. On note $\mathcal{V}$ l'ensemble des valuations partielles prolongeables pour toute partie finie $\mathcal{C}$ de $\mathcal{E}$ en une valuation satisfaisant $\mathcal{C}$. C'est-à-dire :

$$\mathcal{V} := \left\{ \varphi \in \bigcup_{X \subseteq \mathcal{P}} \{0, 1\}^X \mid \forall \mathcal{C} \in \wp_f(\mathcal{E}), \exists \delta \in \{0, 1\}^{\mathcal{P}}, \begin{array}{l} \delta|_{\text{dom } \varphi} = \varphi \\ \forall F \in \mathcal{C}, \delta(F) = 1 \end{array} \right\}.$$

L'ensemble $\mathcal{V}$ est non-vide car il contient l'application vide de $\{0, 1\}^{\emptyset}$ puisque $\mathcal{E}$ est finiment satisfiable. On définit une relation

d'ordre $\preceq$ sur $\mathcal{V}$ par :

$$\varphi \preceq \psi \quad \text{ssi} \quad \psi \text{ prolonge } \varphi.$$

Montrons que $(\mathcal{V}, \preceq)$ est inductif. Soit $\mathcal{C}$ une chaîne de $\mathcal{V}$, construisons un majorant de $\mathcal{C}$. Soit λ la valuation partielle définie sur $\text{dom } \lambda = \bigcup_{\varphi \in \mathcal{C}} \text{dom } \varphi$, par : si $x \in \text{dom } \lambda$ alors il existe $\varphi \in \mathcal{C}$ tel que $x \in \text{dom } \varphi$ et on pose $\lambda(x) = \varphi(x)$.

La valuation λ est définie de manière unique, *i.e.* ne dépend pas du choix de φ . En effet, pour tout $x \in \text{dom } \lambda$ et tous $\varphi \in \mathcal{C}$ et $\psi \in \mathcal{C}$ tels que $x \in \text{dom } \varphi \cap \text{dom } \psi$, comme $\mathcal{C}$ est une chaîne on a $\varphi \preceq \psi$ ou $\psi \preceq \varphi$, donc $\varphi(x) = \psi(x)$.

Notons que λ est un majorant de $\mathcal{C}$. Montrons que $\lambda \in \mathcal{V}$. Soit B une partie finie de $\mathcal{E}$. On cherche μ qui prolonge λ et satisfait B . L'ensemble de formules B est fini, donc utilise un ensemble fini de variables, dont l'intersection avec $\text{dom}(\lambda)$ est un sous-ensemble fini $\{x_1, \dots, x_n\}$. Il existe $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ dans $\mathcal{C}$ telle que $x_1 \in \text{dom } \varphi_1, \dots, x_n \in \text{dom } \varphi_n$. Comme $\mathcal{C}$ est une chaîne, $\varphi_0 = \max_{i \in [1, n]} \varphi_i$ est bien défini et on a $\varphi_0 \in \mathcal{C}$. Dès lors, $\varphi_0 \in \mathcal{V}$ est prolongeable en ψ_0 qui satisfait B . On a de plus $x_1, \dots, x_n \in \text{dom } \varphi_0$. On définit :

$$\begin{aligned} \mu : \mathcal{P} &\longrightarrow \{0, 1\} \\ x \in \text{dom } \lambda &\longmapsto \lambda(x) \\ x \in \text{var } B &\longmapsto \psi_0(x) \\ \text{sinon} &\longmapsto 0. \end{aligned}$$

Comme λ et ψ_0 coïncident sur $\text{dom } \lambda \cap \text{var } B$, μ est bien définie. De plus, comme μ et ψ_0 coïncident sur $\text{var } B$, μ satisfait B . Donc $\lambda \in \mathcal{V}$ d'où l'on tire que $\mathcal{V}$ est inductif.

D'après le lemme de Zorn, $\mathcal{V}$ admet un élément maximal φ . Pour montrer le théorème, il suffit de montrer que $\text{dom } \gamma = \mathcal{P}$. Si $\text{dom } \gamma \neq \mathcal{P}$, soit $x \notin \text{dom } \gamma$. Montrons que γ n'est pas maximal

en définissant $\gamma' \in \mathcal{V}$ qui vérifie $\gamma \prec \gamma'$. On prend $\text{dom } \gamma' = \text{dom } \gamma \cup \{x\}$.

- ▷ Si, pour toute partie finie B de $\mathcal{E}$, il existe une valuation δ qui prolonge γ et qui satisfait B telle que $\delta(x) = 0$, alors on pose $\gamma'(x) = 0$.
- ▷ Sinon, on pose $\gamma'(x) = 1$.

Montrons que $\gamma' \in \mathcal{V}$. Soit B un ensemble fini de formules de $\mathcal{E}$.

- ▷ Si $\gamma'(x) = 0$ alors il existe une valuation δ prolongeant γ et satisfaisant B telle que $\delta(x) = 0$, et donc δ prolonge γ' .
- ▷ Si $\gamma'(x) = 1$ alors il existe une partie finie B_0 de $\mathcal{E}$ telle que toute valuation δ prolongeant γ et satisfaisant B_0 vérifie $\delta(x) = 1$. On choisit une valuation qui prolonge γ et satisfait $B \cup B_0$; elle prolonge γ' .

On a donc une contradiction avec la maximalité de γ . On en conclut que $\text{dom } \gamma = \mathcal{P}$, ce qui termine la preuve du théorème. $\square$

1.3 Annexe : preuve détaillée du lemme de lecture unique.

Ce qui suit est une preuve (très, et probablement trop) détaillée du lemme de lecture unique. Merci à Quentin Vermande pour cette preuve !

Théorème 1.1 (Lecture unique). Toute formule $G \in \mathcal{F}$ vérifie une et une seule de ces propriétés :

- ▷ $G \in \mathcal{P}$;
- ▷ il existe $F \in \mathcal{F}$ telle que $G = \neg F$;
- ▷ il existe $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ telle que $G = (F_1 \vee F_2)$;
- ▷ il existe $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ telle que $G = (F_1 \wedge F_2)$;
- ▷ il existe $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ telle que $G = (F_1 \rightarrow F_2)$;
- ▷ il existe $F_1, F_2 \in \mathcal{F}$ telle que $G = (F_1 \leftrightarrow F_2)$;

et ces sous-formules sont uniques.

Preuve. Montrons l'existence. Posons

$$\mathcal{G} = \mathcal{P} \cup \left\{ \begin{array}{l} \neg F_1 \\ (F_1 \vee F_2) \\ (F_1 \wedge F_2) \\ (F_1 \rightarrow F_2) \\ (F_1 \leftrightarrow F_2) \end{array} \middle| F_1, F_2 \in \mathcal{F} \right\}$$

Comme $\mathcal{F}$ est stable par les opérations de construction des formules, on a $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$. Montrons alors que $\mathcal{G}$ est stable par ces mêmes opérations. On a déjà $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{G}$. Par ailleurs, pour tout $F \in \mathcal{G}$, on a $F \in \mathcal{F}$, d'où $\neg F \in \mathcal{G}$. Soient ensuite $F_1, F_2 \in \mathcal{G}$ et $\sigma \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$. Comme F_1 et F_2 sont des formules, on obtient $(F_1 \sigma F_2) \in \mathcal{G}$. En conclusion, $\mathcal{G}$ est stable par les opérations de construction des formules, donc contient $\mathcal{F}$.

La partie difficile de la preuve d'unicité est le cas des opérateurs binaires. Il faut par exemple montrer que pour toutes formules F_1 ,

F_2 , G_1 et G_2 , les formules $(F_1 \vee F_2)$ et $(G_1 \wedge G_2)$ sont différentes. Pour cela, on montre qu'un préfixe propre d'une formule n'est pas une formule. On commence par obtenir des contraintes sur les parenthèses qu'un préfixe d'une formule peut avoir. Montrons déjà que toute formule contient autant de parenthèses ouvrantes que de parenthèses fermantes. Notons pour toute formule $F \in \mathcal{F}$, $o(F)$ le nombre de parenthèses ouvrantes de F et $f(F)$ son nombre de parenthèses fermantes et montrons par récurrence simple, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad \forall F \in \mathcal{F}_n, o(F) = f(F).$$

- ▷ Les éléments de $\mathcal{F}_0 = \mathcal{P}$ ne contiennent ni parenthèse ouvrante ni parenthèse fermante, d'où $\mathcal{P}(0)$.
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vraie. Soit $F \in \mathcal{F}_{n+1}$.
 - Si $F \in \mathcal{F}_n$, alors $o(F) = f(F)$ d'après $\mathcal{P}(n)$.
 - Supposons qu'on dispose de $G \in \mathcal{F}_n$ tel que $F = \neg G$. Alors $\mathcal{P}(n)$ donne l'égalité $o(G) = f(G)$, d'où l'on tire $o(F) = o(G) = f(G) = f(F)$.
 - Supposons qu'on ait $F_1, F_2 \in \mathcal{F}_n$ et $\sigma \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tels que $F = (F_1 \sigma F_2)$. $\mathcal{P}(n)$ s'écrit, pour F_1 et F_2 , $o(F_1) = f(F_1)$ et $o(F_2) = f(F_2)$. Dès lors, on calcule $o(F) = o(F_1) + o(F_2) + 2 = f(F_1) + f(F_2) + 2 = f(F)$.

Dans tous les cas, on a $o(F) = f(F)$, d'où $\mathcal{P}(n+1)$.

Discutons maintenant des préfixes d'une formule. Notons, pour deux mots u et v , $u < v$ lorsque u est un préfixe propre de v et montrons par récurrence simple, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad \forall F \in \mathcal{F}_n, \forall G < F, o(G) = f(G) = 0 \vee f(G) < o(G).$$

- ▷ Les éléments de $\mathcal{F}_0 = \mathcal{P}$ n'ont pas de préfixe propre, d'où $\mathcal{P}(0)$.
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vrai. Soient $F \in \mathcal{F}_{n+1}$ et G un préfixe propre de F .

- Si $F \in \mathcal{F}_n$, alors $o(G) = f(G) = 0$ ou $f(G) < o(G)$ d'après $\mathcal{P}(n)$
- Supposons qu'on ait $F_1 \in \mathcal{F}_n$ tel que $F = \neg F_1$. Si G est vide, alors $o(G) = f(G) = 0$. Sinon, G s'écrit $\neg G_1$ avec G_1 un préfixe strict de F_1 . L'hypothèse $\mathcal{P}(n)$ donne $o(G_1) = f(G_1) = 0$ ou $f(G_1) < o(G_1)$. Or, on a $o(G) = o(G_1)$ et $f(G) = f(G_1)$, d'où $o(G) = f(G) = 0$ ou $f(G) < o(G)$.
- Supposons qu'on ait $F_1, F_2 \in \mathcal{F}_n$ et $\sigma \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tels que $F = (F_1 \sigma F_2)$. On distingue les cas selon la longueur de G .
 - Si G est le mot vide, alors $o(G) = f(G) = 0$
 - Supposons que $G = (G_1$ avec G_1 un préfixe strict de F_1 . L'hypothèse $\mathcal{P}(n)$ appliquée à F_1 et G_1 donne $o(G_1) = f(G_1) = 0$ ou $f(G_1) < o(G_1)$. Dans les deux cas, on a $f(G_1) \leq o(G_1)$, d'où $f(G) = f(G_1) < o(G_1) + 1 = o(G)$.
 - Supposons que $G = (F_1$. Alors $o(F_1) = f(F_1)$, donc $f(G) = f(F_1) = o(G_1) < o(G_1) + 1 = o(G)$.
 - Supposons que $G = (F_1 \sigma G_2$ avec G_2 un préfixe strict de F_2 . $\mathcal{P}(n)$ donne $o(G_2) = f(G_2) = 0$ ou $f(G_2) < o(G_2)$. Dans les deux cas, on obtient $f(G_2) \leq o(G_2)$. De plus, on a $o(F_1) = f(F_1)$, donc

$$\begin{aligned}
 f(G) &= f(F_1) + f(G_2) \\
 &\leq o(F_1) + o(G_2) \\
 &< o(F_1) + o(G_2) + 1 \\
 &= o(G).
 \end{aligned}$$

Dans tous les cas, on conclut bien $o(G) = f(G) = 0$ ou $f(G) < o(G)$. D'où $\mathcal{P}(n+1)$.

Montrons maintenant par récurrence simple, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la propriété

$$\mathcal{P}(n) : \quad \forall F \in \mathcal{F}_n, \forall G < F, G \notin \mathcal{F}.$$

- ▷ Une formule de $\mathcal{F}_0 = \mathcal{P}$ n'a pas de préfixe propre, d'où $\mathcal{P}(0)$.
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{P}(n)$ est vrai. Soient $F \in \mathcal{F}_{n+1}$ et G un préfixe propre de F .
 - Si $F \in \mathcal{F}_n$, alors G n'est pas une formule d'après $\mathcal{P}(n)$.
 - Supposons qu'on dispose de $F_1 \in \mathcal{F}_n$ tel que $F = \neg F_1$. Supposons que G est une formule. Comme une formule n'est pas vide, G s'écrit $\neg G_1$ avec G_1 un préfixe strict de F_1 . Avec l'existence dans le théorème de lecture unique vue plus haut, G_1 est une formule, ce qui contredit $\mathcal{P}(n)$ pour F_1 et G_1 .
 - Supposons qu'on ait $F_1, F_2 \in \mathcal{F}_n$ et $\sigma \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tels que $F = (F_1 \sigma F_2)$. Supposons que G est une formule. Comme une formule n'est pas vide, G commence par une parenthèse ouvrante. En particulier, $o(G) \neq 0$. Or, G est un préfixe propre de F , donc $f(G) < o(G)$. Ceci est impossible puisque, G étant une formule, on a aussi $f(G) = o(G)$.

Dans tous les cas, G n'est pas une formule, d'où $\mathcal{P}(n+1)$.

Nous sommes prêts à montrer que les propriétés du théorème de lecture unique sont mutuellement exclusives. Les deux premières le sont et excluent les autres en considérant la première lettre des formules qu'elles décrivent. Plus précisément, les formules satisfaisant la première propriété commencent par une variable, celles satisfaisant la deuxième commencent par une négation et les autres commencent par une parenthèse. Pour les autres cas, considérons $F_1, F_2, G_1, G_2 \in \mathcal{F}$ et $\sigma, \sigma' \in \{\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow\}$ tels que $(F_1 \sigma F_2) = (G_1 \sigma' G_2)$. Quitte à échanger les rôles de F_1 et G_1 , de F_2 et G_2 et de σ et σ' , on peut supposer que $(F_1$ est un préfixe de $(G_1$. Alors F_1 est un préfixe de G_1 . Or F_1 et G_1 sont des formules, donc F_1 n'est pas un préfixe propre de G_1 , ou encore $F_1 = G_1$. Par conséquent, $(F_1 \sigma F_2) = (F_1 \sigma' G_2)$, d'où $\sigma = \sigma'$, puis $F_2 = G_2$. On conclut bien l'unicité. $\square$

2 La logique du premier ordre.

2.1 Les termes.

On commence par définir les *termes*, qui correspondent à des objets mathématiques. Tandis que les formules relient des termes et correspondent à des énoncés mathématiques.

Définition 2.1. Le langage $\mathcal{L}$ (du premier ordre) est la donnée d'une famille (pas nécessairement finie) de symboles de trois sortes :

- ▷ les symboles de *constante* ;
- ▷ les symboles de *fonction*, avec un entier associé, leur *arité* ;
- ▷ les symboles de *relation*, avec leur arité, aussi appelés *pré-dicats*.

Les trois ensembles sont disjoints.

Remarque 2.1. ▷ Les constantes peuvent être vues comme des fonctions d'arité 0.

- ▷ On aura toujours, sauf si précisé autrement, les relations « $=$ » d'arité 2, et « $\perp$ » d'arité 0.
- ▷ On a toujours un ensemble de variables $\mathcal{V}$.

Exemple 2.1. Le langage $\mathcal{L}_g$ de la théorie des groupes est défini par :

- ▷ une constante : c ,

- ▷ deux fonctions : f_1 d'arité 2 et f_2 d'arité 1 ;
- ▷ la relation $=$.

Ces symboles sont notés usuellement $e, *, \square^{-1}$ ou bien $0, +, -$.

Exemple 2.2. Le langage $\mathcal{L}_{\text{co}}$ des corps ordonnés est défini par :

- ▷ deux constantes 0 et 1,
- ▷ quatre fonctions $+, \times, -$ et $\square^{-1}$,
- ▷ deux relations $=$ et $\leq$.

Exemple 2.3. Le langage $\mathcal{L}_{\text{ens}}$ de la théorie des ensembles est défini par :

- ▷ une constante $\emptyset$,
- ▷ trois fonctions $\cap, \cup$ et $\square^c$,
- ▷ trois relations $=, \in$ et $\subseteq$.

Définition 2.2. Par le haut. L'ensemble $\mathcal{T}$ des termes sur le langage $\mathcal{L}$ est le plus petit ensemble de mots sur $\mathcal{L} \cup \mathcal{V} \cup \{ (,), , \}$ qui

- ▷ contienne $\mathcal{V}$ et les constantes ;
- ▷ est stable par application des fonctions, c'est-à-dire que pour des termes $t_1, \dots, t_n$ et un symbole de fonction f d'arité n , alors $f(t_1, \dots, t_n)$ est un terme.¹

Par le bas. On pose

$$\mathcal{T}_0 = \mathcal{V} \cup \{c \mid c \text{ est un symbole de constante de } \mathcal{L}\},$$

puis pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{T}_{k+1} = \mathcal{T}_k \cup \left\{ f(t_1, \dots, t_n) \mid \begin{array}{l} f \text{ fonction d'arité } n \\ t_1, \dots, t_n \in \mathcal{T}_k \end{array} \right\},$$

et enfin

$$\mathcal{T} = \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{T}_k.$$

Remarque 2.2. Dans la définition des termes, on n'utilise pas les relations.

Exemple 2.4. ▷ Dans $\mathcal{L}_g$, $*(x, \square^{-1}(y), e)$ est un terme, qu'on écrira plus simplement en $(x * y^{-1}) * e$.

▷ Dans $\mathcal{L}_{co}$, $(x + x) + (-0)^{-1}$ est un terme.

▷ Dans $\mathcal{L}_{ens}$, $(\emptyset^c \cup \emptyset) \cap (x \cup y)^c$ est un terme.

Définition 2.3. Si t et u sont des termes et x est une variable, alors $t[x : u]$ est le mot dans lequel les occurrences de x ont été remplacées par le mot u . Le mot $t[x : u]$ est un terme (preuve en exercice).

Exemple 2.5. Avec $t = (x * y^{-1}) * e$ et $u = x * e$, alors on a

$$t[x : u] = ((x * e) * y^{-1}) * e.$$

Définition 2.4. ▷ Un terme *clos* est un terme sans variable (par exemple $(0 + 0)^{-1}$).

▷ La *hauteur* d'un terme t est le plus petit k tel que $t \in \mathcal{T}_k$.

Exercice 2.1. ▷ Énoncer et prouver le lemme de lecture unique pour les termes.

▷ Énoncer et prouver un lemme de bijection entre les termes et un ensemble d'arbres étiquetés.

1. Attention : le « ... » n'est pas un terme mais juste une manière d'écrire qu'on place les termes à côté des autres.

2.2 Les formules.

Définition 2.5. Les formules sont des mots sur l'alphabet

$$\mathcal{L} \cup \mathcal{V} \cup \{ (,), , , \exists, \forall, \wedge, \vee, \neg, \rightarrow \}.$$

L'ensemble des *formules* $\mathcal{F}$ du langage $\mathcal{L}$ est défini par

- ▷ on pose $\mathcal{F}_0$ l'ensemble des *formules atomiques*, c'est-à-dire l'ensemble des formules de la forme $R(t_1, \dots, t_n)$ où R est un symbole de relation d'arité n et $t_1, \dots, t_n$ des termes ;
- ▷ on pose, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{F}_{k+1} := \mathcal{F}_k \cup \left\{ \begin{array}{c} (\neg F) \\ (F \rightarrow G) \\ (F \vee G) \\ (F \wedge G) \\ \exists x F \\ \forall x G \end{array} \left| \begin{array}{c} F, G \in \mathcal{F}_k \\ x \in \mathcal{V} \end{array} \right. \right\};$$

- ▷ et on pose enfin $\mathcal{F} := \bigcup_{k \in \mathbb{N}} \mathcal{F}_k$.

Exercice 2.2. La définition ci-dessus est « par le bas ». Donner une définition par le haut de l'ensemble $\mathcal{F}$.

Exemple 2.6. ▷ Dans $\mathcal{L}_g$, l'un des axiomes de la théorie des groupes s'écrit

$$\forall x \exists y (x * y = e \wedge y * x = e).$$

- ▷ Dans $\mathcal{L}_{co}$, l'énoncé « le corps est de caractéristique 3 » s'écrit

$$\forall x (x + (x + x) = 0).$$

▷ Dans $\mathcal{L}_{\text{ens}}$, la loi de De Morgan s'écrit

$$\forall x \forall y (x^c \cup y^c = (x \cap y)^c).$$

Exercice 2.3. ▷ Donner et montrer le lemme de lecture unique.

▷ Énoncer et démontrer un lemme d'écriture en arbre.

Remarque 2.3 (Conventions d'écriture.). On note :

- ▷ $x \leq y$ au lieu de $\leq(x, y)$;
- ▷ $\exists x \geq 0 (F)$ au lieu de $\exists x (x \geq 0 \wedge F)$;
- ▷ $\forall x \geq 0 (F)$ au lieu de $\forall x (x \geq 0 \rightarrow F)$;
- ▷ $A \leftrightarrow B$ au lieu de $(A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$;
- ▷ $t \neq u$ au lieu de $\neg(t = u)$.

On enlève les parenthèses avec les conventions de priorité

0. les symboles de relations (le plus prioritaire) ;
1. les symboles $\neg, \exists, \forall$;
2. les symboles $\wedge$ et $\vee$;
3. le symbole $\rightarrow$ (le moins prioritaire).

Exemple 2.7. Ainsi, $\forall x A \wedge B \rightarrow \neg C \vee D$ s'écrit

$$(((\forall x A) \wedge B) \rightarrow ((\neg C) \vee D)).$$

Remarque 2.4. Le calcul propositionnel est un cas particulier de la logique du premier ordre où l'on ne manipule que des relations d'arité 0 (pas besoin des fonctions et des variables) : les « variables » du calcul propositionnel sont des formules atomiques ; et on n'a pas de relation « = ».

Remarque 2.5. On ne peut pas exprimer *a priori* :

- ▷ des quantifications sur un ensemble de valeurs² ;
- ▷ « $\exists n \exists x_1 \dots \exists x_n$ » une formule qui dépend d'un paramètre ;
- ▷ le principe de récurrence : si on a $\mathcal{P}(0)$ pour une propriété $\mathcal{P}$ et si pour tout n on a $\mathcal{P}(n) \rightarrow \mathcal{P}(n+1)$ alors on a $\mathcal{P}(n)$ pour tout n .³

Quelques définitions techniques qui permettent de manipuler les formules.

Définition 2.6. L'ensemble des sous-formules de F , noté $S(F)$ est défini par induction :

- ▷ si F est atomique, alors on définit $S(F) = \{F\}$;
- ▷ si $F = F_1 \oplus F_2$ (avec $\oplus$ qui est $\vee$, $\rightarrow$ ou $\wedge$) alors on définit

$$S(F) = S(F_1) \cup S(F_2) \cup \{F\};$$

- ▷ si $F = \neg F_1$, ou $F = Qx F_1$ avec $Q \in \{\forall, \exists\}$, alors on définit

$$S(F) = S(F_1) \cup \{F\}.$$

C'est l'ensemble des formules que l'on voit comme des sous-arbres de l'arbre équivalent à la formule F .

Définition 2.7. ▷ La *taille* d'une formule est le nombre de connecteurs ($\neg$, $\vee$, $\wedge$, $\rightarrow$), et de quantificateurs ($\forall$, $\exists$).

- ▷ La racine de l'arbre est
 - « F » si la formule F est atomique ;
 - « $\oplus$ » si $F = F_1 \oplus F_2$ avec $\oplus$ un connecteur (binaire ou unaire) ;
 - « Q » si $F = Qx F_1$ avec Q un quantificateur.

2. En dehors de $\mathcal{L}_{\text{ens}}$, en tout cas.

3. C'est le « $\forall \mathcal{P} \dots$ » qui pose problème ici.

- Définition 2.8.** ▷ Une *occurrence* d'une variable est un endroit où la variable apparaît dans la formule (*i.e.* une feuille étiquetée par cette variable).
- ▷ Une occurrence d'une variable est *liée* si elle se trouve dans une sous-formule dont l'opérateur principal est un quantificateur avec cette variable (*i.e.* un $\forall x F'$ ou un $\exists x F'$).
 - ▷ Une occurrence d'une variable est *libre* quand elle n'est pas liée.
 - ▷ Une variable est libre si elle a au moins une occurrence libre, sinon elle est liée.

Remarque 2.6. On note $F(x_1, \dots, x_n)$ pour dire que les variables libres de F sont parmi $\{x_1, \dots, x_n\}$.

Définition 2.9. Une formule est *close* si elle n'a pas de variables libres.

Définition 2.10 (Substitution). On note $F[x := t]$ la formule obtenue en remplaçant toutes les occurrences libres de x par t , après renommage éventuel des occurrences des variables liées de F qui apparaissent dans t .

Définition 2.11 (Renommage). On donne une définition informelle et incomplète ici. On dit que les formules F et G sont α -équivalentes si elle sont syntaxiquement identiques à un renommage près des occurrences liées des variables.

Exemple 2.8. On pose

$$F(x, z) := \forall y (x * y = y * z) \wedge \forall x (x * x = 1),$$

et alors

- ▷ $F(z, z) = F[x := z] = \forall y (z * y = y * z) \wedge \forall x (x * x = 1)$;
- ▷ $F(y^{-1}, z) = F[x := y^{-1}] = \forall u (y^{-1} * u = u * z) \wedge \forall x (x * x = 1)$.

On a procédé à un renommage de y en u .

2.3 Les démonstrations en déduction naturelle.

Définition 2.12. Un *séquent* est un couple noté $\Gamma \vdash F$ (où $\vdash$ se lit « montre » ou « thèse ») où Γ est un ensemble fini de formules appelé *contexte* (i.e. l'ensemble des hypothèses), et F est une formule, appelée *conséquence* du séquent.

Remarque 2.7. Les formules ne sont pas nécessairement closes. Et on note souvent Γ comme une liste.

Définition 2.13. On dit que $\Gamma \vdash F$ est *prouvable*, *démontrable* ou *dérivable*, s'il peut être obtenu par une suite finie de règles (c.f. ci-après). On dit qu'une formule F est *prouvable* si $\emptyset \vdash F$ l'est.

Définition 2.14 (Règles de la démonstration). Une règle s'écrit

$$\frac{\text{prémisses : des séquents}}{\text{conclusion : un séquent}} \text{ nom de la règle} .$$

Axiome.

$$\frac{}{\Gamma, A \vdash A} \text{ ax}$$

Affaiblissement.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A} \text{ aff}$$

Implication.

$$\frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} \rightarrow_i \quad \frac{\Gamma \vdash A \rightarrow B \quad \Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash B} \rightarrow_e^4$$

Conjonction.

$$\frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \wedge B} \wedge_i \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash A} \vee_e^g \quad \frac{\Gamma \vdash A \wedge B}{\Gamma \vdash B} \vee_e^d$$

Disjonction.

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee_i^g \quad \frac{\Gamma \vdash B}{\Gamma \vdash A \vee B} \vee_i^d$$

$$\frac{\Gamma \vdash A \vee B \quad \Gamma, A \vdash C \quad \Gamma, B \vdash C}{\Gamma \vdash C} \vee_e^5.$$

Négation.

$$\frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} \neg_i \quad \frac{\Gamma \vdash A \quad \Gamma \vdash \neg A}{\Gamma \vdash \perp} \neg_e$$

Absurdité classique.

$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \perp_e$$

(En logique intuitionniste, on retire l'hypothèse $\neg A$ dans la prémisse.)

Quantificateur universel.

$$\text{si } x \text{ n'est pas libre dans les formules de } \Gamma \quad \frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma \vdash \forall x A} \forall_i$$

$$\frac{\Gamma \vdash \forall x A}{\Gamma \vdash A[x := t]} \forall_e$$

Rappelons que pour la substitution $A[x := t]$, on devra potentiellement renommer des variable liées de A qui apparaissent dans t .

Quantificateur existentiel.

$$\frac{\Gamma \vdash A[x := t]}{\Gamma \vdash \exists x A} \exists_i$$

$$\frac{\text{avec } x \text{ ni libre dans } C \text{ ni dans les formules de } \Gamma \quad \Gamma \vdash \exists x A \quad \Gamma, A \vdash C}{\Gamma \vdash C} \exists_e$$

Égalité.

$$\frac{}{\Gamma \vdash t = t} =_i \quad \frac{\Gamma \vdash A[x := t] \quad \Gamma \vdash t = u}{\Gamma \vdash A[x := u]} =_e$$

Remarque 2.8. Si on n'a pas la condition sur $\forall_i$, on peut faire

$$\frac{\frac{}{x = y \vdash x = y} \text{ax}}{x = y \vdash \forall x x = y} \forall_i.$$

Si on n'a pas la condition sur $\exists_e$, on peut faire

$$\frac{\frac{\frac{}{\emptyset \vdash 0 = 0} =_i}{\emptyset \vdash \exists x x = 0} \exists_i \quad \frac{}{x = 0 \vdash x = 0} \text{ax}}{\emptyset \vdash x = 0} \exists_e.$$

2.4 La sémantique.

Définition 2.15. Soit $\mathcal{L}$ un langage de la sémantique du premier

-
4. Aussi appelée *modus ponens*
 5. C'est un raisonnement par cas

ordre. On appelle *interprétation* (ou *structure*, ou *modèle*) du langage $\mathcal{L}$ l'ensemble $\mathcal{M}$ des données suivantes :

- ▷ un ensemble **non vide**, noté $|\mathcal{M}|$, appelé *domaine* ou *ensemble de base* de $\mathcal{M}$;
- ▷ pour chaque symbole c de constante, un élément $c_{\mathcal{M}}$ de $|\mathcal{M}|$;
- ▷ pour chaque symbole f de fonction d'arité n , une fonction $f_{\mathcal{M}} : |\mathcal{M}|^n \rightarrow |\mathcal{M}|$;
- ▷ pour chaque symbole R de relation d'arité n (sauf pour l'égalité « = »), un sous-ensemble $R_{\mathcal{M}}$ de $|\mathcal{M}|^n$.

Remarque 2.9. ▷ La relation « = » est toujours interprétée par la vraie égalité :

$$\{(a, a) \mid a \in |\mathcal{M}|\}.$$

- ▷ On note, par abus de notation, $\mathcal{M}$ pour $|\mathcal{M}|$.
- ▷ Par convention, $|\mathcal{M}|^0 = \{\emptyset\}$.

Exemple 2.9. Avec $\mathcal{L}_{\text{corps}} = \{0, 1, +, \times, -, \square^{-1}\}$, on peut choisir

- ▷ $|\mathcal{M}| = \mathbb{R}$ avec $0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, +_{\mathbb{R}}, \times_{\mathbb{R}}, -_{\mathbb{R}}$ et $\square_{\mathbb{R}}^{-1}$;
- ▷ ou $|\mathcal{M}| = \mathbb{R}$ avec $2_{\mathbb{R}}, 2_{\mathbb{R}}, -_{\mathbb{R}}, +_{\mathbb{R}}$, etc.

Définissons la *vérité*.

Définition 2.16. Soit $\mathcal{M}$ une interprétation de $\mathcal{L}$.

- ▷ Un *environnement* est une fonction de l'ensemble des variables dans $|\mathcal{M}|$.
- ▷ Si e est un environnement et $a \in |\mathcal{M}|$, on note $e[x := a]$ l'environnement e' tel que $e'(x) = a$ et pour tout $y \neq x$, $e(y) = e'(y)$.
- ▷ La *valeur* d'un terme t dans l'environnement e , notée $\text{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)$, est définie par induction sur l'ensemble des

termes de la façon suivante :

- si c est une constante, $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(c, e) := c_{\mathcal{M}}$;
- si x est une variable $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(x, e) = e(x)$;
- si f est une fonction n -aire,

$$\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(f(t_1, \dots, t_n), e) = f_{\mathcal{M}}(\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t_1, e), \dots, \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t_n, e)).$$

Remarque 2.10. La valeur $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)$ est un élément de $|\mathcal{M}|$.

Exemple 2.10. Dans $\mathcal{L}_{\text{arith}} = \{0, 1, +, \times\}$, avec l'interprétation

$$\mathcal{M} : \mathbb{N}, 0_{\mathbb{N}}, 1_{\mathbb{N}}, +_{\mathbb{N}}, \times_{\mathbb{N}},$$

et l'environnement

$$e : \quad x_1 \mapsto 2_{\mathbb{N}} \quad x_2 \mapsto 0_{\mathbb{N}} \quad x_3 \mapsto 3_{\mathbb{N}},$$

la valeur du terme $t := (1 \times x_1) + (x_2 \times x_3) + x_2$ dans l'environnement e est $2_{\mathbb{N}} = (1_{\mathbb{N}} \times 2_{\mathbb{N}}) + (0_{\mathbb{N}} \times 3_{\mathbb{N}}) + 0_{\mathbb{N}}$.

Lemme 2.1. La valeur $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)$ ne dépend que de la valeur de e sur les variables de t .

Notation. $\triangleright$ Lorsque cela est possible, on oublie $\mathcal{M}$ et e dans la notation, et on note $\mathcal{Val}(t)$.

- $\triangleright$ À la place de $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)$ quand $x_1, \dots, x_n$ sont les variables de t et $e(x_1) = a_1, \dots, e(x_n) = a_n$, on note $t[a_1, \dots, a_n]$ ou aussi $t[x_1 := a_1, \dots, x_n := a_n]$. C'est un *terme à paramètre*, mais attention ce n'est **ni un terme, ni une substitution**.

Définition 2.17. Soit $\mathcal{M}$ une interprétation d'un langage $\mathcal{L}$. La *valeur* d'une formule F de $\mathcal{L}$ dans l'environnement e est un élément de $\{0, 1\}$ noté $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$ et définie par induction sur l'en-

semble des formules par

- ▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(R(t_1, \dots, t_n), e) = 1$ ssi $(\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t_1, e), \dots, \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(t_n, e)) \in R_{\mathcal{M}}$;
- ▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(\perp, e) = 0$;
- ▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(\neg F, e) = 1 - \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$;
- ▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F \wedge G, e) = \min(\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e), \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(G, e))$;
- ▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F \vee G, e) = \max(\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e), \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(G, e))$;
- ▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F \rightarrow G, e) = 1$ ssi $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e) \leq \mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(G, e)$;
- ▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(\forall x F, e) = 1$ ssi pour tout $a \in |\mathcal{M}|$, $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e[x := a]) = 1$;
- ▷ $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(\exists x F, e) = 1$ ssi il existe $a \in |\mathcal{M}|$, $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e[x := a]) = 1$.

Remarque 2.11. Ainsi définis, les connecteurs ont leur sens courant.

Dans le cas du calcul propositionnel, si R est d'arité 0, *i.e.* une variable propositionnelle, comme $|\mathcal{M}|^0 = \{\emptyset\}$ alors on a deux possibilités :

- ▷ ou bien $R = \emptyset$, et alors $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(R, e) = 0$;
- ▷ ou bien $R = \{\emptyset\}$, et alors $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(R, e) = 1$.

Notation. À la place de $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e) = 1$, on note aussi $\mathcal{M}, e \models F$ et on dit que $\mathcal{M}$ *satisfait* F , que $\mathcal{M}$ est un *modèle* de F (dans l'environnement e), ou que F est vraie dans $\mathcal{M}$.

Lemme 2.2. La valeur $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$ ne dépend que de la valeur de e sur les variables libres de F .

Preuve. En exercice. □

Corollaire 2.1. Si F est close, alors $\mathcal{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$ ne dépend pas de e et on note $\mathcal{M} \models F$ ou $\mathcal{M} \not\models F$.

Remarque 2.12. Dans le cas des formules closes, pour obtenir la valeur de F , on doit quand même utiliser un environnement lorsqu'on doit traiter un $\forall$ ou un $\exists$.

Notation. On note $F[a_1, \dots, a_n]$ pour $\text{Val}_{\mathcal{M}}(F, e)$ avec $e(x_1) = a_1, \dots, e(x_n) = a_n$. C'est une *formule à paramètres*, mais ce n'est **pas** une *formule*.

Exemple 2.11. Dans $\mathcal{L} = \{S\}$ où S est une relation binaire, on considère deux interprétations :

- ▷ $\mathcal{N} : |\mathcal{N}| = \mathbb{N}$ avec $S_{\mathcal{N}} = \{(x, y) \mid x < y\}$,
- ▷ $\mathcal{R} : |\mathcal{R}| = \mathbb{R}$ avec $S_{\mathcal{R}} = \{(x, y) \mid x < y\}$;

et deux formules

- ▷ $F = \forall x \forall y (S x y \rightarrow \exists z (S x z \wedge S z y))$,
- ▷ $G = \exists x \forall y (x = y \vee S x y)$;

alors on a

$$\mathcal{N} \not\models F \quad \mathcal{R} \models F \quad \mathcal{N} \models G \quad \mathcal{R} \not\models G.$$

En effet, la formule F représente le fait d'être dense pour un ordre, et G d'avoir un plus petit élément.

Définition 2.18. Dans un langage $\mathcal{L}$, une formule F est un *théorème (logique)* si pour toute structure $\mathcal{M}$ et tout environnement e , on a $\mathcal{M}, e \models F$.

Exemple 2.12. On a quelques théorèmes simples : $\forall x \neg \perp$, et $\forall x x = x$ et même $x = x$ car on ne demande pas que la formule soit close.

Dans $\mathcal{L}_g = \{e, *, \square^{-1}\}$, on considère deux formules

- ▷ $F = \forall x \forall y \forall z \left(\begin{array}{c} x * (y * z) = (x * y) * z \\ \wedge \\ x * e = e * x = x \\ \wedge \\ \exists t (x * t = e \wedge t * x = e) \end{array} \right)$;
- ▷ et $G = \forall e \forall e' (\forall x (x * e = x * e' = x) \rightarrow e = e')$.

Aucune des deux n'est un théorème (F n'est vrai que dans les groupes, et c'est même la définition de groupe, et G est vraie en particulier dans les monoïdes (unicité du neutre à droite)⁶), mais $F \rightarrow G$ est un théorème logique.

Définition 2.19. Soient $\mathcal{L}$ et $\mathcal{L}'$ deux langages. On dit que $\mathcal{L}'$ *enrichit* $\mathcal{L}$ ou que $\mathcal{L}$ est une *restriction* de $\mathcal{L}'$ si $\mathcal{L} \subseteq \mathcal{L}'$.

Dans ce cas, si $\mathcal{M}$ est une interprétation de $\mathcal{L}$, et si $\mathcal{M}'$ est une interprétation de $\mathcal{L}'$ alors on dit que $\mathcal{M}'$ est un *enrichissement* de $\mathcal{M}$ ou que $\mathcal{M}$ est une *restriction* de $\mathcal{M}'$ ssi $|\mathcal{M}| = |\mathcal{M}'|$ et chaque symbole de $\mathcal{L}$ a la même interprétation dans $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}'$, i.e. du point de vue de $\mathcal{L}$, $\mathcal{M}$ et $\mathcal{M}'$ sont les mêmes.

Exemple 2.13. Avec $\mathcal{L} = \{e, *\}$ et $\mathcal{L}' = \{e, *, \square^{-1}\}$, $\mathcal{L}'$ est une extension de $\mathcal{L}$. On considère

- ▷ $\mathcal{M} : \quad |\mathcal{M}| = \mathbb{Z} \quad e_{\mathcal{M}} = 0_{\mathbb{Z}} \quad *_{\mathcal{M}} = +_{\mathbb{Z}};$
- ▷ $\mathcal{M}' : \quad |\mathcal{M}'| = \mathbb{Z} \quad e_{\mathcal{M}'} = 0_{\mathbb{Z}} \quad *_{\mathcal{M}'} = +_{\mathbb{Z}} \quad \square_{\mathcal{M}'}^{-1} = \text{id}_{\mathbb{Z}},$

et alors $\mathcal{M}'$ est une extension de $\mathcal{M}$.

Proposition 2.1. Si une interprétation $\mathcal{M}$ de $\mathcal{L}$ est un enrichissement d'une interprétation $\mathcal{M}'$ de $\mathcal{L}'$, alors pour tout environnement e ,

1. si t est un terme de $\mathcal{L}$, alors $\text{Val}_{\mathcal{M}}(t, e) = \text{Val}_{\mathcal{M}'}(t, e);$
2. si F est une formule de $\mathcal{L}$ alors $\text{Val}_{\mathcal{M}}(F, e) = \text{Val}_{\mathcal{M}'}(F, e).$

Preuve. En exercice. □

Corollaire 2.2. La vérité d'une formule dans une interprétation ne dépend que de la restriction de cette interprétation au langage de la formule. □

6. Et, il existe des modèles qui ne vérifient pas G , il suffit par exemple de définir $x *_{\mathcal{M}} y := x$ où $\mathcal{M}$ a au moins deux éléments

Définition 2.20. Deux formules F et G sont *équivalentes* si $F \leftrightarrow G$ est un théorème logique.

Proposition 2.2. Toute formule est équivalente à une formule n'utilisant que les connecteurs logiques $\neg$, $\vee$ et $\exists$. $\square$

Définition 2.21. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$.

1. Une fonction $\varphi : |\mathcal{M}| \rightarrow |\mathcal{N}|$ est appelée un $\mathcal{L}$ -*morphisme* de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$ lorsque

- ▷ pour chaque symbole de constante c , on a $\varphi(c_{\mathcal{M}}) = c_{\mathcal{N}}$;
- ▷ pour chaque symbole f de fonction n -aire, on a

$$\varphi(f_{\mathcal{M}}(a_1, \dots, a_n)) = f_{\mathcal{N}}(\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) ;$$

- ▷ pour chaque symbole R de relation n -aire (autre que « = »), on a

$$(a_1, \dots, a_n) \in R_{\mathcal{M}} \text{ ssi } (\varphi(a_1), \dots, \varphi(a_n)) \in R_{\mathcal{N}}.$$

2. Un $\mathcal{L}$ -*isomorphisme* est un $\mathcal{L}$ -morphisme bijectif.
3. On dit que $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ sont *isomorphes* s'il existe un $\mathcal{L}$ -isomorphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$.

Remarque 2.13. 1. On ne dit rien sur « = » car si on impose la même condition que pour les autres relations alors nécessairement φ est injectif.

2. La notion dépend du langage $\mathcal{L}$.
3. Lorsqu'on a deux structures isomorphes, on les confond, ce sont les mêmes, c'est un renommage.

Exemple 2.14. Avec $\mathcal{L}_{\text{ann}} = \{0, +, \times, -\}$ et $\mathcal{L}' = \mathcal{L}_{\text{ann}} \cup \{1\}$, et les deux modèles $\mathcal{M} : \mathbb{Z}/3\mathbb{Z}$ et $\mathcal{N} = \mathbb{Z}/12\mathbb{Z}$, on considère la

fonction définie (on néglige les cas inintéressants) par $\varphi(\bar{n}) = \overline{4n}$.

Est-ce que φ est un morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$? Oui... et non...

Dans $\mathcal{L}$ c'est le cas, mais pas dans $\mathcal{L}'$ car $\varphi(1) = 4$.

Exemple 2.15. Dans $\mathcal{L} = \{c, f, R\}$ avec f une fonction binaire, et R une relation binaire, on considère

▷ $\mathcal{M} : \mathbb{R}, 0, +, \leq ;$

▷ $\mathcal{N} :]0, +\infty[, 1, \times, \leq .$

Existe-t-il un morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$? Oui, l'exponentielle.

Proposition 2.3. La composée de deux morphismes (*resp.* isomorphisme) est un morphisme (*resp.* un isomorphisme). $\square$

Notation. Si φ est un morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$ et e est un environnement de $\mathcal{M}$, alors on note $\varphi(e)$ pour $\varphi \circ e$. C'est un environnement de $\mathcal{N}$.

Lemme 2.3. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$, et φ un morphisme de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$. Alors pour tout terme t et tout environnement e , on a

$$\varphi(\text{Val}_{\mathcal{M}}(t, e)) = \text{Val}_{\mathcal{N}}(t, \varphi(e)).$$

$\square$

Lemme 2.4. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$, et φ un morphisme *injectif* de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$. Alors pour toute formule atomique F et tout environnement e , on a

$$\mathcal{M}, e \models F \text{ ssi } \mathcal{N}, \varphi(e) \models F$$

Lemme 2.5. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$, et φ un

isomorphisme⁷ de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$. Alors pour toute formule F et tout environnement e , on a

$$\mathcal{M}, e \models F \text{ ssi } \mathcal{N}, \varphi(e) \models F$$

Corollaire 2.3. Deux interprétations isomorphes satisfont les mêmes formules closes.

Exercice 2.4. Les groupes $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ et $\mathbb{Z}/2\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ sont-ils isomorphes ? Non. En effet, les deux formules

- ▷ $\exists x (x \neq e \wedge x * x \neq e \wedge x * (x * x) \neq e \wedge x * (x * (x * x)) = e)$,
- ▷ $\forall x (x * x) = e$

ne sont pas vraies dans les deux (pour la première, elle est vraie dans $\mathbb{Z}/4\mathbb{Z}$ mais pas dans $(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})^2$ et pour la seconde, c'est l'inverse).

Remarque 2.14. La réciproque du corollaire est **fausse** : deux interprétations qui satisfont les mêmes formules closes ne sont pas nécessairement isomorphes. Par exemple, avec $\mathcal{L} = \{\leq\}$, les interprétations $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ satisfont les mêmes formules closes, mais ne sont pas isomorphes.

Définition 2.22. Soit $\mathcal{L}$ un langage, $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$. On dit que $\mathcal{N}$ est une *extension* de $\mathcal{M}$ (ou $\mathcal{M}$ est une *sous-interprétation* de $\mathcal{N}$) si les conditions suivantes sont satisfaites :

- ▷ $|\mathcal{M}| \subseteq |\mathcal{N}|$;
- ▷ pour tout symbole de constante c , on a $c_{\mathcal{M}} = c_{\mathcal{N}}$;
- ▷ pour tout symbole de fonction n -aire f , on a $f_{\mathcal{M}} = f_{\mathcal{N}}|_{|\mathcal{M}|^n}$ (donc en particulier $f_{\mathcal{N}}(|\mathcal{M}|^n) \subseteq |\mathcal{M}|$) ;
- ▷ pour tout symbole de relation n -aire R , on a $R_{\mathcal{M}} = R_{\mathcal{N}} \cap |\mathcal{M}|^n$

7. On utilise ici la *surjectivité* pour le « $\exists$ ».

$$|\mathcal{M}|^n.$$

Proposition 2.4. Soient $\mathcal{M}$ et $\mathcal{N}$ deux interprétations de $\mathcal{L}$. Alors $\mathcal{M}$ est isomorphe à une sous-interprétation $\mathcal{M}'$ de $\mathcal{N}$ si et seulement si, il existe un morphisme injectif de $\mathcal{M}$ dans $\mathcal{N}$.

Exemple 2.16 (Construction de $\mathbb{Z}$ à partir de $\mathbb{N}$). On considère la relation $(p, q) \sim (p', q')$ si $p + q' = p' + q$. C'est une relation d'équivalence sur $\mathbb{N}^2$. On pose $\mathbb{Z} := \mathbb{N}^2 / \sim$. Il y a un isomorphisme $\mathbb{N}^2 / \sim \rightarrow \mathbb{Z}$ donné par $(p, q) \mapsto p - q$. Est-ce qu'on a $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{N}^2 / \sim$? D'un point de vue ensembliste, non. Mais, généralement, l'inclusion signifie avoir un morphisme injectif de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}^2 / \sim$.

Définition 2.23. Une *théorie* est un ensemble (fini ou pas) de formules closes. Les éléments de la théorie sont appelés *axiomes*.

Exemple 2.17. La *théorie des groupes* est

$$\begin{aligned} T_{\text{groupe}} := \{ & \forall x (x * e = e * x = x), \\ & \forall x (x * x^{-1} = e \wedge x^{-1} * x = e), \\ & \forall x \forall y \forall z (x * (y * z) = (x * y) * z) \} \end{aligned}$$

dans le langage $\mathcal{L}_g$.

Exemple 2.18. La *théorie des ensembles infinis* est

$$\begin{aligned} T_{\text{ens infinis}} := \{ & \exists x (x = x), \\ & \exists x \exists y (x \neq y), \\ & \exists x \exists y \exists z (x \neq y \wedge y \neq z \wedge z \neq x) \\ & \dots \} \end{aligned}$$

dans le langage $\mathcal{L}_{\text{ens}}$.

Définition 2.24 (Sémantique). ▷ Une interprétation $\mathcal{M}$ *satisfait* T (ou $\mathcal{M}$ est un *modèle* de T), noté $\mathcal{M} \models T$, si $\mathcal{M}$ satisfait toutes les formules de T .

- ▷ Une théorie T est *contradictoire* s'il n'existe pas de modèle de T . Sinon, on dit qu'elle est *non-contradictoire*, ou *satisfiable*, ou *satisfaisable*.

Exemple 2.19. Les deux théories précédentes, T_{groupes} et $T_{\text{ens infinis}}$, sont non-contradictaires.

Définition 2.25 (Syntaxique). Soit T une théorie.

- ▷ Soit A une formule. On note $T \vdash A$ s'il existe un sous-ensemble fini T' tel que $T' \subseteq T$ et $T' \vdash A$.
- ▷ On dit que T est *consistante* si $T \not\vdash \perp$, sinon T est *inconsistante*.
- ▷ On dit que T est *complète* (« *axiome-complète* ») si T est consistante et, pour toute formule $F \in \mathcal{F}$, on a $T \vdash F$ ou on a $T \vdash \neg F$.

Exemple 2.20. La théorie des groupes n'est pas complète : par exemple,

$$F := \forall x \forall y (x * y = y * x)$$

est parfois vraie, parfois fausse, cela dépend du groupe considéré.⁸

Exemple 2.21. La théorie

$$T = \mathbf{Th}(\mathbb{N}) := \{F \mid \mathbb{N} \models F\}$$

est complète mais pas pratique.

8. On applique ici le théorème de correction, vu plus tard.

De par le théorème d'*incomplétude de Gödel*, on montre qu'on ne peut pas avoir de *joli* ensemble d'axiomes pour $\mathbb{N}$.

Proposition 2.5. Soit T une théorie complète.

1. Soit A une formule close. On a $T \vdash \neg A$ ssi $T \not\vdash A$.
2. Soient A et B des formules closes. On a $T \vdash A \vee B$ ssi $T \vdash A$ ou $T \vdash B$.

Preuve. $\triangleright$ Si $T \vdash \neg A$ et $T \vdash A$, alors il existe $T', T'' \subseteq_{\text{fini}} T$ tels que $T' \vdash \neg A$ et $T'' \vdash A$. On a donc $T' \cup T'' \vdash \perp$ par :

$$\frac{\frac{T' \vdash \neg A}{T' \cup T'' \vdash \neg A} \text{ aff} \quad \frac{T'' \vdash A}{T' \cup T'' \vdash A} \text{ aff}}{T' \cup T'' \vdash \perp} \neg_e$$

On en conclut que $T \vdash \perp$, absurde car T est supposée complète donc consistante. On a donc $T \vdash \neg A$ implique $T \not\vdash A$.

Réciproquement, si $T \not\vdash \neg A$, alors $T \vdash A$ puisque T est complète.

- $\triangleright$ Si $T \vdash A$ ou $T \vdash B$, alors par la règle $\vee_i^g$ ou $\vee_i^d$, on montre que $T \vdash A \vee B$.

En outre, si $T \not\vdash A$ et $T \not\vdash B$, alors d'après 1, on a $T \vdash \neg A$ et $T \vdash \neg B$. On montre ainsi (en exercice) que $T \vdash \neg(A \vee B)$ d'où $T \not\vdash A \vee B$ grâce à 1.

□

2.5 Théorème de complétude de Gödel.

Théorème 2.1 (Complétude de Gödel (à double sens)).

Version 1. Soient T une théorie et F une formule close. On a $T \vdash F$ ssi $T \models F$.

Version 2. Une théorie T est consistante (syntaxe) ssi elle est

non-contradictoire (sémantique).

Remarque 2.15. La version 1 se décompose en deux théorèmes :

- ▷ le *théorème de correction* (ce que l'on prouve est vrai)

$$T \vdash F \implies T \models F ;$$

- ▷ le *théorème de complétude* (ce qui est vrai est prouvable)

$$T \models F \implies T \vdash F.$$

Pour la version 2, on peut aussi la décomposer en deux théorèmes⁹ :

- ▷ la *correction*, T non-contradictoire implique T consistante ;
- ▷ la *complétude*, T consistante implique T non-contradictoire.

Par contraposée, on a aussi qu'une théorie contradictoire est inconsistante.

Proposition 2.6. Les deux versions du théorème de correction sont équivalentes.

Preuve. ▷ D'une part, on montre « non V2 implique non V1 ». Soit T non-contradictoire et inconsistante. Il existe un modèle $\mathcal{M}$ tel que $\mathcal{M} \models T$ et $T \vdash \perp$. Or, par définition, $\mathcal{M} \not\models \perp$ donc $T \not\models \perp$.

- ▷ D'autre part, on montre « V2 implique V1 ». Soient T et F tels que $T \vdash F$. Ainsi, $T \cup \neg F \vdash \perp$, donc $T \cup \{\neg F\}$ est inconsistante, et alors, d'après la version 2 de la correction, $T \cup \{\neg F\}$ est contradictoire, donc n'a pas de modèle. Autrement dit, tous les modèles de T sont des modèles de F , autrement dit $T \models F$.

□

9. On a une négation dans ce théorème, donc ce n'est pas syntaxe implique sémantique pour la correction, mais non sémantique implique non syntaxe.

Proposition 2.7. Les deux versions du théorème de complétude (sens unique) sont équivalentes.

Preuve. ▷ Soit T contradictoire. Elle n'a pas de modèle. Ainsi, on a $T \models \perp$ d'où $T \vdash \perp$ par la version 1. Elle est donc inconsistante.

▷ Soient T et F telles que $T \models F$. Considérons $T \cup \{\neg F\}$: cette théorie n'a pas de modèle, donc est contradictoire, donc est inconsistante, et on a donc que $T \cup \{\neg F\} \vdash \perp$ d'où $T \vdash F$ par $\perp_e$.

□

Remarque 2.16 (Attention !). On utilise « $\models$ » dans deux sens.

- ▷ Dans le sens *modèle* $\models$ *formule*, on dit qu'une formule est vraie dans un modèle, c'est le sens classique.
- ▷ Dans le sens *théorie* $\models$ *formule*, on dit qu'une formule est vraie dans tous les modèles de la théorie, c'est un sens plus inhabituel.

2.5.1 Preuve du théorème de correction.

Montrons la version 1 du théorème de correction.

Proposition 2.8. Soient T une théorie, $\mathcal{M}$ une interprétation et F une formule close. Si $\mathcal{M} \models T$ et $T \vdash F$ alors $\mathcal{M} \models F$.

Preuve. Comme d'habitude, pour montrer quelque chose sur les formules closes, on commence par les formules et même les termes. On commence par montrer que la substitution dans les termes a un sens sémantique.

Lemme 2.6. Soient t et u des termes et e un environnement. Alors, $\mathcal{V}al(t[x := u], e) = \mathcal{V}al(t, e[x := \mathcal{V}al(u, e)])$.

Preuve. En exercice. □

Lemme 2.7. Soient A une formule, t un terme, et e un environnement. Alors $\mathcal{M}, e \models A[x := t]$ ssi $\mathcal{M}, e[x := \mathcal{V}al(t, e)] \models A$.

Preuve. En exercice. □

On termine la preuve en montrant le lemme (plus fort que la proposition) ci-dessous.

Lemme 2.8. Soient Γ un ensemble de formules et A une formule tels que $\Gamma \vdash A$. Soit $\mathcal{M}$ une interprétation et soit e un environnement. Si $\mathcal{M}, e \models \Gamma$, alors $\mathcal{M}, e \models A$.

Preuve. Par induction sur la preuve de $\Gamma \vdash A$, on montre la proposition précédente.

- ▷ Cas inductif $\rightarrow_i$. On sait que A est de la forme $B \rightarrow C$, et on a $\Gamma, B \vdash C$. Soient $\mathcal{M}$ et e tels que $\mathcal{M}, e \models \Gamma$. Montrons que $\mathcal{M}, e \models B \rightarrow C$. Il faut donc montrer que si $\mathcal{M}, e \models B$ alors $\mathcal{M}, e \models C$. Si $\mathcal{M}, e \models B$ alors $\mathcal{M}, e \models \Gamma \cup \{B\}$. Or, comme $\Gamma, B \vdash C$, par hypothèse d'induction, on obtient $\mathcal{M}, e \models C$.
- ▷ Cas inductif $\forall_e$. On sait que A est de la forme $B[x := t]$, avec $\Gamma \vdash \forall x B$. Soient $\mathcal{M}$ une interprétation et e un environnement tels que $\mathcal{M}, e \models \Gamma$. L'hypothèse de récurrence donne $\mathcal{M}, e \models \forall x B$, d'où $\mathcal{M}, e[x := \mathcal{V}al(t, e)] \models B$ et on conclut $\mathcal{M}, e \models B[x := t]$ grâce au lemme précédent.
- ▷ Les autres cas inductifs sont laissés en exercice.
- ▷ Cas de base **ax**. Si $A \in \Gamma$ et $\mathcal{M}, e \models \Gamma$ alors $\mathcal{M}, e \models A$.
- ▷ Cas de base $=_i$. On a, pour tous $\mathcal{M}, e$ que $\mathcal{M}, e \models t = t$. □



2.5.2 Preuve du théorème de complétude.

On va montrer la version 2, en *trois étapes*. Soit T une théorie consistante sur le langage $\mathcal{L}$.

1. On enrichit le langage $\mathcal{L}$ en $\mathcal{L}'$ avec des constantes, appelées *témoins de Henkin*, qui nous donnerons les éléments de notre ensemble de base : les termes.
2. Pour définir complètement le modèle, on complète la théorie T en une théorie Th sur $\mathcal{L}'$.
3. On quotiente pour avoir la vraie égalité dans le modèle.

Cette construction est assez similaire à la définition de $\mathbb{C}$ comme le quotient $\mathbb{R}[X]/(X^2 + 1)$.

Proposition 2.9. On peut étendre $\mathcal{L}$ en $\mathcal{L}'$ et T en T' consistante tels que, pour toute formule $F(x)$ de $\mathcal{L}'$, ayant pour seule variable libre x , il existe un symbole de constante c_F de $\mathcal{L}'$ tel que l'on ait $T' \vdash \exists x F(x) \rightarrow F(c_F)$, d'où le nom de témoin.

Preuve. On fait la construction « par le bas » :

- ▷ $\mathcal{L}_0 = \mathcal{L}$;
- ▷ $T_0 = T$;
- ▷ $\mathcal{L}_{n+1} = \mathcal{L}_n \cup \{c_F \mid F \text{ formule à une variable libre de } \mathcal{L}_n\}$;
- ▷ $T_{n+1} = T_n \cup \{\exists x F \rightarrow F(c_F) \mid F \text{ formule de } \mathcal{L}_n\}$;
- ▷ et enfin $\mathcal{L}' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} \mathcal{L}_n$ et $T' = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} T_n$.

On commence par montrer quelques lemmes.

Lemme 2.9. Soient Γ un ensemble de formules et A une formule. Soit c un symbole de constante qui n'apparaît ni dans Γ ni dans A . Si $\Gamma \vdash A[x := c]$ alors $\Gamma \vdash \forall x A$.

Preuve. Idée de la preuve. Quitte à renommer, on peut supposer que x n'apparaît pas dans Γ , ni dans la preuve de $\Gamma \vdash A[x := c]$. Alors, de la preuve de $\Gamma \vdash A[x := c]$, on peut déduire une preuve de $\Gamma \vdash A(x)$ en remplaçant c par x . Avec la règle $\forall_i$, on en conclut que $\Gamma \vdash \forall x A$. $\square$

Lemme 2.10. Pour toute formule F à une variable libre x sur le langage $\mathcal{L}'$,

$$T' \vdash \exists x F(x) \rightarrow F(c_F).$$

Preuve. La formule F a un nombre fini de constantes (car c'est un mot fini), donc F est une formule sur $\mathcal{L}_n$ pour un certain $n \in \mathbb{N}$, donc $(\exists x F(x) \rightarrow F(c_F)) \in T_{n+1} \subseteq T'$. $\square$

Il nous reste à montrer que la théorie T' est consistante.

Il suffit de montrer que tous les T_n sont consistantes. En effet, si T' est non-consistante, il existe un ensemble fini $T'' \subseteq T'$ tel que $T'' \vdash \perp$. Comme T'' est fini, il existe un certain $n \in \mathbb{N}$ tel que $T'' \subseteq T_n$ et donc $T_n \vdash \perp$.

On montre par récurrence sur n que T_n est consistante.

- ▷ On a $T_0 = T$ qui est consistante par hypothèse.
- ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que T_n est consistante. Supposons $T_{n+1} \vdash \perp$. Alors, il existe des formules à une variable libre $F_1, \dots, F_k$ écrites sur $\mathcal{L}_n$ telles que

$$T_n \cup \{ \exists x F_i \rightarrow F_i(c_{F_i}) \mid 1 \leq i \leq k \} \vdash \perp.$$

Ainsi (exercice)

$$T_n \vdash \left(\bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i \rightarrow F_i(c_{F_i})) \right) \rightarrow \perp.$$

Les c_{F_i} ne sont pas dans T_n d'où, d'après le lemme 2.9,

$$T_n \vdash \forall y_1 \forall y_2 \dots \forall y_n \left(\bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i \rightarrow F_i(y_i)) \right) \rightarrow \perp.$$

On peut montrer que (théorème logique)

$$\vdash \forall y (A(y) \rightarrow \perp) \leftrightarrow (\exists y A(y) \rightarrow \perp), \quad (\star)$$

d'où

$$T_n \vdash \left(\exists y_1 \exists y_2 \dots \exists y_n \bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i \rightarrow F_i(y_i)) \right) \rightarrow \perp.$$

On a aussi

$$\vdash \exists y_1 \exists y_2 (A(y_1) \wedge A(y_2)) \leftrightarrow (\exists y_1 A(y_1)) \wedge (\exists y_2 A(y_2)), \quad (\star\star)$$

et pour y non libre dans A , on a

$$\vdash \exists y (A \rightarrow B) \leftrightarrow (A \rightarrow \exists y B).$$

On a donc

$$T_n \vdash \left(\bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i(x) \rightarrow \exists y_i F_i(y_i)) \right) \rightarrow \perp.$$

Or,

$$\vdash \bigwedge_{1 \leq i \leq k} (\exists x F_i(x) \rightarrow \exists y_i F_i(y_i)) \quad (\star\star\star)$$

On a donc $T_n \vdash \perp$, ce qui contredit l'hypothèse, d'où T_{n+1} consistante.

En exercice, on pourra montrer les théorèmes logiques $(\star)$, $(\star\star)$, et $(\star\star\star)$.

□

Ensuite, on veut compléter T' en préservant le résultat de la proposition précédente. On cherche Th (axiome-)complète telle que $T' \subseteq \text{Th}$

et pour toute formule à une variable libre F de $\mathcal{L}'$, on a

$$\text{Th} \vdash \exists x F \rightarrow F(c_F).$$

Faisons le cas dénombrable (sinon, lemme de Zorn) : supposons $\mathcal{L}'$ au plus dénombrable. Soit $(F_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une énumération des formules closes de $\mathcal{L}'$. On définit par récurrence

- ▷ $K_0 := T'$;
- ▷ pour tout $n \in \mathbb{N}$ tel que K_n est défini, si K_n est complète, on pose $K_{n+1} := K_n$, sinon avec $p \in \mathbb{N}$ minimal tel que l'on ait $K_n \not\vdash F_p$ et $K_n \not\vdash \neg F_p$, on pose $K_{n+1} := K_n \cup \{F_p\}$.

Lemme 2.11. On pose $\text{Th} := \bigcup_{n \in \mathbb{N}} K_n$. La théorie Th a les propriétés voulues.

Preuve. 1. On a $T' \subseteq \text{Th}$.

2. La théorie Th est consistante. En effet, il suffit de montrer que tous les K_n le sont (par les mêmes argument que la preuve précédente). Montrons le par récurrence.
 - ▷ La théorie $K_0 = T'$ est consistante par hypothèse.
 - ▷ Soit $n \in \mathbb{N}$ tel que K_n est consistante. Si K_n est complète, alors $K_{n+1} = K_n$ est consistante. Sinon soit $p \in \mathbb{N}$ tel que $K_{n+1} = K_n \cup \{F_p\}$. On a $K_n \not\vdash F_p$ et $K_n \not\vdash \neg F_p$. Si $K_n, F_p \vdash \perp$, alors par la règle $\neg_i$, on a $K_n \vdash \neg F_p$, ce qui est faux. Ainsi K_{n+1} est consistante.

On en conclut que Th est consistante.

3. La théorie Th est complète. Sinon, on dispose de $p \in \mathbb{N}$ tel que $\text{Th} \not\vdash F_p$ et $\text{Th} \not\vdash \neg F_p$. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $q_n \in \mathbb{N}$ tel que $K_{n+1} = K_n \cup \{F_{q_n}\}$ avec q_n minimal tel que $K_n \not\vdash F_{q_n}$ et $K_n \not\vdash \neg F_{q_n}$. La suite q est strictement croissante, donc $q_{p+1} > p$, ce qui contredit la minimalité de q_{p+1} .

□

On construit un quotient avec « $=$ » comme relation d'équivalence, puis on vérifie que les fonctions et relations sont bien définies (ne

dépendent pas du représentant choisit, comme pour les groupes quotients).

Soit $\mathcal{E}$ l'ensemble des termes clos de $\mathcal{L}'$, qui n'est pas vide car il contient les termes $c_{x=x}$ (avec la définition de c_F ci-avant). On définit sur $\mathcal{E}$ la relation $\sim$ définie par $t \sim t'$ ssi $\text{Th} \vdash t = t'$.

Exercice 2.5. Montrer que $\sim$ est une relation d'équivalence.

On pose enfin $|\mathcal{M}| := \mathcal{E}/\sim$. On notera $\bar{t}$ la classe d'un terme clos t . On définit l'interprétation des symboles de $\mathcal{L}'$:

- ▷ si c est une constante, alors $c_{\mathcal{M}} := \bar{c}$;
- ▷ si f est un symbole de fonctions d'arité n ,

$$f_{\mathcal{M}}(\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n) := \overline{f(t_1, \dots, t_n)}.$$

Lemme 2.12. La définition de $f_{\mathcal{M}}$ dépend pas des représentants choisis, c'est-à-dire si $\bar{u}_1 = \bar{t}_1, \dots, \bar{u}_n = \bar{t}_n$ alors

$$\overline{f(t_1, \dots, t_n)} = \overline{f(u_1, \dots, u_n)}.$$

Preuve. ▷ On a $\text{Th} \vdash t_i = u_i$ pour tout i par hypothèse

- ▷ donc avec $=_i$, on a $\text{Th} \vdash f(t_1, \dots, t_n) = f(t_1, \dots, t_n)$
- ▷ donc avec $=_e$, on a $\text{Th} \vdash f(u_1, t_2, \dots, t_n) = f(t_1, t_2, \dots, t_n)$
- ▷ ...etc...
- ▷ donc avec $=_e$, on a $\text{Th} \vdash f(u_1, \dots, u_n) = f(t_1, \dots, t_n)$

□

[suite de la définition de l'interprétation]

- ▷ si R est un symbole de relation d'arité n , on définit

$$(\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n) \in R_{\mathcal{M}} \text{ ssi } \text{Th} \vdash R(t_1, \dots, t_n).$$

Exercice 2.6. Montrer que cette définition ne dépend pas des représentants choisis.

Lemme 2.13. Soit F une formule à n variables libres et $t_1, \dots, t_n$ des termes clos. Alors, $\mathcal{M} \models F[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n]$ ssi $\text{Th} \vdash F[t_1, \dots, t_n]$.

Preuve. Par induction sur F en supposant que F n'utilise que $\neg$, $\vee$, $\exists$ comme connecteurs. En effet, pour toute formule G , il existe une formule F qui n'utilise que $\neg$, $\vee$, $\exists$ et qui vérifie $\vdash F \leftrightarrow G$, ce qui permet de conclure directement pour G si le résultat est vrai sur F .

- ▷ Pour $F = R(u_1, \dots, u_m)$, où les u_i sont des termes à n variables $x_1, \dots, x_n$, on a

$$F[t_1, \dots, t_n] = R(\underbrace{u_1(t_1, \dots, t_n)}_{v_1}, \dots, \underbrace{u_m(t_1, \dots, t_n)}_{v_m})$$

où l'on définit $v_i := u_i(t_1, \dots, t_n)$ qui est clos car les t_i sont clos. On veut montrer que

$$\mathcal{M} \models \underbrace{F[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n]}_{R(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)} \text{ ssi } \text{Th} \vdash \underbrace{F[t_1, \dots, t_n]}_{R(v_1, \dots, v_m)}.$$

Or, on a $\mathcal{M} \models R(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m)$ ssi $(\bar{v}_1, \dots, \bar{v}_m) \in R_{\mathcal{M}}$, i.e. ssi $\text{Th} \vdash R(v_1, \dots, v_m)$, d'où le résultat.

- ▷ Pour $F = F_1 \vee F_2$, et $t_1, \dots, t_n$ sont des termes clos, on veut montrer que

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models F_1[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \vee F_2[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \\ \text{ssi } \text{Th} \vdash F_1[t_1, \dots, t_n] \vee F_2[t_1, \dots, t_n]. \end{aligned}$$

Or,

$$\begin{aligned}\mathcal{M} &\models F_1[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \vee F_2[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \\ \text{ssi } \mathcal{M} &\models F_1[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \text{ ou } \mathcal{M} \models F_2[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n] \\ \text{ssi } \text{Th} &\vdash F_1[t_1, \dots, t_n] \text{ ou } \text{Th} \vdash F_2[t_1, \dots, t_n]\end{aligned}$$

par hypothèse. Ainsi,

- avec $\forall_i^g$ et $\forall_i^d$, on a que $\text{Th} \vdash F_1[t_1, \dots, t_n] \vee F_2[t_1, \dots, t_n]$;
 - réciproquement, on utilise le lemme 2.5 car Th est complète.
- ▷ Pour $F = \neg G$, en exercice.
- ▷ Si $F = \exists x G$ et $t_1, \dots, t_n$ sont des termes clos, on a $\mathcal{M} \models \exists x G[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n, x]$ ssi il existe t dans $\mathcal{E}$ tel que $\mathcal{M} \models G[\bar{t}_1, \dots, \bar{t}_n, t]$, c'est-à-dire ssi il existe $t \in \mathcal{E}$ tel que $\text{Th} \vdash G(t_1, \dots, t_n, t)$ d'après l'hypothèse de récurrence. Si c'est le cas, on obtient $\text{Th} \vdash \exists x G(t_1, \dots, t_n, x)$ avec $\exists_i$. Réciproquement, si $\text{Th} \vdash \exists x G(t_1, \dots, t_n, x)$ alors $\text{Th} \vdash G(t_1, \dots, t_n, c_{G(t_1, \dots, t_n, x)})$, donc il existe un terme t tel que $\text{Th} \vdash G(t_1, \dots, t_n, t)$.

□

Lemme 2.14. On a $\mathcal{M} \models \text{Th}$ (et donc $\mathcal{M} \models T$).

Preuve. On montre que pour tout $F \in \text{Th}$, on a $\mathcal{M} \models F$. Pour cela, on utilise le lemme précédent : si F est close, alors

$$\mathcal{M} \models F \text{ ssi } \text{Th} \vdash F.$$

□

2.5.3 Compacité.


Théorème 2.2 (Compacité (sémantique)). Une théorie T est contradictoire ssi elle est finiment contradictoire, *i.e.* il existe

$T' \subseteq_{\text{fini}} T$ telle que T' est contradictoire.

Preuve. Soit T une théorie. Si T est finiment contradictoire, alors T est contradictoire. Réciproquement, supposons T contradictoire. On utilise le théorème de complétude. Ainsi T est inconsistante. Il existe donc $T' \subseteq_{\text{fini}} T$ avec T' inconsistante par le théorème de compacité syntaxique ci-dessous (qui est trivialement vrai). On applique le théorème de correction pour en déduire que T' est contradictoire. $\square$

Théorème 2.3 (Compacité (syntaxique)). Une théorie T est inconsistante ssi elle est finiment inconsistante.

Preuve. Ceci est évident car une preuve est finie. $\square$



Dans la suite de cette sous-section, on étudie des applications du théorème de compacité.

Théorème 2.4. Si une théorie T a des modèles finis arbitrairement grands, alors elle a un modèle infini.

Preuve. Posons, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$\varphi_n = \exists x_1 \dots \exists x_n \bigwedge_{1 \leq i < j \leq n} x_i \neq x_j,$$

puis $T' = T \cup \{\varphi_n, n \in \mathbb{N}^*\}$. Si T'' est une partie finie de T' ,

on dispose de $n \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $m \in \mathbb{N}$ tel que $\varphi_m \in T''$, $m \leq n$. Comme T admet des modèles finis arbitrairement grands, on dispose d'un modèle de T de cardinal au moins n , qui est donc modèle de T'' . Ceci étant valable pour toute partie finie de T' , d'après le théorème de compacité T' est non-contradictoire. Autrement dit, elle admet un modèle, qui est un modèle infini de T . $\square$

Corollaire 2.4. Il n'y a pas de théorie des groupes finis *i.e.* un ensemble d'axiomes dont les modèles sont exactement les groupes finis.

Théorème 2.5 (Löwenheim-Skolem). Soit T une théorie dans un langage $\mathcal{L}$ et κ un cardinal infini tel que $\kappa \geq \text{card } \mathcal{L}$. Si T a un modèle infini, alors T a un modèle de cardinal κ .

Exemple 2.22.

- ▷ Avec $T = \mathbf{Th}(\mathbb{N})$, on a un modèle indénombrable de T .
- ▷ Avec $T = \mathbf{ZFC}$, on a un modèle dénombrable de T .

3 L'arithmétique de Peano.

- ▷ DEDEKIND (1888) et PEANO (1889) formalisent l'arithmétique.
- ▷ En 1900, David HILBERT, lors du 2ème ICM à Paris, donne un programme dont le 2nd problème est la *cohérence de l'arithmétique*.
- ▷ En 1901, RUSSEL donne son paradoxe concernant l'« ensemble » de tous les ensembles.
- ▷ En 1930, HILBERT est toujours optimiste : « On doit savoir, on saura ! »

La formalisation de l'arithmétique engendre deux questions :

1. est-ce que tout théorème est prouvable ? (▷ complétude)
2. existe-t-il un algorithme pour décider si un théorème est prouvable ? (▷ décidabilité)

Le second point est appelé « *Entscheidungsproblem* », le problème de décision, en 1928.

- ▷ En 1931, Gödel répond NON à ces deux questions.

On a donné plusieurs formalisations des algorithmes :

- ▷ en 1930, le λ -calcul de Church ;
- ▷ en 1931–34, les fonctions récursives de Herbrand et Gödel ;
- ▷ en 1936, les machines de Turing.

On démontre que les trois modèles sont équivalents.

La thèse de Church–Turing nous convainc qu'il n'existe pas de modèle plus évolué « dans la vraie vie ».

3.1 Les axiomes.

On définit le langage $\mathcal{L}_0 = \{\textcircled{0}, \textcircled{S}, \oplus, \otimes\}$ où

- ▷ $\textcircled{0}$ est un symbole de constante ;
- ▷ $\textcircled{S}$ est un symbole de fonction unaire ;
- ▷ $\oplus$ et $\otimes$ sont deux symboles de fonctions binaires.

On verra plus tard que l'on peut ajouter une relation binaire $\leq$.

Remarque 3.1 (Convention). On note $\mathbb{N}$ la $\mathcal{L}_0$ -structure de domaine $\mathbb{N}$ dans laquelle on interprète les symboles de manière habituelle :

- ▷ pour $\textcircled{0}$, c'est 0 ;
- ▷ pour $\textcircled{S}$, c'est $\lambda n.n + 1$ (i.e. $x \mapsto x + 1$) ;
- ▷ pour $\oplus$, c'est $\lambda n \lambda m.n + m$;
- ▷ pour $\otimes$, c'est $\lambda n \lambda m.n \times m$.

Les axiomes de Peano.

On se place dans le cas égalitaire. L'ensemble $\mathcal{P}$ est composé de $\mathcal{P}_0$ un ensemble fini d'axiomes (A1–A7) et d'un schéma d'induction (SI).

Trois axiomes pour le successeur :

$$\mathbf{A1.} \quad \forall x \neg(\textcircled{S}x = \textcircled{0})$$

$$\mathbf{A2.} \quad \forall x \exists y \left(\neg(x = \textcircled{0}) \rightarrow x = \textcircled{S}y \right)$$

$$\mathbf{A3.} \quad \forall x \forall y (\textcircled{S}x = \textcircled{S}y \rightarrow x = y)$$

Deux axiomes pour l'addition :

$$\mathbf{A4.} \quad \forall x (x \oplus \textcircled{0} = x)$$

$$\mathbf{A5.} \quad \forall x \forall y \left(x \oplus (\textcircled{S}y) = \textcircled{S}(x \oplus y) \right)$$

Deux axiomes pour la multiplication :

$$\mathbf{A6.} \quad \forall x (x \otimes \textcircled{0} = \textcircled{0})$$

$$\mathbf{A7.} \quad \forall x \forall y (x \otimes (\textcircled{\mathbf{S}} y) = (x \otimes y) \oplus x)$$

Et le schéma d'induction :

SI. Pour toute formule F de variables libres $x_0, \dots, x_n$,

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n \left(\begin{array}{l} F(\textcircled{0}, x_1, \dots, x_n) \rightarrow \\ \forall x (F(x, x_1, \dots, x_n) \rightarrow F(\textcircled{\mathbf{S}} x, x_1, \dots, x_n)) \rightarrow \\ \forall x F(x, x_1, \dots, x_n). \end{array} \right)$$

Remarque 3.2. $\triangleright$ Le schéma est le **SI** avec hypothèse faible, qui permet de montrer le **SI** avec hypothèse forte. On adopte la notation $\forall y \leq x, F(y, x_1, \dots, x_n)$ pour

$$\forall y ((\exists z z \oplus y = x) \rightarrow F(y, x_1, \dots, x_n)).$$

Le **SI** avec hypothèse forte est :

$$\forall x_1 \cdots \forall x_n (\forall x ((\forall y \leq x, F(y, x_1, \dots, x_n)) \rightarrow F(x, x_1, \dots, x_n)) \rightarrow \forall x F(x, x_1, \dots, x_n))$$

- $\triangleright$ L'ensemble $\mathcal{P}$ est non-contradictoire car $\mathbb{N}$ est un modèle, appelé *modèle standard*.
- $\triangleright$ On peut remplacer le **SI** par une nouvelle règle de démonstration :

$$\frac{\Gamma \vdash F(\textcircled{0}) \quad \Gamma \vdash \forall y (F(y) \rightarrow F(\textcircled{\mathbf{S}} y))}{\Gamma \vdash \forall x F(x)} \text{ rec}.$$

Exercice 3.1. Montrer l'équivalence entre **SI** et la nouvelle règle **rec**, *i.e.* on peut démontrer les mêmes théorèmes.

Notation. On note $\textcircled{n}$ le terme $\underbrace{\textcircled{\mathbf{S}} \cdots \textcircled{\mathbf{S}}}_{n \text{ fois}} \textcircled{0}$ pour $n \in \mathbb{N}$.

Définition 3.1. Dans une $\mathcal{L}_0$ -structure, on dit qu'un élément est *standard* s'il est l'interprétation d'un terme $\overline{n}$ avec $n \in \mathbb{N}$.

Remarque 3.3. Dans $\mathbb{N}$ (le modèle standard), tout élément est standard.

Théorème 3.1. Il existe des modèles de $\mathcal{P}$ non isomorphes à $\mathbb{N}$.

Preuve. 1. Avec le théorème de Löwenheim-Skolem, il existe un modèle de $\mathcal{P}$ de cardinal κ pour tout $\kappa \geq \aleph_0$, et $\text{card } \mathbb{N} = \aleph_0$.

2. Autre preuve, on considère un symbole de constante c et on pose $\mathcal{L} := \mathcal{L}_0 \cup \{c\}$. On considère la théorie

$$T := \mathcal{P} \cup \{ \neg(c = \overline{n}) \mid n \in \mathbb{N} \}.$$

Montrons que T a un modèle. Par le théorème de compacité de la logique du premier ordre, il suffit de montrer que T est finiment satisfiable. Soit $T' \subseteq_{\text{fini}} T$. On dispose de $n \in \mathbb{N}$ tel que si $\neg(c = \overline{k}) \in T'$, alors $k \leq n$. On étend l'interprétation $\mathbb{N}$ de $\mathcal{L}_0$ en une interprétation de $\mathcal{L}$ en posant $c_{\mathbb{N}} := n + 1$. Alors, $\mathbb{N}$ est un modèle de T' . Ainsi, T' est satisfiable et donc T aussi avec un modèle $\mathcal{M}$.

Montrons que $\mathbb{N}$ et $\mathcal{M}$ ne sont pas $\mathcal{L}_0$ -isomorphes. Par l'absurde, supposons qu'on ait un isomorphisme $\varphi : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{N}$. Alors $n = \varphi(c_{\mathcal{M}})$ satisfait les mêmes formules que $c_{\mathcal{M}}$, par exemple, $\mathcal{M}, (_ \mapsto c_{\mathcal{M}}) \models \neg(x = \overline{n})$. Or, on ne peut pas avoir $\mathbb{N}, (_ \mapsto n) \models \neg(x = \overline{n})$. **Absurde.**

□

On a montré au passage que tous les modèles isomorphes à $\mathbb{N}$ n'ont que des éléments standards.

Théorème 3.2. Dans tout modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{P}$,

1. l'addition est commutative et associative ;
2. la multiplication aussi ;
3. la multiplication est distributive par rapport à l'addition ;
4. tout élément est *régulier* pour l'addition :

$$\mathcal{M} \models \forall x \forall y \forall z (x \oplus y = x \oplus z \rightarrow y = z) ;$$

5. tout élément non nul est régulier pour la multiplication :

$$\mathcal{M} \models \forall x \forall y \forall z (\neg(x = \textcircled{0}) \wedge x \otimes y = x \otimes z \rightarrow y = z) ;$$

6. la formule suivante définit un ordre total sur $\mathcal{M}$ compatible avec $+$ et $\times$:

$$x \leq y \text{ ssi } \exists z (x \oplus z = y).$$

Preuve. On prouve la commutativité de $+$ en trois étapes.

1. On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x (\textcircled{0} \oplus x = x)$. On utilise le [S1](#) avec la formule $F(x) := (\textcircled{0} \oplus x = x)$.
 - ▷ On a $\mathcal{P} \vdash \textcircled{0} \oplus \textcircled{0} = \textcircled{0}$ par [A4](#).
 - ▷ On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x (F(x) \rightarrow F(\textcircled{\text{S}}x))$, c'est à dire :

$$\forall x ((\textcircled{0} \oplus x = x) \rightarrow (\textcircled{0} \oplus (\textcircled{\text{S}}x) = \textcircled{\text{S}}x)).$$

On peut le montrer par [A5](#).

Questions/Remarques :

- ▷ Pourquoi pas une récurrence normale ? On n'est pas forcément dans $\mathbb{N}$!
 - ▷ Grâce au théorème de complétude, on peut raisonner sur les modèles, donc en maths naïves.
2. On montre $\mathcal{P} \vdash \forall x \forall y (\textcircled{\text{S}}(x \oplus y) = (\textcircled{\text{S}}x) \oplus y)$. On veut utiliser le [S1](#) avec $F(x, y) := \textcircled{\text{S}}(x \oplus y) = (\textcircled{\text{S}}x) \oplus y$. Mais ça ne marche pas... (Pourquoi ?)

La bonne formule est $F(y, x) := (\mathbb{S})(x \oplus y) = (\mathbb{S}x) \oplus y$.

▷ On montre $\mathcal{P} \vdash F(\mathbb{0}, x)$, c'est à dire

$$\mathcal{P} \vdash (\mathbb{S})(x \oplus \mathbb{0}) = (\mathbb{S}x) \oplus \mathbb{0}.$$

Ceci est vrai car

$$(\mathbb{S})(x \oplus \mathbb{0}) \stackrel{\text{A4}}{=} \mathbb{S}x \stackrel{\text{A4}}{=} (\mathbb{S}x) \oplus \mathbb{0}.$$

▷ De plus, on a aussi $\mathcal{P} \vdash F(y, x) \rightarrow F(\mathbb{S}y, x)$ car : si $(\mathbb{S})(x \oplus y) = (\mathbb{S}x) \oplus y$, alors

$$\begin{aligned} (\mathbb{S})(x \oplus (\mathbb{S}y)) &\stackrel{\text{A5}}{=} (\mathbb{S}\mathbb{S})(x \oplus y) \\ &\stackrel{\text{hyp}}{=} (\mathbb{S})((\mathbb{S}x) \oplus y) \\ &\stackrel{\text{A5}}{=} ((\mathbb{S}x) \oplus (\mathbb{S}y)). \end{aligned}$$

3. On utilise le **SI** avec $F(x, y) := (x \oplus y = y \oplus x)$. D'une part, on a $F(\mathbb{0}, y) = (\mathbb{0} \oplus y = y \oplus \mathbb{0})$ par 1 et A4. D'autre part, si l'on a $x \oplus y = y \oplus x$ alors $(\mathbb{S}x) \oplus y = y \oplus (\mathbb{S}x)$ par A5 et 2. Par le **SI**, on conclut.


□

Exercice 3.2. Finir la preuve du théorème.

3.2 Liens entre $\mathbb{N}$ et un modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{P}$.

Définition 3.2. Soient $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$ et $\mathcal{N} \models \mathcal{P}_0$ avec $\mathcal{N}$ une sous-interprétation de $\mathcal{M}$, on dit que $\mathcal{N}$ est un segment initial de $\mathcal{M}$, ou que $\mathcal{M}$ est une extension finale de $\mathcal{N}$, si pour tous $a, b, c \in |\mathcal{M}|$ avec $a \in |\mathcal{N}|$ on a :

1. si $\mathcal{M} \models c \leq a$ alors $c \in |\mathcal{N}|$;
2. si $b \notin |\mathcal{N}|$ alors $\mathcal{M} \models a \leq b$.



Remarque 3.4. ▷ Les points peuvent être incomparables et dans $\mathcal{M}$.

- ▷ L'ensemble $\mathcal{P}_0$ est très faible, on ne montre même pas que $\oplus$ commute ou que $\leq$ est une relation d'ordre (c.f. TD).

Théorème 3.3. Soit $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$. Alors, le sous-ensemble de $\mathcal{M}$ suivant est une sous-interprétation de $\mathcal{M}$ qui est un segment initial et qui est isomorphe à $\mathbb{N}$:

$$\left\{ a \in |\mathcal{M}| \mid \begin{array}{l} \text{il existe } n \in \mathbb{N} \text{ tel que } a \\ \text{est l'interprétation} \\ \text{de } \underline{n} \text{ dans } \mathcal{M} \end{array} \right\}.$$

Preuve (Idée de la preuve). 1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \underline{n+1} = \underline{\mathbf{S}} \underline{n}$.

2. Pour tout $n, m \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \underline{m} \oplus \underline{n} = \underline{m+n}$.
3. Pour tout $n, m \in \mathbb{N}$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \underline{m} \otimes \underline{n} = \underline{m \times n}$.
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}_*$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \neg(\underline{n} = \underline{\mathbf{0}})$.
5. Pour tout $n \neq m$, on a $\mathcal{P}_0 \vdash \neg(\underline{m} = \underline{n})$.
6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$ (admis), on a

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall x \left(x \leq \underline{n} \rightarrow (x = \underline{\mathbf{0}} \vee x = \underline{\mathbf{1}} \vee \dots \vee x = \underline{n}) \right).$$

7. Pour tout x , on a $\mathcal{P}_0 \vdash \forall x (x \leq \underline{n} \vee \underline{n} \leq x)$.

□

3.3 Les fonctions représentables.

Cette section détaille un outil technique pour montrer le théorème d'incomplétude de Gödel vu plus tard. On code tout avec des entiers !

Définition 3.3. Soit $f : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction totale et $F(x_0, \dots, x_p)$ une formule de $\mathcal{L}_0$. On dit que F *représente* f si, pour tout p -uplet d'entiers $(n_1, \dots, n_p)$ on a :

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall y \left(F(y, \underline{n_1}, \dots, \underline{n_p}) \leftrightarrow y = \underline{f(n_1, \dots, n_p)} \right).$$

On dit que f est *représentable* s'il existe une formule qui la représente.

Un ensemble de p -uplets $A \subseteq \mathbb{N}^p$ est *représenté* par $F(x_1, \dots, x_p)$ si pour tout p -uplet d'entiers $(n_1, \dots, n_p)$, on a

1. si $(n_1, \dots, n_p) \in A$ alors $\mathcal{P}_0 \vdash F(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_p})$;
2. si $(n_1, \dots, n_p) \notin A$ alors $\mathcal{P}_0 \vdash \neg F(\underline{n_1}, \dots, \underline{n_p})$.

On dit que A est *représentable* s'il existe une formule qui le représente.

Exercice 3.3. Montrer qu'un ensemble est représentable ssi sa fonction indicatrice l'est.

Exemple 3.1 (Les briques de base des fonctions récursives).

- ▷ La fonction nulle $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto 0$ est représentée par $F(x_0, x_1) := x_0 = \underline{0}$.
- ▷ Les fonctions constantes $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto n$ sont représentées par $F(x_0, x_1) := x_0 = \underline{n}$, où $n \in \mathbb{N}$.
- ▷ Les projections $\pi_p^i : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}, (x_1, \dots, x_p) \mapsto x_i$ sont représentées par $F(x_0, x_1, \dots, x_p) := x_0 = x_i$.
- ▷ La fonction successeur $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, x \mapsto x+1$ est représentée par $F(x_0, x_1) := x_0 = \underline{\mathbf{S}} x_1$.

- ▷ L'addition $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}, (x, y) \mapsto x + y$ est représentée par $F(x_0, x_1, x_2) := x_0 = x_1 \oplus x_2$.
- ▷ La multiplication $f : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}, (x, y) \mapsto x \times y$ est représentée par $F(x_0, x_1, x_2) := x_0 = x_1 \otimes x_2$.

On introduit trois nouvelles opérations.

Récurrence. Soient $g(x_1, \dots, x_p)$ et $h(x_1, \dots, x_{p+2})$ des fonctions partielles. On définit une fonction partielle f par :

- ▷ $f(0, x_1, \dots, x_p) := g(x_1, \dots, x_p)$;
- ▷ $f(x_0 + 1, x_1, \dots, x_p) := h(x_0, f(x_0, \dots, x_p), x_1, \dots, x_p)$.

Composition. Soient $f_1, \dots, f_n$ des fonctions partielles de p variables et g une fonction partielle de n variables. Alors, la fonction composée $g(f_1, \dots, f_n)$ est définie en $(x_1, \dots, x_p)$ ssi les fonctions f_i le sont et g est définie en $(f_1(x_1, \dots, x_p), \dots, f_n(x_1, \dots, x_p))$.

Schéma μ . Soit $f(x_1, \dots, x_{p+1})$ une fonction partielle. Soit

$$g(x_1, \dots, x_p) := \mu y. (f(y, x_1, \dots, x_p) = 0).$$

Elle est définie en $(x_1, \dots, x_p)$ si et seulement s'il existe y tel que $f(y, x_1, \dots, x_p) = 0$ et tous les $f(x, x_1, \dots, x_p)$ sont définies pour $x \leq y$. Dans ce cas, $g(x_1, \dots, x_p)$ est le plus petit y tel que $f(y, x_1, \dots, x_p) = 0$.

Définition 3.4. L'ensemble des fonctions récursives primitives (*resp.* récursives) est le plus petit ensemble des fonctions contenant les briques de base et stable par composition et récurrence (*resp.* par composition, récurrence et schéma μ).

Exemple 3.2. Les fonctions

$$f(x_1, x_2, y) := y^2 - (x_1 + x_2)y + x_1x_2$$

et

$$f(x_1, x_2) := \min(x_1, x_2)$$

sont récursives primitives.

Définition 3.5. Une fonction récursive *totale* est une fonction récursive définie partout.

Remarque 3.5. ▷ Une fonction récursive primitive est totale.
 ▷ Une fonction récursive peut se fabriquer avec un seul schéma μ à la fin (c.f. cours de FDI).

Théorème 3.4. Toute fonction récursive totale est représentable.

On a déjà montré que les briques de base sont représentables. On montre trois lemmes qui montreront le théorème ci-dessus.

Lemme 3.1. L'ensemble des fonctions représentables est clos par composition.

Preuve. Soient $f_1(x_1, \dots, x_p), \dots, f_n(x_1, \dots, x_p)$ et $g(x_1, \dots, x_n)$ des fonctions représentées par $F_1(x_0, \dots, x_p), \dots, F_n(x_0, \dots, x_p)$ et $G(x_0, \dots, G_n)$. On va montrer que $h = g(f_1, \dots, f_n)$ est représentée par

$$H(x_0, \dots, x_p) := \exists y_0 \cdots \exists y_n (G(x_0, y_1, \dots, y_n) \wedge \bigwedge_{1 \leq i \leq n} F_i(y_i, x_1, \dots, x_p))$$

En effet, pour tous entiers $n_1, \dots, n_{\max(p,n)}$:

- ▷ $\mathcal{P}_0 \vdash \forall y (F_i(y_1, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_p}) \leftrightarrow y = \overline{f_i(n_1, \dots, n_p)})$;
- ▷ $\mathcal{P}_0 \vdash \forall y (G(y_1, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_n}) \leftrightarrow y = \overline{g(n_1, \dots, n_n)})$.

Dans tout modèle $\mathcal{M}$ de $\mathcal{P}_0$, pour tout $y \in |\mathcal{M}|$, et tous $n_1, \dots, n_p \in \mathbb{N}$, $H(y, n_1, \dots, n_p)$ est vraie ssi il existe $y_1, \dots, y_n$ dans $|\mathcal{M}|$ tels que pour tout i , $F_i(y_i, x_1, \dots, x_p)$ est vrai et $G(y, y_1, \dots, y_n)$ est vrai. Donc, avec les hypothèses précédents,

on a $H(y, n_1, \dots, n_p)$ ssi il existe $y_1, \dots, y_n$ dans $|\mathcal{M}|$ tels que pour tout i , $y_i = f_i(n_1, \dots, n_p)$, et $y = g(y_1, \dots, y_p)$, i.e. ssi

$$y = g(f_1(n_1, \dots, n_p), \dots, f_n(n_1, \dots, n_p))$$

ssi $y = h(n_1, \dots, n_p)$. On conclut

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall y \left(H(y, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_p}) \leftrightarrow y = \overline{h(n_1, \dots, n_p)} \right).$$

□

Lemme 3.2. Si, à partir d'une fonction représentable totale, on obtient par schéma μ une fonction totale, alors cette fonction est représentable.

Preuve. Soit $g : \mathbb{N}^{p+1} \rightarrow \mathbb{N}$ une fonction représentable totale, et soit $f : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ définie par

$$f(x_1, \dots, x_p) := \mu x_0. \left(g(x_0, \dots, x_p) = \overline{0} \right).$$

Supposons f totale et montrons qu'elle est représentable. Soit $G(y, x_0, \dots, x_p)$ qui représente g . Alors, pour tous $n_1, \dots, n_p$ on a

$$\mathcal{P}_0 \vdash \forall y \left(G(y, \overline{n_1}, \dots, \overline{n_p}) \leftrightarrow y = \overline{g(n_1, \dots, n_p)} \right).$$

Considérons la formule

$$F(y, x_1, \dots, x_p) := G(0, y, x_1, \dots, x_p) \wedge \forall z < y, \neg G(0, z, x_1, \dots, x_p),$$

où l'on note $\forall z < y, H$ pour $\forall z ((\exists h y = \mathbf{S}(z \oplus h)) \rightarrow H)$. Montrons que F représente f . Soit $\mathcal{M}$ un modèle de $\mathcal{P}_0$. Soient $n_1, \dots, n_p$ des entiers et $y \in |\mathcal{M}|$. On a $F(y, n_1, \dots, n_p)$ ssi $G(0, y, n_1, \dots, n_p)$ est vrai et, pour tout $z < y$, $\neg G(0, z, n_1, \dots, n_p)$ est vrai. Montrons que $b := f(n_1, \dots, n_p)$ est le seul élément à satisfaire $F(y, n_1, \dots, n_p)$. On a bien $G(0, b, n_1, \dots, n_p)$ par définition de f et pour tout entier $z < b$, on a $\neg G(0, z, n_1, \dots, n_p)$. Mais, si on a $z < b$ et z n'est pas un entier ? Ce cas n'existe pas

car la sous-représentation isomorphe à $\mathbb{N}$ est un segment initial, il n'y a donc que des entiers qui sont inférieurs à b dans $|\mathcal{M}|$. D'où $F(b, n_1, \dots, n_p)$. Montrons que b est le seul. Soit y tel que $F(y, n_1, \dots, n_p)$. Montrons que $y = b$.

- ▷ Si y est un entier, c'est vrai par définition de b .
- ▷ Sinon $y > b$. Rappelons que $g(b, x_1, \dots, x_p) = 0$, de sorte que la formule $\forall z < y, \neg G(0, z, x_1, \dots, x_p)$ est fausse, et donc $F(y, n_1, \dots, n_p)$ aussi.

□

Lemme 3.3. L'ensemble des fonctions totales est stable par définition par récurrence.

Preuve. Soient f, g, h telles que

- ▷ $f(0, x_1, \dots, x_p) = g(x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $f(x_0 + 1, x_1, \dots, x_p) = h(x_0, f(x_0, \dots, x_p), x_1, \dots, x_p)$

Soient G, H représentant g et h . On a dans $\mathbb{N}$: $y = f(x_0, \dots, x_p)$ ssi il existe $z_0, \dots, z_{x_0}$ tels que

- ▷ $z_0 = g(x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $z_1 = h(0, z_0, x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $z_2 = h(1, z_1, x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $\vdots$
- ▷ $z_{x_0} = h(x_0 - 1, z_{x_0-1}, x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $y = z_{x_0}$

Zut ! On ne peut pas écrire $\exists z_0 \dots \exists z_{x_0}$! On va utiliser une fonction qui permet de coder une suite d'entiers dans un couple d'entier (a, b) . Interruption de la preuve. □

Lemme 3.4 (Fonction β de Gödel). Il existe une fonction β à trois variables, récursive primitive et représentable, tel que pour tout $p \in \mathbb{N}$ et toute suite $(n_0, \dots, n_p) \in \mathbb{N}^{p+1}$, il existe des entiers a et b tels que pour tout $0 \leq i \leq p$, on ait $\beta(i, a, b) = n_i$.

Preuve. Soient $(a_0, \dots, a_p)$ une suite d'entiers deux à deux premiers, et $(n_0, \dots, n_p)$ une suite d'entiers. Alors il existe $b \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $0 \leq i \leq p$, $b \equiv n_i \pmod{a_i}$ (par le théorème Chinois).

Choisissons a et les a_i (qui induisent b). On pose $a = m!$, où $m = \max(p, n_0, \dots, n_p)$. Alors, on pose $a_i := a(i+1) + 1$ pour tout $0 \leq i \leq p$. Les a_i sont bien deux à deux premiers. En effet, pour $j > i$, si a_i et a_j ont un facteur premier commun c , alors $c \mid (a_i - a_j)$ donc $c \mid a(j-i)$. Comme c est premier, on a $c \mid a$ ou $c \mid j-i$. Dans les deux cas, puisque $j-i \leq p \leq m$ on a $c \mid a$. Or c divise aussi a_i , donc c divise 1, ce qui est impossible. Ainsi, avec b tel que $b \equiv n_i \pmod{a_i}$ pour tout $0 \leq i \leq p$ et sachant que pour tout $0 \leq i \leq p$, $n_i < a_i$, on définit $\beta(i, a, b)$ comme le reste de la division de b par $a(i+1) + 1$. La fonction β est représentée par

$$B(x, i, a, b) := \exists q \left(b = q \otimes \mathbf{S}(a \otimes \mathbf{S}i) \oplus x \wedge x < \mathbf{S}(a \otimes \mathbf{S}i) \right).$$

On considère

$$B'(x_0, x_1, x_2, x_3) := B(x_0, x_1, x_2, x_3) \wedge \forall x_4 < x_0, \neg B(x_4, x_1, x_2, x_3).$$

Cette dernière formule représente aussi β mais implique aussi que x_0 est un entier standard. $\square$

On reprend la preuve du lemme 3.3.

Preuve. Soient f, g, h telles que

- ▷ $f(0, x_1, \dots, x_p) = g(x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $f(x_0 + 1, x_1, \dots, x_p) = h(x_0, f(x_0, \dots, x_p), x_1, \dots, x_p)$

Soient G, H représentant g et h . On a dans $\mathbb{N}$: $y = f(x_0, \dots, x_p)$ ssi il existe $z_0, \dots, z_{x_0}$ tel que

- ▷ $z_0 = g(x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $z_1 = h(0, z_0, x_1, \dots, x_p)$
- ▷ $z_2 = h(1, z_1, x_1, \dots, x_p)$

▷ :

▷ $z_{x_0} = h(x_0 - 1, z_{x_0-1}, x_1, \dots, x_p)$

▷ $y = z_{x_0}$

c'est-à-dire ssi la formule

$$F := \exists a \exists b \left[\begin{aligned} & (\exists z_0 B'(z_0, \textcircled{0}, a, b) \wedge G(z_0, x_1, \dots, x_p)) \\ & \wedge \forall i < x_0, \exists z \exists z' \left(\begin{aligned} & B'(z, i, a, b) \\ & \wedge B'(z', \textcircled{\mathbf{S}} i, a, b) \\ & \wedge H(z', i, z, x_1, \dots, x_p) \end{aligned} \right) \\ & \wedge B'(y, x_0, a, b) \end{aligned} \right]$$

est vraie. En effet, soient $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$, et $n_0, \dots, n_p$ des entiers et $c \in |\mathcal{M}|$.

- ▷ Si c interprète $\overline{f(n_0, \dots, n_p)}$ alors en choisissant a et b avec le lemme précédent sur la fonction β , on a bien $F(c, n_0, \dots, n_p)$.
- ▷ Réciproquement, si $\mathcal{M} \models F(d, \textcircled{n_0}, \dots, \textcircled{n_p})$ alors il existe a, b, z_0 tels que $B'(z_0, \textcircled{0}, a, b)$ et $G(z_0, n_1, \dots, n_p)$, et donc $z_0 = g(n_1, \dots, n_p)$. Et, pour tout $i \leq n_0$, il existe r_i et s_i tels que

$$B'(r_i, i, a, b) \wedge B'(s_i, i + 1, a, b) \wedge H(s_i, i, r_i, n_1, \dots, n_p)$$

donc $r_i = f(i, n_1, \dots, n_p)$ grâce aux propriétés de B' et car r_i est un entier naturel, et donc par récurrence $d = f(n_0, \dots, n_p)$.

□

Ceci conclut la preuve du théorème 3.4.

Maintenant que l'on a transformé les fonctions en formules, faisons l'opposé. Notre but est de montrer le théorème suivant : toute théorie consistante contenant $\mathcal{P}_0$ est indécidable. La « partie technique » de

l'indécidabilité de Gödel est la preuve par diagonalisation.

3.4 Indécidabilité des théories consistantes contenant $\mathcal{P}_0$.

On va coder :

1. les suites d'entiers ;
2. les termes ;
3. les formules ;
4. les preuves.

Lemme 3.5 (Récursion). Soient $p, n \in \mathbb{N}$ et

- ▷ $k_1, \dots, k_n : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que $\forall y \neq 0, \forall i, k_i(y) < y$;
- ▷ $g : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$;
- ▷ $h : \mathbb{N}^{p+n+1} \rightarrow \mathbb{N}$

des fonctions récursives primitives (*resp.* récursives). Alors, la fonction $f : \mathbb{N}^{p+1} \rightarrow \mathbb{N}$ définie de la façon suivante est récursive primitive (*resp.* récursive primitive) :

$$f(0, x_1, \dots, x_p) := g(x_1, \dots, x_p)$$

et pour tout $y \in \mathbb{N}^*$

$$f(y, x_1, \dots, x_p) := h(y, u_1, \dots, u_n, x_1, \dots, x_p),$$

où l'on note $u_i := f(k_i(y), x_1, \dots, x_p)$ pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$. □

Lemme 3.6 (Définition par cas). Soient $P_1, \dots, P_n$ des parties de $\mathbb{N}^m$ récursives primitives (*resp.* récursives) deux à deux disjointes et $f_1, \dots, f_{n+1} : \mathbb{N}^m \rightarrow \mathbb{N}$ des fonctions récursives primitives (*resp.* récursives). Alors la fonction suivante est récursive primi-

tive (*resp.* récursive) :

$$f(x_1, \dots, x_m) := \begin{cases} f_1(x_1, \dots, x_m) & \text{si } P_1(x_1, \dots, x_m) \\ f_2(x_1, \dots, x_m) & \text{si } P_2(x_1, \dots, x_m) \\ \vdots & \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_m) & \text{si } P_n(x_1, \dots, x_m) \\ f_{n+1}(x_1, \dots, x_m) & \text{sinon} \end{cases}$$

□

Lemme 3.7 (Définition par cas et récursion). Soient $p, n, m \in \mathbb{N}$, et

- ▷ $g : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$
- ▷ $k_1, \dots, k_m : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$
- ▷ $f_1, \dots, f_n : \mathbb{N}^{m+p+1} \rightarrow \mathbb{N}$
- ▷ $f_{n+1} : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$

des fonctions récursives primitives (*resp.* récursives) et $P_1, \dots, P_n$ des parties de $\mathbb{N}^p$ deux à deux disjointes et récursives primitives (*resp.* récursives). Supposons que pour tous $1 \leq i \leq m$ et $y \in \mathbb{N}^*$, $k_i(y) < y$. Alors la fonction f définie par les équations ci-dessous est récursive primitive (*resp.* récursive) :

$$f(0, x_1, \dots, x_p) := g(x_1, \dots, x_p)$$

et pour tout $y \in \mathbb{N}^*$

$$f(y, x_1, \dots, x_p) := \begin{cases} f_1(y, u_1, \dots, u_m, x_1, \dots, x_p) & \text{si } P_1(x_1, \dots, x_p) \\ f_2(y, u_1, \dots, u_m, x_1, \dots, x_p) & \text{si } P_2(x_1, \dots, x_p) \\ \vdots & \vdots \\ f_n(y, u_1, \dots, u_m, x_1, \dots, x_p) & \text{si } P_n(x_1, \dots, x_p) \\ f_{n+1}(x_1, \dots, x_p) & \text{sinon,} \end{cases}$$

où l'on note $u_i := f(k_i(y), x_1, \dots, x_p)$ pour tout $i \in \llbracket 1, m \rrbracket$. □

3.4.1 Codage des suites d'entiers.

Proposition 3.1. Pour tout entier non nul p il existe des fonctions récursives primitives bijectives $\alpha_p : \mathbb{N}^p \rightarrow \mathbb{N}$ et $\beta_p^1, \dots, \beta_p^p : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ telles que la réciproque de α_p est $(\beta_p^1, \dots, \beta_p^p)$ et, de plus, si $x > 1$ et $p \geq 2$ alors $\beta_p^i(x) < x$.

Preuve. L'idée est qu'on utilise la fonction de Cantor (ou l'énumération de Peano) :

$$\alpha_2(n, m) := \frac{(n+m)(n+m+1)}{2} + n$$

et on pose pour tout $p \geq 2$

$$\alpha_{p+1}(x_1, \dots, x_{p+1}) := \alpha_p(x_1, \dots, x_{p-1}, \alpha_2(x_p, x_{p+1})).$$

Ainsi,

$$\alpha_p(x_1, \dots, x_p) = \alpha_2(x_1, \alpha_2(x_2, \dots)).$$

□

3.4.2 Les termes.

On suppose que l'ensemble des variables est $\{x_i \mid i \in \mathbb{N}\}$.

Définition 3.6. Le nombre de Gödel d'un terme t sur $\mathcal{L}$, noté $\#t$, est défini par :

- ▷ si $t = \textcircled{0}$ alors $\#t := \alpha_3(0, 0, 0)$;
- ▷ si $t = x_n$ alors $\#t := \alpha_3(n+1, 0, 0)$;
- ▷ si $t = \textcircled{S} t_1$ alors $\#t := \alpha_3(\#t_1, 0, 1)$;
- ▷ si $t = t_1 \oplus t_2$ alors $\#t := \alpha_3(\#t_1, \#t_2, 2)$;
- ▷ si $t = t_1 \otimes t_2$ alors $\#t := \alpha_3(\#t_1, \#t_2, 3)$.

Lemme 3.8. Le codage est injectif.

Preuve. Expliciter la fonction de décodage définie sur l'espace image. $\square$

Lemme 3.9. L'ensemble $\text{Term} := \{\#t \mid t \text{ est un terme de } \mathcal{L}_0\}$ est récursif primitif.

Preuve. Montrons que la fonction indicatrice T de Term est récursive primitive. On utilise le lemme de définition par cas et récursion donné précédemment :

- ▷ si $\beta_3^3(x) = 0$ et $\beta_3^2(x) = 0$ alors $T(x) = 1$ (x est le code de $\textcircled{0}$ ou $x_{\beta_3^1(x)-1}$) ;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 1$ et $\beta_3^2(x) = 0$ alors $T(x) = T(\beta_3^1(x))$ (x est le code de $\textcircled{S}t$) ;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 2$ alors $T(x) = T(\beta_3^1(x)) \cdot T(\beta_3^2(x))$ (x est le code de $t \oplus t$) ;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 3$ alors $T(x) = T(\beta_3^1(x)) \cdot T(\beta_3^2(x))$ (x est le code de $t \otimes t$) ;
- ▷ sinon, $T(x) = 0$.

$\square$

3.4.3 Les formules.

Définition 3.7. On étend $\# \cdot$ aux formules :

- ▷ $\#(t_1 = t_2) := \alpha_3(\#t_1, \#t_2, 0)$
- ▷ $\#(\neg F) := \alpha_3(\#F, 0, 1)$
- ▷ $\#(F_1 \vee F_2) := \alpha_3(\#F_1, \#F_2, 2)$
- ▷ $\#(F_1 \wedge F_2) := \alpha_3(\#F_1, \#F_2, 3)$
- ▷ $\#(F_1 \rightarrow F_2) := \alpha_3(\#F_1, \#F_2, 4)$
- ▷ $\#(\forall x_k F) := \alpha_3(\#F, k, 5)$
- ▷ $\#(\exists x_k F) := \alpha_3(\#F, k, 6)$
- ▷ $\#\perp = \alpha_3(0, 0, 7)$.

Lemme 3.10. Le codage ci-dessus est injectif. $\square$

Lemme 3.11. L'ensemble $\text{Form} := \{\#F \mid F \text{ formule de } \mathcal{L}_0\}$ est récursif primitif. $\square$

3.4.4 Opérations sur les formules.

Lemme 3.12. Les ensembles suivants sont récursifs primitifs :

- ▷ $\theta_0 := \left\{ (\#t, n) \mid \begin{array}{l} t \text{ est un terme et } x_n \text{ n'a} \\ \text{pas d'occurrence dans } t \end{array} \right\};$
- ▷ $\theta_1 := \left\{ (\#t, n) \mid \begin{array}{l} t \text{ est un terme et } x_n \text{ a} \\ \text{une occurrence dans } t \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_0 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ n'a} \\ \text{pas d'occurrence dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_1 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ n'a} \\ \text{pas d'occurrence libre dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_2 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ n'a} \\ \text{pas d'occurrence liée dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_3 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ a} \\ \text{une occurrence libre dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_4 := \left\{ (\#F, n) \mid \begin{array}{l} F \text{ est une formule et } x_n \text{ a} \\ \text{une occurrence liée dans } F \end{array} \right\};$
- ▷ $\phi_5 := \{ \#F \mid F \text{ est une formule close} \}.$

Preuve. On montre le résultat pour θ_0 (le reste en exercice). On définit la fonction indicatrice de θ_0 , notée $g_0(x, y)$, par (en utilisant le lemme de définition par cas et récursion) :

- ▷ si $\beta_3^3(x) = \beta_3^2(x) = 0$ et $\beta_3^1(x) \neq y + 1$ alors $g_0(x, y) := 1$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 1$ et $\beta_3^2(x) = 0$ alors $g_0(x, y) := g_0(\beta_3^1(x), y)$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 2$ ou 3 alors $g_0(x, y) := g_0(\beta_3^1(x), y) \times g_0(\beta_3^2(x), y)$;
- ▷ sinon, $g_0(x, y) := 0$.

$\square$

Lemme 3.13 (Substitutions). Il existe des fonctions récursives primitives Subst_t et Subst_f à trois variables telles que, si t et u sont des termes, et si F est une formule, alors pour tout entier n ,

- ▷ $\text{Subst}_t(n, \#t, \#u) := \#(u[x_n := t])$
- ▷ $\text{Subst}_f(n, \#t, \#F) := \#(F[x_n := t])$.

Preuve. On définit Subst_t par cas/récursion. Pour (n, y, x) , on a :

- ▷ si $\beta_3^3(x) = 0$ alors
 - si $\beta_3^1(x) = n + 1$ alors $\text{Subst}_t(n, y, x) := y$,
 - sinon $\text{Subst}_t(n, y, x) := x$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 1$ alors

$$\text{Subst}_t(n, y, x) := \alpha_3(\text{Subst}_t(n, y, \beta_3^1(x)), 0, 1) ;$$

- ▷ sinon

$$\text{Subst}_t(n, y, x) := \alpha_3(\text{Subst}_t(n, y, \beta_3^1(x)), \text{Subst}_t(n, y, \beta_3^2(x)), \beta_3^3(x)) ;$$

Puis, on définit Subst_f par, pour (n, y, x) ,

- ▷ si $\beta_3^3(x) = 0$ alors $\text{Subst}_f(n, y, x) = \alpha_3(\text{Subst}_t(n, y, \beta_3^1(x)), \text{Subst}_t(n, y, \beta_3^2(x)), 0)$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 1$ alors $\text{Subst}_f(n, y, x) = \alpha_3(\text{Subst}_f(n, y, \beta_3^1(x)), 0, 1)$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 2, 3$ ou 4 alors $\text{Subst}_f(n, y, x) = \alpha_3(\text{Subst}_f(n, y, \beta_3^1(x)), \text{Subst}_f(n, y, \beta_3^2(x)), \beta_3^3(x))$;
- ▷ si $\beta_3^3(x) = 5$ ou 6 alors
 - si $\beta_3^2(x) = n$, x_n est liée dans F donc $\text{Subst}_f(n, y, x) := x$;
 - sinon $\text{Subst}_f(n, y, x) := \alpha_3(\text{Subst}_f(n, y, \beta_3^1(x)), \beta_3^2(x), \beta_3^3(x))$;
- ▷ sinon $\text{Subst}_f(n, y, x) := x$.

□

3.4.5 Codage des preuves.

On code un contexte comme des suites finies, *i.e.* des listes de formules (c'est plus facile que pour les ensembles).

Définition 3.8. On définit le codage par :

- ▷ $\#[] := 0$;
- ▷ $\#(F :: \Gamma) := 1 + \alpha_2(\#\Gamma, \#F)$.

Lemme 3.14. Le décodage est unique. □

Lemme 3.15. La substitution d'une formule dans un contexte est récursive primitive. Tester si une variable est libre (*resp.* liée) dans un contexte est récursif primitif. □

3.4.6 Codage des preuves en déduction naturelle.

Remarque 3.6. Le contexte de la conclusion et des prémisses est le même sauf pour

$$\frac{\Gamma \vdash A}{\Gamma, B \vdash A} \text{ aff} \quad \frac{\Gamma, A \vdash B}{\Gamma \vdash A \rightarrow B} \rightarrow_i \quad \frac{\Gamma, A \vdash \perp}{\Gamma \vdash \neg A} \rightarrow_i$$


$$\frac{\Gamma, \neg A \vdash \perp}{\Gamma \vdash A} \perp_c \quad \frac{}{\Gamma \vdash A} \text{ ax}.$$

On peut toujours déterminer le contexte du haut à partir du bas donc donner le contexte de la racine suffit. Une preuve est donc finalement un contexte et un arbre de dérivation où les nœuds sont étiquetés par une formule et un numéro de règle.

Exemple 3.3. La preuve

$$\frac{\frac{\frac{}{\neg A, A \vdash A} \text{ ax} \quad \frac{}{\neg A, A \vdash \neg A} \text{ ax}}{\neg A, A \vdash \perp} \neg_e \quad \frac{\frac{\frac{}{A \rightarrow \perp, A \vdash A} \text{ ax} \quad \frac{}{A \rightarrow \perp, A \vdash A \rightarrow \perp} \text{ ax}}{A \rightarrow \perp, A \vdash \perp} \rightarrow_e}{\frac{\frac{\frac{}{\neg A \vdash A \rightarrow \perp} \rightarrow_i}{\neg A \vdash A \rightarrow \perp} \rightarrow_i \quad \frac{\frac{\frac{}{A \rightarrow \perp, A \vdash \perp} \neg_i}{A \rightarrow \perp \vdash \neg A} \rightarrow_i}{\vdash (A \rightarrow \perp) \rightarrow \neg A} \rightarrow_i}{\vdash \neg A \leftrightarrow (A \rightarrow \perp)} \wedge_i$$

peut être codée par l'arbre suivant avec le contexte [] à la racine :



Définition 3.9. On numérote

- ▷ $\#_{\text{ax}} := 0$
- ▷ $\#_{\neg_e} := 1$
- ▷ $\#_{\neg_i} := 2$
- ▷ $\#_{\rightarrow_e} := 3$
- ▷ $\#_{\rightarrow_i} := 4$
- ▷ $\#_{\wedge_e} := 5$
- ▷ $\#_{\wedge_i} := 6$
- ▷ *etc.*

Définition 3.10 (Nombre de Gödel des preuves). ▷ Si D^* est un arbre de preuve à un seul nœud étiqueté par la formule F et la règle n alors $\#D^* := \alpha_3(n, \#F, 0)$.

- ▷ Si D^* est un arbre de preuve dont la racine est étiquetée par la formule F et la règle n à k prémisses avec les sous arbres $D_1^*, \dots, D_k^*$

$$\frac{D_1^* \quad \dots \quad D_k^*}{F} \text{ règle } n$$

alors $\#D^* := \alpha_3(n, \#F, \alpha_k(\#D_1^*, \dots, \#D_k^*) + 1)$.

On pose ensuite $\#D := \alpha_2(\#D^*, \#I)$ pour une preuve D .

Lemme 3.16. C'est un code injectif.

Lemme 3.17. L'ensemble $\text{Preuve} := \{\#D \mid D \text{ est une preuve}\}$ est récursif primitif.

3.4.7 Théories (in)décidables.

Définition 3.11. Un ensemble A de formules est un ensemble d'*axiomes* d'une théorie T si $A \vdash T$ et $T \vdash A$.

Définition 3.12. Une théorie T sur $\mathcal{L}_0$ a un ensemble d'axiomes Ax_T récursif si l'ensemble des numéros des formules de Ax_T est récursif.

Remarque 3.7. Si Ax_T est fini, alors il est récursif (exemple : $\mathcal{P}_0$).

Lemme 3.18. L'ensemble des axiomes de Peano $\mathcal{P}$ est récursif.

Preuve. Il suffit de montrer que l'ensemble des axiomes du schéma de récurrence est récursif. On définit

$$A_F := \forall x_1 \dots \forall x_n \left(\left(F(0, x_1, \dots, x_n) \wedge \forall x_0 (F(x_0, \dots, x_n) \rightarrow F(\mathbb{S}x_0, x_1, \dots, x_n)) \right) \rightarrow \forall x_0 F(x_0, \dots, x_n) \right).$$

Idée pour décider si N est le code d'une formule A_F :

1. décoder pour trouver n et F ;
2. calculer $\#A_F$ et vérifier si c'est N .

□

Proposition 3.2. Si une théorie T a un ensemble d'axiomes Ax_T récursif alors l'ensemble

$$\text{Dem}_T = \{ (\#D, \#F) \mid D \text{ est une preuve de } F \text{ dans } T \text{ avec } \text{Ax}_T \}$$

est récursif.

Preuve. L'idée de la preuve est la suivante : pour (x, y) ,

1. vérifier que x est le code d'une preuve D et y le code d'une formule F ;
2. vérifier que D est une preuve de F ;
3. vérifier que le contexte final ne contient que des éléments de Ax_T .

□

Dans la suite, on prend $\mathcal{L} \supseteq \mathcal{L}_0$.

Définition 3.13. Une théorie est *décidable* si l'ensemble de ses théorèmes est récursif.

Remarque 3.8 (Rappel). Une théorie est *consistante* si elle a un modèle.

Théorème 3.5. Soit T une théorie consistante contenant $\mathcal{P}_0$. Alors, T est indécidable.

Preuve. On suppose que T est décidable et on construit par diagonalisation une formule F telle que $T \vdash F$ et $T \vdash \neg F$. Soit

$$\theta := \{ (m, n) \mid m = \#(F(n)) \text{ et } T \vdash F(\textcircled{n}) \}.$$

L'ensemble T est décidable donc θ aussi. On pose

$$B := \{ n \in \mathbb{N} \mid (n, n) \notin \theta \},$$

qui est récursif.

D'après le théorème de représentation, il existe une formule $G(x)$ représentant B :

- ▷ $n \in B \implies \mathcal{P}_0 \vdash G(\overline{n})$ donc $T \vdash G(\overline{n})$;
- ▷ $n \notin B \implies \mathcal{P}_0 \vdash \neg G(\overline{n})$ donc $T \vdash \neg G(\overline{n})$.

Soit $a = \sharp(G(x))$. Est-ce que $a \in B$?

- ▷ On a $a \in B \iff (a, a) \notin \theta \iff T \not\vdash G(@)$. Or, si $a \in B$ alors, par définition de G , on a $T \vdash G(@)$. **Absurde !**
- ▷ On a $a \notin B \iff (a, a) \in \theta \iff T \vdash G(@)$. Or, si $a \notin B$ alors, par définition de G , on a $T \vdash \neg G(@)$. Donc T est non consistante. **Absurde !**

□

Exemple 3.4 (Application du théorème). La théorie $T = \mathbf{Th}(\mathbb{N})$ est indécidable.

Exemple 3.5 (Quelques théories décidables). ▷ La théorie des ordres denses sans extrémités (la théorie linéaire des rationnels) est une théorie décidable.

- ▷ La théorie des corps réels clos (*théorème de Tarski*) est une théorie décidable.
- ▷ L'arithmétique de Presburger (la théorie linéaire des entiers) est une théorie décidable.
- ▷ Pour chaque p , la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p est une théorie décidable.

On peut donc répondre à l'Entscheidungsproblem, le problème de décision.

Théorème 3.6 (Church, indécidabilité du calcul des prédicats). Si $\mathcal{L} \supseteq \mathcal{L}_0$, l'ensemble T des théorèmes logiques sur $\mathcal{L}$ n'est pas récursif.

Preuve. Soit T_0 l'ensemble des théorèmes logiques sur $\mathcal{L}_0$. Soit G la conjonction des axiomes de $\mathcal{P}_0$. Pour toute formule F , on a $\mathcal{P}_0 \vdash F$ ssi $T_0 \vdash (G \rightarrow F)$. Si T est récursif, alors T_0 aussi et $\mathcal{P}_0$ est décidable. **absurde.** $\square$

3.5 Théorèmes d'incomplétude de Gödel

Théorème 3.7 (Premier théorème d'incomplétude de Gödel). Soit T une théorie qui a un ensemble d'axiomes récursifs, qui est consistante, et qui contient $\mathcal{P}_0$. Alors, T n'est pas axiome-complète.

Preuve. Une théorie qui a un ensemble d'axiomes récursifs et qui est complète est décidable.

En effet, pour F une formule, comment déterminer (algorithmiquement) si $T \vdash F$? On énumère toutes les preuves jusqu'à en trouver une de F ou de $\neg F$. $\square$

Corollaire 3.1. La théorie $\mathcal{P}$ n'est pas complète.

Question.

Peut-on exhiber une formule F telle que $T \not\vdash F$ et $T \not\vdash \neg F$?

On va construire F qui « dit » que T est consistante.

Définition 3.14. On pose :

- ▷ $\text{Dem}_T := \{ (\#D, \#F) \mid D \text{ preuve de } F \text{ dans } T \}$;
- ▷ $\text{Dem}_{\mathcal{P}_0} := \{ (\#D, \#F) \mid D \text{ preuve de } F \text{ dans } \mathcal{P}_0 \}$.

Proposition 3.3. ▷ Ces ensembles sont récursifs donc représentés par deux formules F_T et $F_{\mathcal{P}_0}$.

- ▷ La fonction $\text{neg} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, \#F \mapsto \#(\neg F) = \alpha_3(\#F, 0, 1)$ est

récursive et représentée par une formule $F_{\text{neg}}(x_0, x_1)$:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{P}_0 \vdash \forall x (F_{\text{neg}}(x, \overline{n}) \leftrightarrow x = \overline{\text{neg}(n)}).$$

□

Définition 3.15. On pose

$$\text{Coh}(T) := \neg \exists x_0 \cdots \exists x_3 (F_T(x_0, x_2) \wedge F_T(x_1, x_3) \wedge F_{\text{neg}}(x_2, x_3)).$$

Remarque 3.9. La fonction Coh n'est pas complètement définie, car elle dépend du choix de F_T et de F_{neg} .

Proposition 3.4. La théorie T est consistante ssi $\mathbb{N} \models \text{Coh}(T)$.

Remarque 3.10. On pourrait avoir $\mathcal{M} \models T$, avec T consistante et $\mathcal{M} \models \neg \text{Coh}(T)$. En effet, il suffit que x_0, x_1, x_2, x_3 ne soient pas des entiers standards.

Théorème 3.8 (Second théorème d'incomplétude de Gödel). Soit T une théorie consistante, axiome-réursive, et contenant $\mathcal{P}_0$. Alors, $T \not\models \text{Coh}(T)$.

Remarque 3.11. Si $\mathbb{N} \models T$, ce théorème implique le 1er théorème d'incomplétude car $\mathbb{N} \not\models \neg \text{Coh}(T)$, donc $T \not\models \neg \text{Coh}(T)$ et donc T est incomplète.

Définition 3.16. L'ensemble Σ est le plus petit ensemble de formules contenant $\mathcal{L}_0$ qui

- ▷ contient les formules sans quantificateurs ;
- ▷ est clos par $\wedge, \vee, \exists$;

- ▷ est clos par quantification universelle bornée, *i.e.* si $F \in \Sigma$ alors

$$(\forall v_0 (v_0 < v_1 \rightarrow F)) \in \Sigma.$$

Exemple 3.6. Les relations « $n \mid m$ » et « m est premier » peuvent s'exprimer avec des formules de Σ .

Lemme 3.19 (Représentation (bis)). Toute fonction récursive totale est représentable par une formule de Σ .

Preuve. Les formules que l'on construit dans le lemme 3.3 sont des formules de Σ . □

Lemme 3.20. Il existe des formules F_T et $F_{\mathcal{P}_0}$ qui satisfont :

1. $\vdash \forall v_0 \forall v_1 (F_{\mathcal{P}_0}(v_0, v_1) \rightarrow F_T(v_0, v_1))$;
2. F_T et $F_{\mathcal{P}_0}$ sont dans Σ ;
3. si F est une formule close de Σ alors

$$\mathcal{P} \vdash (F \rightarrow \exists x_1 F_{\mathcal{P}_0}(x_1, \#F)).$$

Preuve. 1. Il suffit de remplacer F_T par $F_T \vee F_{\mathcal{P}_0}$.

2. C'est une conséquence du lemme précédent.
3. On va le montrer pour une théorie $\mathcal{P}_1$ contenant $\mathcal{P}_0$ et conséquence de $\mathcal{P}$ mais, *a priori*, plus faible que $\mathcal{P}$. Puis, on l'admet pour $\mathcal{P}$, et on admet que $\mathcal{P} \vdash \mathcal{P}_1$. On le montre avec la proposition suivante. □

Proposition 3.5. Soit F une formule close sur $\mathcal{L}_0$ dans Σ . Alors,

$$\mathbb{N} \models F \rightarrow \exists x_1 F_{\mathcal{P}_0}(x_1, \#F).$$

Preuve. ▷ Si F est fausse, c'est montré.

- ▷ Si $\mathbb{N} \models F$, il faut montrer que F a une preuve dans $\mathcal{P}_0$, i.e. que pour tout modèle $\mathcal{M} \models \mathcal{P}_0$, on a $\mathcal{M} \models F$ i.e. que dans tout extension finale $\mathcal{M}$ de $\mathbb{N}$ alors $\mathcal{M} \models F$, pour cela il suffit de montrer le lemme suivant.

□

Lemme 3.21. Soient $\mathcal{N}$ une $\mathcal{L}_0$ -structure et $\mathcal{M}$ une extension finale de $\mathcal{N}$. Soient $F(x_1, \dots, x_p) \in \Sigma$ et $a_1, \dots, a_p \in \mathcal{N}$. Alors, $\mathcal{N} \models F(a_1, \dots, a_p)$ implique $\mathcal{M} \models F(a_1, \dots, a_p)$.

Preuve. Par induction sur $F(x_1, \dots, x_p) \in \Sigma$. Les cas intéressants sont les quantificateurs. Pour « $\exists$ », on applique que $|\mathcal{N}| \subseteq |\mathcal{M}|$. Pour le « $\forall$ » *borné*, on utilise la finalité de l'extension $\mathcal{M}$ de $\mathcal{N}$.

□

On termine la preuve du point 3.

Preuve. On pose

$$\mathcal{P}_1 := \mathcal{P}_0 \cup \{ F \rightarrow \exists x F_F(x_1, \sharp F) \mid F \text{ formule close de } \Sigma \}.$$

On a montré que $\mathbb{N} \models \mathcal{P}$. On admet que $\mathcal{P} \vdash \mathcal{P}_1$ donc $T \vdash \mathcal{P}_1$.

□

Lemme 3.22 (Cœur du 2nd théorème d'incomplétude). Soit T une théorie consistante, axiome-réursive, et contenant $\mathcal{P}$. Alors, $T \not\vdash \text{Coh}(T)$.

Preuve. ▷ Soit $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ définie par, pour tout n , s'il existe une formule $F(x_0)$ telle que $n = \sharp F(x_0)$, alors on pose $g(n) = \sharp F(\overline{n})$, sinon $g(n) = 0$. C'est la formule appliquée à elle-même. La fonction g est primitive réursive,

donc représentée par une formule $G(x, y)$ telle que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \mathcal{P}_0 \vdash \forall x (G(x, \overline{n}) \leftrightarrow x = \overline{g(n)}).$$

- ▷ On considère la formule « il existe une preuve de x_0 appliquée à elle-même » :

$$\varepsilon(x_0) := \exists x_1 \exists x_2 (F_T(x_1, x_2) \wedge G(x_2, x_0)).$$

- ▷ On pose $a := \sharp(\neg\varepsilon(x_0))$, « il n'existe pas de preuve de x_0 appliquée à elle-même ».
- ▷ On pose $b := g(a) = \sharp(\neg\varepsilon(@))$, « il n'existe pas du preuve du fait qu'il n'existe pas de preuve de x_0 appliquée à elle-même ».
- ▷ Dans $\mathcal{P}_0$, on a $\forall x_2 (G(x_2, @) \leftrightarrow x_2 = \overline{b})$.
- ▷ Par définition, $\varepsilon(@)$ est $\exists x_1 \exists x_2 (F_T(x_1, x_2) \wedge G(x_2, @))$. « Il existe une preuve du fait qu'il n'existe pas de preuve de nous-même ». Dans $\mathcal{P}_0$, avec le point précédent, $\varepsilon(@)$ est équivalent à $\exists x_1 F_T(x_1, \overline{b})$ ($\star$). Ainsi, on a « $\varepsilon(@)$ ssi il y a une preuve de $\neg\varepsilon(@)$ »

Voici le paradoxe :

- ▷ Prouvons que $T \vdash \text{Coh}(T) \rightarrow \neg\varepsilon(@)$. Il suffit de montrer que $\mathcal{P} \vdash \varepsilon(@) \rightarrow \neg\text{Coh}(T)$. Soit $T_1 := \mathcal{P} \cup \{\varepsilon(@)\}$. Alors d'après ($\star$), $T_1 \vdash \exists v_1 F_T(v_1, \overline{b})$ et $b = \sharp(\neg\varepsilon(@))$. On a donc une preuve de $\varepsilon(@)$ et une preuve de $\neg\varepsilon(@)$, donc de $\neg\text{Coh}(T)$ en donnant (l'encodage de) ces deux preuves.
- ▷ On va montrer que $T \vdash \neg\varepsilon(@)$ mène à un paradoxe. Si c'est vrai, soit C le numéro d'une preuve de $\neg\varepsilon(@)$ dans T . Alors, $\mathcal{P}_0 \vdash F_T(\overline{C}, \overline{b})$. D'où, avec ($\star$), $\mathcal{P}_0 \vdash \varepsilon(@)$, ce qui est impossible car T est consistante. Donc $T \not\vdash \neg\varepsilon(@)$ et donc $T \not\vdash \text{Coh}(T)$.

□

4 La théorie des ensembles.

On se place dans la logique du 1er ordre avec $\mathcal{L} = \{\in, =\}$. On se place dans un univers $\mathcal{U}$ non vide, le modèle, dont les éléments sont appelés des *ensembles*.

Il faudra faire la différence entre les ensembles « naïfs » (les ensembles habituels), et les ensembles « formels » (les éléments de $\mathcal{U}$).

On a le paradoxe de Russel. On peut l'écrire

« On a un barbier qui rase tous les hommes qui ne se rasent pas eux-mêmes. Qui rase le barbier ? ».

Si $\mathcal{U}$ est l'ensemble de tous les ensembles, alors

$$a := \{ x \in \mathcal{U} \mid x \notin x \}$$

vérifie $a \in a \iff a \notin a$, **paradoxe**. Pour éviter ce paradoxe, on choisit donc de ne pas faire de $\mathcal{U}$ un ensemble.

4.1 Les axiomes de la théorie de Zermelo-Fraenkel.

ZF1. *Axiome d'extensionnalité* : deux ensembles sont égaux ssi ils ont les mêmes éléments

$$\forall x \forall y (x = y \leftrightarrow \forall z (z \in x \leftrightarrow z \in y)).$$

- *Axiome de la paire*¹ : il existe une paire $\{x, y\}$ pour tout élément x et y

$$\forall x \forall y \exists z \forall t (t \in z \leftrightarrow (t = x \vee t = y)).$$

1. On verra plus tard que cet axiome est une conséquence des autres (de [ZF 3](#) et [ZF 4](#)).

[*continué plus tard...*]

Remarque 4.1. Cela nous donne l'existence du *singleton* $\{x\}$ si x est un ensemble. En effet, il suffit de faire la paire $\{x, x\}$ avec l'Axiome de la paire.

Définition 4.1. Si a et b sont des ensembles, alors (a, b) est l'ensemble $\{\{a\}, \{a, b\}\}$. Ainsi, (a, a) est l'ensemble $\{\{a\}\}$.

Lemme 4.1. Pour tous ensembles a, b, a', b' , on a $(a, b) = (a', b')$ ssi $a = a'$ et $b = b'$.

Preuve. En exercice. □

Définition 4.2. On peut construire des 3-uplets (a_1, a_2, a_3) avec $(a_1, (a_2, a_3))$, et ainsi de suite pour les n -uplets.

Notation. On utilise les raccourcis

- ▷ $t = \{a\}$ pour $\forall x (x \in t \leftrightarrow x = a)$;
- ▷ $t = \{a, b\}$ pour $\forall x (x \in t \leftrightarrow (x = a \vee x = b))$;
- ▷ $t \subseteq a$ pour $\forall x (x \in t \rightarrow x \in a)$.

ZF3. *Axiome des parties* : l'ensemble des parties $\wp(a)$ existe pour tout ensemble a

$$\forall a \exists b \forall t (t \in b \leftrightarrow t \subseteq a).$$

ZF2. *Axiome de la réunion* : l'ensemble $y = \bigcup_{z \in x} z$ existe

$$\forall x \exists y \forall t (t \in y \leftrightarrow \exists z (t \in z \wedge z \in x)).$$

Remarque 4.2. Comment faire $a \cup b$? La paire $x = \{a, b\}$ existe

par l'**Axiome de la paire**, et $\bigcup_{z \in x} z = a \cup b$ est un ensemble par **ZF 2**.

ZF 4'. *Schéma de compréhension* : pour toute formule $\varphi(y, v_1, \dots, v_n)$ et tous ensembles $v_1, \dots, v_{n+1}$, on a l'ensemble $x = \{y \in v_{n+1} \mid \varphi(y, v_1, \dots, v_n)\}$.

$$\forall v_1 \dots \forall v_{n+1} \exists x \forall y \left(y \in x \leftrightarrow (y \in v_{n+1} \wedge \varphi(y, v_1, \dots, v_n)) \right).$$

Remarque 4.3. Peut-on faire le paradoxe de Russel ? On ne peut pas faire $a := \{z \in \mathcal{U} \mid z \notin z\}$ car $\mathcal{U}$ n'est pas un ensemble ! Et, on ne peut pas avoir de paradoxe avec $b := \{z \in E \mid z \notin z\}$ grâce à l'ajout de la condition $z \in E$.

Définition 4.3. Une *relation fonctionnelle* en w_0 est une formule $\varphi(w_0, w_1, a_1, \dots, a_n)$ à paramètres (où les a_i sont dans $\mathcal{U}$) telle que

$$\mathcal{U} \models \forall w_0 \forall w_1 \forall w_2 \left(\varphi(w_0, w_1, a_1, \dots, a_n) \wedge \varphi(w_0, w_2, a_1, \dots, a_n) \rightarrow w_1 = w_2 \right).$$

En termes naïfs, c'est une fonction partielle. On garde le terme *fonction* quand le domaine et la collection d'arrivée sont des *ensembles*, autrement dit, des éléments de $\mathcal{U}$.

ZF 4. *Schéma de substitution/de remplacement* : « la collection des images par une relation fonctionnelle des éléments d'un ensemble est aussi un ensemble ». Pour tout n -uplet $\bar{a}$, si la formule à paramètres $\varphi(w_0, w_1, \bar{a})$ définit une relation fonctionnelle $f_{\bar{a}}$ en w_0 et si a_0 est un ensemble alors la collection des images par $f_{\bar{a}}$ des éléments de a_0 est un ensemble noté $\{f_{\bar{a}}(x) \mid x \in a_0\}$.

$$\begin{aligned} & \forall a_0 \dots \forall a_n \\ & \left(\left(\forall w_0 \forall w_1 \forall w_2 (\varphi(w_0, w_1, a_1, \dots, a_n) \wedge \varphi(w_0, w_2, a_1, \dots, a_n)) \rightarrow w_1 = w_2 \right) \right. \\ & \quad \downarrow \\ & \left. \exists x \forall y (y \in x \leftrightarrow \exists w_0 w_0 \in a_0 \wedge \varphi(w_0, y, v_1, \dots, v_n)) \right). \end{aligned}$$

Théorème 4.1. Si ZF 1, ZF 2, ZF 3 et ZF 4 sont vrais dans $\mathcal{U}$, il existe (dans $\mathcal{U}$) un et un seul ensemble sans élément, que l'on notera $\emptyset$.

Preuve. ▷ *Unicité* par ZF 1.

- ▷ *Existence.* On procède par compréhension : l'univers $\mathcal{U}$ est non vide, donc a un élément x . On considère la formule $\varphi(w_0, w_1) := \perp$ qui est une relation fonctionnelle. Par ZF 4 (avec la formule φ et l'ensemble $a_0 := x$), il existe un ensemble a_{n+1} qui est vide.

□

Proposition 4.1. Si ZF 1, ZF 2, ZF 3 et ZF 4 sont vrais dans $\mathcal{U}$, alors l'**Axiome de la paire** est vrai dans $\mathcal{U}$.

Preuve. On a $\emptyset$ dans $\mathcal{U}$ et également $\wp(\emptyset) = \{\emptyset\}$ et $\wp(\wp(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ par ZF 3.

Étant donné deux ensemble a et b , on veut montrer que $\{a, b\}$ est un ensemble avec ZF 4

$$\varphi(w_0, w_1, a, b) := (w_0 = \emptyset \wedge w_1 = a) \vee (w_0 = \{\emptyset\} \wedge w_1 = b),$$

où

- ▷ $w_0 = \emptyset$ est un raccourci pour $\forall z (z \notin w_0)$;
- ▷ $w_0 = \{\emptyset\}$ est un raccourci pour $\forall z (z \in w_0 \leftrightarrow (\forall t t \notin z))$.

Ces notations sont compatibles avec celles données précédemment.

Comme φ est bien une relation fonctionnelle, on peut appliquer ZF 4 avec $a_0 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$ et on obtient $\{a, b\}$. □

Proposition 4.2. Si ZF 1, ZF 2, ZF 3 et ZF 4 sont vrais dans $\mathcal{U}$, alors ZF 4' est vrai dans $\mathcal{U}$.

Preuve. On a la formule $\varphi(y, v_1, \dots, v_n)$ et on veut montrer que

$$\mathcal{U} \models \forall v_1 \dots \forall v_{n+1} \exists x \forall y \left(y \in x \leftrightarrow (y \in v_{n+1} \wedge \underbrace{\varphi(y, v_1, \dots, v_n)}_{\bar{v}}) \right).$$

On considère la formule $\psi(w_0, w_1, \bar{v}) := w_0 = w_1 \wedge \varphi(w_0, \bar{v})$, qui est bien une relation fonctionnelle en w_0 . La collection

$$\{ y \in v_{n+1} \mid \varphi(y, v_1, \dots, v_n) \}$$

est l'image de v_{n+1} par ψ par **ZF 4**. □

Remarque 4.4. La réciproque du théorème précédent est fausse ! Les axiomes **ZF 4** et **ZF 4'** ne sont pas équivalents. On le verra en TD (probablement).

Proposition 4.3. Le produit ensembliste de deux ensembles est un ensemble.

Preuve. Soient v_1 et v_2 deux ensembles. On considère

$$X := v_1 \times v_2 = \{ (x, y) \mid x \in v_1 \text{ et } y \in v_2 \} \text{ (en naïf).}$$

La notation (x, y) correspond à l'ensemble $\{\{x\}, \{x, y\}\} \in \wp(\wp(v_1 \cup v_2))$.

On applique **ZF 4'** dans l'ensemble ambiant $\wp(\wp(v_1 \cup v_2))$, on définit le produit par compréhension à l'aide de la formule

$$\varphi(z, v_1, v_2) := \exists x \exists y \left(z = \{\{x\}, \{x, y\}\} \wedge x \in v_1 \wedge y \in v_2 \right).$$

C'est bien un élément de $\mathcal{U}$. □

Définition 4.4. Une *fonction* (sous-entendue *totale*) d'un ensemble a dans un ensemble b est un sous-ensemble de $a \times b$ qui

vérifie la propriété

$$\varphi(f, a, b) := \left(\begin{array}{c} \forall x \forall y \forall y' \left((x, y) \in f \wedge (x, y') \in f \rightarrow y = y' \right) \\ \wedge \\ \forall x \left(x \in a \rightarrow \exists y \left(y \in b \wedge (x, y) \in f \right) \right) \end{array} \right).$$

On identifie ainsi f et son graphe.

Une *fonction partielle* d'un ensemble a dans un ensemble b est un sous-ensemble de $a \times b$ qui vérifie la propriété

$$\varphi(f, a, b) := \forall x \forall y \forall y' \left((x, y) \in f \wedge (x, y') \in f \rightarrow y = y' \right).$$

On note b^a la collection des fonctions partielles de a dans b .

Proposition 4.4. La collection b^a est un ensemble, *i.e.* si a et b sont dans $\mathcal{U}$ alors b^a aussi.

Preuve. En exercice. □

Notation (Réunion indexée). Soit a une famille d'ensemble indexée par l'ensemble I , *i.e.* une fonction de domaine I . Pour $i \in I$, on note a_i , ou $a(i)$, pour l'unique objet y tel que $(i, y) \in a$.

Proposition 4.5. Si I est un ensemble et a est une fonction de domaine I , alors $\bigcup_{i \in I} a_i$ est un ensemble. Autrement dit, si dans $\mathcal{U}$, [ZF 1](#), [ZF 2](#), [ZF 3](#), [ZF 4](#) sont vraies, et que I et a sont dans $\mathcal{U}$, et a est une fonction, alors la collection définie naïvement par $\bigcup_{i \in I} a_i$ appartient à $\mathcal{U}$.

Preuve. On pose $b := \{a_i \mid i \in I\}$. C'est bien un ensemble car b est l'ensemble des images des éléments de I par a . On peut écrire a comme relation fonctionnelle :

$$\varphi(w_0, w_1, a) := (w_0, w_1) \in a.$$

On a donc que b est un ensemble avec ZF 4.

Et, $\bigcup_{i \in I} a_i = \bigcup_{z \in b} z$ donc on conclut par ZF 2. $\square$

Proposition 4.6 (Propriété d'intersection). Si I est un ensemble non vide et a est une fonction de domaine I alors $\bigcap_{i \in I} a_i$ est un ensemble.

Preuve. On pose $c := \bigcup_{i \in I} a_i$ qui est un ensemble par la proposition 4.5. On considère

$$\varphi(x, a, I) := \forall i (i \in I \rightarrow x \in a_i).$$

Par compréhension (ZF 4') on construit l'ensemble

$$\bigcap_{i \in I} a_i := \{x \in c \mid \varphi(x, a, I)\}.$$

$\square$

Proposition 4.7. Si I est un ensemble et a est une fonction de domaine i alors $\prod_{i \in I} a_i$ est un ensemble.

Preuve. La collection $\prod_{i \in I} a_i$ est l'ensemble des fonctions de I dans $\bigcup_{i \in I} a_i$ telles que $f(i) \in a_i$ pour tout i . $\square$

ZF 5 *Axiome de l'infini* : il existe un ensemble ayant une infinité d'éléments

$$\exists x (\emptyset \in x \wedge \forall y (y \in x \rightarrow y \cup \{y\} \in x)).$$

On encode les entiers avec des ensembles :

- ▷ $0 \rightsquigarrow \emptyset$
- ▷ $1 \rightsquigarrow \{\emptyset\}$
- ▷ $2 \rightsquigarrow \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$
- ▷ $\vdots$

$$\triangleright n + 1 \rightsquigarrow n \cup \{n\}$$

$$\triangleright \quad \vdots$$

Ainsi, on a $n = \{0, 1, \dots, n-1\}$.

Remarque 4.5. Si on retire $\emptyset \in x$, on peut avoir $x = \emptyset$ qui satisfait la version modifiée de ZF5.

Cependant, sans retirer $\emptyset \in x$, on peut quand même avoir un ensemble fini s'il existe un ensemble fini y tel que $y \in y$. Ceci est impossible avec l'axiome de bonne fondation.

Remarque 4.6. Les français sont les seuls à considérer que l'axiome de bonne fondation ne fait pas partie de la théorie de ZF.

4.2 Ordinaux et induction transfinie.

Théorème 4.2 (Cantor). 1. Soient A et B deux ensembles, supposons qu'il existe des injections $A \rightarrow B$ et $B \rightarrow A$ alors il existe une bijection $A \rightarrow B$.

2. Il n'existe pas de surjection de $A \rightarrow \wp(A)$.

Preuve. En TD. □

Définition 4.5. Deux ensembles sont *équipotents* s'il existe une bijection entre-eux.

Définition 4.6. Soit A un ensemble. Un *ordre (partiel, strict)* sur A est une relation binaire $<$ (donnée par un sous-ensemble de $A \times A$) telle que

1. *transitivité* : $\forall x \forall y \forall z \ x < y \rightarrow y < z \rightarrow x < z$;
2. *anti-réflexivité* : $\forall x, x \not< x$.

Notation. On note $x \leq y$ pour $x < y$ ou $x = y$.

Exemple 4.1. L'ordre $\subsetneq$ sur $\wp(\mathbb{N})$ est partiel. Les ordres $<_{\mathbb{N}}$, $<_{\mathbb{R}}$, $<_{\mathbb{Z}}$ sur $\mathbb{N}$, $\mathbb{R}$, $\mathbb{Z}$ sont totaux.

Définition 4.7. Soit $(A, <)$ un ensemble ordonné. Soient $a, a' \in A$ et $B \subseteq A$. On dit que

- ▷ a est un plus petit élément de B si $a \in B$ et pour tout $b \in B$, $b \geq a$;
- ▷ a est un élément minimal de B si $a \in B$ et pour tout $b \in B$, $b \not< a$;
- ▷ a est un minorant de B si pour tout $b \in B$, $a \leq b$;
- ▷ de la même manière, on définit plus grand élément, élément maximal, majorant ;
- ▷ a est une borne inférieure de B si a est un plus grand élément de l'ensemble des minorants de B ;
- ▷ a et a' sont incomparables si $a \neq a'$ et $a \not< a'$ et $a' \not< a$;
- ▷ un ordre est bien fondé si toute partie non vide de A a un élément minimal ;
- ▷ un bon ordre est un ordre total bien fondé.

Proposition 4.8. Un ordre total est bien fondé ssi il n'existe pas de suite infinie décroissante.

Preuve. En exercice. □

Exemple 4.2. ▷ L'ordre $<$ sur $\mathbb{N}$ est bien fondé.

- ▷ L'ordre $<$ sur $\mathbb{Z}$ n'est pas bien fondé.
- ▷ L'ordre $\subsetneq$ sur $\wp_{\text{finies}}(\mathbb{N})$ est bien fondé.
- ▷ L'ordre $\subsetneq$ sur $\wp(\mathbb{N})$ n'est pas bien fondé.

Définition 4.8. $\triangleright$ Deux ensembles ordonnés sont *isomorphes* s'il existe une bijection préservant l'ordre de l'un vers l'autre. On note $A \simeq B$.

- $\triangleright$ Soit X totalement ordonné. Un sous-ensemble $J \subseteq X$ est un *segment initial* si pour tous $a, b \in X$ avec $a < b$ alors $b \in J$ implique $a \in J$.
- $\triangleright$ Un ensemble X est *transitif* si pour tout $x \in X$ et $y \in x$ alors $y \in X$.
- $\triangleright$ Un ensemble X est un *ordinal* s'il est transitif et que $\in$ définit un bon ordre sur X .
- $\triangleright$ On note $\mathbb{O}$ la *classe des ordinaux*, et on note indifféremment les relations $\in$ et $<$.

Exemple 4.3. Les entiers de Von Neumann sont des ordinaux.

Proposition 4.9. Soient α et β des ordinaux. On a les propriétés suivantes :

1. $\emptyset$ est un ordinal ;
2. si $\alpha \neq \emptyset$ alors $\emptyset \in \alpha$;
3. $\alpha \notin \alpha$;
4. si $x \in \alpha$ alors $x = \{y \in \alpha \mid y < x\}$.
5. si $x \in \alpha$ alors x est un ordinal (on a l'abus de notation $x \in \mathbb{O}$) ;
6. $\beta \subset \alpha$ ssi $\beta = \alpha$ ou $\beta \in \alpha$;
7. $x = \alpha \cup \{\alpha\}$ est un ordinal noté $\alpha + 1$.

Preuve. 1. C'est vrai.

2. La relation $\in$ est un bon-ordre sur α , soit β le plus petit élément. Si $\beta \neq \emptyset$ alors il contient au moins un élément γ d'où $\gamma < \beta$ et $\gamma \in \alpha$ (par transitivité), *absurde* car β est minimal.
3. Le reste sera vu en TD ou en exercice.

□

Proposition 4.10. ▷ Si α et β sont des ordinaux et on a $\alpha \leq \beta \leq \alpha + 1$ alors $\beta = \alpha$ ou $\beta = \alpha + 1$.

▷ Si X est un ensemble non vide d'ordinaux alors $\bigcap_{\alpha \in X} \alpha$ est le plus petit élément de X .

□

Définition 4.9. Soit β un ordinal.

- ▷ S'il existe α tel que $\beta = \alpha + 1$ alors on dit que β est un ordinal successeur ;
- ▷ Sinon, c'est un ordinal limite.

Exemple 4.4. Quelques ordinaux limites :

$$\begin{array}{cccc} \omega & \omega \cdot 2 & \omega \cdot 3 & \omega \cdot \omega \\ & & & \omega^{\omega^{\omega^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\omega}}}}} \end{array}$$

$$\omega^2 + \omega \quad \omega^\omega \quad \omega^{\omega^{\omega^{\cdot^{\cdot^{\cdot^{\omega}}}}}$$

Lemme 4.2. Soit X un ensemble d'ordinaux. Le plus petit élément de X est $\bigcap_{\alpha \in X} \alpha$.

Théorème 4.3. Si α et β sont des ordinaux alors une et une seule de ces propriétés est vérifiée :

$$\alpha = \beta \qquad \alpha \in \beta \qquad \alpha \ni \beta.$$

Preuve. Soit $X = \{\alpha, \beta\}$, on sait que $\alpha \cap \beta$ est le plus petit élément de X .

- ▷ Si $\alpha \cap \beta = \alpha$ alors $\alpha \subseteq \beta$ donc $\alpha = \beta$ ou $\alpha \in \beta$.
- ▷ Si $\alpha \cap \beta = \beta$ alors $\beta \subseteq \alpha$ donc $\alpha = \beta$ ou $\alpha \ni \beta$.

□

Proposition 4.11. Soit X un ensemble d'ordinaux. Alors l'ensemble $b := \bigcup_{\alpha \in X} \alpha$ est un ordinal. On le note $b = \sup_{\alpha \in X} \alpha$. De plus si $\gamma \in b$ alors il existe un certain $\alpha \in X$ tel que $\gamma \in \alpha$.

Preuve. En exercice. □

Proposition 4.12. Soit λ un ordinal non vide. On a :

$$\overbrace{\lambda \text{ est limite}}^{(1)} \iff \overbrace{\lambda = \bigcup_{\alpha \in \lambda} \alpha}^{(2)}.$$

Preuve. 1. Par contraposée, si λ n'est pas limite, alors c'est le successeur d'un certain ordinal β et donc $\lambda = \beta \cup \{\beta\}$. On a

$$\bigcup_{\alpha \in \lambda} \alpha = \beta \cup \bigcup_{\alpha \in \beta} \alpha = \beta \neq \lambda.$$

2. Soit λ limite. Montrons qu'il n'a pas de plus grand élément β . Sinon, $\lambda = \beta \cup \{\beta\}$. Donc, pour tout $\alpha \in \lambda$ il existe un certain $\gamma \in \lambda$ tel que $\alpha < \gamma$, i.e. $\alpha \in \gamma$. On en conclut que $\lambda = \bigcup_{\gamma \in \lambda} \gamma$. □

Théorème 4.4 (Induction transfinie). Soit $\mathcal{P}$ une propriété sur les ordinaux. On suppose que :

- ▷ $\emptyset$ satisfait $\mathcal{P}$;
- ▷ pour tout ordinal α tel que, si tout $\beta < \alpha$ satisfait $\mathcal{P}$, alors α satisfait $\mathcal{P}$:

$$\forall \alpha, (\forall \beta < \alpha, \mathcal{P}(\beta)) \implies \mathcal{P}(\alpha) ;$$

alors tous les ordinaux satisfont $\mathcal{P}$.

Preuve. Par l'absurde, soit α ne satisfaisant pas $\mathcal{P}$. Soit β le plus

petit ordinal de $\alpha \cup \{\alpha\}$ ne satisfaisant pas $\mathcal{P}$. Tous les ordinaux plus petit que β satisfont $\mathcal{P}$, d'où $\mathcal{P}(\beta)$, **absurde**. On en conclut que α n'existe pas. $\square$

Remarque 4.7. En pratique on décompose :

- ▷ on montre pour $\emptyset$;
- ▷ on montre pour α successeur ;
- ▷ on montre pour α limite.

Définition 4.10. Un ordinal α est *fini* si α et tous ses éléments sont vides ou des successeurs.

Proposition 4.13. L'ensemble des ordinaux finis ω est un ordinal. C'est le plus petit ordinal limite.

Preuve. En exercice. $\square$

Lemme 4.3. Soit $f : \alpha \rightarrow \alpha'$ une fonction strictement croissante entre deux ordinaux α et α' . Alors $f(\beta) \geq \beta$ pour tout $\beta \in \alpha$. De plus, on a $\alpha' \geq \alpha$. Aussi si f est un isomorphisme alors $\alpha = \alpha'$ et f est l'identité.

Preuve. ▷ Soit β_0 le plus petit élément tel que $f(\beta_0) < \beta_0$. Comme f strictement croissante, on a $f(f(\beta_0)) < f(\beta_0) < \beta_0$ absurde car β_0 est le plus petit.

▷ Soit $\beta \in \alpha$. On a $f(\beta) \in \alpha'$ et $\beta \leq f(\beta)$ donc $\beta \in \alpha'$, donc $\beta \in \alpha'$, d'où $\alpha \subseteq \alpha'$ et donc $\alpha \leq \alpha'$.

▷ Si f est un isomorphisme alors f^{-1} est strictement croissante. On applique le point précédent à f^{-1} , d'où $\alpha = \alpha'$.

▷ Montrons que f est l'identité. On sait que, pour tout $\beta \in \alpha$, on a $f|_\beta$ strictement croissante de β dans $f(\beta)$ et bijective, d'où $\beta = f(\beta)$ par le point précédent. D'où f est l'identité. $\square$

Théorème 4.5. Tout ensemble bien ordonné est isomorphe à un ordinal. Cet ordinal ainsi que l'isomorphisme sont uniques.

Preuve. Cette preuve ressemble à une induction sans en être une. On aura le droit d'en faire quand on aura le théorème.

Si l'isomorphisme existe, il est unique grâce au lemme précédent. En effet, s'il y en a deux f et g alors $f \circ g^{-1}$ est un isomorphisme entre deux ordinaux égaux, donc c'est l'identité.

Notons $\mathcal{P}(x)$ la propriété « il existe un ordinal α_x et un isomorphisme $f_x : S_{\leq x} \rightarrow \alpha_x$ » où $S_{\leq x} := \{y \in X \mid y \leq x\}$. Pour montrer $\mathcal{P}(x)$ pour tout $x \in X$, on pose

$$Y := \{x \in X \mid \mathcal{P}(x) \text{ est vraie}\}.$$

et on montre $Y = X$.

Supposons $Y \neq X$ et soit $a = \min(X \setminus Y)$.

- ▷ Si Y a un plus grand élément b , alors il existe un isomorphisme $f_b : S_{\leq b} \rightarrow \alpha_b$ (car on a $\mathcal{P}(b)$). Or, $S_{\leq a} = S_{\leq b} \cup \{a\}$ (il faudrait montrer que Y est un segment initial de X). Et, on construit $f_a : S_{\leq a} \rightarrow \alpha_b \cup \{\alpha\}_b$ qui est un isomorphisme, donc $a \in Y$, **absurde**.
- ▷ Si Y n'a pas de plus grand élément, on considère $\alpha := \bigcup_{x \in Y} \alpha_x$ un ordinal. Pour tout $x \in Y$ il existe un isomorphisme f_x de $S_{\leq x}$ dans α_x . Si on prend $x < y < \alpha$ alors $(f_y)_{|S_{\leq x}}$ est un isomorphisme et, par unicité, on a donc que f_y prolonge f_x . On peut définir un isomorphisme f comme union des f_x pour $x \in Y$. C'est un isomorphisme de $S_{< a}$ dans $\beta := \bigcup_{x < a} \alpha_x$. On peut prolonger f en $f_X : S_{\leq a} \rightarrow \beta + 1$ où $a \mapsto \beta$, d'où $a \leq Y$, **absurde**.

□

Lemme 4.4 (Définition récursive transfinie des fonctions). Soient

- ▷ α un ordinal ;

- ▷ S une collection ;
- ▷ $\mathcal{F}$ la collection des applications définies sur les ordinaux $\beta \leq \alpha$ et prenant leur valeurs dans S ;
- ▷ F une relation fonctionnelle de domaine $\mathcal{F}$ à valeur dans S .

Alors il existe une unique fonction f dans $\mathcal{F}$ définie sur α telle que :

$$(\star) \quad \text{pour tout } \beta < \alpha \quad F(f|_\beta, f(\beta)).$$

Preuve. Unicité. Soient f et g satisfaisant $(\star)$. Montrons $\mathcal{P}(\beta)$:
 « si $\beta < \alpha$ alors $f(\beta) = g(\beta)$ » par induction transfinie.

- ▷ On a directement $\mathcal{P}(\emptyset)$ car il y a une unique fonction de $\emptyset \rightarrow \emptyset$.
- ▷ Supposons que $f(\gamma) = g(\gamma)$ pour tout $\gamma < \beta$. Alors $f|_\beta = g|_\beta$ et donc par $(\star)$ on a $f(\beta) = g(\beta)$.

Existence. Soit τ l'ensemble des ordinaux $\gamma \in \alpha$ tels qu'il existe $f_\gamma \in \mathcal{F}$ définie sur γ et vérifiant $(\star)$. Alors τ est un segment initial de α donc un ordinal. Par unicité si $\gamma < \gamma'$ alors $f_{\gamma'}$ prolonge f_γ . On définit f_τ par $F(f_\gamma, f_\tau(\gamma))$ si $\gamma < \tau$.

- ▷ Si $\tau \in \alpha$ alors f_τ prolonge tous les f_γ et donc $\tau \in \tau$,
impossible.
- ▷ D'où $\tau = \alpha$.

□

Exercice 4.1. Généraliser la preuve ci-dessus en remplaçant α par la classe de tous les ordinaux $\mathcal{O}$ (et remplacer $\mathcal{F}$ par autre chose).

Proposition 4.14. 1. La classe $\mathcal{O}$ n'est pas un ensemble.

2. Il n'existe pas de relation fonctionnelle bijective entre $\mathcal{O}$ et un ensemble a .

Preuve. 1. En effet, supposons $\mathcal{O}$ un ensemble. On a que $\mathcal{O}$ est transitif et $\in$ y définit un ordre total, donc $\mathcal{O}$ est un ordinal. D'où $\mathcal{O} \in \mathcal{O}$ ce qui est impossible pour un ordinal.

2. Sinon $\mathcal{O}$ serait un ensemble.

□

4.3 Axiome de choix et variantes équivalentes.

Les axiomes du choix sont exprimable au premier ordre !

AC 1. Le produit d'une famille d'ensembles non vides est non vide.

AC 2. Pour tout ensemble a non vide, il existe une fonction de $\mathcal{P}(a)$ dans a tel que si $x \subseteq a$ est non vide alors $f(x) \in x$. (C'est une fonction de choix.)


AC 3. Si a est un ensemble dont tous les éléments sont non vides et deux à deux disjoints alors il existe un ensemble c tel que, pour tout $x \in a$, $x \cap c$ a exactement un élément.

(Lemme de) Zorn. Tout ensemble non vide partiellement ordonné et inductif admet un élément maximal.

On rappelle qu'un ensemble partiellement ordonné X est inductif si $X \neq \emptyset$ et si tout sous-ensemble $Y \subseteq X$ totalement ordonné admet un majorant dans X .

(Lemme de) Zermelo. Tout ensemble peut être muni d'un bon ordre (*i.e.* un ordre total où toute partie non vide a un plus petit élément).

En supposant les axiomes **ZF 1**, ..., **ZF 5**, on va montrer les implications suivantes :



4.3.1 AC 1 implique AC 2.

On rappelle que l'ensemble $\prod_{i \in I} a_i$ est l'ensemble des fonctions f de I dans $\bigcup_{i \in I} a_i$ telles que $f(i) \in a_i$ pour tout i .

Soit a non vide. On considère $\prod_{\emptyset \neq x \subseteq a} x$ qui est non vide par AC 1. Soit f un de ses éléments. On a, pour tout $\emptyset \neq x \subseteq a$, que $f(x) \in x$ donc f est une fonction de choix.

4.3.2 AC 2 implique AC 3.

Soit a un ensemble dont les éléments sont non vides et deux à deux disjoints. On considère $b = \bigcup_{x \in a} x$ qui est un ensemble. Par AC 2, on a une fonction de choix f sur $\wp(b)$. On prend $c = \{f(x) \mid x \in a\}$. Comme les x sont disjoints, on obtient la propriété recherchée.

4.3.3 AC 3 implique AC 1.

Soit $X = \prod_{i \in I} a_i$ un produit d'ensembles non vides. On considère $A := \{\{i\} \times a_i \mid i \in I\}$. Par AC 3, il existe c tel que, pour tout $x \in A$, $x \cap c$ a exactement un élément. Donc, c peut s'écrire

$$c = \{(i, d_i) \mid i \in I \text{ et } d_i \in a_i\}.$$

On a donc $c \in \prod_{i \in I} a_i$ (c'est le graphe d'une fonction) et donc $\prod_{i \in I} a_i \neq \emptyset$.

4.3.4 AC 2 implique Zermelo.

Soit a un ensemble non vide.

Remarque 4.8 (Idée). L'idée est qu'on utilise $f : \mathcal{P}(a) \rightarrow a$ une fonction de choix pour définir l'ordre. On peut imaginer définir $x \leq y$ ssi $f(\{x, y\}) = x$ (on traite donc f comme la fonction minimum), mais on n'a pas la transitivité. Il faut être plus futé.

On va construire en partant du plus petit une bijection entre a et un ordinal.

- ▷ $h(0) := f(a)$
- ▷ $h(1) := f(a \setminus \{h(0)\})$
- ▷ $h(2) := f(a \setminus \{h(0), h(1)\})$
- ▷ $\vdots$
- ▷ $h(\omega) = f(a \setminus \{h(0), h(1), \dots\})$
- ▷ $\vdots$

On s'arrête quand $a \setminus \{h(0), h(1), \dots\}$ est vide.

Soit $\theta \notin a$ (pour « détecter » quand l'ensemble $a \setminus \{h(0), \dots\}$ est vide). Il existe car a est un ensemble donc pas l'univers tout entier.

On définit

$$F(\alpha) := \begin{cases} f(a \setminus \{F(\beta) \mid \beta < \alpha\}) & \text{si } a \setminus \{F(\beta) \mid \beta < \alpha\} \neq \emptyset \\ \theta & \text{sinon} \end{cases}.$$

D'après le dernier lemme de la section précédente, on peut construire l'application F ainsi et elle est unique.

S'il n'existe pas d'ordinal α tel que $F(\alpha) = \theta$ alors F est une injection de $\mathbb{O}$ dans a . **Absurde**. Il existe donc α tel que $F(\alpha) = \theta$.

Le sous-ensemble $\{\beta \in \alpha + 1 \mid F(\beta) = \theta\}$ a un plus petit élément β . Montrons que $F|_{\beta}$ est une bijection de β dans a .

- ▷ D'une part, on sait que c'est une injection.
- ▷ D'autre part, $F(\beta) = \theta$ implique $\{F(\gamma) \mid \gamma < \beta\} = a$ donc $F|_{\beta}$ est une surjection.

On définit le bon ordre $x \prec y$ ssi $F^{-1}(x) < F^{-1}(y)$.

4.3.5 Zermelo implique AC2.

Soit a non vide. Il existe un bon-ordre $<$ sur a . Soit $\emptyset \neq x \subseteq a$. On définit $f(x) = \min x$, c'est bien une fonction de choix.

4.3.6 Zorn implique AC 3.

Soit a un ensemble dont les éléments sont disjoints et non vides. On pose :

$$b := \bigcup_{x \in a} x \quad \text{et} \quad X := \{c \subseteq b \mid \forall x \in a, |c \cap x| \leq 1\}.$$

Montrons que l'ensemble $(X, \subseteq)$ est inductif.

Soit $Y \subseteq X$ totalement ordonné. Montrons que Y a un majorant dans X . On pose $z = \bigcup_{y \in Y} y$ qui majore Y . On a bien $z \in X$ (on ne duplique pas les éléments). On en conclut que X est inductif. Soit d un élément maximal de X (il existe par [Zorn](#)).

- ▷ S'il existe $x \in a$ tel que $x \cap d = \emptyset$ alors prenons $u \in x$ et posons $d_1 := d \cup \{u\}$. On obtient $d_1 \in X$ et $d \subsetneq d_1$ donc d n'est pas maximal, **absurde**.
- ▷ Pour tout $x \in a$, on a $|d \cap x| = 1$, donc d est l'ensemble recherché (appelé c dans [AC 3](#)).

4.3.7 AC 2 implique Zorn.

Soit a un ensemble inductif.

Remarque 4.9 (Idée). On construit une chaîne dans a (*i.e.* un ensemble totalement ordonné) de taille maximale (c'est ici qu'on utilise la fonction de choix de [AC 2](#)). Elle a un majorant car a est inductif. Ce majorant est l'élément maximal.

Soit $f : \wp(a) \rightarrow a$ une fonction de choix donnée par [AC 2](#). Si $x \subseteq a$ on appelle majorant strict de x un $y \in a$ tel que $z < y$ pour tout $z \in x$.

- Remarque 4.10 (Idée – suite).**
- ▷ On part de $\emptyset : a_1 = f(a)$ est un majorant strict de $\emptyset$.
 - ▷ Soit X_1 l'ensemble des majorants stricts de $\{a_1\}$. On pose $a_2 := f(X_1)$.

- ▷ Soit X_2 l'ensemble des majorants stricts de $\{a_1, a_2\}$. On pose $a_3 := f(X_2)$.

Formellement, soit $C := \{x \subseteq a \mid x \text{ a un majorant strict dans } a\}$. On a $\emptyset \in C$. On définit

$$\begin{aligned} m : C &\longrightarrow a \\ x &\longmapsto f(\{y \in a \mid y \text{ est un majorant strict de } x \text{ dans } a\}). \end{aligned}$$

On définit par induction une chaîne maximale (dernier lemme de la section précédente). Soit $\theta \notin a$. On définit :

$$F(\alpha) := \begin{cases} m(\{F(\beta) \mid \beta < \alpha\}) & \text{si } \{F(\beta) \mid \beta < \alpha\} \in C \\ \theta & \text{sinon} \end{cases}.$$

La fonction F n'est pas une injection de $\mathbb{O}$ dans a donc il existe un ordinal α tel que $F(\alpha) = \theta$. Comme $\alpha + 1$ est un ordinal, l'ensemble $\{\beta \in \alpha + 1 \mid F(\beta) = \theta\}$ a un plus petit élément α_0 . L'ensemble $\{F(\beta) \mid \beta < \alpha_0\}$ n'a pas de majorant strict mais a un majorant M car a inductif. Et, a n'a pas d'élément plus grand que a . Ainsi M est maximal dans a .

4.3.8 Indépendance de ZF et de l'axiome du choix.

On a les deux théorèmes suivants (que l'on admet).

Théorème 4.6 (Gödel, 1938). S'il est cohérent, ZF ne réfute pas l'axiome du choix.

Théorème 4.7 (Cohen, 1963). S'il est cohérent, ZF ne montre pas l'axiome du choix.

Ainsi l'axiome du choix est indépendant de ZF. Cependant, il existe des versions plus faibles : axiome du choix dépendant (ACD), axiome du choix dénombrable (AC_ω).

5 Exemples de théories décidables.

Dans ce chapitre, on traite de l'élimination des quantificateurs dans les corps réels clos (et les corps algébriquement clos).

5.1 De quoi on parle ?

5.1.1 L'élimination des quantificateurs.

Définition 5.1. Une théorie T (de la logique du 1er ordre) admet *l'élimination des quantificateurs* si pour toute formule $\varphi(\bar{y})$, il existe une formule sans quantificateurs $\psi(\bar{y})$ telle que $T \vdash \forall \bar{y} (\varphi(\bar{y}) \leftrightarrow \psi(\bar{y}))$.

Lemme 5.1. Une théorie T élimine les quantificateurs ssi pour toute formule $\varphi(x, \bar{y})$ sans quantificateurs, il existe une formule $\psi(\bar{y})$ sans quantificateurs et $T \vdash \forall \bar{y} (\exists x \varphi(x, \bar{y}) \leftrightarrow \psi(\bar{y}))$.

Preuve. Idée de la preuve :

- ▷ « $\implies$ ». C'est un cas particulier.
- ▷ « $\impliedby$ ». Toute formule est équivalente à une formule pré-nexe, c'est-à-dire une formule où les quantificateurs sont à la racine :

$$Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi(x_1, \dots, x_n),$$

où $\varphi(\dots)$ est sans quantificateurs. Pour démontrer que

toute formule est équivalente à une formule prénexe, on procède par induction sur la formule, et on doit potentiellement procéder à des cas d' α -renommage au besoin.

Pour toute formule sous forme prénexe, le lemme est vrai. $\square$

Exemple 5.1. La théorie des booléens est la théorie

$$T_{\text{bool}} := \{\forall x \, x = 0 \vee x = 1, 0 \neq 1\},$$

sur le langage $\mathcal{L} = \{0, 1\}$. Cette théorie admet l'élimination des quantificateurs. Par exemple, une formule

$$F := \exists x_1 \cdots \exists x_n (x_1 = 1 \vee x_2 = 0 \vee x_4 = 1) \wedge \cdots),$$

est équivalente à $\top$ ou $\perp$.

Exemple 5.2. Sur le langage $\mathcal{L}_{\text{co}} = \{0, 1, +, \times, \leq\}$, la théorie $T := \mathbf{Th}(\mathbb{R})$ admet l'élimination des quantificateurs. Par exemple, la formule

$$\varphi(a, b, c) := \exists x (a \times x \times x + b \times x + c = 0)$$

est équivalente à la formule sans quantificateurs

$$\psi(a, b, c) := (a \neq 0 \wedge b^2 - 4ac \geq 0) \vee (a = 0 \wedge b \neq 0) \vee (a = 0 \wedge b = 0 \wedge c = 0) .$$

5.1.2 Les corps réels clos et le théorème de Tarski.

Définition 5.2. Un *corps réel clos* est un corps commutatif ordonné dans lequel on a le théorème des valeurs intermédiaires pour les polynômes à 1 variable.

La théorie T_{CRC} est la théorie du 1er ordre dont les axiomes sont :

- ▷ axiomes de corps commutatifs ;

- ▷ axiomes de relation d'ordre total ;
- ▷ $1 > 0$;
- ▷ axiomes de corps ordonné (compatibilité de $+$ et $\times$ avec $\leq$) :

$$\forall x \forall y \forall z \left(\begin{array}{c} x \leq y \rightarrow x + z \leq y + z \\ \wedge \\ (z \geq 0 \wedge x \leq y) \rightarrow x \times y \leq y \times z \\ \wedge \\ (z \leq 0 \wedge x \leq y) \rightarrow x \times y \geq y \times z \end{array} \right) ;$$

- ▷ schéma d'axiomes pour le théorème des valeurs intermédiaires : pour $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{array}{c} \forall a_0 \dots a_n \forall x \forall y \\ a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n \geq 0 \wedge a_0 + a_1 y + \dots + a_n y^n \leq 0 \\ \downarrow \\ \exists z (x \leq z \leq y \vee y \leq z \leq x) \wedge a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n = 0. \end{array}$$

Exemple 5.3. Exemples de corps réels clos : $\mathbb{R}$ les réels, $\bar{\mathbb{Q}} \cap \mathbb{R}$ les nombres réels algébriquement clos.

Qu'en est-il de $\mathbb{C}$? Si on a $i \geq 0$ et on a $1 \leq 2$ alors $i \leq 2i$ et par multiplication par i on a $-1 \leq -2$, absurde! Le même procédé fonctionne si l'on suppose $i \leq 0$. Il n'y a pas de manière d'ordonner $\mathbb{C}$ de telle sorte à ce qu'il soit un corps réel clos.

Proposition 5.1. 1. Un corps réel clos est de caractéristique 0.

2. Dans un corps réel clos, on a le théorème de Rolle (entre deux racines d'un polynôme, la dérivée s'annule).

Preuve. Idée de la preuve :

1. On a $1 > 0$ donc $2 > 1 > 0$ donc $3 > 0$, *etc.* On montre, par récurrence, pour tout n que $n > 0$ et donc $n \neq 0$.

2. On montre que si la dérivée est de signe constant alors le polynôme est monotone d'où le théorème de Rolle.

□

À quoi ressemblent les formules dans $\mathcal{L}_{co}$?

- ▷ Les termes représentent des polynômes à plusieurs variables et à coefficients dans $\mathbb{N}$.
- ▷ Les formules atomiques représentent des équations et inéquations entre polynômes :

$$P(X) \leq Q(X) \text{ ou } P(X) = Q(X),$$

et même $P(X) \geq 0$ ou $P(X) = 0$ avec P à coefficient dans $\mathbb{Z}$.

- ▷ Les formules sans quantificateur sont équivalentes à des formules de la forme

$$\bigvee_i \bigwedge_j (P_{i,j} \Delta_{i,j} 0),$$

où $\Delta_{i,j} \in \{<, >, =\}$.

- ▷ Les formules sont équivalentes à des formules sous forme prénexe de la forme

$$Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \bigvee_i \bigwedge_j (P_{i,j} \Delta_{i,j} 0),$$

avec $Q_i \in \{\forall, \exists\}$.

Théorème 5.1 (Tarski). La théorie des corps réels clos admet l'élimination des quantificateurs. Elle est axiome-complète et décidable.

Preuve. En supposant que T_{CRC} admet l'élimination des quantificateurs, alors on a une théorie axiome-réursive ~~qui contient les entiers donc indécidable par Gödel~~. Non ! On ne contient pas $\mathcal{P}_0$! En effet, l'axiome A1 n'est pas vérifié : on n'a pas $\textcircled{S} x \neq 0$!

Soit F une formule close de $\mathcal{L}_{co}$. Montrons que $T_{CRC} \vdash F$ ou $T_{CRC} \vdash \neg F$. Il existe une formule sans quantificateurs G telle que $T_{CRC} \vdash F \leftrightarrow G$ et G n'a pas de variable. Ainsi G est équivalent

à une conjonction de disjonction de formules équivalentes à

$$\textcircled{n} > \textcircled{m} \text{ ou } \textcircled{n} = \textcircled{m}.$$

La valeur de vérité ne dépend pas du modèle, d'où $T_{\text{CRC}} \vdash G$ ou $T_{\text{CRC}} \vdash \neg G$, donc $T_{\text{CRC}} \vdash F$ ou $T_{\text{CRC}} \vdash \neg F$, et donc T_{CRC} est axiome-complète.

Comme T_{CRC} est axiome-réursive, pour décider si $T_{\text{CRC}} \vdash F$, il suffit d'énumérer toutes les preuves jusqu'à en trouver une de F ou de $\neg F$. $\square$

5.2 La méthode d'élimination.

5.2.1 Rappels et exemples.

Il suffit de montrer le lemme ci-dessous.

Lemme 5.2. Si pour toute formule F de la forme $\exists x \bigvee_i \bigwedge_k P_{i,j} \Delta_{i,j} 0$ avec $P_{i,j}$ des polynômes et $\Delta_{i,j} \in \{<, >, =\}$, il existe une formule sans quantificateurs G telle que

$$T_{\text{CRC}} \vdash \forall \bar{y} G(\bar{y}) \leftrightarrow F(\bar{y})$$

alors T_{CRC} admet l'élimination des quantificateurs.

Idée de la méthode :

- ▷ On part d'un polynôme, par exemple $ax^2 + bx + 1$.
- ▷ On calcule des « quantités importantes » (des polynômes de degré 0 en x), ici a et $a^2 - 4a$.
- ▷ On trouve des « conditions de signe » qui permettent de satisfaire la formule, ici $a \neq 0 \wedge a^2 - 4a \geq 0$.

Définition 5.3. Avec $P \in \mathbb{Z}[\bar{Y}][X] = \mathbb{Z}[Y_1, \dots, Y_n][X]$, les poly-

nômes s'écrivent comme

$$P(X) = a_n X^n + \cdots + a_0 \text{ où } n \geq 1, a_n \neq 0 \text{ et } a_i \in \mathbb{Z}[\bar{Y}],$$

et on définit les opérations :

- ▷ *dérivée* $D(P) := \frac{\partial P(X)}{\partial X}$;
- ▷ *extraction du coefficient dominant* $E(P) := a_n$;
- ▷ *omission du terme dominant* $O(P) := a_{n-1}X^{n-1} + \cdots + a_0$;
- ▷ *reste modifié* $MR(P, Q)$:
si $P = a_n X^n + \cdots + a_0$ et $Q = b_m X^m + \cdots + b_0$ où

$$n = \deg P \geq m = \deg Q$$

alors $MR(P, Q)$ est l'unique polynôme de $\mathbb{Z}[\bar{Y}][X]$ de degré $r < m$ tel qu'il existe $L \in \mathbb{Z}[\bar{Y}][X]$ et

$$(b_m)^{n-m+1} \times P = Q \times L + R.$$

Exemple 5.4. Si $P = X^4$ et $Q = 3X^2 + X + 1$ alors

$$\begin{array}{r}
 X^4 \\
 - X^4 - \frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{3}X^2 \\
 \hline
 -\frac{1}{3}X^3 - \frac{1}{3}X^2 \\
 -\frac{1}{3}X^3 + \frac{1}{9}X^2 + \frac{1}{9}X \\
 \hline
 -\frac{2}{9}X^2 + \frac{1}{9}X \\
 -\frac{2}{9}X^2 + \frac{2}{27}X + \frac{2}{27} \\
 \hline
 \frac{5}{27}X + \frac{2}{27}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 3X^2 + X + 1 \\
 \frac{1}{3}X^2 - \frac{1}{9}X - \frac{2}{27} \\
 \hline
 \end{array}$$

et le reste modifié est $MR(P, Q) = 3^3 \left(\frac{5}{27}X + \frac{2}{27} \right) = 5X + 2$.

5.2.2 Énoncé comme lemme clé.

Lemme 5.3 (Informel). À partir d'un ensemble fini de polynômes S , on obtient en temps fini un ensemble fini de polynômes $BC(S)$ de degré 0 en appliquant les quatre opérations D , E , O et MR . ¹

Exemple 5.5. À partir de $S = \{\overbrace{aX^2 + aX + 1}^{p_0}\}$, on a

- ▷ on commence par ajouter p_0 ;
- ▷ d'abord les dérivées, omissions et extractions : on ajoute les polynômes $2aX + a$, a et $aX + 1$, $2a$, 1 et 0 ;
- ▷ ensuite on calcule le reste modifié

$$\text{MR}(aX^2 + aX + 1, 2aX + a) = 4a^2 - a^3,$$

et on l'ajoute ;

- ▷ on calcule le reste modifié

$$\text{MR}(aX^2 + aX + 1, aX + 1) = a,$$

et on l'ajoute (il y est déjà) ;

- ▷ on calcule le reste modifié

$$\text{MR}(2aX + a, aX + 1) = a^2 - 2a,$$

et on l'ajoute ;

- ▷ on ne conserve que les polynômes de degré 0.

Dans l'exemple on obtient (après suppression des termes inutiles pour les comparaisons à 0),

$$\text{BCS} = \{a, 4a^2 - a^3, a^2 - 2a\}.$$

On a, en théorie, 27 conditions de signe possibles ($3^{|\text{BC}(S)|}$) :

- ▷ $a > 0$ et $4a^2 - a^3 > 0$ et $a^2 - 2a < 0$,
- ▷ $a > 0$ et $4a^2 - a^3 < 0$ et $a^2 - 2a < 0$,
- ▷ $a = 0$ et $a^2 - a^3 > 0$ et $a^2 - 2a > 0$,
- ▷ *etc* pour les 24 autre cas.

On traite deux cas : $a > 0$ et $4a^2 - a^3$ et $a^2 - 2a$.

X	$-\infty$	γ_2		γ_1	$+\infty$
a	$>$	$>$	$>$	$>$	$>$
$4a^2 - a^3$	$>$	$>$	$>$	$>$	$>$
$a^2 - 2a$	$<$	$<$	$<$	$<$	$<$
$aX + 1$	$-\infty <$	$<$	$<$	0	$> +\infty$
$2aX + a$	$-\infty <$	0	$>$	$>$	$> +\infty$
$aX^2 + aX + 1$	$+\infty >$	$>$	$>$	$>$	$> +\infty$

5.3 Corps algébriquement clos.

Définition 5.4. Un *corps algébriquement clos* est un corps commutatif dans lequel tout polynôme a une racine.

Exemple 5.6. Le corps $\mathbb{C}$ est algébriquement clos. En effet, il s'agit du *théorème fondamental de l'algèbre*, i.e. un polynôme de degré n a n racines comptées avec multiplicité.

Tout polynôme est ainsi un produit de polynômes de degré 1.

Définition 5.5. La *théorie des corps algébriquement clos* est la théorie formée des :

- ▷ axiomes de corps ;
- ▷ du schémas d'axiomes, noté Clos_n , pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\forall a_0 \dots \forall a_n (a_1 \neq 0 \vee \dots \vee a_n \neq 0 \rightarrow \exists b a_0 + a_1 b + \dots + a_n b^n = 0).$$

Définition 5.6. Un corps est de *caractéristique* $p \in \mathbb{N}^*$ s'il est modèle de l'ensemble Car_p définie par

$$\{(1 \neq 0) \wedge (1+1 \neq 0) \wedge \dots \wedge \underbrace{(1+\dots+1 \neq 0)}_{p-1} \wedge \underbrace{(1+\dots+1 = 0)}_p\}.$$

Un corps est de *caractéristique* 0 s'il est modèle de l'ensemble Car_0 définie par

$$\{1 \neq 0, 1 + 1 \neq 0, 1 + 1 + 1 \neq 0, \dots\}.$$

La *théorie des corps algébriquement clos de caractéristique* $p \in \mathbb{N}$ est :

$$\text{ACF}_p := \{\text{Axiomes des corps}\} \cup \{\text{Clos}_n \mid n \in \mathbb{N}\} \cup \text{Car}_p.$$

Exemple 5.7. Les corps $\mathbb{C}$ et $\bar{\mathbb{Q}}$ sont modèles de cette théorie. **Attention**, $\mathbb{F}_p$ ne l'est pas (et $\mathbb{F}_{p^n}$ non plus), il faut prendre sa clôture algébrique $\bar{\mathbb{F}}_p$ et $\bar{\mathbb{F}}_{p^n}$.

Remarque 5.1. $\triangleright$ Tous les corps finis sont de la forme $\mathbb{F}_{p^n}$ avec p premier.

- $\triangleright$ Un élément a est dit *algébrique* sur le corps $\mathbb{k}$ si c'est la racine d'un polynôme à coefficient dans $\mathbb{k}$. On dit que a est *algébrique de degré* q si le polynôme minimal dont a est racine est de degré q .

Exemple 5.8. $\triangleright$ Le nombre $\sqrt{3}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré 2.

- $\triangleright$ Le nombre i est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré 2.
- $\triangleright$ Le nombre $\sqrt[3]{2}$ est algébrique sur $\mathbb{Q}$ de degré 3.
- $\triangleright$ Le nombre π n'est pas algébrique sur $\mathbb{Q}$.

Remarque 5.2. Si a est algébrique de degré q sur $\mathbb{k}$ alors $\mathbb{k}(a)$ est le corps engendré par $\mathbb{k}$ et a . C'est l'ensemble des polynômes de degré $\leq q - 1$ sur $\mathbb{k}$, et on définit le produit modulo un polynôme minimal de a .

Exemple 5.9. On a $\mathbb{R}(i) = \mathbb{R}[X]/(X^2 - 1) \cong \mathbb{C}$. Le produit est :

$$\begin{aligned}(aX + b)(cX + d) &= acX^2 + X(ad + bc) + bd \\ &= (ad + bc)X + bd - ac.\end{aligned}$$

En particulier, si a est de degré q sur $\mathbb{F}_{p^n}$ alors $\mathbb{F}_{p^n}(a) \cong \mathbb{F}_{p^{qn}}$.

Théorème 5.2 (Tarski–bis). Pour tout p , la théorie des corps algébriquement clos de caractéristique p admet l'élimination des quantificateurs. Elle est complète et décidable.

Preuve. Comme la dernière fois, il suffit de montrer pour toute formule de la forme

$$\exists x (P_1(x) = 0 \wedge \cdots \wedge P_n(x) = 0 \wedge Q(x) \neq 0),$$

il existe une formule sans quantificateurs équivalente dans ACF_p .
On continue la preuve sur un exemple. $\square$

Exemple 5.10. On élimine les quantificateurs sur

$$\exists x (ax^2 + ax + 1 = 0 \wedge ax + 1 \neq 0),$$

avec la caractéristique $p = 0$. On a les polynômes suivants :

- ▷ $p_0(X) = aX^2 + aX + 1$
- ▷ $p_1(X) = Dp_0(X) = 2aX + a$
- ▷ $p_2(X) = Ep_0 = a$
- ▷ $p_3(X) = aX + 1$
- ▷ $p_4(X) = \text{MR}(p_0, p_1) = 4a^2 - a^3$
- ▷ $p_2(X) = \text{MR}(p_0, p_3) = a$
- ▷ $p_5(X) = \text{MR}(p_1, p_3) = a^2 - 2a$.

Les « conditions de signe » sont $= 0$ ou $\neq 0$ (notés 0 et $\neq$).

On se place dans un cas exemple :

	autres	γ_1	γ_2	γ_3	γ_4
a	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$
$4a^2 + a^3$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$
$a^2 - 2a$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	$\neq$
$aX + 1$	$\neq$	0	$\neq$	$\neq$	$\neq$
$2aX + a$	$\neq$	$\neq$	0	$\neq$	$\neq$
$aX^2 + aX + 1$	$\neq$	$\neq$	$\neq$	0	0

Ainsi, pour $a \neq 0$, $4a^2 - a^3 \neq 0$, $a^2 - 2a \neq 0$ alors on a

$$\exists x \left(ax^2 + ax + 1 = 0 \wedge ax + 1 \neq 0 \right).$$

Avec les autres cas, on peut en déduire que

$$\exists x \left(ax^2 + ax + 1 = 0 \wedge ax + 1 \neq 0 \right)$$

est équivalente à

$$\bigvee_{\substack{\text{tableau de la condition de signe} \\ \text{a une colonne qui convient}}} \text{(conditions de signe)}.$$

Exercice 5.1. En déduire que ACF_p est complète et décidable.

Remarque 5.3. En 2010, une preuve ~~Coeq~~ **Rocq** de l’élimination des quantificateurs de cette théorie a été publiée par Cyril Cohen et Assia Mahboubi.

5.3.1 Applications aux mathématiques.

Théorème d’Ax–Grothendieck.

Théorème 5.3 (Ax–Grothendieck). Si P est un polynôme de $\mathbb{C}^n$ dans $\mathbb{C}^n$ injectif alors il est bijectif (et son inverse est un polynôme!).

On va prouver ce théorème en trois lemmes.

Lemme 5.4. Si φ est une formule qui admet comme modèle un corps algébriquement clos de caractéristique arbitrairement grande, alors φ admet comme modèle un corps algébriquement clos de caractéristique 0.

Preuve. On utilise le théorème de compacité de la logique du 1er ordre. Soit $T := \text{ACF}_0 \cup \{\varphi\}$. Montrons que T a un modèle. Pour cela, on montre que T est finiment satisfiable. Soit $T' \subseteq_{\text{fini}} T$. Soit n le plus grand entier tel que

$$\underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_n \neq 0) \in T'.$$

Soit $p > n$ un nombre premier tel que φ admet comme modèle un corps algébriquement clos $\mathbb{k}$ de caractéristique p (qui existe par hypothèse). Alors $\mathbb{k} \models \varphi$, et

$$\mathbb{k} \models \{\text{Axiomes des corps}\} \cup \{\text{Clos}_n \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

D'où, $\mathbb{k} \models \text{ACF}_p$, et donc $\mathbb{k} \models T'$. Ainsi T est finiment satisfiable donc satisfiable. On en déduit que φ admet un modèle de caractéristique 0. $\square$

Lemme 5.5. Soit $\mathbb{k}$ un corps fini et soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P : \mathbb{k}^n \rightarrow \mathbb{k}^n$ un polynôme injectif. Alors P est bijectif.

Preuve. Comme $\mathbb{k}^n$ est fini, P est bijectif. $\square$

Lemme 5.6. Soit $\mathbb{k}$ un corps fini et soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\bar{\mathbb{k}}$ la clôture

algébrique de $\mathbb{k}$. Soit $P : \bar{\mathbb{k}}^n \rightarrow \bar{\mathbb{k}}^n$ un polynôme injectif. Alors P est bijectif.

Preuve. On suppose P non surjectif, il existe donc $\bar{b} = (b_1, \dots, b_n) \in \bar{\mathbb{k}}^n \setminus P(\bar{\mathbb{k}}^n)$ des nombres algébriques dans $\mathbb{k}$. Ils sont racines de polynômes minimaux à coefficients dans $\mathbb{k}$. Soient $\bar{a} = (a_1, \dots, a_m)$ les coefficients de ces polynômes, ce sont des éléments de $\bar{\mathbb{k}}$. Soient $\bar{c}$ les coefficients de P .

Soit $\mathbb{k}' := \mathbb{k}(\bar{a}, \bar{b}, \bar{c})$, c'est un corps fini. On a $P : \mathbb{k}'^n \rightarrow \mathbb{k}'^n$ injectif pas surjectif, qui est impossible d'après le lemme précédent. $\square$

On peut maintenant montrer le théorème d'Ax–Grothendieck.

Pour un degré d fini et un entier n fixé, on va construire la formule $\phi_{n,d}$ qui exprime qu'un polynôme de degré $\leq d$ de $\mathbb{k}^n$ dans $\mathbb{k}^n$ qui est injectif et surjectif. Soit $M(n, d)$ l'ensemble fini des monômes unitaires de degré $\leq d$ avec n variables $x_1, \dots, x_n$:

$$M(n, d) := \{1, x_1, x_2, x_1x_2, \dots, x_1^d, x_1^{d-1}x_2, \dots\}.$$

On introduit la formule suivante, qu'on note $\varphi_{n,d}$.

$$\begin{aligned} & \forall (a_{m,i})_{m \in M(n,d), i \in [1,n]} \\ & \left(\forall x_1 \dots x_n \forall y_1 \dots y_n \bigwedge_{i=1}^n \sum_{m \in M(n,d)} a_{m,i} m = \sum_{m \in M(n,d)} a_{m,i} m [x_j := y_j]_{j \in [1,n]} \rightarrow \bigwedge_{i=1}^n x_i = y_i \right) \\ & \quad \downarrow \\ & \forall y_1 \dots y_n \exists x_1 \dots x_n \bigwedge_{i=1}^n y_i = \sum_{m \in M(n,d)} a_{m,i} m. \end{aligned}$$

Par le troisième lemme, pour tout corps fini $\mathbb{k}$, on a $\bar{\mathbb{k}} \models \varphi_{n,d}$ donc pour tout p premier, on a $\bar{\mathbb{F}}_p \models \varphi_{n,d}$. Par le premier lemme, il existe donc $\mathbb{k}$ de caractéristique 0 telle que $\mathbb{k} \models \varphi_{n,d}$. Par la complétude de la théorie des corps algébriquement clos, on a que $\mathbb{C} \models \varphi_{n,d}$.

Conjecture de la Jacobienne (1939).

C'est une question encore ouverte. On reçoit plein de preuves fausses.

Définition 5.7. Soit $P : \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ un polynôme. Son *jacobien* est le déterminant de la matrice jacobienne

$$\text{Jac } P = \left| \left(\frac{\partial P_i}{\partial x_j} \right)_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n} \right|.$$

C'est un polynôme.

Proposition 5.2. Si P est injectif sur $\mathbb{C}^n$ alors P est localement injectif. Et donc, pour tout x (théorème des fonctions implicites), $\text{Jac}(P)$ n'est jamais nul, d'où le fait que $\text{Jac } P$ est un polynôme constant non nul.

Remarque 5.4 (Conjecture (problème 16 de la liste de Steve Smale)). En caractéristique 0, $\text{Jac } P$ non nul implique P injectif.

Remarque 5.5. En caractéristique p , c'est faux : $P(x) := x - x^p$ est non-inversible et $P'(x) = 1 - px = 1$.

Exemple 5.11. ▷ Avec $n = 1$ et $d = 1$, on considère

$$\begin{aligned} P : \mathbb{C} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ x &\longmapsto P(x) := ax + b. \end{aligned}$$

On a $\text{Jac } P = a$ et, $a \neq 0$ implique P injectif.

- ▷ Avec $n = 1$ et $d = 2$, on considère

$$P : \mathbb{C} \longrightarrow \mathbb{C}$$

$$x \longmapsto P(x) := ax^2 + bx + c.$$

Si $\text{Jac } P = 2ax + b$ est non nul, alors $a = 0$ et $b \neq 0$. C'est le cas précédent !

- ▷ Avec $n = 2$ et $d = 1$, on considère

$$P : \mathbb{C}^2 \longrightarrow \mathbb{C}^2$$

$$x \longmapsto P(x, y) := (ax + by + c, dx + ey + f).$$

On a $\text{Jac } P = \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix} = ae - bd$. On a $\text{Jac } P$ non nul implique $ae - bd \neq 0$ ce qui implique que le système

$$\begin{cases} ax + by + c = 0 \\ dx + ey + f = 0 \end{cases}$$

est inversible, donc la conjecture est vraie.

On a montré quelques résultats partiels :

- ▷ pour $d \leq 2$ en 1980 ;
- ▷ pour $d \leq 3$ dans le cas général.