

CHAPITRE 16

Dérivation

Hugo SALOU MP2I

Dernière mise à jour le 23 février 2022

Table des matières

I	Définition et premières propriétés	2
II	Théorème de Rolle et accroissements finis	5
III	Dérivées n -ièmes	8
IV	Fonctions à valeurs complexes	11

Première partie

Définition et premières
propriétés

Dans ce paragraphe, f désigne une fonction définie sur un intervalle ouvert non vide I à valeurs réelles.

Definition

Soit $a \in I$. On dit que f est dérivable en a si $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ a une limite qui est finie quand $x \rightarrow a$.

Dans ce cas, cette limite est notée $f'(a)$ et est appelée nombre dérivée de f en a

On dit que f est dérivable sur I si f est dérivable en tout $a \in I$.

L'application $\begin{matrix} I \longrightarrow \mathbb{R} \\ a \longmapsto f'(a) \end{matrix}$ est la dérivée de f et est notée f'

Proposition

f est dérivable en $a \iff f$ a un développement limité d'ordre 1 au voisinage de a

■

Proposition

Si f est dérivable en a alors f est continue en a .

■

Proposition

Soient f et g dérivables en a

1. $f + g$ est dérivable en a et $(f + g)'(a) = f'(a) + g'(a)$
2. $f \times g$ est dérivable en a et $(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a)$
3. Si $g(a) \neq 0$, alors $\frac{f}{g}$ est dérivable en a et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{(g(a))^2}$$

■

Proposition

Soit f dérivable en a et g dérivable en $f(a)$. Alors, $f \circ g$ est dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = g'(f(a))f'(a)$$

■

Proposition

On suppose que f est bijective dérivable en a et $f'(a) \neq 0$. Si f^{-1} est continue,

alors f^{-1} est dérivable en $f(a)$ et

$$(f^{-1})'(f(a)) = \frac{1}{f'(a)}$$

■

Deuxième partie


**Théorème de Rolle et
accroissements finis**

Théorème**Théorème de Rolle**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$. On suppose que $f(a) = f(b)$.

Alors,

$$\exists c \in]a, b[, f'(c) = 0$$



■

Définition

On dit que f présente un maximum local en a s'il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in]a - \eta, a + \eta[, f(x) \leq f(a)$$

et un minimum local en a s'il existe $\eta > 0$ tel que

$$\forall x \in]a - \eta, a + \eta[, f(x) \geq f(a)$$

Un extremum local est un minimum local ou un maximum local.

Proposition

Soit $a \in I$ tel que $f(a)$ est un extremum local de f où f est dérivable en a .

Alors, $f'(a) = 0$ □

Définition

Soit f dérivable et $a \in I$. On dit que a est un point critique de f si $f'(a) = 0$.


On dit que $f(a)$ est une valeur critique

Théorème**Théorème des accroissements finis**

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.

Alors, il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c)$$



■

Proposition

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable avec I un intervalle non vide.

1. f est croissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \geq 0$
2. f est décroissante sur $I \iff \forall x \in I, f'(x) \leq 0$
3. $\forall x \in I, f'(x) > 0 \implies f$ strictement croissante
4. $\forall x \in I, f'(x) < 0 \implies f$ strictement décroissante
5. f constante $\iff \forall x \in I, f'(x) = 0$

■

Théorème**Théorème de la limite de la dérivée**

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue (sur I), $a \in I$. On suppose f dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et que $\lim_{x \xrightarrow[\neq]{a} a} f'(x)$ existe.

Alors,

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \xrightarrow{x \xrightarrow[\neq]{a} a} \lim_{x \xrightarrow[\neq]{a} a} f'(x)$$

■

Proposition

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. On suppose qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in I, |f'(x)| \leq M$$

Alors f est M -lipschitzienne sur I .

■

Troisième partie

Dérivées n -ièmes

Definition

On dit que f est une fois dérivable si f est dérivable. Dans ce cas, on note $f^{(1)}$ la fonction f' .

Pour $n \in \mathbb{N}_*$, on dit que f est dérivable n fois si f est dérivable $n - 1$ fois et $f^{(n-1)}$ est dérivable une fois. Dans ce cas, $f^{(n)} = \left(f^{(n-1)}\right)'$.

Remarque *Convention*

$$f^{(0)} = f$$

Definition

f est de classe \mathcal{C}^n si f est dérivable n fois et $f^{(n)}$ est continue.

Proposition

Soit f dérivable n fois et $k \leq n$.

Alors f est dérivable k fois et $f^{(n)} = \left(f^{(k)}\right)^{(n-k)}$

□

Proposition

Soit f et g deux fonctions dérivables n fois en a .

Alors, $f + g$ est dérivable n fois en a et

$$(f + g)^{(n)}(a) = f^{(n)}(a) + g^{(n)}(a)$$

Si f et g sont de classe \mathcal{C}^n , alors, $f + g$ est de classe \mathcal{C}^n

■

Proposition**Leibniz**

Soient f et g dérivables n fois en a . Alors, $f \times g$ est dérivable n fois en a . et

$$(*) : \quad (f \times g)^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(a) g^{(n-k)}(a)$$

Si f et g sont de classe \mathcal{C}^n alors $f \times g$ est de classe \mathcal{C}^n .

■

Proposition

Soient f et g dérivables n fois (resp. de classe \mathcal{C}^n). On suppose $g(a) \neq 0$.

Alors, $\frac{f}{g}$ est dérivable n fois (resp. \mathcal{C}^n) en a .

■

Proposition

Soit f dérivable n fois en a et g dérivable n fois en $f(a)$ (resp. f et g de classe \mathcal{C}^n).

Alors, $g \circ f$ est dérivable n fois en a (resp. de classe \mathcal{C}^n). ■

Definition

On dit que f est de classe \mathcal{C}^∞ si f est de classe \mathcal{C}^n pour tout $n \in \mathbb{N}$, i.e. f est dérivable une infinité de fois.

Proposition formule de Taylor avec reste intégral

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^{n+1} et $a \in I$. Alors

$$(*) \quad \forall x \in I, f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k + \int_a^x f^{(n+1)}(t) \frac{(x-t)^n}{n!} dt$$
■

Proposition Inégalité de Taylor-Lagrange

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe \mathcal{C}^{n+1} et $M \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in I, \left| f^{(n+1)}(x) \right| \leq M$$

Alors, pour tout $a \in I$,

$$\forall x \in I, \left| f(x) - \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq M \frac{|x-a|^{n+1}}{(n+1)!}$$
■

Quatrième partie

Fonctions à valeurs complexes

Definition

Soient $f : I \rightarrow \mathbb{C}$, (I intervalle de \mathbb{R}) et $a \in I$.

f est dérivable en a si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \in \mathbb{C}$

Proposition

f est dérivable en $a \iff \Re(f)$ et $\Im(f)$ sont dérivables en a

Dans ce cas, $f'(a) = \Re(f)'(a) + i\Im(f)'(a)$

□

Proposition

La somme, le produit, de fonctions dérivables sont dérivables ; le quotient également si le dénominateur ne s'annule pas.

□

Proposition


idem avec les dérivées n -ièmes

□

Remarque

Attention ⚠

Le théorème de Rolle n'est plus vraie.



$$\begin{aligned} f : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{C} \\ t &\longmapsto e^{it} \end{aligned}$$

$$f(0) = f(2\pi) = 1$$

f est continue sur $[0, 2\pi]$ et dérivable sur $]0, 2\pi[$

$$\forall t, f'(t) = ie^{it} \neq 0$$

Proposition

La formule de Taylor avec reste intégral et l'inégalité de Taylor-Lagrange sont aussi vrais dans \mathbb{C} . \square