Fórmulas

Teoría de Conjuntos III, 2026-2

Profesor: Luis Jesús Turcio Cuevas.
Ayudante: Hugo Víctor García Martínez.

La siguiente lista de fórmulas son (equivalentes a una fórmula) Δ_0, y por tanto, son absolutas para clases transitivas.

i) $x = 0$.

ii) $0 \in x$.

iii) $x = \{a, b\}$.

iv) $x = (a, b)$.

v) $x \subseteq y$.

vi) x es transitivo.

vii) x es ordinal.

viii) x es límite.

ix) x es natural.

x) x es inductivo.

xi) $x \subseteq \omega$.

xii) $x = \omega$.

xiii) $x = \bigcup a$.

xiv) $x = \bigcap a$.

xv) $x = a \cup \{a\}$.

xvi) $x = a \cup b$.

xvii) $x = a \cap b$.

xviii) $x = a \setminus b$.

xix) $x = a \times b$.

xx) R es relación.

xxi) R es relación transitiva.

xxii) R es relación simétrica.

xxiii) R es relación reflexiva.

xxiv) R es relación asimétrica.

xxv) R es relación tricotómica.

xxvi) R es orden parcial en P.

xxvii) R es orden parcial irreflexivo en P.

xxviii) R es orden parcial en P y xRy.

xxix) R es orden parcial irreflexivo en P y xRy.

xxx) R es orden total en P.

xxxi) R es orden total en P y xRy.

xxxii) f es función, denotado $\mathrm{fun}(f)$.

xxxiii) $\mathrm{fun}(f)$ y $y = \mathrm{dom}(f)$.

xxxiv) $\mathrm{fun}(f)$ y $y = \mathrm{ima}(f)$.

xxxv) $\mathrm{fun}(f)$ y $y = f(x)$.

xxxvi) $\mathrm{fun}(f)$ y $g = f \restriction A$.

xxxvii) $\mathrm{fun}(f)$ y f es sobreyeciva.

xxxviii) $\mathrm{fun}(f)$ y f es inyectiva.

xxxix) $\mathrm{fun}(f)$ y f es biyectiva.