



Informação sobre Protocolo Clínico da Lira e da aplicação mobile da Lira

Avaliação de PHDA e Autismo em Mulheres Adultas.



O problema clínico

Muitas mulheres no espectro do autismo passam anos sem diagnóstico, em parte porque desenvolvem estratégias de *camouflaging* (camuflagem social) que escondem os sinais mais clássicos.

A apresentação feminina pode ser mais subtil e difícil de identificar na avaliação clínica.

Beck, Lundwall, Gabrielsen, Cox, & South, 2020, Looking good but feeling bad: "Camouflaging" behaviors and mental health in women with autistic traits, Autism, 24(4), 809–821; PMID: 32429817.

Impacto clínico frequente

Mulheres frequentemente apresentam:

- burnout
- ansiedade
- depressão
- sensação persistente de falha pessoal
- diagnósticos errados ou tardios

Desafios na avaliação clínica

Desafios frequentes na avaliação:

- utilização de múltiplos instrumentos e fontes de informação
- ausência de um protocolo estruturado que integre todos os dados
- variabilidade na organização da avaliação entre profissionais
- dificuldade em captar apresentações femininas ou mais subtis

Desafios na avaliação clínica

Complexidade do processo



- utilização de múltiplos instrumentos
- múltiplas fontes de informação clínica

Variabilidade clínica

- ausência de um protocolo estruturado que integre a informação
- dificuldade em captar apresentações femininas


IDENTIFICAÇÃO

App: ajuda mulheres a reconhecer sinais, validar a sua experiência e ser **agente ativo** no seu processo terapêutico.



AVALIAÇÃO


Protocolo Clínico: apoia profissionais de saúde a avaliar com maior rigor e com conhecimento atualizado em neurodivergência na mulher.



Endgame


Transformar a experiência de identificação

De confusa, tardia e solitária → para clara, informada e apoiada



App

- Reconhecimento de sinais
- Autoconhecimento e empoderamento
- Acompanhamento no dia a dia




Protocolo Clínico

- Mais rigor
- Maior especificidade

O Protocolo Clínico Lira

Um protocolo estruturado para avaliação de PHDA e Autismo em mulheres adultas, combinando anamnese clínica estruturada com questionário clínico, cuja análise gera um perfil dimensional organizado segundo critérios DSM-5-TR.



Perfil Dimensional

O perfil dimensional organiza as respostas do questionário em domínios clínicos relevantes para formulação clínica, diferenciação e compreensão do impacto funcional, incluindo:

- comunicação & padrões CRR
- fatores associados e impacto funcional
- sintomas nucleares de PHDA (desatenção e hiperatividade/impulsividade)
- estratégias de masking e adaptação social

A plataforma apresenta também:

- impacto funcional
- sinais clínicos principais
- alertas clínicos para apoiar a integração com a anamnese e o juízo clínico.

Integração com critérios DSM-5-TR

A plataforma mapeia as respostas do questionário para os critérios DSM-5-TR de PEA e PHDA, apresentando indicadores de suporte para cada critério que apoiam a leitura clínica.

PEA - Perturbação do Espectro do Autismo

- A: comunicação e interação social
- B: padrões restritos e repetitivos
- C: início no desenvolvimento
- D: impacto funcional
- E: exclusão de déficit intelectual

PHDA - Perturbação de Hiperatividade e Déficit de Atenção

- sintomas de desatenção
- hiperatividade / impulsividade
- presença de sintomas antes dos 12 anos
- impacto funcional
- sintomas presentes em ≥ 2 contextos
- exclusão de outras condições

A interpretação diagnóstica requer sempre integração com a anamnese clínica e o juízo clínico.

Como melhora a prática clínica

Processo atual	Com o Protocolo Lira
5–6 consultas	potencial para reduzir o número de consultas
~3 horas de relatório	potencial para reduzir o tempo de integração e relatório
Apresentações femininas podem passar despercebidas na avaliação	Organização estruturada dos critérios DSM-5-TR para PEA e PHDA
Sem protocolo standard (alta variabilidade)	Estruturado, consistente e completo
Comunicação manual (e-mails entre sessões)	Emails automáticos e personalizados
Questionários offline	Experiência de preenchimento online e guiada

Mais rigor clínico, menos tempo de avaliação e maior capacidade de identificar perfis femininos frequentemente subavaliados.

Fluxo da avaliação

